





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4865/A

4865/A A. XIX. P

Z. 9

6

8

...

...


...

...

...

97. 100
100. 100
100. 100

1K
18A



68492

Pauli Aeginetæ,
MEDICINÆ TO
TIVS ENCHIRI
DION,

SEPTEM LIBRIS VNIVERSAM RE-
ctè medendi rationem complectens,
nuncq; denuò multo quàm antea & e-
mendatius, & forma artis huius stu-
diosius commodiorem in lu-
cem editum.

ALBANO TORINO VITO-
durenfi interprete, ex postrema eius
recognitione.

Accessit rerum & uerborum toto opere
memorabilium locupletiss.
Index.

Cum Cas. M. priuilegio ad quin-
quennium.

BASILEAE.

PAVLVS EGINE
ta de se.

Nos lege, qui magni cupis aurea scripta Galeni,
Tramite difficili non remorante sequi.
Illius æquarunt immensa uolumina uires,
Omnia sed cursu nos breuiore damus.

nos lege qui magni cupis aurea scripta Galeni,

Tramite difficili non remorante sequi.

REVERENDISSIMO

in Christo patri ac Domino, D. Sebastiano Ser-
ma, Monasterij apud D. Ergauia Vrbantum
Abbati, omnib. regijs uirtutibus insigni, domi-
no suo summe obseruando, Alba-
nus Torinus S.



A mihi cum amplissi-
ma Celsitudine tua lu-
stris ab hinc quinque,
quum isthic essem, in-
tercessit familiaritas at
que necessitudo: ita me
incomparabili comitate, beneuolentia,
literarum ac uirtutum tuarum ornamen-
tis, uitaq; qua facile regnas, integritate
deuinxisti, summa ueneratione dignis.
Pater, ut tametsi haftenus nunquam mi-
hi contigerit faciem intueri tua, nullum
tamen neq; temporis neq; loci interual-
lum, nulla neq; priuata neq; publica, ne
que aulica deniq; ac ducalia (quib. con-
tinenter distringor) negocia, unquam tui
memoria potuerint expectorare. Quin
alta mente reposta, tua immensa in me
officia iugiter permanent. Admonet us-
que me tui, ac ueluti totum ante oculos
ponunt, litera tua perelegantes, & car-
mina mire pura, docta, arguta, & plane
Apollinea, abste iam olim exarata: in
quibus

EPISTOLA

quibus optimam tui partem animum, sic
 expressum conspicio, ut nullus Apelles
 corporis effigiem repraesentare queat e-
 uidētius. Viebar autem eo tempore con-
 suetudine tua multum. Coniunctissimē
 quippe & amantissimē mecum uixeras,
 & iucundē de omni disciplinarum gene-
 re identidem diserebas, eoq; à latere tuo
 nunquam discedebam. Plurima itaq; à
 te prudenter disputata, plurima etiā bre-
 uiter & commodē dicta memoriæ man-
 dabam: fieriq; studebā tua singulari pru-
 dentia doctior, utpote quo nemo ea æ-
 tate mihi uidebatur nec sapientior, neq;
 prudentior. Tuq; uicissim meam etiam
 qualem cunq; exilitatem, summa animi
 uoluptate semper uisus es exosculari, q;
 uidebar tibi ad bonas artes præclara ie-
 cisse fundamenta, utriusq; literaturæ pri-
 mordijs haud infeliciter ea adhuc ætate
 degustatis. Eoq; in nihil non præclarū
 de meo profectu expectabas. Spem ipse
 tuam fefellerim, an uicerim, mea monu-
 menta qualiacunq; testabūtur. Quorum
 hic unum augustissimo nomini tuo, ceu
 manifestarium aliquod gratitudinis sym-
 bolum, consecrare uisum est, ut uigiliæ
 nostræ gratiam maiorem, ac splendoris
 non

N V N C V P A T O R I A .

non parum apud lectorem assequatur,
 sub inclyti nominis tui præfatione uelu
 ti munite, in publicum edite, & quasi mu
 tui ueteris nostri amoris redintegratio
 existant. In quo suscipiendo, si regiū Ar
 taxerxis animum præstabis, abūde mihi
 satisfactum existimabo: neque pigebit,
 maiora sub nominis tui auspicijs (nimirū
 foelicibus) in lucem edere. Spes est quip
 pe haud parua, ita cum primis candido
 lectori probatum iri lucubrationunculas
 nostras, si tu quidem eas animo haud in
 grato susceperis, unice studiorum & stu
 dioforum Meccenas. nullo nāq; alio uer
 bo nec breuius, nec absolutius, tuū istud
 tam singulare in literas ac literatos om
 nes studium, tuorumq; summam præco
 niorum comprehendam. Qui utiq; unus
 multa eruditione (ut cætera præteream)
 cum miro uitæ candore coniuncta, bo
 nam Abbatum partem lōgè lateq; supe
 ras. Quam hominū de te pulcherrimam
 opinionem, non modò frequentes illi,
 quos monachis tuæ curæ creditis, docto
 res hætenus præfecisti, (qui animum co
 rundem optimis tum morib. tū discipli
 nis imbuant) uiri undecunq; doctissimi
 satis declararunt: uerū, quod quidem
 æ 3 longè

E P S T O L A

lōgè præstātis. duco, tui etiā præconiū fa-
tis magnam fidē facit, quod tu cum pau-
cis Germaniæ Abbatib. (fermè dixerim,
ex omnibus solus) tua sponte caues, ne
bona ecclesijs hinc inde tuis dicata dila-
pidentur: sed quo in longè pietissimū
usum cōferantur, omnia moliris. nullis
quippe sumptibus parcis, quo minus iu-
venes tui cœnobij, tuæ fidei commissi,
bonis literis cū sacris tū prophanis ita
instituantur, ut illorū aliquis in republi-
ca Christiana ingrauescēte pastorum pe-
nuria usus esse possit. Videmus enim,
proh dolor, hodie statum reipub. Chri-
stianæ, nescio quorum culpa, ita habere,
ut ecclesiæ passim aliquot Parochis de-
stituantur: nisi ē monasterijs, tanquam
ex scholis sacris, qui illis verbum Dei
prædicent, ministri fideles mitterentur.
Proinde Celsitudo tua pro sua singulari
prudētia intelligit, cœnobia olim non
in hoc maximis sumptib. extructa, ut il-
lic saginentur tantum, veluti in hara por-
ci, hominū corpora: sed magis, ut in his
ad usum reipublicæ Christianæ maximè
utilem foueantur uiri haud uulgarī do-
ctrina, equitate, prudentia, & pietate in-
signes. Sed nolo tuarum laudum enco-
miū

N V N C V P A T O R I A.

mium (cui scio q̄ nō sufficiam) in episto-
la, scriptorū more conscribere, qui bonā
præfationis partē, laudibus eorum quib.
suas nuncupant uigilias, occupant: hoc
ueræ uirtutis præmium arbitrati, ut eius
memoria posteritati isthac ratione conse-
cretur. Mihi uerò, tametsi citra fucū lau-
dandi cāpus pateat: quoniam aut et mea
simplicitas ab omni blandiloquentiæ spe-
cie est alienissīma, et tua singularis mode-
stia ab omnibus eiusmodi laudibus ue-
hementer abhorret: his prætermis̄sis, de
Aegineta pauca quædam adiiciam.

Paulus Aegineta illustris & compen-
diosissimus medicinæ scriptor, artis me-
dicæ peculiaria problemata omnia hac
Epitome perstrinxit, in quib. omnes me-
dicinæ partes, quantum compendio fie-
ri potuit, perspicuè, miro ordine & artifi-
cio docentur: unde nostræ ætatis homi-
nes medendi rationem, quam Practicē
uocant, breui condiscant. Congessit au-
tem ex antiquis excellentibus medicis,
tanquam flosculos, in hanc epitomen.
Neq; de suo quicquā, præterquā pau-
ca, quæ in operibus artis ipse obseruauit,
& expertus est, addidit. quemadmodū
ipse in præfatione sua pulchrè testa-

EPISTOLA

tur: ex qua omnia plenius hauries. Aui-
 cenna Arabicæ familiæ princeps, hunc
 authorem, in his quæ ad curationes, &
 præcipue ad partem chirurgicam spectant,
 secutus est. Allegatur à priscis simpli-
 citer Pauli nomine. Galeni simia haud
 iniuria à quibusdam appellatur. Sunt
 qui eum Actio uetustiorē, aut eius tem-
 poris fuisse autument. Nec defunt, qui
 scholis eundem nostris accommodatio-
 rem, propter compendium, ordinem, &
 artificium contendunt. Hunc tam excel-
 lentem medicinæ scriptorem, olim pri-
 mus (etiam si rumpanitur illa Codro) la-
 tinitate, in maxima temporis angustia
 & præcipitantia, ex unico uitiolissimo
 exemplari, utcumque donauit. Nunc ue-
 rò maiore tandem cura et fide totum de-
 integro, codicibus Græcis emendatori-
 bus, et ueritatis ipsius acriore iudicio ad-
 hibitis, recognoui, ac nitori denique suo
 tantum non ad unguem restitui. Restāt
 quippe nonnulla, quæ nec mihi faciunt
 satis: quibus de, si posthac compertius
 quippiam, uel posterior cogitatio (δευτέ-
 ρων ἢ ἀμεινόντων, iuxta prouerbiū) uel ube-
 rior meliorum exemplarium copia, uel
 amicorum admonitio suppediet, pali-
 nodiam

N V N C V P A T O R I A .

nodiam canere nequaquā pudebit. Qua
in re si quispiam me prauenerit, meaꝓ
uel castigauerit, uel meliorē, ut futurum
auguror, uersionem attulerit, tantum a-
berit ut ægrè feram, ut etiam illi gratiam
habiturus sim maximam. Quemadmo-
dum equidem eorum qui talia molitūtur,
diligentiā commendo, ita felicitatem
suspicio, qui ne in scriptis suis Moino
carpendum quippiam reliqui fiat, præ-
stare possunt. mea quippe tenuitas istud
ne per somnium quidem polliceri ausit:
in hoc potissimum scripti genere, quod
calumnijs est præ cæteris obnoxium: at
que hac ætate, in qua nihil à uilitigato-
ribus tutum, cauillis & mordicibus om-
nia patent. Hos igitur qualescunꝓ labo-
res nostros C. T. tanquam tutelari numi-
ni, cū memoratis, tū hoc potissimum
nomine offerimus, ut debita beneuolen-
tiæ memoria gratiam aliquam literato
munusculo reponamus. Dominus Iesus
seruet ac prosperet uitam tuam omnem,
unicum Abbatum decus: Albanumꝓ
tuum à longo iam tempore, toto pecto-
re tibi addictum, ames, foueas, ac tuca-
ris. Ex Monte Plusiaco. Pridie Calend.
April. Anno M, D, X L V I.

α 5

PAVLI

PAULI AEGINETAE RERVM
memorabilium Index.

A	Bdominis mēbranæ uul	ex Acinis uinaceis malagma
nera	468	732
abies	574	aconitum 555
ex Abiste acopum	736	aconiti potus 416
abietina resina	620	acopa ungenta 720. 732. di-
ad Abrasa	332	uersi generis 733. 734
abrotoni iur	550	acorum, acorus 559. 555
abscessus	450. 451. 453	acrides 555
abscessibus corporis exterioribus. 335. rēpendis. 336		acrochordon 333. 438. 502
emplastrum 704. 714		actē. 555 adarce. 552. 736
absinthium	564	adiantum 22. 552
absinthij dilutio ebrietatem		adipis esus 55
arceri	60	adipes diuersorum animalium 626 adxon 553
acaetia 554	pastillus 679	agilops. 172. 552 oculi. 442
acalis. 554	acalyphe. 554	Aegyptia faba 51
acantha	554	Aegyptia ori inseruiēs. 688
acanthobole	449	peſsus 750
acanthus, acanthes, acanthi		agyros 552
um	554	equinoctium uernum et autumnale 65
accipitrum fel	618	æra 554
Aceratus Galeni	712	ær salubris, aut uitiosus, cuiusmodi 25
acetabulum	760. 761	æris corruptio, eiusdēq; correctio 102. 103
acetum	611	areoli 760
aceti fex	652	æ crematum. 616 eiusdem emplastris inferendi ratio 721
ex Achate lapide emplastrū		æris flos. 636 squama. eod. modo 599 quomodo ad emplastra
710		
achor. 131. ad achoras medicamenta. eod. inde		
achoræ	613	
achras. 564	achrades. 357	
acinorum uux nucleī	569	

INDEX.

- plastra coquendus. 721
 ærugo 582
 æruginis emplastro inferens
 de ratio 722
 æstate quali uictus ratione
 utendum 28
 æthiopis herba 553
 ætonychos 552
 602 agallochum 551
 Agapeti antidotus 67
 agaricum. 551 eius sumptio
 uenenosa. 424. usus
 642 ageraton 551
 ageratus lapis 198
 agninus pulmo 616
 agnis 553
 agnus 551 agrostis 551
 aiuga 636 aizoon 552
 alabastritæ cinis 601
 Alana gleba 569
 ad Alarum graueolentias et
 sudationes 219
 alauda avis 594
 albugines 178
 alcaea 555
 alcibiadios 552.578
 alcioniorum genera 556
 Alexandri cyphoides 668
 ex Albucis emplastrum 704
 Alexandria herba 571
 alica 50 alicacabum 627
 alimentorum facultates 46
 alypi seminis usus 643
 allium 49.625
 ally eius contra uiperæ mor-
 sum saluberrimus 401
 ex Allyis ruptorium empla-
 strum 705
 alme 556
 ex Alno acopum 736
 aloë 556 ex purgantib. so-
 la stomacho amica. 640
 ex aloë catapotia 645
 aloë quando emplastris inde
 da 724
 aloes usus 639.640.641
 ex Aloe collyrium 698
 alopecia 124.125
 alopex 557
 alphi 593.610 candidi et
 atri 326.327
 alfine. 556
 alterationis procluitas uir-
 tuti magis quam uitio ad
 scribenda 26
 altercui 633. eius usus. 414
 althæa 555. inde empla-
 strum 706
 circa Aluum astrictam aut lu-
 bricam in febr. quæ ob-
 seruanda 118
 aluum quæ subducant bene-
 ualentibus 22
 alui excrementa, at q. hinc
 prasagia 88
 alumen scissile 627. rotun-
 dum & stragalotes cod.
 placitis. plinibitis 628
 aluminis emplastro inferens
 di ratio 722
 aluminis

INDEX.

aluminis uires	627	amurca	358
alypiae	643	amygdalinum oleum	742
alypij semen	556	amygdala. 53 amara	558
alyson 556. eius usus. 643		dulcia eod.	
amaracus	557	ex Amygdalis amaris pastil	
amaracini olei compositio.	745	lin. 676 amyllum	558
amarantium	557. 575	amylus panis	50 (709)
amaurosis	182	Amythaonis emplastrum.	
Amazonum pastillus	675	anabrochismus	436
ambe spatula	536	ex Anacardijs Theodoretus.	
amblyopia	182. 179	667 anagallis	559
ambrosia 557. 566. arce		anagyris	559
diu febribus	732	anacollemata	692
ad Ambusta 330. ut pilires		anarrbinon	560
nascantur	332	anasarca	253. 643
amiantum	557	anchilops	172
ammonia 50 ammi. 557		ex Anchusa emplastrum.	708
ammoniacae guttae emplastrum		anchusae species	551
Aris inferenda ratio. 723		ancyle, ancylotes	380
ammoniaci thymiana. 557		ancylum	446
eius usus	645	ancylloglosson	446
ammos	557	andrachne	559
amomum	559	andronius pastillus	677
amore insanientium morbus		androsarcei	559
et remedia	356	androsamon	559. 633
ampelitis	469	anemone	559
ampeloleuce	558	anethina	712 (740)
ampeloprasa 49. ampelo		anethini olei preparatio	
prasum	558	anethum 559 eius deco	
ampelos agris 558. heme		Elum	107
ron. eod melena 558		aneurysma. 374. 454. 467	
amphibena morsus	402	angina, eiusq. differentia.	
	199	angiolo	

INDEX.

angiologia	429	tia. cod. procidentia. 272
ad Angylus emplastrū.	709	ani perforandi ratio. 498
angylosis	739	aparine 560
anguis exuuie	569	apechema 509
anhelosis medendis	206	aperientia medicamēta. 184
anicetos emplastrum	713	Aphace. 563 aphrodes. 606
animalium pedestrium caro		aphrodisiasticon clidiō. 675
nes 54.	partes. 55	aphroditarium 682
animi defectio	120	aphronitrum 563
anisi semen	560	aphroselinus 602
anisotachys pulsus	78	aphtha. 5 apiastrum. 605
anonis. 560	anorexia. 222	apios 560
anni temporum ratio	65	apium. 622 montanum. 612
anserina caro	54	palustre. 575 satium.
adeps	626	48. 582 syluestre. 625
anthemis	636	apy usus 643
anthera. 311	antherū. 683	apum iētib. medendis. 396
anthraces	345	apochyma. 560 quomodo
anthyllis. 2. eius genera. 559		emplastris inserēdū. 723
antiū. 198	antiades. 447	apocymum 560
antidotorum differētia. 655		apollinaris herbæ esus. 414
diuersarum compositio.		Apollophanis malagma.
cod. inde	731	
antirrhinum	560	apomeli 689. 690
antitosis	523	apoplexia 157
antrachosis	179	aposcarnismos 509
antylum	732	appetitus à cibis auersio.
ani condylomata. 498	ri= 222. 665	
mā. cod	(680	aprugnum iecur 580 (633
ad Ani dolores hypothum.		aqua cœlestis optima 26.
ani fistulæ. 495. inflamma		aqua intercus. 252 quomo-
tio. 269 erysipelata. cod.		do educatur 465
dolores. 270. excrecens		aquæ inter cutem utilis pi-
		cro

INDEX.

era	666	Aristophanium emplastrum.	
aqua, in qua ferrum extinguitur	709	armenia terra	53.
etum	623	armeniaceum	561
aqua mulsa	60	armeniaceus lapis	602
aqua salubris aut uitiosa	arnabo. 561	arnoglossu.	562
quæz	(xius 424	arquatus.	258
aquæ haustus quatenus non	ariaba Aegyptia	761	(562
aquæ uitia quomodo corrigenda	26(644	artemisia.	566. eius species
aquæ prolicientia pharmaca	tenuior	374	
aquarum diuersa ratio.	633	arteriæ. 74. earum incisio.	
aquagium purgatorium ex	429	(205	
caryophyllo	645	arteriace hypoglossitis.	204
aquilarum fel	638	arteriacus affectus	201. 203
arabicus lapis	601	arthritis	298
araneæ ictus	397	ad Arthriticos emplastrum.	
aranci muris morsus	399	719	
aranci uires	560	articularis morbus	298
arbutus.	592	articulorum contusiones.	332
arcion.	561	arctium.	561. 565
Argæi montis lapides	601	bulcera.	372
argemõ.	175	argemone.	560
argentæ uiuum.	633	eius	tophi
haustus	423	articulis luxatis	381
argenti recrementa	575	ad Articulos contractos, seu	
argenti spuma.	600. potata.	ligatos.	380. cõuulsos
423		ad Articulos emplastru.	712
arhythmus pulsus quis.	77	artos.	562
Ariobarzantium empla-		asarum.	562
strum	707	ascalobotes	562
aridorum mensuræ	761	ascarides	381. 386
arifarum	560	ascites hyderus	253
aristolochia.	31. eius species	asciten solam inter hydro-	
560	usus	pis species manu operã	
	643	postulare	

INDEX.

postulare	465	rium & sutorium. 604
asclepias. 562. smegma. 684		quomodo emplastris im-
ascyrrhon	559. 633	mittendum. 721. inde aco
aselli	540	pon
asy lapidis flos. 601. inde em		738
plastrum	718	atrebularius humor, sanguis
asininum iecur	580	nis fex
assalathi uires	562	atrimplex
asparagi. 481. petraeus, mya		48. 563
cantharus	562	atrophia
asphalax. 718. asphaltus. 563		180
asphodeli radix	563	attenuatis partibus quomo-
aspidis senectus	569	do medendum
aspidis species. 404. et mor		32
sus. eod. non sine uolupta		attonitus morbus
te letalis	405	157
ex Aspidum cinere empla-		audiendi difficultati medica
strum	714	mentum
asplenium. 563. astaphis. 563		15
aster. 211. 674. Atticus. 344		in Auditorium meatu si qua
563. 566. Magni	697	inciderunt
asthma. asthmatici	205	443
astragalus	563	auditorys meatibus non per
Atactos antidotus	672	uis
athanasia dolorem sedans,		443
ad pleuritidem	662	auditus grauitas. 188. contus
athara. athera	552. (710	sio. eod.
athena ad hulcera sordida.		auellana. 53. 586. inde empla
atheromata	355. 453	strum
atrachelos pulsus	77	718
atractylis	360. 563	auena. 50. 567. eius coquens
atramentum Indicum. 604		da ratio
metallum, eod. scripto-		58
		auium carnes sicca
		55
		auium in cibo facultates. 54
		auricula muris
		556. 608
		auricularia, & de aurium
		dolore
		184. inde
		auripigmentum. 562 eiusde
		emplastris inferendi ratio.
		721
		auripigmenti haustus
		423
		auris collisa
		516
		auris

INDEX.

aures animalium concoctu	735	(405
difficiles	55	basilisci uirus, et morsus.
aures cruore exudantes.	186	batrachos. 197. 565. eius spe
uerminosæ	187	cies 565
auriæ calculis, aut alijs quæ		batus. 565 bdellium eod.
inciderunt extrahendis.	187	bdellij emplastris inferendi
aurium humectationes.	6. 50	ratio. 724. eiusdẽ usus. 643
nitrus aut sibilus.	187	for. bechiũ. 566 bechicon. eod.
des. 621		hulcera, car. tussientibus utile 205
nium excreſcentia	186	bellaria ad renum & uesi-
autumno quali uictus ratio		cæ uitia 671
ne utendum	28	belulcum 504
axillæ adustio	461	besafa 200. 609. 688
azanite acopon	734	beta 47. 48. 630
		betonica 565
B		564 bilem atram purgãtia cuius
Bacharis	729	modi. 643 & quibus po
baion malagma	743	tis. exhibenda. eod. inde
balaninum oleum	564	bilem flauam purgãtia sim
balanus myrpsica	564	placia 639
balauſtiũ. 564		ballote. 396
a Balneo potius liberalior, ne		bilem purgantibus quando
nent inflar	411	utendum. 640. & quibus
balnea calida frigidis salu-		præcipue eod. inde
briora	27	biliosi humoris fluxus in po
balneorum sordes	570	dagra curatio 300
balotes. 565		balsamum. 564
e Balsami succo collyrium.		bisacutiũ. 48 bitumen. 563
699		quomodo emplastris inſe-
balsami unguento immitten		rendum 723
di ratio	739	blatta 623
barbara emplastrum	711	blepharoxylon 173
barbaricum acopum	735	blitum. 48. 566 boleti. 50
basilicum tetrapharmacũ.		bolus Armenius 569
		botanicum emplastrũ. 704
		bothrium

INDEX.

bothriū. 175	botrys. 566	cadmia quomodo emplastris	
bouis talus, & fœmora. 613		inferenda.	722
brachij fractura	522	cadmix species. 583. botryia	
brachialis luxatio	538	tis, placitis. eod.	
branchus	201. 203	ē Cadmid emplastrum. 708	
brassica. 47. 595. canina		cape 49	capa 596
560	(567	calamagrostis	584
barathri. 566	bretanica.	calaminta	584
bromium acopum	734	calamus odoratus	584
bromus	567	phragmites. eod.	
branchoccele	455	calcanei attritiones ē longo	
bruchi	584	decubitu	312
bryon thalassion	567	calcaneorū rimæ. 311. 708	
bryonia. 567. eius cymæ. 49		calculus renū et uesticæ. 239	
uires	558	calculi in uestica, aut renib.	
bubo. 343	ad bubonesema	signa	475
plastrum	716	calculi excindēdi ratio. 474	
bubonium	344. 563. 566	475	(669
bubonoccele	262. 484	calculo laborantib. oxymel	
bubula caro	55	calida intemperies quomo-	
bubulum fel	637. sterCUS.	do emendetur	41. 42
593	a deys	626	caligatio 182
buccellatus catharticus. 646		calliblephara	174
buccinorum testa. 589. 613		callionymi fel	637
buglossum	566 (417	callus	312. 495
bulbus. 566. 49 syluester		calli fracturariū excreSCeNa	
bulimos. 115	bunium. 566	tia. 531 concretio. eod.	
638	buphthalmon. 566	callos adimentia	376
buprestis potus	412. 566	caltha	24
butyrum	566	caluaria fractura multiplex	
		509. eius curatio. 511. inde	
Cacalia. 584	cachexia 252	calx. 631. eius haustus	423
caclis,	625	ē Calce lixiuum	592
		β	calyx

INDEX.

calyx	232	capillity tinctura	127 an
cameli cerebrum	573. lotis	ro similis	129
um	613	capillorū glutinamentū.	175
cameratio	508. 509	ad Capillorū profluuiū.	127
campe, bruchi	584	capillorum uitia	124. 126
canabrosis	208 (cod.	capillos augens & nigrio.	
canamū 583.	eius radix.	res reddens aqua	126.
cancer	348. 463	capillos extenuantia	127
cancer immedicabilis mor-		capistrum	517
bus Hippocrati	316	capito marinus pisc.	58
cancrorum cinis	585	capnion 585 capnos. cod.	
canis arcendis	128	capnistos trochiscus	205
canis rabiosi hepar	579	capparis 48 radix.	585
morsus 592 quomo-		caprea fel. 628 sanguis	554
do cognoscendus	393	caprificus	719. 628
ad Canum morsus empla-		caprillus adeps. 626 caro	55
strum 7to non rabi-		cornu. 588 fel. 637 he	
entium	395	par. 57. lotium. 613 san	
canina appetentia	115	guis 551 stercus. 593	
canini stercoris usus	200	& Caprino stercore mala	
231. 592		gma 730 (gantia 23	
cannabis semen	585	caput per os & nares pur-	
canopum	585	capitis ad ustio in lippientia	
cantharides	584	bus & elephātiāsi. 427	
eorum haustus	411	capitis dolor, cephalalgia.	
capillatio	509. (126	132 ex calore, aut frigo	
capilli quibus conferuntur.		re. 132 ex biliosis humori	
quomodo cirrati reddan		bus. 134 per consensum.	
tur. 127 & nigri. 128 ruf		cod. ex ebrietate. 135 ex	
si quomodo tingantur et		iētu. cod. in febribus. 109	
flauescūt. 128 item nigri.		capitis exanthemata, bulcu	
cod. ut candidi reddan		scula densa et rubra. 130	
tur	129	manantia 131 ficosa. 132	
		capitis	

INDEX.

capitis figuratio	35	586	
capitis fractura	308 eius	cartilaginosa concoctu difa	
differentia. cod. inde. me		ficilia	55
dendi ratio	511	cartilaginosi pisces	59
capitis morborum praesagia		carya	586
63		carynon oleum	743
capitis pediculatio	132	caryophyllon	586 ex eo
capiti conueniens puluis	682	dem aquagium purgato	
carbunculus oculi	179	rium	645
carbunculi	334.345.347	caseus	632 eius esus 57
ad Carbunculos emplastrum.		cassamon	586
716		castia	586
carcino des strumae	452	castaneae	54 glandes
carcinoma oculi	179	Sardoniae	418
cardami semen	585	castorium	587 coagulum
cardamine	624	619	
cardamomum	585	catachristi trochisci	673
carduus	48.624	catagmatica	702
caricae	52	catagmaticum emplastrum.	
caries lignorum	621	719.720	
caris	585	cataphora	85.146
carnis in hulceribus excre-		cataphorae.62 curatio	109
scientiae	361.362	cataplasmata	680
carne nutriens emplastrum		catarrhus	201.202.
strum	719	204.	
car nibus procreantibus colo-		ad Catarrhosum caput smeg-	
lyrium	371	ma	685
carotides	453	catechomeni	145
carpesiae succus	416	cathartica puls.	648
carpesium	586	catharticae oliuae	646
carpobalsamum	564	catharticus buccellatus.	646
carpus 523 caros	146	catheter	246.161
cariradices	49 semen	catheterismus	474
		6 2	catoche

INDEX.

catoche, catalepsis	145	sipelas. eod. eiusdem mem	
catochos. 85. 140. 144	eius	brana inflammatio	513
curatio	145	nigrefactio	514
caucalis	587. 701	cerebri temperamenti indicia	
caudatio	487 (508)	31. 36 uulnerati signa.	
caulatum ruptura cuiusmodi		506 cerion	122
causos febris	98	cerui cornu. 588. ex eo pastil	
causon 403	cecis. 538	lus	675 (508)
cedria	587	ceruina caro. 55	medulla
cedri differentia	587	cerui ocellus	574
e Cedri liquore emplastrum		cerussa. 638 eiusdem empla	
715	(404)	stris inferenda ratio 721.	
cenchros. 587. eius morsus		708	(422)
centaury minoris usus. 642		cerussa sumptae remedium.	
radix	587	cestros 410 cestron	565
centipes marina	624	chala streon	602
centuncularis herba	570	Chalestra uicus. eod.	
cepea	589	chalacia. 438 chalaciu	173
cephalea	48. 136	chalbanon	635
cephalalgia	132	chalcantion 636 chalcant	
cephalica huiusmodi	360	thus eod.	
cera. 589. eius modus ad ole		chalicium. 607. 635. quomodo	
um in paradisi acopis. 720		ad coquenda	721
ceranium italicu 760. 761		chaleos	636
cerasia	52. 588	chamaracissus	636
cerastis morsus	405	chamaedaphne. 572. eiusdem	
ceratoma,	588	asparagus	49
ceratia		chamaedrops	637
ceratu 759 cercosis	487	chamaedrys	636. 637
cerebri diuersorum animan		chamelea. 357. 637. eius u-	
tium uires	573	sus	643
cerebri esus	55	chamaeleontis haustus	414
cerebri inflammatio. 142	ery	radix. 636 sanguis	553
		chama-	

INDEX.

chamaeleuce	636	chrysolinon. chrysonema.	
chamamelini olei præpara	516	chus	760.761
tio	740	cibarius panis	50
chamamelū. 636 (usus. 643		ciborum appetitus auersio	113.114
chamapitys 636. 417. eius		ciborum in uentriculo cor-	
chamaraphanum. 643. eius		ruptio	17(47
usus	653	ciborum uarietas insalubris	
chamasyce	637	cicada 630 inde medica	
characius	631	mentum	669
charta deusta	614	cicatricem hulceribus obdu	
e Charta pastillus	677	cētia 364.365. 708.715	
chelidonia aspis	404	cicatrices oculorū	177. ea
chelidonium	637	rum tinctura	178
chema. 760 chemosis	171	ad Cicatrices atras	367
Chia terra	569	cicer 576 cicera. 51 eo	
chiacum collyrium	692	rum species	576
chironia hulcera. 366. ad ea		cichorium	414. 590
dem pastillus	679	ciclamimum	413
choa 759 chœnix	761	ciconiarum stercus	593
chœrades	452	cicuta 597 eius potus	415
chœradicum	355	cimices 593 cinara. 48	
chæropelethum	704	cinnamalis herba	22
chærospelethos	233	cinerula	66. (69 c
chole 637 cholera	226	cinis alius alio uehementior	
chondri coquendi ratio	51	630 (strum. 717	
chondrilla	638	cinnabaris. 539. inde empla	
chondrus	50. 638	cinnamomum	589
chrysanthemum	24	circea radix	589
chrysanthum	575	ciria 522 cissampelos. 575	
chryse enemos emplastrum		cissanthemon	597
719 chrysites	638	cissaros. 590 cissaris	589
chrysocolla	613 638	cissium emplastrum	706
chrysocoma radix	638		
		β 3	cissos

INDEX.

crissos, cisthos	590	colla. 591	colliquatio	107
citrage	605	collisio		509
citrinum malagma	730	collyrium liquidum indolo-		
citrinum malum. 2. 590. 408		rium		169
e Citrio malo purgatorium		de Collyrijs	690. inde	
646	citta	colobomata		445
clauicula fracta. 517	eiusde	colocyntha. 591	colocyn-	
luxatio	534	thi. 592	eius usus	641.
clauicula inter animalia so-		642	colon	233
lus homo fortitus	534	colori corporis uitiatu me-		
clauus. 312. 502 oculi	176	dicamentum		15
clematitis	561. 590	colpas		368
Cleonis collyrium	498	columbinus sanguis		553
Cleopatra mors	404. 405	columella. 447	eius inflam-	
clidius Oribasij aphrodisia		matio	198. 199	
sticō 675 clinopodiu. 591		colymbades	53. 360. 556	
cluninum iecur	580	coma, uigil somnus		140
clysteris uesica immitendi		144	comaro	592
ratio	474	us	23	
encoron	644	comitialis morbus. 148. 149		
enici semen	591. 645	ex consensu stomachi	151	
enidium granum	681. 591	alicuius mebris uitio. eod.		
coaguli cuiusuis uires	619	ad Comitiali oppressos er-		
coccus 591 coccymelea. 591		rhinon		137
cochlearum esus	58	ad Comitiale scilla prapa-		
cochliæ crematae	594	ratio		662
cœlia	591	conceptui adiuuando reme-		
cœliaca affectio	227	dia	290. 292	
cœloma	175	conchilia		591
colchicum uenenū. 410. 417		conchula cremata quomo-		
colica agritudo. 233 cuius		do emplastris inferenda		
modi Aeginetæ tempore		722		
337		conchularū Indic. testæ	611	
		ad Concoctionis difficultas		
		tem		

INDEX.

tem	666	cornulaca	631
cōdylomata 487 sedis	498	cornu uires	588
condylomata uulvæ	292	coronopidis radix	594
293		ē Coronopodio cōfectio pur	
congus	750.761	gans	648
coni cortex & folia	597	ut Corpus suauiter spiret.	14
conia	592	corporis cuiusq; dimēſiones	
Constantini ſapo	685	tres 75 corruda	589
contrariorum uſus in reme		coryza	201.202
dys adhibendis quatenus		coſtarum fractura	520
conueniat	304	coſtus	594
ad Contuſiones	351	cotonea	53
conuulſio	152	ex Cotoneis medicamētum	
conuulſiones	162	665. inde purgatorium	
conuulſory pulſus	80.87	646 cotyla	759.761
conyza. 592 copros	592	cotyledon	594
copton ad ſtomachi duriciē		coxa luxatio. 541 eius ſpe	
731		cies. cod. inde	
coracum emplaſtrum	709	coxarum aduſtio	492
coralium	593.671 (671	coxarū oſium fractura	521
ē Corallio med. ad podagrā		coxendicis affectus. 295 ad	
cordis affectus	216 inde	cūdem emplaſtrum. 712	
cordis eſus	55	ad Coxēdicum dolores. 672	
cordis indicia	38	crambe	595
cordis palpitatio	217	cratægonum	595
cordis uulnerati ſigna	506	cremaſteres	477
coremata	613	creta cimolia. 569 ſutoria	
coriandri eſus	414	604 crethmon	595
corianum. corion. corian		Cretica terra	569
drum	594	crimnon	595
coris herba	594	crinatum thymiama	747
corni fructus	595	crinon	595
corniculatum papauer	606	Criogenes paſtillus	679
		cribe	173.595
		β 4	
		Critonis	

INDEX.

Critonis smegma	684	Etio	11
crinum	576	cyamus	596
ad Cruenta emplastrū	711	cyathus	760.761
crocinū diathoron.	698.94	cyboides os	528
leion	746	cyclaminus	596
crocodes psyllus	674	cyclisci	511
crocodilus terrestris	671	cycnarium collyrium	693
crocodili ictus	406	cydonatum contusum	fra.
gus 554 semen	596	gmen tis integris	665
crocodilorum terrestrium ster.		cydonia mala	606
eus. 595		cygnus rubens, cādidus, etc.	
cod.		collyrium	693
crocomagmalis apparatus		cyma 48	cyminiū 597
676 compositio	746	cynanche	199
crocus 596	crōmyon. 596	cynocrambe	560
crotonum usus	643	cynomorum	560
cubiti fractura	525. luxatio	cynos batus	597
537 cucum. 6. 51. 623		cynos orchis	612
foluestris. cod.		cyparissias	631
cucumeratim ruptura cuius		cyperus	597
modi	508	cyphoeos materia	747
cucumeris foluestri corticis		cyphi magnum, Iliacum, fo	
usus 643	succum 574	larium 748. seleniacum,	
cucurbita	51. 591	siue lunare. cod.	
cucurbitulae anea nitreis		cyphoides ad iocincerosos.	
efficaciores	460	667. 668. 747	
cucurbitularum usus	460	cyphoides oppilationes. 250	
forma	461	cyphosis	539
culices quib. arceantur	390	cypri folia	597
cupressus 197	cura 156	cyprinum oleum	744. 745
Curei malagma. 730	(445	ē Cyrenaico succo pharma	
curgia aurium, aut labrorū		cum ad quartanā	648
culis cōstipatio, siue adstri-		cytini	620
			cy

INDEX.

cytisi folia	597	diabacanu hepaticum	668
D		diabetes	89.245
Dacorum et Dalmatarum		diacaryon	687
tela	505	diaceratos collyrium.	697
dades	571	diachylon mc.	269
damaſcena 53.571	pruna	diacodium	662
591		diacoralliu paſtillus	674
damaſſonium	571	diacrocū collyrium	701
daphne. 571.	herba. cod.	diadaphnidon	284
daphnoides herba. 571. 590		diadiētānu emplaſtrū	710
darti	477. 481	diagigarton	228
daucus. 602. 49. eius ſpecies		diatēum emplaſt.	224
571. 587		diamoron ſimplex. 686 cō-	
decamyron	728	poſitum	687
decretoriæ morborum no-		dianemonis emplaſtrū	716
tæ in initijs uitioſæ	72	diacēnanthes	228
dedolatio	509	diaphanes	626
defluxionū epiphoræ	169	diapyrrhanu emplaſtrū.	705
delirium 139. dendrodes. 631		diarhodon collyrium	698
ad Dentes attritis	196	albō, crocinū, Nili. cod.	
dentes dealbans	196	diarhodos paſtillus	674
dentes quomodo à corrupte		diaroca remedia	169
laſeruandi	15 (de	diaſmyrnon	695
dentium cruciatus	194 in	diaſtole	74
dentium euulſio	446	diaſtruthiu emplaſtrū.	704
dentium ſmegma	195. 196	diathaliſ	695
ad Dentium ſtuporem.	196	diatonlotarion	270
dentib. aduerſa quæ	15	diatrion pepereon	223
ad Dentes quaſſatos	195	diaturpenes ceratiū	718
dentitio infantum	5	dichromō emplaſtrum	714
derma	572	dicrotos pulſus	78. 87
deſeſſio	508. 509	diētamnus	572
deſtillatio	201	didonia	417
		6 5	dies

INDEX.

des decretorij 70. contem	dothienes. 345. emplastrum
platory 71	704
digitorum collisio, siue fra-	drachma 760
ctura 525. luxatio 538	draconis marini ictus. 406
digitorum pedis luxatio. 545.	c Dracunculo emplastrum
546	707 (cod. 572
digitorum pterygia 313. ris	dracunculi. 387 draconia.
ma 310	drimphagia 629
de Digitis adnatis 461	dropax. 733. Gallus 737
Dioclis epistola de sanitate	drupa oliuarum 53
iuuenda 61	dryinus, eiusq; morsus 402
diomphacos malagma. 727	dryopteris. 572 drys 573
Dionysia medendis abscessi	dysenteria. 130. iecoraria 131
bus 336	ad Dysenteriam hypothum
dionysias 572	680 pastillus 675. 676
diospolites 666	dysodes acopum 735. epi-
diphryges 572. eius co-	thema 216
etio 721	dyspnœa 205. 206
diploe 510 dipfacos 245	E
dipsaci radix 572	Ebeni lignum 575
dipsadis morsus 403	ebiscus. 555 ebulus 555
districhiasis 432. 435	ecchymoma 351. 352
dydraui collyrium 694	Echidnae carnes. 577. mors-
dothecatheon medicamen-	sus 400
tum 214. 663	echinus 577
dolichi 51	echinorum esus 58
doloris species et causæ. 136	echion 578
dolorē sedantia. 185. empla-	ecpiesmus 183
strum 709 doracia 53	corythmus pulsus 77
dorcadizon pulsus 78. 86	ectropion 172. 435
dorius 578	clæomeli 574
doryenion 41. 418. 572	clate 574 clatine herba.
Dosibei catapotia 668	cod.

INDEX.

elateriū 136. 574. 623. eius	enatici trochisci	673
sumptio uenenoſa. 424	engisoma	508. 509
uſus 642	enema	702. 703
elca 573	eleon. eod.	entaticum emplaſtrum. 719
electrum. 579 ex eo paſtil-	enterocele	262. 482
lus 674	enthuſiaſtici 152 ſiue en-	
eleliphacus 575	theaſtici. eod.	
eleoſelinum 575	epheleis. 593	ephelis 557
elephantiaſis 316 contagio	ephemerum. 577 eius uene	
ſa 321	num	417
ad Elephantiaſim catharti	ephialtes	154
capuls 648	epibole	154
elephantis ungues, oſſa, den	epicauma	176
tes 575	epilepticorū & ephialtico	
elephantiorum capitis cō-	rum diſcrimen	155
buſtio 427	epimedium	576
elaphoboſcos 574	epimelis	576
elos 176 elymus 576	epinyctides	329. 330
empetrum 576	epipaetis	576
emphyſema 171	epiphora	169
emplafſtella 703	epiplocele	483
emplaſtrorum uaria genera	epiploenterocele	483
702. 703	de Epithematis	724 inde
de Emplaſtris, eorūq; deco-	epithymbri uſus	643
ctione 702. inde	epithymum 576 eius uſus	
emplaſtris inſerēdorum me	22. 643	
dicaminum elixatio. 721	epomphaliū	652
emproſthotonus 164	epulis. 196	epulides. 445
empyema 212	equapiū	625
encanthides 175. 438	equi fluuiatilis pellis	572
encephalos 573	teſticulus	582
enneapharmacum 274	equinum coagulum	619
enneapharmacus peſus	equiſetum	582
750	equorum ſanguis	554
	erchina	

INDEX.

erebinthus	576	tis. 130	infantum	4
Ereria terra	569	excisio		508
eria 576 erice	576	exercitatio quid		7
ex Erica pastillus	676	exercitationis ratio pro æ-		
erigeron	580	tate habenda		7
erynaci terrestria fel. caro,		exercitationum genera		8
testa 578. item marini.		expressio		509
eod.		F		
erinos 577. erythra	136	Faba		590 (eod.
eruca	48. 577	fabæ 51 faba Aegyptia		
eruca picearū haustus	412	farciuitia 192 inde		
erulie 51 eruum	612	james uehemētor, bulmos		
ex Eruis medicamentū	663	115		
eryngium	580	farinatum ruptura cuiusmo		
erysimi semen	577	di		508
erysipelas 141 cerebri 142		fastidium		222
erysipelas inflammatum, et		faucibus inscruietes unctio.		
erysipelacea inflamatio,		nis		685 inde
non idem	141	Fauorum ludibria		154
erysipelata 116. 169. 334.		fauum 131 faum.		356
349. 551		74		
erythrium malagma	719	febricitantium uigilie		108
erythrodanum	377	febris pestilentialis confide.		
Esdrae compositio	664	ratio		105
ethmoide ossa	201	februm diariarum agnatio		
ethmoides meatus 157. 190		ex medela 90. item pu		
eunuchū faciēdi ratio	486	triderum 91. 92. aetia		
euodes medicamentum. 210		narum 93. notarum 94		
eupatorium	577	quartanarum 95. quotio		
euphorbium 577. eius usus		dianarū 96 hepiali. eod.		
64 4. ex eo acopum 715		continuarum. 97 astuan		
eurythmus pulsus quis	77	tium 98. ex erysipelate.		
eusomon	577	99 hēticarion eod se		
exanthemata 328. 613. capi		mutruanarum		101
		februm		

I N D E X.

febrium immoderatis frigo	699		
ribus & rigoribus	110	fœnogræcum	51. 610
fel diuersorū animalū	637	ex Fœnogræci succo collyri	
felis morsus	399	um	697
femoris fractura	526. 528	fœtus nascentis figura natu	
intertrigines	6	ralis quæ	294
fera siccioris alimonie	36	fœtus quini simul editi	294
fermentum	578	fœtum extractio & exci	
è Fermētō emplastrum.	704	sio	489
ferrum aqua extinctum		fontinalis herba	617 (335
623		formica	502 formicæ
ferri recrementum	625		332
squama	599	forniculans pulsus	30
ferula semen	609	fractura quid	508
fex uini. 632	aceti. eod.	fractura cum uulnere illatæ	
fex cremata	632	ratio	529
ad Flagellata	332	fracturarū differētia	508. et
flagris medendis	331	species. eod. inde	
flatus in uētriculo genera-		fractura quæ non occalles	
tio	225	scunt	531
ad Ficationes palpebrarum		fracturarum calli excresecē	
701		tia	531 ad eandem em
ficus 52. 628	arbor. eod.	plastrum	711
ficus capitis. & reliquorum		ad Fracturas emplastrū	713
corp. membrorum	132	719. 720	
ficus cinis	630	fraxinella	617
fici folia	628	fraxinus	605
filicula	617	frictio præparatoria	7
filix	618	frictionum genera. 9. disci	
fistio	508	mina. eod.	
fistula	370	frigida intemperies quomo	
de fistulis generatim	493	do emendatur	42
fistula ani	495	ex Frigore lasis	20
fœniculum maius	582	frigorifici succi	20
è Fœniculi succo collyrium			
		fronti	

INDEX.

frontis incisio	430	genista	625
in Fröte sanguinis detractio		genitalis membri affectus	
cuiusmodi	459	471. 472. inde. impoten	
fructus arborci. 52 horary, si		tia. 267 prasidia. cod. do	
ue fugaces	51	lores 268 hulcera	313
frumentacea	50	683 thymi	473
fuligo 600 eius usus	562	ad Genitaliū uitia pastillus	
fumaria	585	673 emplastrum	709
fungi 50. 608 eorum esus		genitura nimietas 19 proflu	
420		uium	265
furunculus	43. 345	gentiana	568
ad Fuscédines	15	genu luxatio	545
fusus agrestis	48	genuū patellæ contusio, si	
G		ue fractura	527
Gagates lapis	601	geodes lapis	601
gala 567 galactites	600	geranium	568
galbani emplastris inseren-		geras	569
di ratio	713	gestatio	144
gale	567	gigarta	569
galenium malagma	729	gingidion	48. 570
galiancones	557	gingiuarum abscessus	445
galibidolon	568	fluxus 195 pruritus 4.5	
galipsis 568 galium	567	ad Gingiuas exesas	196
galla	588(638	Gingiuas restringens	196
gallinacei cerebrum. 571 fel.		glabrics 124 ad Glabre	
gallarum & gallinaceos		ta	126
rum adeps	626	gladioli radix	610
gallarum sanguis. 553. ster		glans unguentaria	564
cus 591 uenter	591	glandes 54 earum usus. 23	
Gallus dropax	737	cibus	55
ganglion	333. 455. 607	glaucium	570
gangrana	338. 339	glaucoma	181
garum 568 geminalis	612	glaux herba	570
		glechon	

INDEX

glechon 570	gleos eod.	H
gleucinum malagma	797 ad Habitudinem calfacien-	
inde	dam 14	hæma.553
gluten simlagineum	591 hæmatites lapis	600
glutinium ligni, & taurinū.	ad Hæmopticos emplastrum.	711.714
629		
glutinium piscosum	583 hæmorrhagia locellorū	275
glycea bulcera	191 hæmorri morsus	403
glycyrrhiza	570 hæmorrhoides	271.487
glycyfide	570 497 uulua	292.293
gnaphalium	570 halaria ad purgandum.	647
gnidium granum	591 haleculæ manides	132
gonchota 503	(fus 750 halimon	47.555
gone, ad concipiendum pes-	halos anthos	556
gongilis	570 halosachne	556
gonorrhœa	265 harmala	609
gorgylum	571 harmation collyrium	699
gradus qualitatū quomodo intelligendi	550 harmenia emplastrū	712
gramen arundinaceū.	584 ex Harmenico lap. catapota	
granata mala	620 tiā 647	basilia.503
granum cnidium	591 eius hastula regia	563
usus	644 hecatōbe, ad cicatrices	696
grauedo 201	grossi 611 hectica febris. 99 eius speci-	
gruaria deligatura	523 es duæ	100
gruum caro 54	(449 hecticus pulsus	80.87
gulæ infixis spinis, aut alijs	hedera 590 terrestris.	636
gummi 592. eius usus	644 hederaceū emplastrū.	706
gurgulio	198 hedychroi theriacā ingre-	
gutturis hernia	455 inci-	dientis præparatio 656
sio	449 hedyosmus	579
Opsum	571 eius haustus hedyfarum	579
412	571 helcysmata.	575
	571 helenium. 575	heletis. 599
		helicbrysa

INDEX.

belichryson	575	hermodactyli radix	577
beliocaes	362.683	ex Hermodactylis podagri-	
belioscopios	631	ca	647
beliotropium	5.579	herpeta.334	herpes.340
belleborina	576	herpetes	552
belleborus	575	herpes miliaris	340
bellebori albi sumptio uene		hernia aquosa. 477	guttu
nosa	424	ris 455 intestinoru	482
belxine.575. 622.eius uires		hernia species	483
556		heterorhythmus pulsus	77
hemerocalles	579	hiberis 599	hidros 581
hemicrania 136 hemicrani		hienarum fel	637
aci.	cod.	hiera dicta antidota,coruq;	
ad Hemicrania uetera. 138		compositio.650	inde
hemicanicus pastillus	680	hieracites lapis	602
hemictum	761	hippocampus	582
hemina	760.761	hippolapathon	582
hemionitis	579	bippomarathrum	582
hemiplexia.hemiplagia 157.		hippophaes. ippophaos	
hepar diuersorum animalis		582	
um	579	hippopotami pellis 572	testi
hepatis esus	55	culus	582
hepialos jebris.96 unde di-		hipposelinum	582.625
cta	97	hippuris	582
hepfema 578	heraclea 575	hircina caro.55	iecur 579
heracleum	606	sanguis 554 ex eodem me	
heraction	602	dicamentum	699
herculeus lapis	601	hircorum medulla	608
hermala	688	ad Hircum alarum	219
hermaphroditarum uitium		hirudines haustæ	413
quadruplex	486	hirundinaria	637
hermodactylus stomacho		hirundinatum ruptura quae	
aduersus	303	lis	508
		hiruno	

I N D E X.

hirundinatum ruptura qua lis	508	plastrum	712
hirundinis cerebrum	573	bulcera sordida quæ expur gent	360
hirudinum crematorum ci- nis	637	ad Hulcera sordida emplas- trum	710
hædinus sanguis	553	de Hulceribus cicatrice ob- ducendis	364
holca 759 holocleros.	417	humeri summi luxatio.	534
Homeri locus	502	humorum uitiosorum mul- ta species	29
hominis morsus	406	hyacinthi radix	632
hordeolū 173 hordeū.	595	hyalos	633
hordea 50 hordeaceus pa- nis. eod.	horror 101	hydatides palpebrarum uesi- culæ	437
hulcus simplex	357	hyderus ascites	253
hulcera articularum	372	hydnon 633 hydor	lod.
hulcera caua	359	hydrargyros	633
Chironia, malefica, Te- lephia	366	hydreterepiplocele	483
hulcera manantia	132	hyrocele	477
hulcerum lacunæ.	368 uera mes	hydrocephala affectio	427
ad Hulcera depascentia	362	hydromalum	689
363 & serpentia eod.		hydromelum ex libra	140
364 dolentia & inflā- mata 538 humida &		in Hydrope, uinum purgans	647
foetentia 364 immatue- ra, necdum purulenta.		hydrophobia	393
358 inueterata 332 male- fica 349 rupta 372		hydropiper	633
ad Hulcera emplastrū.	719	hydrops 252 ad eundem	
pastillus	678.679	malagma	730
hulcera glutinandi uim ha- bentia	357	hydrorofatum	689.690
ad Hulcera maturanda em- plastrum		hydros	404 (28
		hyeme largiore cibo opus	
		hygidium Ammonij	695
		hydrocollaria	169
		γ hyoscyamos	

INDEX.

hyoscyamos	633	cia	39
hypocoon. 634.		iecoraria dysenteria	231
hyperum 538.	633	ignis sacer	341
hypochyma		ad igne combusta emplastrum	708
hypocisthis	634	ilambonis collyrium	694
hypoglossum. 634.		ilamon anodynon	176
hypoglottides.		ileos	234. 137
hypophages. 634.		ileosi affectus stomachi.	225
hypophagum	634	ileus cinis	630
hypopyd. 177. 179. 440.		ilium fractura	521
hypopyd.		illuones sedis & umbilici	
hypopyd.		purgantes	652
hypopyd.		imbecillitatis signa	68
hypopyd.		imberbes seruantia	261
hypopyd.		impetigines	322
hypopyd.		impotentia genitalium mē-	
hypopyd.		brorum	267 (184
hypopyd.		incidentia medicamenta	
hypopyd.		incuborum ludibria	154
hypopyd.		Indica emplastrum	714
hypopyd.		Indicus lapis	602
hypopyd.		infantis educatio	4. 6
hypopyd.		infantum morbi	4. 5
hypopyd.		inflammationes	333
hypopyd.		inflatio 350 uteri.	286
hypopyd.		inguinis ramex	484
hypopyd.		intemperies calida quomo-	
hypopyd.		do emendetur	41. item
hypopyd.		frigida	42. sicca. 43
hypopyd.		intercus	252
hypopyd.		intertrigines	332
hypopyd.		intestina terræ	569
hypopyd.		intesti-	

INDEX.

intestinatorum esus	56	iuncus odoratus	597.629	
intestinatorum hernia	482 la	eius rotundi species.	eod.	
uor	227 tormina	230	iuniperus	561
exulceratio.	eod.	671	ixie haustus	417
intubus.	47 intybum	622	ixos	581
inula campana	575			
iocinoris affectus	247 eoru		L	
'que indicia	248. inde		Labiorum fissurae	197
ad iocinoris duriciem mala			labrusca flos	610
ma	730.731		lac fissile	57
iocinoris inflammatio	214		lac intus coagulatum	421
215			lac nutricis quomodo pro-	
iocinorosi	247		bandum	2.3
ad iocinerosos Cyphoides.			laetis coquendi ratio	57
667.668			laetis esus	56
ion	582.	ios.eod	laetis uitia quomodo emena-	
iridis illyricae usus	642		danda	3
irini olei preparatio	745		laetis usus	567
irionis semen	577		laetipotatio	56
iris	582		lacerta chalcidica	622
ifatis	419 satiuua.	582	lacertae caput	588 iccur
isca	465 ischias	295	579.621	
isis cruentis dicata	710		lactuca	47.48.581
isopyron	583		ladanum	596
isotheum collyrium	700		lagophthalmi qui	434
ad Ischiadicos emplastrum			435	
716			lagophthalmica affectio	
Italicum emplastrum	719		434 inde	
itea	583 utria	202	lagopus	598
iudaicus lapis	601		lana cremata	619
iuglans	53		lanæ ouillæ uires	576
iugulum fractum	517		lapathon	598
iuguli luxatio	534		è Lapide Iudaico medica-	
			mentum	670
			7 1	è Lapide

INDEX.

¶ Lapidē pl:rygio pastillus	lentiscus	629
678	lentiscinū oleum. 743	eius
Lapides omnis generis quo	usus	194
modo emplastris infu-	leonum adeps	626
rantur 722	leontopetaliradix	599
Lapidū omnis gen:ris uires	lepidium 599	lepis 599
600.601	leporis cerebrum	573
Lapides confringens pbusca	leporis marini potus	412
669. & conditum. cod.	leporina caro. 55	coagulum
¶ Lapidibus collyrium 700	619	
Lappago 582	lepra. 321	leptocaryon. 586
Lapsana 593	letalia signa quæ	68
Laserpitium 623	lethargus. 142	eius curatio
Lasiundo exercitijs superue-	143	caros 142
ens 10 quadruplex. cod.	leucacanthum	599
inde	leucas. 599	leuce. 325. 599
Lasitudines spontaneæ 12	leuca & alphi quid diffe-	
lateralis dolor 214. 216	rant	326
Lathyris 598	leucon	599
Lathyridum usus 642	leuographis	601
Laur 623	leuomata	177. 178
Lauri bacca malagma.	leucopblegmatis	253
731	leucus pastillus	678
Lauri folia, bacca, radix 571	libanum collyrium	697
usus 643	libanius pressus	750
Lauri olei preparatio 743	libanotides tres	599
Læna emplastrum 714	libanotus	600
leguminum facultates 51	liberi procreandis accom-	
lemnestis 736 (qis. cod.	modatum tempus	19
Lenia terra. 563 siue spha-	libra	760
lemniscum 451	lichen herba	598
lentes 634	lichenes equorum	598
lenticula palustris 634	lichenæ feræ	323
lentiginos 193	leuis	

INDEX.

lienis adustio. 465	affectus. 256	lithunus. 476.	litrum 602
256 duricies	258	luoribus tollendis	15
lienis esus	56	lixiviũ. 592 e diuersis. cod.	
ad Lienem emplastrum 712	e Lixiuio emplastrum 716		
malagma. 730	oxymel	locellorum affectus	272
668. pastillus	676	inde	
lienteria	227	locellorũ calidiorum signa	
lignorum caries	621	291. item frigidiorũ	290
lignys	600	humidorum	291
ligustici radix, semen	600	locellorum esus	56
lily flos	595	locellorum exulceratio. 281	
oleum. cod. 596	eius prapara-	inflammatio 278 & deo	
ratio	741	clinatio. cod. inde	
limonijs fructus	598	locellorum muliebrium thy	
linguæ caro	55	mi	487
linguæ scabrics	116 tu-	locustæ	555
mor	197	e Lolys emplastrum	713
linguæ uenarum sectio. 459		lonchitidis semen. 602	usus
lini semen	602	644	
e Lini seminis succo empla-	strum	lordosis	539
703		lotium. uide Vrina	88
lintheum crematum	619	lotij color ante exercitium	
liosporon	602	obseruandus	8
lippientium capitis combu-	stio	lotium prouocantia	64
427		lotium quæ cicant bene ua-	
lippitudo	168	lentibus	22
ad Lippitudinem siccã col-	lyrium	lotus. 603 herba & arbor.	
701		cod.	
ad Lippitudines auspican-	tes monemeron	loti agrestis semen	603
692		e Loto syluestri pastillus.	
liquidorum mensuræ	76	678	
lithi. 600	lythospermũ	602	
lithotomum ferrum	476	lumbrici, eorumq; differen-	
		tia. 381 teretes et retun	
		y	di

I N D E X.

di 382 lati	385	maï radices	606
lupinus.580	lupini 51	manides baleculæ	132
lupus pisc.	58	magnes	601
lupinum iecur.580 ex eo me		maiorana	557.621
dicamentum	667	malabathri folia	604
lupinum stercus	592.593	malachia	274
lusciosi	183	malacostraca	58
ad Luxata 351 (tia .532		de Malagmatis 724. inde	
luxatio quid, eiusq. differen		malum citrium, & medi	
luxationes cū hūlcere. 546		eum	590
cum fractura	547	mala medica, citria	2.53
lycaon. lycanos. lycanthro-		malum terræ. 31 eius species	
pia	135	560	
lycopfi radix	603	mala diuerſe qualitatis. 53	
lychnidis ſemen	603.643	cotonea, punica. eod. dul	
lycium	603	cia, auſtera, acida, acer	
lycoctonium	555	ba. 606 perſica, armeni	
lycopſus. 551 eius radix. 603		aca. eod.	
lygus	551	malorum omnis generis ui	
lynceus collyrium	698	res	606
lyſimachium	603	malicoria	620
lyſiponium acopum	735	malobathrinum collyrium,	
		700	
M		malleoli luxatio	545
Macedonicum emplaſtrum		malua ſylueſtris 604 ex ea	
715		iuſdem ſemine med. 670	
macer cortex	603	mamiras	604
Macceris ligno globuli		māma marib. perinde ut ſc	
671	(716	minis turgescētes (464	
Machætionis emplaſtrum.		mammārū inflammationi	
macilenti quomodo renutri		349	
endi	32	mammillarum cibus	55
madanuda	718	māmillarum uitia 218 inde	
madarofis	174	mammias	

INDEX.

mammis conseruantia. 219	um uires	550
mandragora. 604 eius pos- tus 416	medicaminum quæ empla- stris inscruntur, elixatio.	721
Manethonis puluis ex fece uini 682	medica mala	2.53.590
mania 152 eius curatio. 154	è Medico malo medicamen- tum	666
manna thuris 604	medimnus Atticus	761
manus collisio, siue fractu- ra. 525 rimæ 310	medullæ cſus	55
marasmus 100	medullarum omnium uis ea- dem	353
marathrum 604	medullarum uires	608
marina aqua 580	mel. 605 amarum, Sardoii, ſachar. eod. Heracleiæ ponticæ	422
marrubium 618. nigrum 565	mel infanti præbendum	4
è Marrubij semine medis- cament. 670	mel uno grauius	760 item
è Marrubio linctus. 663 cõ- fectura eod.	oleo. eod.	
martianum malagma. 726	mellis cſus	60
Massaliotæ aridum 684	è Melle emplastrum	703
maſtiche. 604 Chia & Aegyptia eod.	melenæ Serapionis	713
maſtichinum oleum 743	melamphyllon	554
Maſtucha 749	melampycnon	608
Maſuaphium 749	melan	604
matricis morſus 404	melanchlorum emplastrum	706
maxilla inferior confracta 516	melanchlorus paſtillus. 679	
maxillæ inferioris luxa- tio 532	melancholia	152
maza 50 mecon 605	melæcholiæ mederi rem ue- neream	18
meconium 410	melanteria	604
medicamentorum ſimplici- um	melanthium	604
	melea	222
	7 4	metia

I N D E X.

melia	605	menta	579
melij radix	605	menti ficoſa exanthemata	
melicerides	355.356.453	132	
melilotum	605	mercurialis ſemen	602.
melino	576	uſus	22
melini olei præparatio.	742	mergi iecur.	580 uenter.591
meliffophyllon	605	meſopotamenon	746
melitera Oribafy	682	meſpila	53.605
melittes	600	metalli cuiuſuis recremen-	
melittomata	273	tum	625
melliſauia	453	melō	176
melopepon	51	ex Metallicis emplaſtrū.	713
meloplacuntij præparatio.	665	metaſyncriticus poſſus	285
memæcylus	605.eod	metopium oleum	742
membrorū amputatio	500	metrenchytes	276.387
memoria iactura	146	milax	607
memycalum	592	miliaris herpes	340
mendeſium malagma	726	miliū.50.587	miliū ſolis
menidum capita	588 (24	602 ex eodem medica-	
menſes muliebres trahentia		mentum	670
menſium ſuppreſſio, eiꝯq;		milphoſis	174
cauſæ	273	millefolium	608
menſibus mouendis idonea		millipeda	611
que	274	milui caput	588
menſtruorum purgatio.	272	mina attica, Aegyptia, Ro-	
quomodo incipiant, aut		mana	760 miniū.568
deſinant.cod.		miniij emplaſtris inferendi	
menſtruorum purgatio ni-		ratio.722 miſy	607
mia	275	miibridatios antidotus	408
meſſura quid	758	Mithridaticæ antidoti præ-	
de Meſſuris.758 earum no-		paratio	659
ta	759	Mithridatis mors.	408
		Mnaſai emplaſtrum	707
		mochelæa	740
		mochliſcos	

INDEX.

mochlifcos	530	ad Morsus canum non rabi
modius Aegypt. & Italicus		dorum 395 (392
761.736		ad Morsus uenenatos. 391.
mola uteri	285	motophylax. 531 mucus 201
moly	609	muliebri profluuium 276
molybdæna	607	277
molybdos	607	muliebri membro imperfo
monemerom ad lippitudines		rato 487. eiusq. phimo.
692 mora	52	cod. (sio 289
morbis diutinus quibus no-		muliebrium locorū præclu
tis deprehendatur	69	mulsa aqua 60631
morbis spem'ne an pericu-		mulus pisc. 58 eiusdem esus
lū ostendat, unde cognoscē		mulorum urina. 613 ex eadē
dum	68	emplastrum 718
morbi decretorium præsciri		murenæ morsus. 405. 406
quomodo possit	70	muria 556
morbi principium quale di-		muris aranei morsus 399
cendum	68	muris caput 588
morbi passim uagantes cu-		Musæ pastillus 676
ijsmodi	102	muscerda 593
morborum capita quæ &		muscus marinus 567
quot inquirenda	67. 68	mustelæ cerebrum 573 ci-
morborum dies decretorij cu		nis 567 uenter 591
ijsmodi	70. 71	mustum decoctum 578
morborum futura crisis quos		è Musto medicamentū. 687
modo prænosceda.	72	myacanthinus 589
quomodo peracta iam,		myaces 607
optima agnoscenda.	74	myagri semen 607
mori fructus	607	myaron. 608 mycetes. 688
morum decoctum. 687 ex		mydriasis 180
ru bis. cod.		myelos 608
morochthus	601	myeroxus 601 myita 503
morosis	146	myocephalon 176
		γ 5 myopes

I N D E X.

myopes. 183	myopiasis. 183	nares fractæ & contuse
myosote	608	514
myuri, & myurizontes pul	narium factor	191 bulce.
sus qui	78.79.86	ra.cod.
myracopa. 739	myrice 608	narium sanguinis profluvia
myrmecia	637 (cod.	quæ sistant
myrrha. 625. 608	myrrhis	narium uitia
myrrha emplastris inferens	narphia	190. inde
deratio	724 (708	naribex
myrsinatum emplastrum.	nascaphthon	602
myrsinutes	631	609
myrsinoides	590	609
myrteti præparatio	690	609
myrtus. 608	myrtula, myr	609
tis	cod.	609
ex Myrto sylvestri medica	mentum.	683
myschlion	117	609
my si quomodo emplastris	immittendum	721
mystrâ. 760. 761	myza. 608	
N		
Nacaphthon	609	
napus 49	napy 609	
narca	609	
narcissi radix	609	
narcoticorū usus nimius, no	xius	301
nardinum collyrium	606	
nardus Celtica. 653.	Cilissa	429
Cicizine	728	
gallica	609	
nardi spicæ radix	609	
	nares fractæ & contuse	
	narium factor	191 bulce.
	ra.cod.	
	narium sanguinis profluvia	
	quæ sistant	375
	narium uitia	190. inde
	narphia	602
	naribex	609
	nascaphthon	609
	nasturtium	43
	eiusdem semen	585
	naugantium uictus ratio cu	
	iufmodi	30
	nausea febricitantium	117
	Naxia cos	602
	nephritici 239	nepita 584
	nera pastillus	676
	nerium 410. 610	eius flos
	664	
	Neronis emplastrum	712
	nerui saucy	376
	neruorum abscessus	337
	ad Neruorum uulnera em	
	plastrum	706. 710
	neuras	610
	Nicolai emplastrum	711
	nigella 604	eius esus. 424
	Nili diarbodon	698
	Nili malagma	730
	nitrum. 602.	eiusdem empla
	stris inferendi ratio. 722	
	nitri spuma	564
	cx xii	

INDEX.

ex Nitro emplastrū. 716. 717	fio. 18; . 440	sugillatio.
noctūæ sanguis 553	nes. 177	cicatrices. eod.
noma 268 ad nomas. 362	alia uitia. inde. suppura-	
714. 678 oris 683	tio. 440	agylaps 445
nucatin ruptura cuiusmo-	ad Oculorum caliginem. 16	
di 508	oculorum expresiones 183	
nuceum oleum 743	oculorum fluxione laboran-	
nuscitio 181	tiū agglutinamenta 701	
nuscitiosi 638	ad Oculorum bulcera 75	
nutrix qualis deligenda 2	inde	
nux arbor, eius cortex, fru-	oculorum perturbatio 168	
ctus, succus 586	inflāmatio. eod. unguis	
nux pinea. 52 persica. eod. in	439	uuatio 439
glans. 53 auellana. eod.	ad Odoratus uitia 190	
pantica 586	oa, oe. 610	cedema 349.
ex Nucibus decoctum 687	Oenanthe. 610. 746. ex ea-	
nyctalops 181	dem malagma 731	
nymphæ amputandæ ratio	cenanthia, cen antharia, eo-	
487	rumq; usus & præpa-	
nymphæa 580. 610	ratio 746 (610.	
Nymphodoti pastillus. 680	cenorhodium. 678	cenos.
O	æsypon 576	æsypos 611
Obolus 760	oleæ germina 573	oliuitas.
obtusio 182	eod.	
ocbra 569	ocbri 18	oleæ radicis cort. usus 643
ocimastrum 554	ex Oleæ surculorum succo	
ocimū 48	ocimoides 639	collyrium 694.
ocium perpetuum insalubre	oleago. 637	olearea cos 602
47	ocularia 167	oleastrū. 573
ocularium medicamentorū	oleomel. 574	
diuersa genera 690. 691	olera esculenta quæ 47	
inde	olerum syluestrium succus	
oculi procidentia. 176	suffu	pestilens 48
	olciorum notæ	88
		oleum

INDEX.

oleum anethinum	12	Ophiafis	124
oleum melle leuius, uino gra		ophioscorodon	625
uius	760	ophites lapis	601
olei emplastro immittēdi ra		ophrioscus	541
tio	722	ophthalmia	168
olei lauacro uires deijci.	165	ad Ophthalmiā errhinon	137
olei usus	573.574 (710	opisthotonicis potio	166
ex Olco et aceto emplastrū.		opisthotonus	164
oleorum compositiones ac		opium 606 letale	410
uires diuersæ. 738 inde		opobalsamum	564
oliuæ Aethiopicæ lachry-		opopanax 614 quomodo	
ma	573	emplastris admisceatur	
oliuæ cathartica	646	723	
oliuarum drupæ	53	opos 612 orchis 347. 612	
olostium. 611 olusatrum	48	oreoselinum	612
olympus. olympiacum	695	oribasy liquidum 708 clidi-	
olynthi	611	um. 675 melitera	682
omēti prolapsus	468. 470	origani species	612
omotribes	574	originatio	100
omphacintē. 574 malagma		oris affectus	194 bulcera
224		5 195 columella	198
omphacion	611	oris iucundum odorem præ	
omphacitis	588	stans	196
omphacocarpos	560	ori inseruientes uncliones.	
omphacomeli	689. 690	685 inde	
onagra	611	orminon. 612 orobache	612
onobrychis	611	orabea 576 orobus	612
onochilos. 552 onoclea	551	orthocatheutos	522
704		orthopnea	205 ortho
onoma, onomis, ononis. 560		pnoici	206
611		oryza	50. 51. 612
onothera 611 onothuris,		os sacrum infestantis hulce-	
oni 611 onyche cod.		ris curatio	122
		osis	

INDEX.

osſis ſacri fractura. 521.522	paonia radix	152
offa cremata	613 paliuri fol. & radix	613
oſſiū rupturā multiplex 508	palma 635 palmula 53	
oſ. heos	477 palmularum emplaſtrū 708	
oſtracites lapis	601 palpebram irritantium pilo	
oſtracoderma	58.2;7 rum euulſio	436
oſtreorum eſus	58 teſta palpebrae inferioris affe-	
613. inde puluis	682 Etus. 435 ſuperioris con-	
oſyris 613 othonna 610	ſutio	432
701	palpebrae inuerſio	435
ouilla caro	55 palpebrae coaleſcentes	438
ouilla lana uires	576 ad Palpebrarum deſluuia	
ouillum ſcl. 637. ſtercus 593	174 trichiaſin	175
cer. brum. 571. pellis. 572	palpebrarū pediculatio	173
oui albumen. 639. uitellus.	174 tubercula	438. uer
cod.	ruca eod. ueſicula	437
oui uariuſ uſus	639 uſtio medicamētis facta	
oua fricta in ſartagine, noſ	434 & ſutura	435
xia	54 (54 palpitatio cordis	217
ouorum diuerſae facultates.	palumbi uenter	591 ſter-
ex Ouis emplaſtrum	708 cus	593
oxera emplaſtrum	712 pamphates emplaſtrū.	717
oxos. 611. Oxybaphū.	759 panaces Aſclepium & Chi	
oxycanthus	611 ronium	614
oxygalactinus caſcus	632 panax Hercules	614
oxylapathon	598 panchryſon medicamen.	
oxymel Iuliani	645 ſime	171.172
plex. 660 ſpleniciū	668 pancratium	613
ad calculum	669 panicum	50.576
oxiſchoenus	276.629 panis genera	50 uſus. 562
oxena	190.191 pantolmios paſtillus	679
P	panus	343
Paderota	554 papauer. 605 cornutum. ſi	
	ue cor-	

INDEX.

pepo	6	les, aut cōtra, quæ.294
ue corniculare	419	spu. parulis 195.445
mosum	614	parygron 138
Papaueris capitibus anti-		passionis pastillus 677
dotus	662	pastillus purgatorius 646
papaueris succi emplastris		pastilli, eorumq; genera, cō-
inferendi ratio. 724	eius-	positiones, usus, 673 inde
dem potus	415	pastinaca 626.49
papporum esus	424	pastinacæ marinæ morsus
papula. 328	papyrus 614	405.406. radius 632
paracentesis	256.466	patella 527 eius contusio,
paraecynanche	199	siue fractura cod.
paralus	631	Paula emplastrum 716
paralysis	157	pauus concoctu difficilior
paralysis ex colico morbo	54	
contracta	162	paxillos extrahentia 373
pararhythmus pulsus	77	pectoris ruptura 519 ex-
parastata	477	pressio cod. suppuratio
parasynanche	199	212
parasyrmata	332	pediculatio capitis. 132 palpe
pardalianches	555	brarum 173.174
parcisis	158.160	pedum rimæ 310(716
pariendi difficultas	293	peganera ad pleureticos.
parietaria	575	peganum. 615 pelaria. 176
parietariæ usus	334	pelarium ex argenti recre-
paristhmia	447	mento 706
Parnassi gramen	551	pelecynus 579
paronychia 312	parony-	pellarium ad hulcera 693
chie	614	pellis ouillæ usus 572
parotis	189	pentamyron 729
parthenion	575	pentomoros 570
parthenij usus	643	peplon. 614. peplion. cod. pe
parturiendi formæ natura-	ply usus	642
		pepon

I N D E X.

pepon 51. eius semen. eod.	phagedæna quid	364
614	ad Phagedænas	362
peponatum Critonis. eod.	phalangiorum ictus	396
smegma	634 398	
perdicium	575 phalangites	634
perdicum fel	638 phalangosis	432. 435
peregrinantium uictus ratio cuiusmodi optima	phalaridis succus	634
29.30	pharicum	419
perichlymeni semē et folia	pharmaca simplicia bilem	
615	purgantia	639
periphimosi	472 phaseli. 51 phasganion.	610
peripneumonia	207 phasiolon	585
periscyphismus	431 phelli	634
perizonata	330 philagrianum malagma.	
perniones. 310 perone	527 726	
persæa 615 persica	52 philanthropos	560
peborum usus & preparatio. 749 item differentie eod.	philetarion	616. 639
pebulus croceus. 749. item aurei coloris	750 Philippi pastillus	676
pebulus mollitorius	284 philocotyche	709
pebus quid	274 philonis antidotus	661
pestis, siue febris pestilentialis consideratio	103 philoxeni medicamentum	664
petasites	615 philyra folia	634
ex Petasone emplastrum	717 phimas. 289 phimosi.	472
petreum	628 pbimus muliebrium locello	
petroselini semen. 615 (615	rum	488
peucedani succus & radix.	phlaustini pastillus	677
phaci 634 phaa	575 phlegmone	333. 334
phaum ad hypopios	693 phlogoses	248
	phlomi genera	635
	phlomitidis	611
	phlyctæna	177. 329. 330
	phocæ coagulum	619
	phoenicis	

INDEX.

phœnicine emplastrum.		pinguedini abolendæ	31
703		piper longum. 614	album,
phœnix 635	phorbia 517	atrium	cod.
phorimū alumen 360. 635		piperis radix	614
phrenitis 139 eius curatio		ē Piperum tribus generibus	
140 phrenion 617		medicamentum	666
phrygius lapis 601		ē Piperibus duobus antido-	
phibiria 132		tus, ad pleuritidem	662
phibisis 180. 212		pirum sylvestre	564
ad phthisim, ē marrubio lin-		piri uires	560
ctus 663		pirorum facultates	53
pbu 635		piscium esus	58
pbusca lapides confringens.		piscium recentium ius.	578
669 purgans, & stoma-		piscosum gluten	583
cho grata 647		pisselaon. 616	pistacia 53
phycos 635 phyllites. 635		pistaciorum fructus	616
phymata 343 pica 12		pisum	51
picea. 615 eius fructus 616		pituitæ in uentriculo supe-	
cortex eod.		riore abundantia	21
picea resina 620		pituitam naribus extrahens	
picearū cruce haustus 412		errhinon	137
piera Galeni 45. 666 ex oxy		pituitā purgātia. 643 quib.	
melite. eod.		exhibenda. eod. inde	
picru 590		pityides	616
pili cremati 632		pityocampe	616
pilorum palpebram irritan-		pityusa	616
tium euulsio 436		pix arida & liquida	615
pilis faciei tollendis 194		piceis emplastro immittendæ	
pilos demoliens psilothrum.		ratio	723
261		placitis alumen	628
pilula ad feruores 715		plantæ hucera et rimæ. 311	
pineanux 52		platanus	616
pnigitis terra 569		plenitas cauenda, & quo-	
		modo	

INDEX.

modo ei medendum	16	pompholix. 617. 678. quos	
pleuritis	214	notha	215
plinthitis alumen	628	modo emplastris infera-	
plumbago. 607 eiusdem em		tur	722
plastro immittendæ ra-		pomum sylvestre	576
tio	721	pomorum repletio uitæda. 28	
plumbarium stercus	625	de Ponderib. 758. 759. 760	
plumbi deusti emplastris in		populeum oleum	742
serendi ratio	721	populus alba	599
plumbi ramenti haustus	423	porcinus pulmo	616
plumbi uires	607	pori. 299 porri go.	129
pnigalion	154	ex calceamentorum atz	
podagra 298. 299 ad can-		tritu	311
dem med. 714. 718. 647		porrrum	49. 618
671. 672. 685. 706		potamogiton	617
de Podagra cuitanda	309	poterium	610. 617
paonia. 570 antidotus	668	potimi trochisci	673
polemonium	616	potiones suaues et frugi	
polenta	50. 595	688	
polium minus	617	præcocia	52. 53
pollen farinaceus	571	præcordiorum affectus	220
è Polline emplastrum. 704		prægnantibus quæ accidat,	
polyarchion	725. 726	quo eis uictu uten-	
polycnemum. 617 polygalon		dum	1
cod. polygonaton 599. 617		præputium glandi adhære-	
polygonoides	590	scens	473
polygonon	1. 617	præputij circumcidendi ra-	
polypodes ad uenerem exci-		tio	473
tare	18	prasion. 618 præsoides. 576	
polypodium. 617. eiusdem ra-		prester unde dictus	403
dicis usus	643	presteris morsus	403
polypus	190. 444	priapismus	266
polyporum usus	58	priapiscus. 488 primus. 618	
		procidentia uteri	288
		proa	

INDEX.

profluvium muliebre. 276. 277 puerorum educatio qualis
 propolis. 618 eiusdem emplastrum optima 67
 stris inferenda ratio. 723 pulegium. 570. eiusdem usus
 propomata. 688. propterea 643
 sis 176 pulicaria herba 415. 638
 prosopites herba 561 pulmonis agnitio. 38 eius. 56
 prosphysis 477 vulnerati signa 506
 prunum 591 pulmonum, diversorum ani
 pruni species 591 mantum usus 616
 prurigo 314 pulsus quid. 74. duplex eius
 pseudobunion 566. 638 usus. cod. 85 (83
 pseudocinnamomum 589 pulsus causae. 82 depravatio
 pseudodictamnus 572. 638 pulsum genera et differē
 psilothra 261. inde 278. 558 tia. 75. 76. inde
 psimybion 638 pultationes 453
 psitacium 707. psora 321 pumex. 589. eiusdem emplastrum
 psorici preparatio 639 stro inferenda ratio. 722. 715
 psorophthalmia 171 punici mali decoctum 687
 psychotrophon 565 flores 620
 psyracia 130 purgandi medicamentis qui
 psylli potus 415 praecipue 640
 ptarmica folia 618 purgandi tempus 640
 ptelea. 618 pterygia. 178. purgandorum qualis habē
 179. 313. 439 500 da ratio 648 inde
 pterygomata. 487. pteris. purgatiua pharmaca stomas
 580. 618 cho noxia. 640. eorum
 ptillofis. 174 ptisana. 595 cōpositio. 645. inde
 ptisanæ coquenda ratio. 51 purgatiuis nō operantib. 648
 ptixas 404 purpure cremata 617
 ad Pudendorum dolores. 268 pusionum olei usus 592
 tumorem. 269 hucera. pyrethrum. 619. eius usus 643
 349. 364 pyrites. 601 609
 pudendorum impotentia. 267 pyros 619 pytia 619
 pytia

INDEX.

pyliriasis	129	resinæ emplastris immittendæ	
pyxis acopum	736	ratio	722
Q		resinarū omnium uires.	620
Qualitatum ordo et excessus	550 (648	resolutio. 158. 160. canina.	161
ad Quartanā pharmacum		rha	619
quercus folia, glandes	573	rha ponticum	1
cinis	630	rhacosis	485
querna filix	572	ragades. 268. uulue	292
quinquefolium	614	ramnus	619
R		rhaphanus	619
Radices esculentæ quæ.	49	rheas papauer	605
radij fractura	525	rheum	619
radicula	49	ad rheumata. 664	679
ramex, eius quæ species	262	rhigos	7
263. 480. 481. 483. 484		rhodacena	53
rana palustris deuorata. 413		rhodia radix	620
ranarum sanguis	553. u-	rhodia sanguinem compri-	
sus	565 (565	mens	682
ranunculus. 197 eius species		rhododendron	410
rapa	49	rhodomali præparatio.	
raphanatum rupturæ.	508	690	
rapum terræ	59	rhodostacti compositio.	
rapiradix & semen	570	cod.	
raucedo	201. 203.	rhœa	620
recutiti. 471. reduuia	312.	rhœti præparatio	690
refractio quid	508	rhododaphne	610
regius morbus	256 358	rhus	635
reycula	619	rhus coriarium	620
renum esus	55	rhyas	439. 175
renum mala. 238. 241. 242.		rhypos	620
245. 669		rhythmus. 77. eius differenz	
renū sanguinis eruptio. 244		tix. cod.	
		♂ 2	ricini

I N D E X.

ricini fructus. 589	foliū.	sabinum oleum.	574
cod. usus	643	sachar mel	605
ricinorum sanguis	553	sacra antidota quæ	650
rigor. 164	eius species. cod.	sæpiæ testa	622
ad Rimas manuum, ac pedū.		sagapenum	621
310	(740	sagapeui emplastris inferen	
rosacei olei preparatio.		diratio	724
rosarum uis	620	sal indicion	117
rosatum thymiana	747	salis flos. 556	spuma. cod. ex
rostra animalium concoctū		eo emplastrum	719
difficilia	55	ex Sale emplastrū. 717	pur
rubeta deuorata	413	gatio	647
rubia tinctorum	577	salia quomodo emplastris in	
rubia herba	129	ferantur	722
ad Rubicundum uultum fac		saluum uires	555
ciendum	194	salamandræ cinis	621
et Rubrica pictorum empla		salamandræ haustus	412
strum	715	417	
rubrica emplastro inferens		salicis folia, flores, cortex.	
de ratio	722	581	
ribus. 565	caninus	597	et Salicibus emplastrum. 711
ad Rugas faciei	192	salina stomachi	222
rugosa corpori medicamen		salinæ humanæ uis	622
tum	14	salua	575
rumex	598	sambucus. 555. eius flos. 585	
ruptio	152	rad. cortex	645
rupturarum diuersa gene		samia terra	568
ra	508	samius aster	211
ruta agrestis. 609. 424. 615		et Sampsucho malagma	731
et hortensis. cod.	688	samsychon	621
ruta ueneri aduersa	18	sandaracha. 621. eiusdem em	
8		plastris inferendæ ratio.	
Sabina	566	721	
		sandara	

INDEX.

sandarachæ haustus	423	saphyrus	602
sandix	621	sarapias herba	361
sanguinalis herba	1.617	sarcocolla	621.702
sanguinei fluxus in podagra		sarcoma	190
curatio	302.306	sarda terra	367
sanguis arteriæ & uenæ		sardonias herba	411.418
quid differat	374	sardonias glandes	418
sanguinis diuersæ species et		sardonius risus	419
uires	553	satureia sylvestris	581
sanguinis e uena & arteria		satyriaca antidotus	671
eruptio	373	satyriasis. 265. satyrium. 621	
sanguinis eruptiones ex ore.		saura. 621	saxifraga 621
199 sanguinis esus. 56		scammonia. 624	eius usus
ad sanguinis excreationem		641	stomacho noxius
pastillus	675	223.641.647	
sanguinis per uenam euacu		scandix	624
atio, eiusq; causæ. 456. ac		scandulatum ruptura cuius	
ratio	457. inde	modi	503
sanguinis profluuium e nari		scaphoides os	528
bus	191.120	scapulæ fractura	519
sanguinis redundatio du		schinos	629
plex	456	schistus lapis	600
sanguinis renu eruptio. 244		scilla. 624 eiusdem præpa	
sanguinis sputatio. 208.		ratio ad comitalem mor	
210.209. inde		bñ 661	
sanguinis taurini potus. 421		scylliticum	661
sanguinem comprimēs rho		scilliticorum pastillorum	
dia	682	preparatio	656
sanguinem sistentia	375	scincus. 408	scingus. 671
e sanguinib. antidotus. 554.		scingi carnes	624
660		ad Scirrhomata emplastrū.	
sapo Constantini	685	705	
sapon. 621	saprotes 621	scirrhus	352.557
		3	ad Scirrhos

INDEX.

ad Scirrhus emplastrum.	652		
717.718		sedis ulcera	267
scissile alumen	627	selachia	274.
scleroma	284	selusina terra	569
sclerophthalmia	172	seminaria conceptacula	
scoliosis	539	477	
scolopendra. 624. scolopen		seminis prolifici incontinen-	
drion. cod.		tia	265
scolopendra morsus	398	Se minibus malagma	731
scolopomacherion	443	pastillus	674.
scolymon	624	semodius	761
scordium	624	senecio	580.
scordij usus	643	Senecione emplastrum.	
scoria	625	707	
scorodon. 625. scarodropra		senectæ temperamentum.	
sum. cod.		13	
scorpioides	625	senum victus ratio	cod.
scorpius terrenus	cod.	seps	612
scorpy marini sel. 625. 637.		septi transversi uulnerati si-	
ictus. 406. 397. 398.		gna	506
392		serapius	612
scorpiuron	579	seriphium	622
ad Scrophulus. 714 emplaz		seris	622. 638
strum	704	serpillum	577
scrotum. 477 eius inflam-		serratus pulsus	80. 87
matio. 263 laxatio. 485		sertula campana. 605. inde	
scrupulus	760	malagma	725
scytales morsus	402	serum lactis	567
sebi esus	55	sesaminum oleum	742
secundæ quomodo educendæ		sesamoidis semen	612
492		sesamum	622
sedigiti	462	sefeli	572
sedis illitiones purgantes		sefelis	622.
		sefelis	

INDEX.

seuactiones	453	sifari radix	623
seuum diurnitate reddi ca		sifymbrium.	624
lidiu	627	sifon	623
sextarius	760.761	Ita sitis febricitantium	116
licus	761	sium. 48	623
sicyonium oleum	744	smaridis caput	588
simplex & compositum.		smegma aridum, Asclepias	
eod. si-yos	623	684	
sideratio	338	de Smegmatis. 680. 682. in	
sideritis	417. 575	de	
sideritis Hera clea	622	smilax. 410. 625. eiusdē poe	
Achillea	eod.	tus	418
sideros	623	smilium ad abscessus	705
sigillum lemnium	568	smyrna. 625. smyris	601
signa in aegrotantibus leta		smyrnium	48
liaqua	63	sole exustis	20
siligineus panis	50	solanum furiosum. 411. 418	
siliqua. 760	siliqua. 53	solanum hortense	627
sillybum. 623	silurus. 623	solani species. 627. soporife	
silphae 623	silphium. eod.	rum, furiosum. eod.	
similagineus panis	50	solaris herba	5
simplicium medicamentorū		solastrum	2
uires	550	solearum ueterū coria. 572	
sinapi	48. 609	solstitium autumnale. 671.	
sinapismus	733	brumale, aestiuale	65
sinapismi præparatio	737	somnus quid, eiusq; commo	
singultuum uariæ causæ, &		da	60. 61 (144
curatio	118	somnus uigil, coma	140.
sinopica rubrica	568	somni meridiani incommo-	
simus	368. 370. 493	da	61
siphonis uesciæ immittendi		sonchus. 625. sopor	62
ratio	474	soporifera	108
siraon. 578	siraon. 628	soporiferorum usus	61. 62
siriasu. 6.	siricum	621	forba. 53. sorbus
			610
		d 4	sordes

INDEX.

sordes expurgans empla-	ad Sputum cruentum. 204.
strum 719	208 (644
sory. 607. 629 quomodo em	squamæ Cypriæ usus 643
plastris inseratur 721	squamarum omnis generis
sotira antidotus 663	uires 599
sparganion 625	stachys 626
sparti. 625 spathe 320	stælicum profechij 695
specillum. 280 speculium	staltica collyria 170
626. specularis lapis	staphylinum 571. 626
sp hacelos 338	staphylepartum 198
spbagitides uenæ 157	staphyloma 176. 439
spheclaron 626	steata. 626 stcatomata
sphecle 206. 356. 632. 681	355. 453
spbincler 386. 496	stegnosis 11 stellio. 562
spbondilij 628	stellionis morsus 399
spinæ dorsi fractura aut cō	stercoris diuersorum animā
pressio 521 (539	tum uires 592
spinæ uertebrarum luxatio	sterilitatis præsidia 290
è Spina Aegyptia pastillus.	sternutamenta in febris.
675	113 (191
spinis gult infixis 449	sternutationes prolicientia
spinis extrahentia 373	stigmatis curandis 328
splanchnon 567	stinni 627
splenia 703	stæbes semen & folia 627
splenis obturatio 256. 258	stæchas 627 (47
ad Splenem malagma. 730	stomachos, uentriculi os.
spodiaceum ad inflammatio	stomachi affectus 220 adu.
nes 694	stio. 465 cruciatus con
spodium 626. 695	uulsorij 225
spongia 626	ad Stomachi duriciem co.
spongiarum lapilli 601	pton 731
spuma argenti potata 423	stomachi salua 222
sputi notæ 89	stomachi ulcus 224
	stoma.

I N D E X.

Stomacho quæ adhibenda cu ratio	110	de Sudoribus in febris. 111	
Stomachici	222.554	suffocatio	199 uteri. 286
ad Stomachicos picra	666	suffusio oculorum	440
Stomatica medicam.	607	sugillata	193
Strabismus	182.183	suillæ carnes. 54	humanis
Stragalotes alumen	672	similimæ	55
Strangulatis manus non adhi benda	201	suillum fel. 637. adeps. 626	
Strangulatio	199	sanguis. 553	sulphur 580
Stratiotes	627	superciliorū madarosis	174
Strigmentum	570	suppuratorum adustio. 462	
Strigmentorum uis	620.621	sura 527	surditas 188
Strobilon	597	suini olei præparatio	741
Strobilus	52	suppiriosorum potio	206
Strobilina resina	620	sutorium atramentum. 604	
Strophæ	354	sycæ. 628.	syce. eod.
Strumæ	353.447.452	sycamina	52
ad Strumas emplastrum.		è Sycamini succo emplæ	
712.716	(354	strum	713
ad Strumas exulceratis.		sycamora	53.714
Struthocamelina caro	54	sycamoros	351.628
Sturnorum stercus	593	sycosis. 173	syluæ mater. 615
Stipteria. 627	Styrax. 628	symmetron	550
Styracis usus	643	symphyton	628
è Styrace bechicum	663	synanche	199
Subera	634	synchysis	183
è Subere pastillus	677	syncipitis incisio	431
Subluxatio	532	syncomistos panis	50
de Succedaneis medicamen tis. 751	succinum. 579	syncope. 217 ex crudis huma ribus. 104	tenuibus succis
Succus Cyrenaicus, medicus,		105	
Syriacus, &c.	612	syncopes causa aliæ	106
Sudorifica medicamenta. 24		Syrica	53
		Syringotomata	466
		8 9	Syr

INDEX.

<i>Syrmaismos</i>	63	<i>tensionis laxitudo</i>	11	
<i>systematicus pulsus.</i>	77.78.	<i>tepia</i>	630	
86	<i>systole</i>	74	<i>terebinthina resina</i>	620.6-
<i>Tabes</i>	T	212	<i>iusdem usus</i>	643
<i>tali contusio</i>	528	<i>terebinthus</i>	629	
<i>tali suilli combusti usus</i>	613	<i>terminthus</i>	345	
<i>item bubuli</i>	cod.	<i>terræ cuiuslibet uires</i>	568	
<i>tamarix</i>	608	<i>terræ cuiusvis emplastris in</i>		
<i>tauri cornu.</i>	588	<i>serendæ ratio</i>	722	
<i>sanguis</i>	554	<i>medulla</i>	<i>terræ rapum</i>	596.597
608		<i>testæ ex fornacibus</i>	613	
<i>taurini sanguinis potus.</i>	421	<i>testiculus quid</i>	477	
<i>taurocolla</i>	629	<i>testiculorū bulceribus.</i>	349	
<i>taxus</i>	411.418.625	<i>testiculorum topi</i>	481	
<i>tecolubos</i>	240.601	<i>testium esus</i>	55	
<i>tedæ</i>	571	<i>testium inflammatio</i>	263.	
<i>tedacea resina</i>	620	264.	<i>temperaturæ indi-</i>	
<i>tela quæ extrahant</i>	373	<i>cia</i>	40.41	
<i>telorum differentia</i>	503	<i>testudinis marinæ fel.</i>	638	
<i>telorum extrahendorum ra-</i>		<i>guinis præparatio</i>	406	
<i>tio</i>	502.503.504	<i>tetanus, cuiusq; differentia.</i>		
<i>telis</i>	630	164		
<i>Telephia bulcera</i>	366	<i>tetrapharmacū basilicū.</i>	703	
<i>telephium</i>	630	<i>tettiges</i>	630	
<i>Tellinæ</i>	629	<i>Teucrium</i>	630.637	
<i>temperamentorum ordo &</i>		<i>teutlon</i>	630	
<i>excessus</i>	550	<i>Thaidis cerotum</i>	194	
<i>temperaturæ bonæ & ma-</i>		<i>thalasserus collyrium</i>	699	
<i>læ indicia</i>	33	<i>thalattion hydor</i>	580	
<i>temperaturæ ex saporis qua-</i>		<i>thalietrum. cod. thapsia</i>	580	
<i>litatibus</i>	549	<i>thapsiæ emplastris inferen-</i>		
<i>temulentia remedium</i>	17	<i>udoris usus</i>	58	
<i>tenesmus.</i>	229	<i>dæ ratio</i>	724	
<i>tensio</i>	164	<i>thapsiæ</i>		

INDEX.

Thapsia sumptio uenenosa.	inferenda ratio	724
424	Thure collyrium.	697 pul
Thapsia pastillus	uis	682
680	thylacitis	605.609
Thapsus 129 theion	thymbra	581.643
580	thymelaea	581.591
thelypteron	thymiamatum usus & præ	
theodoretus antidotus	paratio	747
250	thymion	410.411.418
theodoretus ex anacardijs.	thymus	487.581 thymi
667 et absq; anacardijs	269 genitalium	473
cod.	thymorum caro	629
theodotium collyrium.	tianus pessus	750
696	tibia eadem ratio cum cubi	
theriaca antidotus, eiusq;	to	527
preparatio. 656. & u-	tibia fractura	527.528
sus	tilia folia	634
657	tinctorum rubia	577
theriace contra uenena	titanos	631
392	tithymali cinis	630 140
theriacalium pastillorū præ	dix. cod.	
paratio	tithymalli species.	630.631
656	tithymalli usus	642
Theriaci sales	tonsillae	447
658	tonsillarum inflammatio.	
thermarum ultro proueniens	197	
tium usus	tophi articulorum	299
27	304.308. testiculorū.	481
thermus	ad Tophos emplastrum.	
580	717.718	
thlapsi semen	tormina	230 intestia
581	norum	671
thlasis	torpedo marina	609
188.509	toxicum	
thoracis morborum præsa-		
gia		
63		
ad Thoracis uitia Cyphoi-		
des		
667		
thridax		
581		
thronus Marcellius		
677		
thryallis		
635		
thus		
600		
thuris fuligo		
cod.		
buris lachryma emplastris		

I N D E X.

toxicum	419	toxeumata.	tuberculum	498
cod.			ad Tumores emplastrum.	
trachoma	173		717	
tragacantha	631		turturum sanguis	553
tragium	631		tusilago	566
tragoriganus	631	tragoria	tusis febricitantes infestās.	
goniflorum usus	643		112	
tragositodes	631		tusis generatio. 201. curatio	
tragus frumentaceus	631		203. 204	
ad Tremores unguentum.			tusis inueteratæ maturati-	
736			uum	205
de Tremoribus	166		ad Tusim, e' styrace medica	
tribulus	631		mentum	664
triches	632		tylosis	173
trichiasis palpebrarum.			tympanias hydrops	252
175			tyros	632
trichocollia	cod.		V	
tricoeca	605		Va	610
trifolium	603. 611		ualerianæ radix	635
triga	632		uari	193. 194
trigle	631		uaricosus rarnex	481
trigonus pastillus	674		uarix	498
triorchis	347. 361. 612		uarices	481
triphyllon	603. 621		uaricum excisio	498
triticum	50. 619		uasorum dissectio	429
trixaga	636		uenarum plenitudo pericu-	
trochisci	673		losa	16
trogloclites	240. 632		uenarum sectio. 456. eius-	
tropolium	632		dem usus. cod. inde. et. di-	
tryblia	760		uersa ratio	458.
tryx	632		459	
tuber terræ	633		à Venena eiaculantibus quos	
tubera	50		modo cauendum	390
			uenenorum	

I N D E X.

uenenorum præseruatio. 407.	408	uenenorum quocunq; modo sumptorum communis curatio 409	uenenorum simplicium enu meratio 410	uenenis homini insidiantiu astus 407. 408	ad Venenatos morsus 391	ueneris moderatus usus. 18. et opportunus quando 19	ueneræ rei emolumenta. 17.	ueneri aduersa 18. 19. 20 (18)	ad Venerem stimulantia cu iusmodi 18. 19	uenter quomodo sine medi camento mollicendus. 64	uentris affectus 220	uentris diuersorum anima lium usus 591	uentris imi uulneratio 506	inflatio 225	uentris morborum præsa gia 64	uentris plenitudo damnosa 16	uentris resarciendi ratio. 468	uentricul. temperatus et in temperatus cuiusmodi 38	uentriculi esus 56	uentriculi temperatura in	ueratrum alb. & nigrum. 575	e' Veratro utroque pasto lus 679	ueratri exhibendi ratio. 652. 653. inde, usus 641	uerbasci genera 635	uerbenaca 615	uere cuiusmodi uictus ratio ne utendum 28	uermes hulcerum 361	uermes terreni 569	uermiculans pulsus 80	uergiliarum exortus. 650	casus. eod.	uerruca 502	uerrucæ 332. 333	uerterarum contusio et fra ctura 521	uerticilli 628	uertigo, uertiginosi 147	uesica per paralysin exolu ta 246	uesicæ exulceratæ indicia. 242	uesicæ immittendi clysteris ratio 474	uesicæ inflammatio 241	uesicæ mala 238	uesicæ morborum præsa gia 64	ad Vesicæ uitia bellaria. 671	uesicæ uulneratæ signa. 566	7	ex Vesicæ
-----------------------------	-----	--	---	--	-------------------------	--	----------------------------	--------------------------------	---	---	----------------------	---	----------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--	---------------------	---------------	--	---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	-------------	-------------	------------------	---	----------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	-----------

INDEX.

ex Vesicagine pastillus	676	741	
ex Vesicaria past.	679	uiperæ tam maris quam fœ	
uesparum ictibus medendis		minæ morsus	400
396		uiperarum ad theriacam	
uespertilionis sanguis	553	præparatio	656
ueterinus	62.142	uiperarum adeps	627
uictus ratio cuiusmodi sin-		cōtra Viperarū morsus.	392
gulis anni temporib. uti		uiperina pellis.	572
lis 28 negotiantibus		577	cano
peregrinantibus	29	uires demolientia	85
naulgantibus	30	uiscum	581
uigilia febricitantes infe-		uisum aouēs collyrium.	698
stans	108	699	
uigilia sanorum quomodo		uitex. 551	uitiligo 325
arcedæ	61	uitis candida.	558. nigra.
uinum. 610 in quo ferrū ex		eod.	
tinctum	623	uitis satiuæ & syluestris ui	
uinum liberalius à balneo		res 558	uitrum 633
potū ueneni instar	411	uitulina medulla	608
uinū melle et oleo leuius		ulmus. 618	ulophonon. 417
760. uinū purgans, in hy		umbilicus ueneris	594
drope	647	umbilici illitiones purgan-	
uini fex	632 (682	tes	652
e Vini fece cremata puluis.		umbilici procidentia	261
uini potus quatenus noxius		prominentia	466
424		uncia	760
uini uirtutes, & usus, 59. i-		undosus pulsus	80.87
tem abusus	60	unedon	576
e Vino collyrium	700	unguatum ruptura cuiusmo	
uiole	582	di	508
uiole albæ frutex, flores, ra		ungueta quid ab acopis dise	
dx	599	ferant	733
uiolacci olei præparatio.		unguentorum compositio	nes

INDEX.

nes ac uires diuersæ. 738	matio 278	exulceratio
inde	281.488	
unguis oculi 177.178	uteri cancer. 282	scirrhus et
ungues contusi. 313	cruenti.	duricia. 284. mola. 285 in
eod. scabri. eod.	flatio. 286	suffocatio. eod
unguium collisio. 501. ptes	uteri procidentia	288
rygia 500. uilia. 312	uua. 447	eiusq; inflamma
uocis contentio. siue uocifer	atio	198
ratio 10	uua. 52.	uua passæ. eod.
ad Vocem amissam 205	uuatio	439
uolucrum fel. 638	uulpinus adeps 627	pulmo
uoluulus 237	616	uulpis usus 557
uomitio biliosa 117	uulua amputata mulierem	
uomitione quibus utendum	superuixisse	289
652. 653	uulua sine mortis periculo	
uomitioria pharmaca. 652	tota adempta	505
653	(tia. 21	uul. & hæmorrhoides. 292
uomitus difficultati meden	293 præclusio. 289	rha
uomitus ieiuni ratio 63	gades 292	condylomata.
uomitus usus 16. 17. 21	eod.	X
uranium collyrium 697	Xanthion	610
urinæ obseruatio in renum	xerophthalmia	172
& uesicæ affectib. 242	xesta. 759. xiphij radix. 610	
urinæ stillicidium 245	xiris. xyris	610
urinæ usus 613	xylocolla	629
urinam non continentibus	xyster. 696	Z
remedia 246. 247	Zea	578
urinarum notæ 88(242	zingiberis radix	eod.
urinariarū partiū abscessus.	zomos	578
ursinum fel. 637	adeps 625	zopisa resina
sanguis 554	zopyrus antidotus	668
urtica 48. 554	zosimi unguentum	736
uteri abscessus. 280	inflam	zyme. 578
	zythus. 578	

FINIS.

PAULI AEGINETAE
IN SVOS DE RE MEDICALI
broſ Præfatio, Albano Torino
interprete.

Pauli laborem me noſce, qui plurimum
Peragravit terra, Aegina natus patria.



ON quī ueteribus, eorū quæ ad
artē ſpectant, prætermiſſum quic
quam putem, inſtitutū nobis hoc
opus eſt, ſed quī in compendiū do
ctrina redigatur. Cōtrā enim, nō
tam rectē, quā abſolutē etiā, il
lis ad unguē omnia elaborata cē
ſeo. Rectiores uero, præterquā quōd eos attingere nō cu
rant, etiam uanitatis accuſant. unde commentationis huius
conſilium capimus: his quidem cōmentariolum, quod ut ue
riſimile eſt, quærunt, compēdioſum: nobis uerō exercitium
futurū. Abſurdū enim eſt, rhetoras forēſium rerum præ
ceptis breuibus, concinnisq; codiculis, ac ueluti coambuloni
bus (ſic enim uocant) quibus legum quidem omniū ſumma
quædam ad uſum expedita tenetur, uti: nos autē eadē negli
gere. quanquam illi non ſolum perexiguū, ſed iuſtū cogi
tandi, reputandiq; negotij tempus prorogare ſibi poſſūt: no
bis contrā, uel nūquam, uel perrarō ſanē facultas ea datur,
quando in morbis quibuſdam cunctari ſæpenumerō abſq;
graui discrimine nō licet. unde rectē admodū Hippocrates,
pernicē eſſe occaſionem docuit. Illos ſiquidem in ſolis pro
pemodum urbibus uſus occupat negotiorum, ubi magna li
brorum copia eſt: Medicis uerō nō in urbibus, agris' ue, aut
ſolitarijs locis tantū, ſed iam et mari, in ipſis perſæpe na
uib; repentiū morborū neceſſitas incidit, in quib; mora
uel interitum, uel extremū periculum adfert. Quādoquidē
autem

P R A E F A T I O .

autem uniuerſas medendi rationes, uel omnem per ſingula
 materiam memoria tenere, arduus & impoſſibilis conatus
 eſt: Epitomen illam parauimus, e' priſcorum medicorū mo-
 numentis conſarcinata. Neq; enim ex nobis natū quicquā
 adiunximus, paucis quibuſdā exceptis, quæ in arte exercen-
 da notaui, et experientia deprehendi. Pleriq; uerò medico-
 rum illuſtrium ſcriptis congreſſus, Oribasij præſertim (quē
 et ipſe ſua aliunde decerpiſit, unde uolumē, in quo uniuerſam
 ualeitudinis tuendæ rationem complexus ſum, tranſtuli: nā
 poſt Galenum, et iuniores etiam Galeno fuit) præcipua ex
 omnibus delegi, morbo nullo, quantū id fieri potuit, præter
 greſſo. Nā illud in ſeptuaginta libros diuiſum Oribasij uo-
 lumen (Hebdomēcontabiblon appellatū) Medicinæ quidē
 argumentum omne tenet: ſed parare tam immenſum opus,
 haud cuiuſuis eſt. Epitome uerò ad ipſius filium Euſtathij
 ſcripta, quæ ab integra morborū omnium tractatione mul-
 tum abeſt, etiam cæterarum rerum ſpeculationem imperfe-
 ctam habet: aliās cauſis, aliās notis, interdū etiam abſoluta
 curatione, tanquam alia ſubierint, prætermiſſis. Hoc uerò
 quicquid eſt opuſculi, morborū omne genus, qui in ſimilari-
 bus, uel inſtrumentarijs corporis partibus, uel continui diſſo-
 lutione uiſuntur, cum notas, tum cauſas, tum curationes cō-
 plectitur: neq; in ſumma tantū, ſed ubicunq; res ipſa fere-
 bat, ſuſius etiam. Ante uerò hoc, de tuenda ſecūda ualeitudi-
 ne perſcripſimus negociū totū. Poſtremo de ſimplicium, cō-
 poſitorumq; medicamentorū facultatib. librū condidimus.

S E P T E M T O T I V S O P E R I S (V N I
 uerſum enim in totidem libros diductum
 eſt) ſcopi.

In Primo uolumine, omnem quæ ad ualeitudinem tuen-
 dam ſpectat, materiam comperies: et quānam affectiones
 ætatibus, anni temporibus, temperaturis, et alijs quibuſdā,
 peculiari

PAULI ÆGINETÆ

peculiares, præcauantur, & emendentur, facultatesq; ac
usus omnium alimentorum, quemadmodum in capitibus ex
plicauimus.

In Secundo de febribus singulis docetur, præmissis quia
dem quæ huc spectant omnibus notis, uidelicet ab excremen
tis, diebus decretorijs, et alijs id genus: subiectis uerò, quæ fe
bres comitantur symptomatis.

In Tertio de affectionibus per singulas corporis partes,
à capitis coronide ad pedis usq; plantam, extremosq; un
gues grassantibus, agitur.

In Quarto, de his quæ forinsecus corpus impetunt malis,
& ueluti in aperto cõstitutis, quæ non in certis, sed in ple
risq; partib. insurgunt, sermo fit. In quo de lumbricis quoq;
& dracunculis tractatur.

In Quinto, de his quæ uenenũ ictu, morsu uel relinquant:
inibiq; de rabiosi canis morsu, et aquæ metu: deq; canis non
rabidi, hominisq; morsu. Inter quæ de uenenis pariter, &
contra uenena præsidys docetur.

In Sexto, de omnibus quæ tam in carne, ubi & telorum
extrahendi ratio cõprehenditur, quàm in ossibus, in quibus
fractionum uitia, & artuum luxationes continentur, ma
nuum & scalpelli operam desiderant, differtur.

In Septimo, omnium medicamentorum cùm simplicium
tum compositorum uires continentur, præsertim eo
rum, quorum discursim in superioribus sex libris facta est
mentio: maxime maiorum, et tanquã insignium præpara
tionum. Scimus sanè illic non omnes diffuse, ne doctrinæ
fieret confusio, explicari: ut quærens aliquis unã, plures uel
nobilium compositionum, facile reperiatur. Postremò addun
tur nonnulla quæ ad compositiones medicaminum conse
runt, item de succedaneis speciebus, ita ut totum uolumen
in ponderum & mensurarum disciplinam desinat. Exor
dicimur itaq; iam primum commentarium.

HYPOT

LIBRORVM ARGVMENTA.

HYPOTHESIS LIBRI PRIMI.

Primum huius operis hoc volumen est, in quo uniuersam de
tuenda sanitate hypotyposim profecuti sumus, ceu iam pridem
in prefatione ostensum est, et deinceps denuo per capita dicitur.
Illud prius ingenue fateri libet, magnam partem eorum quæ pri-
mo & secundo libro tractantur, huc ex Oribasio traductam. no-
luimus enim propriam opinionem struere, uerum ex omnibus
utilitatem deglubere. In reliquis quinque libris paucissima cõtuntur
ex illius monumentis mutuata sunt.

CAPITA LIBRI PRIMI.

De his quæ in foetura prægnan- tibus accidunt, quoque nutrita tu alēdæ sint grauidæ. Cap. 1	Ad calfaciendā habitudinē. 26
De nutrice 2	Ad uitiatū corporis colerē. 27
De lacte nutriticis probando 3	Ad liuores & fuscidades 28
Quomodo lactis uitia emen- dentur 4	Quæ dentes præseruent 29
De infantis educatione 5	Aduersus grauem auditum. 30
De exanthematis quæ puello oboriuntur 6	Ad oculorum caliginem 31
De rufi & coryza infantis 7	De plenitudine 32
De gingiuarum pruritu 8	De temulentia 33
De dentitione 9	De iis quibus alimenta corrū- puntur 34
De aphtha-oris ulcere 10	De re uenerea 35
Ad scemorum intertrigines 11	De iis qui uenere uti non pos- sunt 36
Cõtra aurium humectationes. 12	De iis qui uenerem immodice exercent 37
De Siriasi 13	De nimietate genituræ 38
Infantium & reliquarum dein- ceps ætatum, usque ad eā quæ uigorem transiisse uidetur, educatio 14	De iis qui ex frigore noxam contraxerunt 39
De frictione præparatoria 15	De iis qui immodico ardore iniuria affecti sunt 40
De exercitationibus 16	De pituita in uentriculo supe- riore abundante 41
De exercitationū generib. 17	Quomodo quis facile uomitū promoueat 42
De frictionum generibus 18	De iis quæ secunda ualitudine cõstitutis, aluum emolliunt, & lotium cient 43
De uociferatione 19	De clysteribus 44
Cuiusmodi lassitudines exerci- tationes excipiant 20	De glandibus 45
De cutis adstrictione 21	De caput purgantibus per os & per nares, deque unguen- tis 46
De spontaneis lassitudinibus. 22	Quæ menses trahant mulie- bres 47
Cuiusmodi rationem uictus se- nectus postulet 23	
Ad rugosum contractumque cor- pus leuigandum 24	
Ut suauiter spiret corpus 25	

Sudo

CAPITA LIBRI I.

Sudorifica medicamenta	48	in uētriculo, exempli loco,	
De aere	49	paulo uero post reliquarū	
De aquis	50	etiam intēperaturarū cor	
De balneis	51	rectio	72
De thermis sua sponte prou-		Quæ sint alimentorū uires.	73
nientibus	52	De oleribus esculentis	74
De uisus ratione singulis anni		De olerum asparagis	75
temporibus utili	53	De iis quæ edendo sunt radici	
Viſus ratio in negotio deg en-		bus	76
tibus	54	De tuberibus ac fungis	77
Viſus iter facientibus obser-		De frumentaceis	78
uandus	55	De legumentis.	79
Nauigantibus quæ uisus ratio		De temporariis fructibus	80
conueniat	56	De his quæ ex arboribus de-	
Quomodo purgandi & exte-		cerpuntur fructibus	81
nuerandi sint obesi	57	De animalibus, primitus q̄ de	
Qui nam macilentis educandi		uolueribus	82
sint	58	De ouis	83
Quomodo partibus attenuatis		De quadrupedib. animalib.	84
medendum	59	De animalium partibus	85
Optimæ tēperaturæ indicia.	60	De lacte	86
Quæ sint male temperaturarū		De lactipotatone	87
corporum notæ	61	De lacte fissili	88
De figuratone capitis	62	De casco	89
Quæ sint temperamēti cerebri		De piscibus	90
indicia	63	De corio testaceo præditis.	91
Ventriculi temperaturæ indi-		De mollibus	92
cia	64	De piscibus sine squamis	93
De indicia pulmonis	65	De grandibus, ceraceis ue	94
De notis tēperaturæ cordis.	66	De uiribus uini	95
Iecoris tēperaturæ indicia	67	De melle & aqua mulsa	96
De notis tēporaturæ testiu	68	De somno	97
De iis quæ omilla sunt	69	De uigilia	98
Qui calidæ corporis distempe-		De ueterno	99
rantia corrigi possint	70	Dioclis epistola prophylacti-	
Quomodo frigidæ intemperan-		ca	100
tia corrigantur	71		
Sic corū distemperamentorum			


F I N I S.

PAULI AEGINETAE

LIBER PRIMVS, AL-

bano Torino interprete.

De his quæ in foetura prægnantibus accidunt, & quonam illis uictu utendum sit. Cap. I.



Vum scēinas utero gerentes, eiusmodi magna ex parte casus affligent, redundatio stomachi, iugis uomitus, sputatio frea- quens, erosiones oris uētriculi, & horror deniq; cibi: operæ precii fuerit, documenta quibus eis subueniatur, tradere. Utan- tur itaq; præsentī commoditate, inambulationibus, obsonijs haud magnā in partē suauibus, melini coloris quod pariter & ab odore cōmendetur uino, in primis lustrico, & pota- tione moderata. His quippe omnib. tum redundationi stoma- chi, tum crebræ uomitioni succurritur. Medicamentorū ue- rō prouinciā subeūt, sanguinalis herba, quæ polygonō Græ- cè uocatur, aqua elixa & epota: pariter & anethū, radixq; pōtica, uernaculo ab indigenis gentis suæ uocabulo Rha ap- pellata. hæc indiscriminatim tā dapib. alijs nondū gustatis, quā secundū ipsas datur ingerere. Forinsecus autē præcor- dijs labruscæ, punicæ syluestris atq; satiue florē, smyrnij co- mam, scēniculiq; semē, cataplasmatīs modo applicare expe- dit. Neq; interest quomodocūq; tēperes, cum palmulis ne, & uino ueteri, siue seorsim. Ad oris uētriculi lācinationes cōdu- cit calidā potare, suauiter inābulare, & hypochondria mol- li lana tueri. Quæ ab edulys appetitus auersione laborant, diuersi generis, & ad uoluptatē cōparatis dapibus, amyloq; arido excitadæ sunt. Maximè uerò id grauidis cōfert, quæ telluris glebam deglutire gestiūt, quemadmodū in malatia, quā Græci citiā, id est picā indigitāt: quæ circa tertiu à cō- ceptu mensem ideo plerūq; ingruit, quod nequeat tum cōce- pius, ob imbecillitatē, omne quod à locellis nutrimentī ratioe

A recipitur,

PAULI AEGINETA

recipitur, cōficere: superuacanea idcirco ac uaria in stomas-
cho retrimēta ueluti strues congerūtur, unde tā diuersarum,
tamq̃; insolentiū rerū nascitur pręgnantib. appetitio. Verbi
gratia, carbonū extindorū, creta cymolea, & aliorū cōplu-
rium. Ex qua ratōe nomenclaturā hāc id malū inuenit, à pi-
curata illa scilicet pica auis uarietate: uel q̃ istiusmodi affe-
ctus illā subinde auē impetat. Cōducunt etiā exercitationes,
& lōgiusculę profectiōes. Si qua uerò in ocio genialiter ui-
uitare assueuerit pręgnās, hęc repētinās nulla cōmoditate
subibit motiones. Expedit pręterea cibū abhorrēti nonnunq̃
acria, pręsertim sinapi, degustare. Aduersus porrò laxos et
eximios pedū tumores, pręsentissima cū utilitate, solostrū,
quā anthyllidē uocāt, in aceto maceratū superdeligatur, &
brassę folia latē distēsa. iuuat cretā cymoleā ex aceto pari-
ter, et alumē cū aceto inducere. Profunt itē mala cognomen-
to Medica, quę Citria dicūtur, in aqua fouēdis pedib. elixa.

De nutrice.

Cap. 2.

Vtrix igitur iudicio delectuq̃; paretur, nulli pręter na-
turam afflictioni obnoxia, neq̃; natu grandior, neq̃; ados-
lescens admodum: ita tamē, ut minima quidē natu, lustra ad-
minus quinq̃; numeret, maxima uerò septimum nō excedat.
pectore sit latiore & mīmosiore, papillis neq̃; cōnientibus,
neq̃; auersis: reliquo corpore quadrato, quod est, neq̃; ualde
obeso, neq̃; supra modum gracilēto. Magnificē porrò iuuas-
bit infantiē, nō ita priāē peperisse nutricē, & pręcipuē ma-
sculū. Fugienda sunt ei arefaciētia immodicē, salsa, acria, as-
cerba, acida, amara, uehemēter calorifica, graue admodū o-
lētia, odoreq̃; nimis insignitē fragrantia cōdimenta, aliaq̃; as-
credinem pręferentia. A coitu pręterea nutrix abstineat.
Manus ac humeros molendo texendoq̃; exerceat, infantem
ulnis huc illuc trimestrem iam & quadrimestrem baiulet.

De lacte altricis probando. Cap. 3.

Primum bonitatē honorem lacti tribues, crassitudine, co-
pia,

LIBER PRIMVS.

3

pia, colore, odoratu, & sapore moderato. Inculpatum item, quod dum super pollicis unguem, nitoris contemplandi gratia instillatur, flexo ungue, nec ocyus, nec lentius delabitur. Quin istoc etiā modo examinari conuenit. Lac emulsiū uia trco uasi inyciatur, cui momentum coaguli triti cum digitis adiectum sit: dein quiescere quoad coaguletur, permittas. si tum minus casei quā serī in eo appareat, hoc parum frugū ducito. Ab hoc diuersum, concoctioni renititur. Laudatissimum, quod intra utrunq; excessum mediocritatem obtinet.

Quomodo lactis uitia emendentur. Cap. 4.

Lactis uitiositas ista ratione corrigitur. Si crassius sit, uomitionibus pituita expellenda est, quæ acetoso mulso pulcherrimè concitantur. Oportet etiā eandem ante cibum laboribus extenuare, cui negotio origanum, hyssopus, satum reia, scandix, thymus, momentū raphani, & salsamentū uetus cum oxymelite in cibo accommodatissima sunt. Sin autem acrius & tenuius lac euaserit, tum laboribus numerosis nutricem subleuare, sorbitionibus uerò, porcinisq; carnibus ali, defruto & uino dulci potari cōuenit. Quod si lac parcius reddatur, sorbitionib. ac cæteris epulis liberalius indulgendum, merūq; suauius bibendū, pectus & ubera confricanda. Quibus etiā cucurbitula agglutinata, quæ factio opus erāt, opē præstilit. Medicamēta uerò, licet creando lacti aliquid expedire intelligam, nolim tamen assiduum ipsorum usum, quod uiolentiū colliquant, præcipere. Bius generis sunt feniculi radix, semē cū ptisana decocta, cytisiq; folia in uino nigro, aut ptisana et nigella anethūq; in passo, pastinaca syluestris tā semē q̄ radix: quæ calida prius macerata exhibenda sunt. Debet aut nutrix quodlibet lac uitiatum, siue crassum, siue acre, tetricūq; odoris fuerit, priusq; sucū puellus hauriat emulgere, atq; ita mammā fellitādū porrigere. Cæterū acre nunq̄ ieiuno propinandū est. Graueolētia ipsius uino odoratiore et ferculis dulcibus corrigitur. Super lacte casei

A 2 modo coas

modo coadmo lib. 3. cap. de Mammarū affectibus, differemus.

De infantis educatione. Cap. 5.

PRæ omni cibo mel infanti nuperrimè nato præbendum est. Mox etiā lac, bis cotidie, uel ad summum ter, offeratur. Vbi uerò alacer factus propius assumit, & cibū concoquendi spem exhibet, tum minus repletibus ipsi edulys uti expedit. Si uerò per imprudentiā nostrā repletus fuerit, somnolentiorq; cōfestim hebetiorq; euadit, uēter intumescit et inflatur, lotiū aquosius redditur, quæ plenitatē arguūt, nihil donec ingessū cibū cōfecerint, exhibendū est. Satis aut fuerit, biennio integro lac tantū pappare, posthæc deniq; initiari.

De exanthematis, quæ puello oboriantur. Cap. 6.

Quæcunq; per summam pueri cutem efflorescūt, principio quidem æqui boniq; faciēda sunt: sed ubi in corporis superficiem probè eruperint, tum curationem lauacris ex myrto, lētisco, rosisq; moliri: deinde rosaceo, aut lētiscino, ceratoq; cum cerussa uti, clemēterq; nitrīs abstergere cōpetit. uehementiora nanq; uix tolerabit. Vtilissimum uerò fuerit, nutricem dulcioribus ferculis pasci, & puerum neq; pleniore, neq; nimis tenui cibo ali. Quod si alius infantis ascripta sit, mel cibo infusum simul elixabis: si ne tum quidē respondeat, resina terebinthina ciceris magnitudine inijciatur. Si plus æquo feratur, milium impendio quā cōpescendo prodest.

De tussis & coryza infantis. Cap. 7.

Quando autem tussis aut grauedo infantem impetit, mel-
litisimis utendum est. Puero igitur multa prius calida abluto, caput ipsius liberaliore mellis copia perungi, postremò lingua digito molliter comprimi debet: mirum enim, quantam pituitæ uim ex ratione uomitu eijciat.

De gingiuarum pruritu. Cap. 8.

In pruritu gingiuarū puellus torqueatur, fotu & abundanti unctiōe ex oleo probè elixo, cum momento cera in eo liquefacto, utendum est.

De

LIBER PRIMVS.

De pueri dentitione.

Cap. 9.

Circa mensem ferè septimum infrendibus dentes produ-
cuntur, quo tempore gingiuarum, maxillarū, tendinūq;
inflammationes, non raro neruorum etiam conuulsiones, im-
petunt. Tunc igitur pusillo nihil, quod mandendū sit, exhi-
bere cōuenit. Ceterū gingiua digitis in balneo assidua fri-
catione palpanda, gallinaccorūq; adipe, aut leporino cere-
bro emolliēda. Vbi uerò iā dentes profuerint, lana delicati-
or atq; syncera, ceruici, capiti, & maxillis applicāda: quæ
ex oleo quoq; dulci & calido fouere, auditorijsq; meatib. i-
dem instillare congruit. Quo tempore infantem uberiore ui-
du nutrire, & calida lauare, confert. Si alui etiam fluore in-
festetur, eam epithematis, quæ comprimendi facultate præ-
dita sunt, compescere conabimur, inspergentes lanæ uel cy-
minum, uel anethum, uel apium. Profuerit etiam semen rosa-
rum inferere, & in uniuersum calorificis arefacere. Si uerò
alius defecta nihil deiciat, melle in glandis instar redactio le-
niter irritetur, aut nepeta cū melle lauigata intingatur. Pu-
to aut efficaciter cōuulsionibus puerorū, heliotropiū, quam
solarem Latini dicunt, aqua elixū opitulari, si eo puerulum
decocto laueris. Expedit, si oleo irino, cyprino, aut sicyonio
illitus, totus incaluerit. Si uerò ubi iam dentes eruperint, di-
gitos morsu sauciat, utile fuerit iridis radicē rasam, neq; ad-
modum siccam, ore continere. Id quod & ulcerib. quoq; præ-
sidio est. Butyrum pariter cum melle illitum confert. Gingi-
uarum postremò pruritus, salsamenti ueteris caro lenit.

Ad oris ulcera quas aphthas nominant. Cap. 10.

Locus quoq; oris, cui aphtha cognomentū est, nuper natis
Voboritur, aliàs quidem subcandido, aliàs in ruborem lan-
guescente, nonnunquā atro colore, qualis in adustorū crustis
uidetur, quod omnium periculosissimum & maximè letife-
rum est. Cui præsidio iris est cum melle, aut arida, si siccam
inspirare malis. Itidem & rosarum folia contusa, pariter

A 3 & ca-

Et earundem flosculi. Crocus, myrrha momentum, galla, thuris, cortex thuris, aut una simul, aut priuatim singula melle irrigata. Præterea aqua mulsa, Et mali punici dulcis cremor subuenit.

Ad femorum intertrigines. Cap. 11.

Duersus intertrigines feminum, myrtus sicca, cyperus,

Ac rosæ magno commodo insparguntur.

Contra aurium humectationes. Cap. 12.

Uincta aurium uitia, lana ex alumine indita, uel uinum mulsum, uel uinum uetus instillatum, uel crocus uino exceptus, arefaciunt.

De Siriasis. Cap. 13.

Siriasis est partium circa cerebrum, eiusque membranas inflammatio. Cœcaui fit in ea sinciput, cœcaui itidem cum pallore oculi, accedit etiam totius corporis ariditas. Succurrit huic malo lutei oui sincipiti cum rosaceo complicati paniculi pigmenti, ne modo impositum: sic tamē, ut assidua mutatione renouetur.

Aliud contra Siriasis!

Conuenit eidem loco herba, quam Græci heliotropion appellant, folia, cucurbitæ ramenta, cucumeris, quem pepo nem nominant, adiacentem carni pelliculam, aut bortenensis solani succum cum rosaceo imponere.

Infantium, & reliquarum deinceps ætatum, usque ad eam quæ uigorem transiuit, educatio. Cap. 14.

Bi ablactati fuerint infantes, relaxato animi freno, suo modo in hilaritate uitam ducere permittentur. Exercitia ludicra, Et leuiore nutritus cōcedatur. A sexto uerò statim anno, primoque septennio, tam pueri quam puellæ præceptoribus mansuetis ac humanis tradendi sunt. Ei namque cum animi relaxatiōe ac gratia, tenellos animos cum literis tum moribus imbuunt. Et animorum securitas relaxatioque, haud parum ad uegetam corporis educationē momēti adfert. Duo decimum natalē ubi peregerint, Grammaticos Et Geometras uisitare

LIBER PRIMVS.

uifitare, corpusq; ipforum exercere neceſſitas eſt. A quarto & decimo anno ad uigeſimum uſq; primum, Mathematicis diſciplinis & Philoſophorum rationibus ſedulam nauet operam, compluriaq; exercitia propter corporis fortitudinem ſubeant, quod animum ac corpus iuxta exercitantes, a Veneris ſtimulo coerceantur. His etiã amplioris uini uſus contrahendus eſt. In ſummo uerò ætatis flore, abſoluta uictus ratio tum animi tum corporis obſeruanda. Proinde nullo non exercitiorum genere utendum, potiſſimum cui operam ſinguli dare conſueuerunt. Cibos abundantiores plenioresq; inculpatæ alimonie uſurpent. Quib. uerò iã ætatis ſua ſtatus declinat, iſs moderatior frugaliorq; tam animi q̃ corporis educatio conſert. Cæterum exercitationes omne genus pro ætatis ratione relaxandæ ſunt; deq; plenioris alimentis ſubtrahendũ, habitu eorum iam ad frigiditatem uergente.

De friſtione præparatoria. Cap. 15.

Exercitationem mediocris quædam corporis calfactio præcedat, friſtione linteolis adminiſtrata, mox nudis etiam palmis oleo madentibus, tantisper dum abundè incaleſcat, & mollius reddatur corpus, iucundusq; rubor efflo-ruerit, & tumoris moles inducatur.

De exercitationibus. Cap. 16.

Vehementior corporis motus, exercitatio eſt: meta autem uehementiæ eſt, animæ ad ſpiſitudinẽ alteratio. Exerci- tationes aut inſtrumētarias corporis partes morbis obnoxi- as minus, ad muniaq; obcũda inſectas; ad hæc, ut cibi uali- dius ab iſdẽ attrahantur, propius permutetur, & liberalius reſiciatur caloris beneficio uehementi motione excitato effi- ciunt. Meatus præterea expurgant, excrementa ob uehemen- tẽ ſpiritus impetũ euacuant. Quoniã ergo diſtributioni in cor- pus particulatim opitulatur exercitatio, conuenit utiq; nul- lam neq; crudorũ neq; incoctorũ ſiue ciborũ ſiue humorum multitudinem, neq; in uētre neq; in inteſtinis cõtineri. peri-

A 4 culum

3 PAVLI ÆGINE TÆ

culum enim est, ne prius in cunctas animantis partes rapiatur, quàm probè concoquatur. Liqueat igitur, exercitationes oportere cibum præcedere. Opportunitatem porro obeundi laboris, lotij color arguit: aqueum quippe, crudum etiam dum succum, ex uentre redditum præfert. Rubrum uerò ac biliosum, concoctionem iam pridem ad unguem absolutam insinuat. Quod modicè pallet, peractam modò concoctionem portendit. Tum igitur exercitationibus manus admouendæ, uesica prius, uentreque; retrimenti exoneratis.

De exercitationum generibus. Cap. 17.

Vniuersæ semel exercitationi commune est, quod naturæ his animantibus caloris augmentum excitat. Separatim uerò considerando, Valens, hoc est uiolenta exercitatio est, quæ musculis & nervis robur præparat: cuius farinæ sunt, fodere, ingenti onere sublato, aut eodè in situ permanere, uel paululū procedere. Huius quoque generis est acclivis inambulatio, item funem manibus apprehensum scandere, atque id genus alia multa. Velox autem exercitatio citra robur & uiolentiam peragitur. eius sortis sunt, cursus, umbratica armorum meditatio, duorum summis manibus complicatis concertationes, & quæ uel coryco, uel exigua pila fit exercitatio. Validum uerò exercitium celeri non rarè componitur, si quis illi perinde atque huic acriter innixus, festinis motiones addiderit. Porro exercitationū genera alia lūbos potius, quàm brachia aut crura fatigant: alia spinā totam, aut thoracē modò, siue pulmonem. Exercitetur autem quisque, donec corpus in tu morem eleuetur, & color ille floridus appareat, motionesque promptas, æquabiles & cōcinnas edat: inter hæc etiam sudorem calidum cum uapore misceri cernes. Desistendum autem ab exercitatione tunc primum est, ubi aliquid eorū quæ memorata sunt, senseris immutatū. Verbi causa, si contractior paulo corporis moles uidebitur, interdicienda cōfestim corporis exercitatio. Nec minus, si floridi coloris gratia marcescit,

LIBER PRIMVS.

cit, quiescendum est. Iam si motionis uigorem collabi senseris, protinus pausandum. Itidem si sudoris ulla uel quantitatis, uel qualitatis alteratio, puta si minor uel frigidior fiat, exercitijs ualedicito. Mox oleo corpori circumfuso quiescere, & recreatoria deinceps fricatione uti cōuenit, ueluti puerorum exercitatores facere consueuerunt.

De frictionum generibus. Cap. 18.

EX frictionibus dura quidem astringendi, mollis uerò laxandi uim possident. proinde quæ æ quo laxiora sunt, durius; quæ uerò astricta sunt, molliter fricare congruit. At si quis temperato sit corpore præditus, constat hunc neque leniter neque durè fricandum, sed summa ope ut uterque uitetur excessus. Multa enim & dura frictio gracilitatem præbet: pauca ediuerso, mollisq; in molem attollit; mediocris æ qualitatem inducit. Tria porrò frictionum discrimina, quæ à quantitate sumuntur, si tribus quæ à qualitate ducuntur, copulaueris, nouem syzygias absolues, perinde atq; è subiecta liquet tabula. Vna siquidem quantitatis, uerbi causa, multa, tribus secundum qualitatem coniugata, duræ inquam, molli & mediocri, in duritia tres constituit differentias. Pauca e contrario, ternis eisdem iuncta, ternas producit alteras. Mediocris uerò qualitate, iisdem tribus connexa, tres alias procreat, quemadmodum subscripta figura licet cernere.

QUANTITAS		QUALITAS	QUANTITAS		QUALITAS
1 Multa	} et {	Dura.	7 Mediocris	} et {	Dura.
2 Multa		Mollis.	8 Mediocris		Mollis.
3 Multa		Mediocris	9 Mediocris		Mediocris
4 Pauca	} et {	Dura.			
5 Pauca		Mollis.			
6 Pauca		Mediocris			

A 5 De

De contentione uocis, seu uociferatione. Cap. 19.

IN uocis exercitatione nihil quidem ad ualitudinis tute-
lam facit, concinna plausibilisq; uocum modulatio. Soe-
nituum autem grauiorum fragor conducit, eoq; intonadum
est. Sic quippe plurima aeris uis in corpus per inspirationē
attrahit, non tam thoracem, quā uentrem, totiusq; corpo-
ris meatus expandit, atq; diducit: quapropter inter legen-
dum superflui etiam humores excernuntur, legentibus quie-
dem sonorosius magis & per sudores. Is autem qui mansue-
tius uocem intendunt, per abditam uniuersae molis exhalas-
nem, sit enim screando per attenuationem plurimū retrimen-
torum, puta, sputi, mucii, pituitae excretio atque expansio.
Quod igitur aliud compendiosius praesidium, his qui prae-
algoris recalcificationem desiderāt, adhibebimus, quā respie-
randi functionē? Legendū itaq; ijs subinde est, quod totius tū
corporis mole remissa, tū carne liquata, arteriā, reliquosq;
spirādi meatus in concinnam raritatē diducentes, per ceteras
uocum grauiores functiones modulētur. Neq; istoc officio
temere, nihil pensi habētes, utemur, sed corpore prauis,
corruptisq; humoribus exorte, stomacho magnis euidentibusq;
cruditatib. carēte, uocis exercitationē aggrediemur,
ne plures uitiosi uapores per corpus mēbratim distrahātur.

De lassitudinibus quae exercitiis superueniunt. Cap. 20.

LASSITUDO ulceris sensum asserens, à retrimentorum tenu-
tum simul & acrimia copia prouenit. Tensionis uerò lassitudo
nullam, de qua ratio ulla sit habenda, superfluitatē cor-
poribus incumbere portendit. Verū in musculis & neruis,
affectio quaedam qua tendi uidentur, residet. Inflammatoria
uerò, qua nimirū partes ueluti contusae, aut phlegmone ob-
sessas sentimus, tum incidere consueuit, cum musculi supra
iustum excalescent, quippiam ex circumfusus sibi retrimentis
attraxerint. Est & alia super has affectio quarta, quae eue-
nit, dum plusquam par sit, musculi exiccantur, sic, ut squa-
lens,

lens, contrahiūq; corpus posito amicu appareat, atq; ad motiones pigrum. Ceterum ulcerosæ lassitudinis remediū est, si quæ redundāt euapores, frictione multa molliq;, oleo non parca manu infuso, à quo omnis adstringendi uis absit. Altera uerò defatigatio, in qua tensio sentitur, hoc sanationis propositum habet, ut relaxetur. Laxatur uerò quod tēsum est, frictione exigua pariter & molli ex oleo dulci & infusato, refocillatione item quauis, & quiete, lauacrisq; temperatis, & lenta deniq; in calidis undis morari: ita ut bis etiam uel ter lauari, mirum in modum conferat. Tertia lassitudinum, quæ inflammationis speciem representat, sanationis treis sortita scopos est: superuacanei uidelicet excrementi euacuationem, extenti relaxationem, & accensi refrigerationem. Oleo igitur copioso, tepido, frictionibus mollissimis, in medijs temperamenti aquis diutina mora, illiusmodi lassitudinibus succurritur. Pari etiam modo, multa quiete, & unctione continua. Quartus affectus, primo quidem die nihil diuersum à superiori ratione, excepta calidior aqua, quæ lentè adstringat. Postera die, recuratiuam exercitationem postulat, ac protinus in natationem gelidam exiliant. Omnes uerò defessi, boni succi alimento refici desiderant.

De cutis adstrictione. Cap. 21.

Cutis constipatio (quam stegnosin Græci nuncupāt) uel meatibus obstructis, uel illis ipsis dēsatis accidit. Obstructio quidem è crudis, crassisq; humoribus originē habet. Densatio uerò modò ab refrigerantibus, uel ab astringentibus, uel plurib. ab arefaciētib. cōciliatur. Protinus uerò istuc ex albicante pallore, uestibus exutis, cutis duritia et dēsitate deprehēditur, & quod inter exercendū agrè incalescūt. Medetur huiusmodi affectioni calfactio, ualentiorib. itaq; exercitationibus, balneisq; calidiorib. utendū est. In solio porro gelido mora diuturnior nō sit, imò neq; aqua sit admodū frigida. Inducendi uerò oleo prius aliquo, mediocrē calfaciendi uim

uim habente, dulci, tenuiumq; partium perungantur. Postremo, cutis densitati sananda, satis efficax remedium oleū anethinum existit, præcipue si ex uiridi anetho confectū sit, & oleum quod ex populo nigra constituitur.

De spontinis lassitudinibus. Cap. 22.

Vandoquidē lassitudo ulceris sensum afferēs, ex acrium
Quætrimentorum uitio nascitur: siquidem momentum modò uitiosi humoris fuerit, sola apothepiæ exercitatiōe corrigitur: si uerò multū et altius radices egerit, huic tum exercitationem, tum omnē penitus motionē interdicemus. quiete uerò, somnoq; refectio, cibi abstinentiam per integrum diem præscribemus: deinde aduentāte uespera, liberaliore oleo perunctum, & mediocriter tēperato lauacro lotum, alimentis optimi succi, sorbilibusq; tenuiter alemus. minimè tamē uino defraudauerimus, quoniā semicrudos, si quid aliud, humores concoquit. Si igitur memoratorū beneficio malum cessauerit, homo ad consuetas functiones paulatim reducendus est. Si uerò sequenti quoq; die perseueret, de ualentiore iam auxilio dispiciendum est. Si uirū robur permiserit, alterum ex duobus, aut uenā secare, aut euacuare, expedit: atqui utrū alteri præferendum potius sit, discernendum. Si uiribus imbecillus sit, à uenæ sectione prorsus abstinendum est: sed purgatio moderata molienda. Vbi uerò humores percrudi admodū extiterint, neq; uasa aperire, neq; purgare, neq; exercitationibus uacare, imò ne mouere quidē in totum, aut lauare, cōtulerit. Verūm omni in quiete hoc modo affecti seruādi sunt. Epulæ potionesq; & medicamina, quibus extenuādi, dissecādiq; potestas, absq; insigni calore, exhibenda. Eduliorum itaq; loco oxymel, ptisanæ exiguum, interdum aquæ etiam mulsæ aliquantulum exhibebimus. Cum aut cunctis in hac conditione constitutis, præcordia attollātur & inflentur, & quicquid offertur, promptè flatuosum redditur, præstiterit, dapib. piperis aliquid confundere. Vincit aut usus medicamenti Diospolitici,

spolitici, simplicis item dia trion pepercon. Vtilissimum eis fuerit oxymeli. Pro potu apomelite utantur, potissimum ubi in acorē transierit: uinoq; leuiter acescente. Nutrimētis præterea, quæ absq; calore extenuât: cuius monetæ habetur cap parisi, ex oxymelite, uel ex oleo & aceto pariter sumptus. Tēſionis laſitudo, quæ nō ab exercitatione proficiſcitur, humorum nimietatē ſolidis animantis partes expandentē, inſi nuat. Cæterū luce clarius eſt, quòd, quādoq; ſanguineus humor nimia abūdarit copia, cum incifa uena detrabere, uel malloſos ſcarificare, præſentiſſimum eſt remedium. Spōta nea uerò laſitudo, in qua inflammationis ſenſus eſt, ne unius quidem atq; alterius horæ, nedum duorum triūmue dierū in ducias ſuſtinet. niſi enim quis ſanguinis miſſione præueni rit, febris illico ſuperueniet acerbīſſima. Satiſ aut fuerit, ſi nihil impediāt, ſanguen bis eodem die detrabere, ac priora quidem detractione non ad hominis uſq; deliquium auferre, poſteriore uerò ne animi quidem deſectionem formidare. Si qui in ea affectione conſtituti ſanguinem detrabere ſu perſederint, ſi bona admodum fortuna ad ſalutem indigent.

Viciuſ ratio ſenum.

Cap. 23.

Rigidi & ſicci corporis temperamētī ſenectus eſt. Emen datur itaq; non calorificis ſolum, ſed humedandi calfaci endiq; uirtute iuxta præditis: proinde fricāda, ſed citra laſi tudinē eſt. Alimentū interdū imbecilliorib. ter adminiſtran dum: circa horam diei tertiam, pauxillum panis cum Attico melle. Septima poſt hæc hora, præmiſſis fricātionib. & exer citijs, qualia ſenibus cōueniunt, balnei quoq; uſu adhibito, ante omnia ſanè quæ aluū deſiciant, mox etiā piſces atq; alites offerātur. poſtremò in cœna, quæ inculpatoſ ſuccoſ pariāt, quæq; ægerrimè corrūpantur in ſtomacho, exhibenda ſunt. Vini mulſi uſum, præſertim hiſ qui uel calculoũ renuſ ſuſpe ctos habent, uel pedū affectioni ſubiacent, nō negauerim, ad ſi ciendo huic petroſelinum. Si quando ob pituitam in uentre

contraſtanti

contractam cogimur aliquid eorum quæ incidunt, seligere, confestim ad humedantem educationem transeundum, ficis quidem maturis ante alias dapes exhibitis. In bruma uerò tempore caricis, nullo mali sensu in dextro hypochondrio infestante. At quando serosa pituitosaque; retrineta in senio confectis corporibus suggeruntur, lotium singulis diebus mouere, et aluum subducere, oleo præsertim, cæteris dapibus non dum gustatis, absorpto, expedit. Constat uerò, quod ante alium cibum olerum omne genus cum oleo et garo, ex mirra item oliua, et pruna Damascena edenda sunt. Quod si uehementius aluus suppressa non responderit, mercuriali et cnico succurritur: quibus non minus conducit et terebinthina, interdum unius modò auellane, nonnunquam duorum aut trium magnitudine sumpta. non raro ex oleo clyster, aluo adstrictæ subuenit.

Ad rugosum corpus. Cap. 24.

Erugatam corporis cutem reddit erui farina, cum uite candida mixta.

Aliud smegma indefinenter abstergens.

Ficus pingues cum bryonia conteruntur, eruique farina, iustaque sepius testa, pauco melle excepta.

Ut suauiter spiraret corpus. Cap. 25.

Sicca cupressi coma confusa, uel piceæ cortex unguento confusus, suaueolentem corpori inducunt odorem. memento tamen, ne quis matutino diluculo, una cum indumentis iam corpori applicatis, momenti uel castæ, uel sauinæ gustare detrectet.

Ad calfaciendam habitudinem. Cap. 26.

Quoniam autem habitum instaurare oportet, fricandum in lauacro corpus intrito calorifico, quod constat nepeeta, sampsocho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, fece uini combusta, nitro, pumice, pro uniuscuiusque ratione momento sinapis, uua timiniæ, et grani Gnidij. Post balneum uerò calorifico utatur acopo, uino giluo ueteri, potu ex uino mulso, pipere, rutha, et consimilibus.

Ad

LIBER PRIMVS.

Ad uitiatum corporis colorem. Cap. 27.

Pallidus corporis color, uita amœna, suauibusq; dapibus corrigitur: miscere autem his radiculam porrumq; cum uiridi cicere oportet. Coloris quoq; gratiam inducit, dulcis mali Punici cremor absorptus. Vincit oleum, in quo diutius bryonia radix elixa. Hoc & cuticulam erugat, & corpus expolit. Expurgandæ cuti medelis, orbiculi qui ex aliqua abstergentium farina, & bullo narcissi, & bryonia radice constant, miscendi sunt. Amygalæ item amaræ, tum radix, tum fructus. si ad manum sint, ex aqua elixa, & pro lauacro adhibita, corpori nitorem conciliant.

Ad liuores & fuscédines. Cap. 28.

Benes à liuore uindicabimus, si cutem ipsorū spissam, & affectionibus minus obnoxia, habitudinemq; omnem longè calidiorem reddemus: quod quidem multo citius assequemur, si salibus in balneis super liuidas partes utemur: quas & spongijs, in raphani, absynthijq; iure submersis, fouere expedit.

Quomodo dentes ab iniuria uindicentur. Cap. 29.

Dentes à deuastatione, corruptelaq; afferuntur si ante omnia corruptiones ciborum uitentur, assiduus deinde uomitus. Horrere post hæc escas dentibus aduersas cōuenit: cuius generis sunt ficus arida, mel coctum, quoniā prædurum est. palmulæ frangi contumaciores, quæq; glutinosa sunt. omnia, adeoq; infragilia, ut dentes dimoueāt. Caueri insuper debent, quæ stuporem inducūt: præfrigida & marcida cuncta. Sunt item à cibo dentes semper accuratè purgandi.

Ad grauem auditum.

Cap. 30.

Ad uersus audiendi difficultatem in primis conducit, auditorios meatus à sordibus expurgare. Tractu autem temporis, linimentum dropace madens, in ipsum demittere, & expressum extrahere. Vna quippe opera et meatus summè expurgatur, & auditus restituitur. Post hæc autem instar crui quopiam inserto, per diem obturabis meatū: quo postera die extrahes.

extracto, singulis diebus oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut adipe anserino, aut modico felle bouino, perlinies. Rursum aliquo temporis interuallo imposito, ex sî napi & ficu laeuigatis, conformatum peniculum horis duabus inferre: quo deinde exempto, oleum, in albuci radice excavata feruefactum, infundito.

Ad oculorum caliginem.

Cap. 31.

N habere expedit. Hinc enim robur speciei accedit. Cauendum uerò, ne læsione delassentur. Abstinentum à uino crasso, ac dulci, epulis item quæ diu supernatant, & concoctioni resistunt, atq; succos lentæ crassæq; materiæ gignūt, ab erucis, porro, & à quibuscūq; acris uapor sursum effertur. Iam uitare pariter expedit supinum decubitus, diuturnum frigus, uentos ex aduerso obuiam flantes, fumū, atq; puluerem. Infunditur porrò præsentis remedio oculis perpeti mēse singulis diebus aqua, ad hunc modum præparata. Fœniculum uiride, cum aqua cœlesti testaceo uasi foris picato inijce, dein de fœniculo exempto, reliquias in eum usum reponito.

De plenitate.

Cap. 32.

Summopere in alimentorū satietate delinquitur. nam etsi probe uentriculus suo fungatur in coquendo officio, uenæ tamen plus iusto repletæ afficiuntur, expanduntur, finduntur, oppilantur, flatu infarciuntur, & plene saburratæ pessum eunt. Nihil uerò in morbis pestilentius uenarum plenitudine existit. Ventris autem plenitas, quinquā in totum (quod redundantiæ ipsius nunc uomitu, nūc alui deiectione excernuntur) tolerabilior sit ea quæ uenis oboritur, tamen ea quoq; damnanda est. Attamen si quis se plus satis ingurgitarit, protinus uomitu eycere studeat. periculum est enim, ne cōcoctione obita, uenæ infarciātur, præsertim si quis iugiter per intemperantiam sese largius inuitans, nullam experitur euacuatiōnem. Vomendum est itaq; prius quā cibaria sumpta in uentriculo

LIBER PRIMVS.

triculo corrumpanitur. Si quid tamen uomitionem impédia-
t alui deiectione plerunque, somno prolixiori indulgeat, & cre-
brius in potu aqua utatur calida. Vbi uerò satis concoxerit,
potissimum si aluum deiecerit, lauare. fomētis uti, paululum
salsamenti gustare, potumq; dilutū haurire expedit. Quod si
neq; desederit, neque maturè obita sit decoctio, et corpus uni-
uersum graue, et ad motus inappositum, somnolentiusq; fue-
rit, mens quoque nulla ratione torpeat, uenarum plenitatem
poriēdit. Qui uerò præter hæc lassitudine capiuntur, eos quie-
ti permittere, donec uenterculus concoctionem absoluat, mox
deinde exercitationibus inanire satius est.

De temulentia. Cap. 33.

Maturus uomitus saluberrimum temulentis est remedium.
Expedit autem ubertim aqua et mulso epotis uomitum
elicere, quo benè multa proyiciatur, et uellicationes stomachi
hebetiores reddantur: Secundum uomitū uerò solio cum illi-
nitione abundanti uti, consilium est. Reliquo tempore tantis-
per sub stragulo conquiescent, dum id uilli edormierint.

Quibus alimenta corrumuntur. Cap. 34.

Fæta ciborum in uentriculo corruptione, quibus retrimen-
ta corrupta excernuntur, rectissima semita ad sanitatem
contendunt. Qui uerò nihil deiciunt, ijs quæ iucundè uen-
trem molliunt, irritandi sunt. In ea affectione constitutis, uo-
mitiones ante cibū, uini dulcis potu citæ conferunt. Ad hæc,
quicquid est uaporosum, quicquid fætidum aut uirosū, atq;
in uniuersum omnia quæ ocys corrumuntur esculenta ui-
tanda sunt. Sed ea quæ inculpatū succum generant obsonia,
cum delectu uenanda sunt. Iam ita habentibus per mediocria
temporis interualla alui subductiones, ex clemētibus cathar-
ticis præsentaneam opem adferunt.

De re uenerca. Cap. 35.

Emolumenta quæ uenerem comitantur, hæc sunt: Plenita-
tem exhaurit, corpus agilius reddit, augmentū procurat,
B G uirile

Et uirile magis efficit. Quod uerò ad animū atinet, implici
 tam ratiocinationis uim extricat, iracundiā mitigat: qua de
 re melancholico appositissimū (si quicquam aliud) est præsi
 diū. Restituit hominem modestiæ, et aliàs quoquo modo de
 mentes sapientiæ. Affectionibus quæ pituita proueniunt, effi
 caciter opitulatur. A cibis appetitus auersionem, in ciborum
 appetentiam reducit. Aliquot multos à libidinosis insomnijs
 uindicauit. Ad uenerē uerò naturæ calidiores et humidiores
 sunt idoneæ, et procliuiores reliquis ad libidinem. Viāus ra
 tio siccificans et refrigerās huic militiæ alienior: Senilis ita
 dem ætas tempusq; autumnū. Viāus itaq; calidus ac humidus
 offerendus est. Esto itē mediocris tū laborū, tum alimentorū
 modus, ut enim moderati laboris, ita ueneris quoq; mediocri
 tas cōmendatur: haud enim ad opus modò excitat, uerū prō
 pitudine quandā ei qui assueuerit, præbet. Veneris ergo de
 siderium, præ cunctis alijs rebus, cupediarū irritat redundās
 copia. Proinde quæ plurimi alimēti sunt cibaria, ad hanc rē
 facta uidentur. Ex piscibus, polypodes (qui sanē ad uenerem
 stimulare haud uulgariter putātur) et omnes molliore carne
 præditi. Ex oleribus uerò, geminalis, crysimū, crucea, rapum:
 atq; hæc uice medicinæ exhibētur. Legumina uerò id genus
 sunt, fabæ, cicer, ochri, quas cruilias dicūt, siliquæ, pisa, quo
 niam flatuosa sunt, et uberi alimenti. idcirco ruha, eo quòd
 flatus dissipat, ac penitus demolitur, ueneris quoq; flagrantia
 am obtūdit. Vuas maximopere cōmendo: humectant enim, et
 spiritui sanguinem infarciunt, quod in coitū stimulat. Qui itaq;
 ad uenerem accessurus est, caueat plenitates, cruditates, labo
 res, defatigationē, ne uomitus et purgationes proximè præ
 cefferint: pari quoq; modo, ne repētinus fluor alui. nam diu
 turnum fluorem concubitus sæpe exiccat. Aestuantem porrò
 coeundi libidinē minimè probo, sed renitendum ei præcipio,
 maximè is qui ex ueneris usu morbo alicui obnoxij sunt. Sa
 tius itaq; fuerit, post exercitationes, balneas, atq; cibum me
 diocrem

LIBER PRIMVS.

19

diocrem, in uenerem congregari. Sic enim tum ad corporis ro-
bur, tum aduersus ingruentes frigoris iniurias plurimum
habet momenti. Veneris autem opportunior occasio à cibo
(ceu mox mihi dictum) et ante somnum, existit. Protinus ea-
nim à coitu somnū capienti lassitudo relaxatur. Adde quòd
temporis id liberis procreandis longè cæteris accommoda-
tius est, cum alijs nominibus, tum quòd mulier somnum capia-
ens, semen genitale melius retinet.

De his qui re uenerea uti non possunt. Cap. 36.

VBrenda pinguitudine frequenter perūgenda sunt, cui mo-
dicū radicis narcissi, aut grani Gnidy, aut pyrethri, aut
uua timiniae, aut seminis urticae, aut anisi adiectū sit. Propia-
nāda sunt etiā piper, aut satirion, aut eruca, aut cnicū, aut u-
no etiā fasce omnia. Ante escas alias, bulbi iosti, fului et exia-
le, cum sale oleoq; aut scyllae momentū marcidæ deglutiētur.
Præterea in hanc militiam confectis medicamentorū præst-
dys uti, ac res deniq; obscenas iugi lectiōe euoluere cōuenit.

De his qui nimium ueneri indulserunt. Cap. 37.

Quoniam ex immodica re uenerea, corpus rarius, frigi-
dus, aridus, imbecilliusq; euadit, astringentia, calorifica,
humectantia, roborifica que potestatis rebus uti ratio est.
Quam ob causam libidinis assiduitate culcitraq; palestra
defatigatis impendit conducit, stragulum calidū, tranquil-
litas, somni ad naturæ necessitatem, tantisper dum corporis
contentio relaxetur, ipsi que tandem à debilitate refocillati
se se recuperent, reficiantq;.

De nimietate genituræ. Cap. 38.

Quidā feruētis genituræ copia saburrati, petulantes, laxi
habent in amabiles cōgressus ferūtur, qua semel in coia-
tu effusa corpus debilitatur, stomachus resoluitur, gracilescūt
tūc et exucci efficiūtur. Verū si eam ob rem se uenere defra-
auerint, capitis grauedine capiūtur, ac ueluti ex repletionē

B 2

cibus

cibum fastidiunt. Deinde propter libidinis in somno imaginationes polluti, eadē patiuntur. Ea de re nihil quod genitale semē auctius reddat, propinandū est: sed cōtrā, quā id corrumpunt potius, tum alimētis tum medicamētis, uti. Lumbos ubi lauerint, oleo rosaceo, melino et omphacino oblinire cōuenit. Præstātius uerò fuerit, ammixta ei crassitudinis gratia, cera inungere. Adijciuntur etiā succi quidā frigorigici, Semperuiui inquit, solani, umbilici Veneris, et psylli: atq; hæc quidē æstatis tempore, sed cæteris anni temporibus, tum reliquorū, tum lactucæ succus, tum lini semen aqua elixū: quippe & hoc refrigerantem succum exhibet. Lamina porro plumbea lumbis supposita, ueneream imaginationē per somnū cohibet. Hoc ipsum præstant herbae quaedam frigorigicae cum rutha, & teneriusculis nonnunquam uiticis turionibus substrata. Semina quoq; uiticis atq; ruthæ comesta, idem efficiunt. Obseruare autem conuenit, ne dum tanto certatim studio lumbos refrigerare molimur, renes iacturam faciant.

De his qui ex frigore noxam contraxerunt. Cap. 39.

Algore plus æquo intenso affecti, locis calidioris unctulo, uel cyprino uel irino delibuti decubant; deinde calore nōnihil restituto, piperis quiddam, aut myrrhae cum uino dulci odoris optimi, annoso, uel succum cyrenaicū, è mero siue aceto, uel pyrethrum, uel castorium ex aceto deuorent. Alimentum autem calorifica ui præditum offerendum est.

De iis qui in sole exusti sunt. Cap. 40.

Qui uerò æstu solis noxam contraxerunt, bis, locis auræ expositis decumbendum est. Vultum præterea, manus, crura gelidis undis irrigare. Sitim potu frigida pro cōsuetudinis ratione sedare expedit. Hæc sanè non cōfertim semel, sed pauxillatim facere, alimenti item parum, facile in partes digestibile, liquidum potius quàm solidum assumere confert.

De

LIBER PRIMVS.

De pituita in uentriculo superiore superabundante: Cap. 41.

Quod si incidas in quempiam, qui ualentis nutrimenti oblationes auerſetur, quiq; ſi aſſumere impellatur, nauſeſcat, neque fortassis quicquam libenter, præter acredinem præſerentia admittat, & iſs quidem oblectetur, ſed uentriculus inflationem nauſeamq; experiatur, & ſolis ruſibus aliquantulum recreetur, interim ipſa quoq; ſumpta cibaria, in acidam præſertim corruptionem conuerſa, uitiatur: omnino perſuaſum ſit, prima ſanationis præſidia exiſtere, ut uentriculus à pituita abſtergatur. Ipſe quidem in cuiusmodi affectione cõſtitutum cognoui, qui radícula ex aceto mulſo ſumpta, fide maiorem craſſæ pituitæ uim euomuit, atq; ita ſecundam extemplò ualeitudinem aſſequutus eſt.

Quomodo quis facile uomitum faciat. Cap. 42.

Quandoquidem uiolenter uomentes plurima sæpæ comittitur abſurda, haud ab re fuerit, rationes quibus uomendi difficultas tollitur, præſcribere. Vomitus enim uero pituitam expurgat, caput releuat, neq; ea quæ quis turbicinando ingurgitauerit, incrudeſcere ſinit, noxamq; uino liberaliore madenti arcet, ſint quæ offeruntur neq; acerbæ, neq; admodum ſiccæ, uerum partim dulcoris humorisq; partim acoris modum non excedant. B' quorum genere principem notã raphano debemus, erucæ, ſaſamẽto perueri, origano uiridi, momento cepis, porriq;. Adiunat uomitum ex legumētis piſana melle adiecto, pulces ex lomento, et carnes pingues. Atqui nõ iura modò ſiue cremores, ſorbenda, ſed uniuerſa ſimul ipſarum moles deglutienda. Noli igitur, quiſquis uomere geſtis, diutulè mädicationi inſiſtere, ſed per elixationẽ cūcta molliora reddantur. Neq; te lateat, uina multi dulcoris ad eã functionem, quaniã diutius in ſtomacho ſupernatit, ſeligenda. Potus hic tepidior eſto. In cibo amygdalis, quæ melle maduerunt, utantur. Placentæ quoq; interdum deguſtadæ. Semen item peponis et cucumeris, maceratum atq; cõtuſum cum melle, necnon & cucumeris

cumeris radicem melle tritam sumere cōgruit. Qui ualentiora exigunt, narcissi bulbo aqua elixo merum diluāt. Quin et irinum quoq; unguulū uomitionem proritat, si quis digitulis eo delibuit irritet. Verū id etiā ad uomentes spectat, nihil pratermittere, nihil reliquū facere, sed hos ab ipso protinus colluere, faciemq; pari studio, aut posca, aut aqua abstergere. nam id dentibus prodest, et caput excitat, exoneratq;.

Quæ sequenda ualetudine constitutis aluum subducunt, & lotium cient. Cap. 43.

PRiscis quibusdam ad secundam ualetudinem tuendā abundē uisum est, diebus singulis aluū atq; uesciam citra reprehensionis notam retrimentis sufficiēter, pro cibi potuq; sumpti multitudine, exonerare. Quod si illi oletum, huic uerō lotium respōdebat, probabant: Sin secus, lotiū quidem ciebant scandicæ, apio, asparago, petroselino, aniso, nepeta, origano, absinthio, graminis, carduiq; radice, cytiso, herba cincinnali (quod adiantum dicunt) aqua elixis, quorum ius in potu cum uino subinde ministrabant. Hæc quippe per lotiū sanguinem expurgant, quod emolumentum adfert præsentissimū. Aluo suppetias ferebant, tercbinthinā, in star oliua sub somnū deuorandam exhibētes. Si uerō acrius aluū subducere animus est, exiguum rhei Barbarici admiscimus. Cōueniunt etiam aluo emolliendæ, oua sorbilia. Ex oleribus beta, malua, ius cochlearū, et hæc fortasse satisfaciunt Validiores in hac re uires habent, mercurialis, in aqua cū salibus elixa, et comesta, et ius eius epotum. Similiter et sambuci folia, polypodyq; radicis duo denarij salsamento insparsi, aut cum ptisana deglutiti. Eiusdem classis est serū lactis, triū aut quatuor heminarū mensura, cum sale et melle sorptū. Ius quoq; ueteris gallinaeci, tam per se, quā cū binis cnici denarijs acceptū. Aloē interim à cœna, quæ triū cicerū magnitudinē æquet, assumere re expedit. Saluberrimus itidē fuerit epithymus cū uino post frugalē cœnā epotus. Verū si quis uehementiore euacuatione egeat, ueris tēpore epithymi drachmā ex oxymelite bauriat.

De cly.

De clysteribus. Cap. 44.

HAbent natura uentres quidam astrictiores, quorum præ debilitate stomachus medicamenta quæ per os sumpta aluum deiciunt, non sustinet: hys clysteribus succurrendum est. Qui si pituita quidem intestino fixius inhaeret, è iure caricarum, betarum, niri, radices cucumeris sylvestris, cum melle et oleo uel chamæmelino, uel anethino cõfiant. Si ariditas acrius urget, uincit decoctum alibæ, fœnogræci, chamæmeli, adiecto oleo & melle haud ita multo. Abundè nonnunquam oleum per se dimidiati acetabuli quantitate, per inferna immissum, facit. Neq; tamen id continuò agendum, ne natura ijs irritata, ultro nec deiectionis obliuiscatur.

De glandibus. Cap. 45.

VSus quoq; glandium celebris est ad sterces excernendum, & ad educenda quæ per clysterem iniecta nõ redduntur. Finguntur uerò glandes è sale asso, melle & nitro. Thymus quoq; non raro melli percocto leuigatus, assumitur. Formantur nonnunquam et è terebinthina, resina et nitro, & modico interim cocco Gnidio. Cæterum quoniam ferè lancinatio inde constitur, partes oleo sunt obliniendæ. Porro dum pyrethrum, aut piper inscriitur, opitulantur dissolutis, & præ algore inflatis. Additur item sæpius et centaurium, pici aut cerato implicitum, resolutioni uerendorum accommodatissimum præsidium. Puris uerò grumus salis inditur. Ex ficu deniq; adiecto nitro, nonnunquam collyria perficiuntur.

De caput per os & nares purgantibus, deq; unguentis earundem etiam. Cap. 46.

HVMores capitis per sputa uacuantur. Id si clementer facere fert animus, cõfundimus piper mastichæ. Si ualidius uacuare studebimus, aliàs pyrethrum, aliàs herbam pedicularem mandere præcipimus. Præterea utriusq; orcitunicæ cõmanducata radix, ad pituitam extrahendam efficax est. Capparis quoque radices cortex. Retrimenta nem serosa

rebus enumeratis euacuantur. Sinapi uerò cū oxymelite gar-
garizatum, aut defrutum in quo origanū uel hyssopū elixa-
tum sit, crassiorē pituitā excernit. Ipse uerò sapa sinapi cum
oxymelite cōfundo. At si à muco quoq; purgari cerebrū ex-
petat, cum per medicamēta quæ acorē obtinent, quorū bene
multa sternutatione eliciūt, euocabimus. Purgat itaq; per na-
res anagallidis utriusq; & cuiusuis orciunicæ, ac betæ suc-
cus, foliorū quoq; syluestris cucumeris succus uel seorsim i-
psius, uel cū decocto, uel betarū naribus infusus. Crudis uerò
humoribus in thoracis, pulmonis, capitisq; parte contentis,
sternutamentū nihil proficit. Quo autē os oblini debet, tale
est: Sapo cum betæ succo dilutū, partibus palati atq; colu-
mellæ illitum, optimē facit. Idem per nares quoq; purgandi
facultatē obtinet. Nigella porrò acquisitu facili, ad nariū il-
litionē subinde usus sum: quā equidē interdum peracri aceto
pridie maceratam, deinde posteriore die cum aceto denuò læ-
uigatā, naribus infundo. Interdū uerò nigellā oleo ueteri li-
quefacio, atq; pari modo usui adhibeo. Ad hunc ferē modum
Archigenes quoq; in obturatione nariū eadem usus est. Prio-
ri autem ex aceto, Crito felle suffusis succurrebat.

Quæ menses trahant mulichres. Cap. 47.

Quæcunq; lotia proritant, eadem & muliebria impellere
solent. Verbi causa, brassicæ radicis decoctū potum, pera-
sicæ radix, ruta, calta (sic enim Romani chrysanthemō uo-
cant) didānum, & semen crucæ. Reperiuntur etiam quæ ori-
locellorū subiecta, menses promouēt: ut ruta læuigata cum
melle, porri liquor, alliumq; contritum subiectum, myrrha
uino diluta, aut leporis deniq; coagulum.

Sudorifica medicamenta. Cap. 48.

Sudorem prouocant chamæmeli farina oleo inspersa, sum-
ma cuti ualidē infricata, seseli pyretrhū, canchri, anisum
pari modo oleo inspersa, nitrum tostū haud ualde tenue cum
oleo: flos salis oleo tēperatus: liquor cyrenaicus, aqua dilu-
tus.

tus, corpori infricatus, cicerisq; quantitate haustus. Consimi-
liter & nepeta, tum si cum aqua mulsa sumatur, tum si foris
quoq; corpus ex eo fricetur.

De aëre. Cap. 49.

Saluberrimus aër est, exquisitè purus: cuiusmodi fuerit, quē
neq; stagnorum, neq; paludū, neq; alicuius profundi spe-
cus, pestiferam auram expirantis, exhalationes perturbant.
E' diuerso, qui latrina quapiam uastum aliquod oppidū ex-
purgante inficitur, pestilens est. Neq; etiam is qui nebulosus
est, frugi uideri potest. Vitiosus item, quisquis in conualli cel-
sis undiq; montibus circumspecta inclusus, nullum omnino re-
cipit perflatum. Ad hunc ergo modum aër infectus, omni pa-
riter atati, omni tēperamēto, iuxta tātopere noxius est, quan-
topere inculpatus ille uniuersos & amœnat & adiuuat. Sed
qui in qualitate, ardore inquam, algore, siccitate, et humidi-
tate aër uariis est, non omnes pariter afficit. Tēperatis nam-
que corporibus aër temperatus: in temperatis uerò, qui con-
trarij temperamenti fuerit, utilissimus est.

De aquis. Cap. 50.

Vae aquarum cū uirtutes, tum uitia sint, explorata ha-
bere conuenit, utpote quæ multiplicē in primis præ cæ-
teris omnibus ferè usum, ad quamlibet uidus rationē sugge-
runt. Latēre itaq; neminē debet, saluberrimam esse, quæ o-
mnis planè tam gustu q̄ olfactu qualitatis expers est, sed po-
tanti extēplō suauissima, intuenti limpidissima uidetur. Quæ
etiā per præcordia maturimè descēdit, hac nullā potiore
aliam inuestigare conuenit. Quæ uerò præcordijs diutius im-
moratur, uentrē uexat, inflationes facit grauatq; deterrima
cēsetur. ea sanè neq; calefit ocys, neq; frige fit prōptius: quin
& quæcūq; in ea elixantur, longiore mora et malignè tan-
dem decoquuntur. Satiis itaq; fuerit, experimēto huiusmodi
aquam discernere. Qui uerò notis quibusdam talē deprehēde-
re studuerit, ex ijs quæ memorabimus faciat iudiciū. Enim.

B 5

uero

uerò quæ septentrionem uersus à sole auersa labitur, ea ut as-
 grè trāsmittitur, ita coctū difficilis et cōtumax est, et calefit,
 et refrigeratur lentius: quæ uerò ad orientem, per meatum
 quempiā siue tellurem excolatur, leuiq; momento calefit et
 refrigeratur, de hac summæ bonitatis spē cōcipias. Ea quoq;
 frugi putanda est, quæ æstiuo tēpore frigidior, brumali uerò
 calidior est. Nec desunt, qui aquæ bonitatē trutina explorāt:
 ei sanè leuiiores cæteris præferūt. si id cū ijs quæ mox recense-
 fuimus, cōmune habet, probatur. Verūm sola hæc, nisi et alijs
 fulciatur notis, exactæ bonitatis coniectura minimè satis est.
 Cælestis porrò aqua, teste Hippocrate, leuissima, suauissima,
 limpidissima, tenuitate deniq; nulli secūda censetur, eo quòd
 à sole leuissimū tenuissimūq; trahatur. Idq; non ex alyis aquis
 modò, sed ex mari etiam, corporibusq;: proinde et omnium
 celerrimè putrescit, ceu è diuersis qualitatibus cōsistens. Ne-
 mo uerò citius putrescibilem aquam deterrimā esse iudicet.
 alterationis quippe procliuitas uirtuti magis quàm uitio ad-
 scribēda est. Quapropter quæ inculpatae aquæ indicys præ-
 dita, facile cōputrescit, saluberrima censenda est. Atqui ubi
 alterari cæperit, sumentibus, raucedinis, tussis, grauitatēq;
 uocis occasiōē præbet. Cæterū ex pluuiialibus aquis æstiu-
 ua et tonitruosa, bonitate nimbose præpollet. Glacialis ue-
 rò, niualisq; omnium uitiosissima habetur, quòd eius cōgelatio-
 ne omnes tenuissimæ partes exprimātur. Vtile aut fuerit, li-
 mosam, teterrimiūq; odoris aquā, uitiosaq; qualitate affectam,
 elixatione prius corrigere, et sic tandē propinare. Et uinum
 miscentes, aquæ uitia emēdamus, stipanti quidem dulcius, cæ-
 teris uerò acerbius. Nonnullas porrò aquas, uerbi gratia li-
 mosam, salsuginosam, bituminosam, excolare expedit. Valde
 uerò gelidā post cibū, sed ne tum quidem confertim raptimq;
 ingurgitandam iudico. Inuenerunt nonnulli cibos ac potus,
 quibus aquarū uitys occurrunt: et alij quidem ciceris decoctā
 propināt, uel ipsummet deuorāt; alij pedes gallinacos cum
 piscicula

pisciculo quopiam elixatos, pariter edunt. Consimiliter & fœniculum. Quidam betam denique & cucurbitam sale conditam, cum uino diluto præsumunt.

De balneis. Cap. 51.

Probo sanè lotionem frigidā, sed ita quidem, ut citra expedientem uicis rationem degentibus nihil conferre, is modò qui ad amussim uitam instituunt, laboribus item et alimentis cōmodissimè funguntur, ex usu esse asseram. Pluribus uerò, qui copiosiore egent refrigerio, indulgisse nōnunquam narrationi æstatis tēpore abunde fucrit, iuuenib. maximè et quadratis. frigidiorib. q̄; præcalsadīs. Sint aut̄ neq; uenere, neq; alia quauis occasione defessi, neq; cruditatē experti, neq; uomitōe, uētrisq; fluore, aut uigilijs deniq; exhausti. Periculosum quippe. simpliciter gelido lauacro uti. Calidū aut̄ ut optimū, ita et tutissimū talib. existit. solatur enim lassitudinē, plenitutes succorū balitu dissipat, calorē inducit, placat, molificat, flatus ubicunq; radices egerint, discutit, somnū accersit, & corpulentiam inuehit. Est uerò utilissimū cuiq; tum uiro, tum mulieri, tū puero, tum seni, magistratibus atq; priuatis.

De thermis sponte prouenientibus. Cap. 52.

Balneorum ultro scaturientiū quædam sunt nitrosæ, quædam sulfuginosæ, quædā aluminosæ, quædam sulphureæ, quædā bituminosæ: aliæ æris, aliæ ferri deniq; naturā æmulantur. Nonnullæ ex earundē rerū mixtura cōstant. idcirco omnes in uniuersum, quotquot ultro therma emergūt, uirtute arefaciēdi calfaciēdiq; præditæ sunt. frigidisq; ac humidis naturis in primis cōducunt. Cæterū quæ nitri salisq; naturā obinēt, capiti, thoraci, destillationib. q̄; affecto, stomacho humecto, hydropicis, ædematis è morbo pullulātib. & pituitosis cōueniunt. Quæ alumine cōstant, sanguinis excretionibus, uomiturienti stomacho, inordinatis fœminarū purgationibus, et ijs quæ identidē abortiūt, opitulātur. Quæ uerò sulphuris uim possident, neruos emolliunt, calfaciuntq; fatigas

fatigationibus subueniunt, stomachi vires non solum prote-
runt, uerum etiam subvertunt. Sed bituminis naturam imitan-
tes, caput replere, sensorijsq; sedibus officere solent, enixè ta-
men calfaciunt, tēpora progressu emolliunt. Quæ aris con-
fusione constant, os, tonsillas, columellâ, & oculos adiuuant
eximie. Quæ ferri naturam retinet, stomacho leni, accom-
modatæ sunt. Oportet autem balnearū aquam sensim citraq;
tumultum ingredi, quod uis ipsius pedetentim irrepens, prom-
ptius in relaxatum corpus demergatur.

De uictus ratione singulis anni temporibus utili. Cap. 53.

Optimum fuerit quæq; anni tempora obseruando, uiuendi
rationem instituire. Per hyemem quidem ualentius exer-
citari, & plenioribus alimētis uti oportet, præcipuè quando
aëris tēpestati Boreas imperat. Vbi uerò austrina tempestas
fuerit, pari quidē exercitationi, sed cibo potationiq; fruga-
liori indulgēdum. Et in uniuersum, ut madido tēpore siccius
omnino reddere corpus, ita & per frigidū tempus calidius.
Vesci carnibus oleribusq; calidis, atq; uinū prolixius bibere,
confert. Vere autē aduentante, hic quidē uomitionibus, alius
alui deiectionibus euacuetur, alius sanguinē detrahat pro re-
cepta cuiusq; cōsuetudine, et animi prōpta uoluntate. Aestate
uerò quies expedit, laborum item & ciborum subtrahio, qui
ex frigidiore genere sunt. potatione quoq; uberiore uti, atq;
omnia quæ refrigerium humiditatemq; conciliant, adhibere
cōuenit. In autūno exadiorē cautelam circa uictus rationem
res postulat: quoniam omnino inequalis ac inordinatus, mor-
borum omne genus parturit. Ne quid circa frigus delinquas-
tur. A' uenere impendit, potuq; gelido cauendum. Matuti-
nū porro aëris frigus, meridianusq; æstus utiliter declinatur.
Pomorum quoq; fugacium repletio uitanda, quoniam non sa-
turitate modò, sed quod uitiosum etiā succū flatuq; generat,
officiū. Optima namq; omnium fructuum ficus ac uua, flatu
excitant: & nisi ante alias escas accipiatur, alimenta quoq;
corrumpuntur.

corrumpunt. Præ alijs uerò ferculis assumpti, neq; inflāt, neq; corrumpunt. Vbi frigidior redditur aër, pro algoris ratione corpus calfaciendū est. Omniaq; perinde ac hyeme iam obrepente peragēda sunt. Nec alienū fuerit, post æquinoctium ex cōmemoratis quibusdam rebus corpus inanire, ne quid superuacaneum in ipso per hyemem retētum, oxiam inferat.

Victus ratio uitam negotiosam transigentibus seruanda. Cap. 54.

Quisquis in negotio degit, speculare debet an superiore se uita exercitare cōsueuerit: an dum exercitationibus uacat, mediocriter illiusmodi cōsuetudinē sustineat, ita quidē ne morbis confluetur, assiduo corpore perspirabili præditus. Huiusmodi quippe corporis natura ad aliam cōsuetudinem nullo pacto traducēda est. Sicuti nec eius, quod ex longis temporū interuallis aduersa uoletudine premitur. Verū si perpetim quispiā ægrotare soleat, idq; fertur plenitati acceptū, per uniuersam tuēdæ sanitatis rationē, hunc scopū tibi præfigas, ut humores iugiter moderatos possideat: sin humorū uitis, ut quā optimē generentur succi, contendendū est. Quorumcunq; igitur corpus succis ex æquo redundatibus scatet, eos omnino lauare prius, mox fricari, leuiterq; dimoueri oportet. Qui autem hæc antea moliri anticipauerint, his quā dantenus eadem augere, cibum circuncidere, eundemq; haud magni nutrimenti ingerere, cōsulimus. Ceterū qui uitiosos humores accumulāt, neutiquam una sanationis intentione curātur, eo quod multiformes sint uitiosorum humorū species. Quidā enim frigidiores, pituitosioresq; quidā calidiores, biliosioresq; nonnulli atræ bilis denique maiorem aceruum cōgerunt. Abstinentum itaq; à cibis ac potibus, qui accretam facile succorum cōgeriem nati sunt gignere. Omnibus autem his commune fuerit auxilium, uentris deiectio.

Ratio uictus peregrinantibus utilis. Cap. 55.

Inineris iniurias facillimē uitabit obesus, maximē si lentius iter festinat. Per æstatem porrò mollis quādam fascia sex

aut

aut septem digitorū latitudine, nec minus quā quinq; cubito-
 torum lōgitudine sinuoso uolumine lūbos ad illa usq; implea-
 cet. Pedum quoq; subsidij proficiſcentibus plusculū praebea-
 rit. Per decliua enim prae miſſū corpus uacillās, ac per prae-
 ceptis ruiturum, ceu statumine quodam suffultum sustinet: sin-
 accliuē scandendum, faciliorem corporis motū eius praesidio
 perfici constat. Praeterea cum in perfectione ab itinere cessa-
 tur, inūgere & exiguū quiddam alimēti aſtūi promere, po-
 tionemq; moderatam hoc tempore propinare ex usu est. A-
 prandio priusquā denuō iter arripiatur, ad tempus quiescen-
 dum est. Si quē neceſſitas dira proficiſci impulerit, sitisq; pre-
 mat, tenuē polentā ex aqua cum salis momento bibat. Aëſſus
 porrō ſolisq; ardores cauendi ſunt, neq; corpus nudū inſola-
 re, ſed ne ab itinere exiccatum indureſcat, cooperire cōuenit.
 Hoc quippe pacto & labor minus afficiet, et nullus memora-
 torum affeſſuum hominem corripit. Hyeme quidē frigidā,
 ante arreptum iter, aluo ſubducta, et unſione admota, cibo-
 rum hyemaliū partem bene magnā, potionis uerō paululum
 ſumere, faſciaq; proceriore nō lumbos modō, uerū ſpinam
 quoq; ac peſtus, probē ac ſcitē inuoluere, expedit. Vbi uerō
 tranquillitati quis ſe crediderit, ſub eiufmodiq; reſeſione fri-
 gus ingruit intenſum, neq; ungi tum, cibū uue ac potum, neq;
 recreationē quāuis aliā, capere praestat, ſi quis eo loco per-
 māſurus eſt. Poſt diutinā proſeſionē cæterosq; labores uali-
 diores, etiā ſi qſ nihil laſitudinis pſcipiat, curari tamē fatiga-
 torū more nō dubitet: ita enim iniurijs minus erit obnoxius.

Nauigantibus qui uiſus conueniat. Cap. 56.

Vomitionibus quae nauigantibus obueniunt, initio quidem
 ut a grē, ita inutiliter reluctamur: ſiquidem plurimū opus
 plerūq; ferre cōſueuerunt. Oportet autem à uomitione neq;
 mulum, neq; ſine diſcrimine quiduis alimenti offerre, ſed len-
 ticulā aridam, et coſcā, cum momento pulgij, aut panē uino
 aquoſo atq; perodoro maceratum: potatione porrō modica,
 nempe

nempe uini penitus aquosi, uel aceti mulsi, utuntur. Caterū len-
tes tātis per dum molliores euadūt, sunt elixandæ: mox in fa-
rinā terendæ, pōst arc faciendæ, ac deniq; in uas aliquod te-
staceū reponendæ. Cum uerò crebræ uomitiones diutius per-
seuerauerint, cibi maiore subtractione utēdum, exiguoq; po-
tu, puta aceto mulso, in quo thymus sit maceratus, siue pulegi-
um. Aqua itē cum hordeaceā farina polline mixta, uel uino
boni odoris aqueo, quod tenuissimū polētæ florem adiectū ha-
beat. Aduersus porrò nauigiorum grauelentias, mala coto-
nia, aut thymum, aut pulegium odorari debent. Et quāminē-
mum fieri potest, salum intueri oportet, donec quis nauigij
immorari assueuerit. Danda postremò est opera, ut aquæ lim-
pidæ sint, neq; fædum odorem, neque salsedinem præferant.

De abolenda pinguedine. Cap. 57.

Cum supra iustum naturæ modum obesum euasit corpus,
Celi quandum ipsum & extenuandū est. Quum igitur osten-
sum sit, calidiorē sicciorēq; temperiē corpus exilius effice-
re, hanc obesit quod ad mediocritatem reducatur, inducemus.
Didicisti aut, quod exercitationes festinæ, nutritiæ exte-
nuās, medicamenta item eiusdem facultatis, animiq; sollicitu-
dines, corporis temperamentum siccius ac calidius, atq; ob id
quidem corpus quoq; gracilius reddūt. Tenuis itaq; uiciū ra-
tio iam omnibus perspicua est. Medicamēta uerò efficaciora
habentur, ruthæ semen, præcipuè syluestris, unā cum corym-
bis, malum terræ, quam aristolochiam dicunt, rotundum, te-
nue centauriū, gentiana, polium, & quæcunq; acrius impet-
lunt lotium, ceu petroselinū: horum nempe singula cū seor-
sim, tum adiectis simul alijs, humores abundē extenuant, &
corpus euacuant. Combustarum porrò uiperarum sales effi-
cacem attenuandi uirtutem possident. Theriaca ipsaq; di-
strahendi & attenuandi potentia regnat. Oleum inunctum,
in quo cucumeris agrestis, alibæ, gentianæ, panacis, & a-
ristolochiæ radices, polium item ac centaurium elixa sint.

Oper-

Oportet autem alimentum non statim à balneis exhibere, uerum ut dormiant priusquam cibum capiant, mandare. Satius autem fuerit, si aqua lauacri ex rebus dissipandi facultate præditis constiterit, præsertim si ultro emergentis copiam habere possimus, cuiusmodi Mitylenæ existit: Sin minus, salis flos aquæ marinæ commiscendus est. Vinum ad hoc tenue atque candidum eligatur. Frictio insuper sicca, quæ panno crassiore ac rigidior sit, efficaciter extenuat. Cibi quoque minus, quam exercitationis ratio postulet, offerendum. Confert itidem ad pinguedinem abolendam insolatio. Vincit, nihil potare: et cibus baria semel duntaxat die assumere, præstat. Frictione item asperiore, nitro uidelicet et salibus, corpus perfricare. Multum etenim nitri, in lauacris extenuat: modicum uero, corpus ad bonam nutritionem irritat. Macilentius etiam reddit hoc medicamentum, quod piperis ac petroselinum duplum, asari uero et anisi dimidium continet. Id quod cum uesticæ, tum alui quosque recrementa pulchre promouet.

Quinam macilenti renutriendi sint. Cap. 58.

Si autem uesticulos admodum reficere studebimus, uino utique, crasso, dapibus crassioris succi, exercitationibus lentis, frictioneque mediocri, et ut simpliciter dicam, omnibus quæ sunt enumeratis contraria, utemur. Profuerit autem plurimum, trium aut quatuor dierum picatio. Si quis ieiunus lauetur, ante lotionem linteo ad corporis usque ruborem confricandus est. Deinde dura quidem, non tamen multa frictione cutim astringendo, densam atque solidiorem reddamus. His qui decolorati sunt, et alimenta non sentiunt, excandescentiam excitare, et animi affectus commouere, expedit.

Quomodo partibus attenuatis medendum. Cap. 59.

Plurima uero macies, quæ membris quibusdam accidit, uel ob diutinam ipsorum quietem, uel ob deligationis modum quo fracturae fasciantur, contrahitur. Quæ circa roborare partium extenuatarum uires, adque eas sanguinis abundantiam attrahere

trahere conuenit, frictionibusq; uti moderatis, motionibus concinnis, & fotu aquæ calidæ moderato. Hæc uerò tantisper peragenda, donec affectus particule cum rubore intumuerint: & priusquam concidant, desistendum. Oportet autem tempicatis medicamentis partes commemoratas oblinire: quas ubi frigidiores senseris, sindone ac calorifico quopiam medicamine confricato. Vsus nonnunquam & thapsia sum, aliàs ex melle, aliàs cum cerato illinens.

Optimæ temperaturæ indicia. Cap. 60.

Optimi temperamenti homo est, ubi corpus ab omnib. extremis ad unguem pari distat spacio: uerbi causa, gracilitatis, obesitatis, molliciei, duriciæ, ardoris, algoris, humiditatis & siccitatis: atq; uno uerbo, cum non naturalia modò uerùm & animalia munia exactè, & penitus inculpate obierit, & exquisitissimè medium hispidi, glabriq; atri, item & candidi obtinuerit. Capillos puer rubicundiores quàm nigriores, adolescens uerò contrario planè modo habeat.

Malæ temperaturarum corporum notæ. Cap. 61.

Corpora plus æquo calidiora, dentes citius edunt, & ad augmentum celerius maturant, tactui calidiora pariter & pingua minus apparent, cutis rubicundæ, atri capillitij, mediocriter hirta, & amplioribus uenis, existunt. Si quis pinguis, crassusq; fuerit, ac uenas simul latiores sortitus sit, non est ea pinguedo naturalis, sed consuetudine acquisita. Frigidioris temperamenti notæ sunt, cum gelidum tangentib. corpus apparet, glabrumq; sit ac pingue. Color cutis unè cum pilis rufior est. Et si frigiditas plurima excesserit, liuidior, ac plumbeus, arctiores sunt uenæ. Si gracilitas huic temperaturæ accedat, neq; is necessariò, sed cōsuetudine talis euasit. Aridū uerò temperamentum durius est & gracilens, tuis medio temperamento, atq; hispidum: quandoquidē à sicca temperie insparabilis omnino duricies est. Gracilitas uerò non congenitis modò temperaturas, sed etiam ex longa consuetudine

¶

consuetudine

cōsuetudine contractas comitatur. Testatur uerò duriciem,
 si corpus ægrè moueatur, & siccum interim ac squalidū ex
 qualibet arefaciente causa reddatur. Humidum, in reliquis
 quidem omnibus bono temperamento respondet, uerū mol-
 lius & carnosius est, à quo mollicies separari non potest. Si
 cuti crassities non insitam solum sequitur temperaturā, sed
 etiam ex diutina quadam consuetudine adquisitam. Peculia-
 re uerò maditatis indicium est, onerari ab humidioribus cor-
 pus. Quibus calidum atq; siccum fuerit temperamentum,
 ij extremè denso ac hispido sunt corpore, capitisq; casaries
 in prima statim ætate facile augmentabilis, quam atram &
 copiosam in iuuentute sortiuntur. Progressu uerò temporis
 caluities comitatur, uenæ latiores sunt, & arteriæ amplæ,
 quæ uehementiore idu percutiunt, uniuersumq; corpus robu-
 stum, dearticulatum, musculosum iuueni, & adipe carens. Cu-
 tis durior & atrior. Gelidum uerò ac humidum tempera-
 mentū, thorax cum reliquo corpore angustus ac glaber ar-
 guit, cutis tenera & candida, capillitiū subrufum, præci-
 pue in adolescentia, in senectū non caluescunt. Sunt huius na-
 turæ statim formidolosi, pusillanimes, segnes, obscuris ue-
 nis, crassi, pingues, musculis, femoribusq; indiscreti, inarti-
 culati, & lingua plerumq; titubāte. Quod si modum mador
 frigiditasq; excesserint, color cutis capillorumq; rubens: si
 plurimum intendatur, luridus existit. Calidū, humidumq;
 temperamentū, & mollius est, & carne magis abundat, q̄ in-
 culpatum. Si uehementer augeatur, prōptius his quæ ex pu-
 trefactione proficiūtur ægritudinibus, corripitur: Sin hu-
 midius paulo quidem, sed multo calidius existat, molliores
 paulo tales bene temperatis, & corpulentiores, nō uerò pau-
 lo hispidiores euadunt, & tangentibus longè calidiores ap-
 parent. Quod si frigidū unū cum siccitate exacta paritate
 intendatur, natura durius, gracilius, & candidum erit cor-
 pus, neq; musculosum, neq; articulatū ac depile, ad ta-
 cū ue-
 rō fris

rd frigidum: pinguedo tamen (etiā si tenuia sint eiusmodi corpora) inter carnes hinc inde intercalata cernitur: capillitium uerò & color, frigiditatis modulo proportionantur. Quod ad animi mores spectat, pusillanimes, meticulosi, mœstitia semper percussi, eiusmodi tēperaturæ homines sunt: atque ut cōpendiō perstringā, in temperamentorū coniugatione semper dominantis qualitatis notæ superare consueuerūt.

Defiguratione capitis. Cap. 62.

Exiguū caput, uitiosam cerebri fabricam peculiariter testatur: neq; tamen ob id grande, necessariū bonæ cōstructionis nota censetur. Nam si ex insitæ potestatis utilem ac plurimam materiam procreantis robore magnitudo euenērit, laudabile indicium est: sin ex solius materiæ copia, malū. Proinde distinguēda sunt hæc, forma scilicet capitis, & ipsæ quæ inde propagātur. Forma quidem, si concinna est, nunquam uerè mala hæc nota existit. Propagaginis uerò capitis, si optimè consent, & neruosum genus bonum habitum firmitatemq; obtinuerit, oculiq; perspicaci admodū acie præditi sint. Acuta uerò, & fastigiata capita, deficientē habēt frontis seu occipitij eminentiam, uel supra quā conueniat auā. Quemadmodum itaq; capitis cū magnitudo, tū paruitas, sic hæc quoq; tam distortæ reprehendūtur figuræ: quarum nonnunquam, rarenter tamen, nonnullæ ceu bonæ cōmēdātur, ubi formatrix scilicet facultas robustior exiiterit.

Temperamenti cerebri indicia. Cap. 63.

Mediocris temperamēti cerebrum, functiones naturales moderatas, recrementorumq; mediocritatē cōtinet, minimeq; ab his omnibus quæ foris occurrant, offenditur. Capitis capillamentū t. lib. per infantia subrufum, per pueritiam subflauū, in adolescentia flauum, & medium quodāmodo inter exquisitè crispum & planū cernitur, nec tamē procliuius caluescunt. Quod si temperato calidius fuerit, cūcta quæ caput circūstāt, calidiora & rubicundiora uidentur,

C 2 oculos

oculorum uenæ uisum nō effugiunt, coma capitis mox in lucem editis promicat. Et si plurimum caliditas excedat, nigra, fortis atq; crispa. Quum uerò non multum, principio quidem subflaua, mox deinde nigricat: ætatum uerò progressu, caluitium facile admittunt. Retrimenta talium sunt modica, inculcataq; sanitate fruuntur. Implentur atq; aggrauantur eorū capita calorificis tum esculentis, tum poculentis, tum odoribus, tum ijs quæ forinsecus incidunt. Breues somni, minimeq; profundi, id genus temperamentis sufficiunt. Qui frigidius quàm par sit, cerebrum habent, his retrimento pluri peculiares ei meatus abundant: cæsaries recta, rubicunda, stabilis, præoptiq; à gelidis causis offenduntur, destillationibus & grauedinibus perpetuò confluantur: uenæ oculorum non conspiciuntur, somnoq; magis quodāmodo destituti sunt. Aridioris cerebri notæ sunt, nulla in meatibus excrementi redundantia, sensuum exacta consummatio. Vigiliæ, asperriimi statim in lucem editis capilli, crispique magis, caluities præcox. Humidioris cerebri indicia sunt, capillamentum planum, caluities nulla, sensus obtusi ac turbulenti, superfluitatum abundantia, somni plures, atq; profundi. Cerebrum calidum & aridum sortiti, excrementis uacant, sensibus regnant exquisitis, plurimū uigilant, celerrimè caluitium experiuntur: prima capillorum origo ocysima, plurimo abundans alimento. nigri sunt pili, & calidi tangentibus caput apparent, & usq; ad uigentem ætatem rubicundi. Sed ubi caliditati maior accesserit, & utraq; temperamentum modicè superant, ijs uenustus color & calor inest, prominentes in luminibus. uenæ apparent, superfluitatum copia moderatè concocta, capillitium rectum, uergens ad flauum, non ex facili caluent. Rebus tamen calfacientibus & humedantibus, eorum capita facile replentur et grauatur. Quod si uehementior calor humiditasq; creuerit, caput morbidum & excrementosum euadit, multoq; celerrimè à calorificis humedantibus

humeantibusq; lædi consuevit, neq; diu uigilare eius tempe-
raturæ homines possunt. cum autē somnus subrepperit, ima-
ginationibus per somnia obruuntur, species oculorum cali-
ginosa, sensus non exquisiti. Gelidum pariter & siccū ce-
reberi temperamentum, frigidum & decoloratum caput te-
statur: quo præditi oculorum uenas latentes obtinent, & à
causis frigidis pròptius offenduntur, eoq; inæquali sanitate
fruuntur: sensus per iuuentutem exactissimos & inculpato
possidēt, sed progrediente ætate maturimè tabescūt, atq; (ut
compendiò dicam) celerrimè circa caput senectutem osten-
dunt. In lucē eiusmodi temperamento editis capilli uix erum-
pūt, prauè alimētis sustentantur, atq; rufescūt. Hudum ge-
lidumq; cereberi temperamentum, ueternosos pariter & so-
mnolentos homines parit: sensibus retusos, excrementis res-
dūdātes, caput algori, plenitudini, destillationib. mucisq; na-
rium peropportunum, neq; tamen caluiciei obnoxiiū reddit.

Ventriculi temperaturæ indicia. Cap. 64.

Ventriculi natura siccioris notæ sunt, si quis uelhemētius si-
ti prematur: quæ exiguis potionib. exstinguatur, à libera-
liorib. grauetur, et fluctuationes percipiat, eo q; superfluum
est fluitate, cibarijsq; gaudeat aridiorib. Humidiore uentri-
culo præditi, minimè siticulosi sunt, et humoris copiam sine
molestia tolerant, & edulys oblectantur humidioribus. Ca-
lidior natura uētriculus, exactius quidem concoquēdi, quàm
appetendi functionē absoluit, præcipuè si dura et mutationi
renitētia ingerātur: delectātur tum cibis, tum potib. calidis:
neq; tamen gelidis, si moderatus ipsoꝝ fuerit usus, læditur.
Frigidioris natura uentriculus, ut appetēdi uirtute uiget, i-
ta coquendi munere friget, maximè si ijs quæ suapte natura
difficulter conficiuntur, & frigidis alimentis oncretur: prò-
ptè enim in ipso acescūt. Amat uerò gelida, sed faciliè ab eo-
rundē immodico usu offenditur. Prauæ uerò temperaturæ
à morbo conflata. hoc ab insitis dissident, q; contraria non

sibi similia affectat. Quocirca si uentriculus decoquendo probè sua munia exequitur, temperatus dicitur: sin secus, intemperatus. Si nidorosas rudationes edat, immoderatum eius ignemq; feruorē testatur: sin acidus, cōtrā. At qui cibaria cōsequi contumacia facile conficit, caloris uehementiā arguit: si hæc minus, sed pisces facilius concoquit, imbecillitatem. Obscruandum tamen, propter humorem ne aliunde uentriculo admeantem id superueniat. Pituitosi nāq; acidum, biliosi nidorosum, uirosū, aut alias quaspiā qualitates extraneas rudant: utrosq; autem communiter nausea infestat. At si in sinuoso uentriculi loculamēto uitiosi humores fluitauerint, uomitu excernuntur. Si uerò corpori ipsius impaet, tunicis eius adhaerescunt, frustra ipsam inanibus nauseis ad uomitum uellicant.

Agnitio pulmonis: Cap. 65.

Non uentriculus modò siticulosos, & siti uacuos reddit, et frigidi calidiūte potus appetentes, sed etiam quæ in thorace consistunt uiscera, cor, pulmo, & hep̃ar. Qui igitur pulmonis calore sitiunt, etiam si potauerint, nō protinus leuātur siti: frigidaq; potio sitim ipsorū magis restinguit, q̃ multa calida. Recreat eos gelidi aeris inspiratio, cū nihil solatiq; cōferat ijs, qui uentriculi ratione sunt sitibundi. Sic quodāmodo affecti, à gelido inspiratu sensu perceptibilem lāsionem percipiunt: quod insigne frigidi pulmonis indicium est. Quin & pituita excrementa cū sreatu et tussi expuunt. Quem admodum aridi pulmones retrimētis atq; pituita carēt, ita humidi superfluitatibus abundant, uocem reddūt obscuram pariter & raucam, intercurrentibus ipsis identidem excrementis, quum acrius impensiusq; uerba facere contenderint.

Cordis indicia. Cap. 66.

Cordis feruētioris notæ sunt, amplitudo respirationis, percussus arteriarū cū uelocitas tum frequētia, audacia, & furiosa temeritas, thorax hispidus, et pectus præcipuè, et quæ sunt hypochondrijs partes proximiores. Magna uerò ex parte

parte, et uniuersum corpus calidius, nisi iecur uehemētius ob-
stiterit. Quin & thoracis uastitas, caliditatis indicium est, nisi
et hic cerebrū magnopere repugnet. In frigidiore uerò cor-
de percussus tēperatis paruiores edūtur: meticulofo sunt ge-
nio, eiusmodi tēperaturæ cor sortiti: pusillanimes itē, oscita-
tesq; et pectore glabro. Cor siccius testatur duriores pulsus,
ira nō procliuiis, sed ferox, et quæ nō facile placari queat, at
que magna ex parte totū simul corpus siccius, nisi hepar cū
uicinis partib. renitatur. Humidius cor arguunt percussus
molles, mores ad iram quidē procliuiiores, sed ocys pacabi-
les, atq; uniuersum corpus humidius, si hepar nō reluctatur.

Calidum & aridum cordis temperamentum indicatur
percussu cū duro, tum magno, tum ueloci, tum deniq; den-
so. Itē respirationib. magnis, pernicipib. et crebris: et sunt om-
nes eiusmodi pectore pariter et hypochondrio hirsutissimo, ad
functiones expediti, iracūdi, audaces, morib. tyrannicis, iræ
præcipitis et pertinacis, ita ut facile pacari nequeat. Quod
si calor et humiditas iuxtā excesserint, minus quidem prædi-
ctis sunt hispidi, uerū ad munia quæq; obeūda prōptissimi:
animo minimē quidē fero, sed ad irascendū duntaxat facili:
percussus arteriarū magni, molles, ueloces, atq; frequentes.
Si cum humiditate frigus uicerit, percussus quidem molles,
mores uerò pusillanimes, timidi et desides existūt: tales gla-
bro sunt pectore, et perinde ut irā nequaquā retinēt, ita ad hāc
haud facile cōmouentur. Cor deniq; gelidū & aridum, per-
cussus duriores edit ac paruos. Bi uerò præ omnib. omnium
minimē ad irascendū prōpti, sed semel perciti, mordicus irā
retinent, maximē uerò omnium pectus habent pilis nudissimū.

Iecoris temperaturæ indicia. Cap. 67:

Iecoris calidi notæ sunt, uenæ grādes, flauæ bilis abundan-
tia: in consistenti ætate etiam atræ: sanguis feruentior, &
ob hoc uniuersum etiam corpus, nisi quæ cordi attinēt, recla-
ment: uenter illis & præcordia hirsuta. Frigidioris uerò

C 4 iocinoris

iocinoris indicia sunt, uenarū angustia, pituitæ abundātia, sanguis, atq; totius corporis habitus frigidior, nisi à corde calor repēdatur. Vēter & præcordia glabra. Siccioris notæ sunt, sanguis crassior et paucior, uenæ duræ, uniuerſusq; corporis habitus aridior. Humidioris uerò hepatis indicia sunt, sanguis copiosus et liquidus, uenæ molliores, pariter et uniuerſum corpus, præterquam sicor obſtiterit. Calidi & sicci notæ sunt, præcordia hispidiſſima, sanguis crassior & minus abūdans, amaræ bilis copia, atq; per uigoris ætatē atræ, uenarū latitudo et duritia, pari modo corpus simul uniuerſum et calidū et aridū: quoniā calor à corde propagatus, frigiditati quæ ab hepate proficiſcitur, facile dominatur, quemadmodū & caliditas à frigidity uincitur. Siccitatem uerò nequit cor humidius ad cōtrariam naturā trāsmutare. Liquet igitur, quod quū in idē utriusq; principij tēperamentis cōfluxerint, exactē corpus uniuerſum iuxta illorū naturam afficitur. Calidius uerò et humidius iecur, minus quidem hirsutum reddit præcordiū, q̄ calidū et aridum, sed pluſculū sanguinis, uenas amplas, habitudinē humidā ac calidā parit, nisi cor resistat. Si uerò permultus supra iustū naturæ modū fuerit utriusq; qualitatis excessus in morbos, q̄ ex putredine, uitiosisq; succis proueniūt, procliuiter prolabuntur. Idq; lōgē magis, si plurimū humiditas, calidū uerò paululū, augeatur. Vitiosis etiā humorib. laborāt. Humidius hepar ac frigidius, pilis nuda habet præcordia, sanguinē reddit pituitosiorē, uenas arctas, uniuerſumq; corpus similiter afficit, nisi à corde in cōtrariā naturā traducatur. Frigidius et siccius iecur, parū sanguinis, uenas angustas, corpus frigidius, præcordiūq; glabriū reddit, nisi & hic quoq; cor impauerit.

De notis temperaturæ testium. Cap. 68.

Calidum testiculorum temperamentiū salax, mariū opifex, et fecundum est: genitales partes protinus obſepit pilis, & circumiacētes quoq; locos contingit. Frigidius cōtraria

traria efficit. Humidum, semine multo, & humido abundat. Aridū pauca genitura, sed crassa generatrix est. Calidū & aridum, semē moderatē crassum producit, & fecundissimū est, & celerrimē ad cōgressum mox à principio animal excitat. Proinde in obscænis uicinisq; partibus pilos præcocißimos, supernē umbilico tenus, infernē uerò ad media usq; femora. petulci tales cū impetu prolabūtur in uenerem, sed confestim satiantur: & si eniti uelint, ualetudinis iacturā faciūt. Si humiditas calori accesserit, hispidi quidē illiusmodi sunt, plus uerò semine abundant, sed reliquis in libidinem proniores nō sunt: uenercis aut præter modum minori detrimento indulgent. Si uerò utraq; hæc, calidum & humidum uehemēter exceßerint, haud citra detrimentum à uenere abstinent. Si testiculi frigida ac humida temperatura, uicina partes glabrescunt, serius re uenerica uti incipiunt, neq; procliuēs in actū irruūt: aqueum et tenue semē emittunt, minus prolificum, muliebris modò sexus procreatiū. Arida & gelida testium tēperies per cætera præcedenti ad amussim respōdet, sed crassius semē & omnino modicū procreat.

De his quæ omissa sunt. Cap. 69.

Vetus nostri corporis particula priuato quopiam temperamento, effectu prædita sunt: uerū de omnium in præsentia notis differere nō est operæ precium, quā infinitæ prope modum sint, & rem nobis omnem cōpendio perstringere sit propositum, illas duntaxat prosecuti, quæ uniuersum potissimē corpus lege quadā cōsortij afficiūt. De cæteris eadem ratione ac uia ratiocinandū ducimus: nō ab excremētis modū, uerū ex reliquis tum functionibus, tum symptomatis, ipsarū temperamēta indagātes. Tēpus igitur est, ut conuersa oratione, totius corporis intēperies emendare aggrediamur. Quomodo calida corporis intēperies emendentur. Cap. 70.

Vum igitur in calido temperatura excessu, bilis exuret, si per inferna deferatur, nihil oportere negotij facere

C 5 cessere

cessere constat. Si ad superiorem uentriculum uergat, post exercitium, ante cibum, epota aqua, uomitione expellatur. Maiore autē cum utilitate tales exercētur, non citata exercitatione, aut ualida, sed deside, et molliore. Quidā uerō impē se calidi nulla exercitatiōe indigēt, sed inābulasse atq; lauasse sat habent. Gaudent tales à cibo lauare. Qui cum calore aridi sunt, humēti nutritu indigent, humidis cibarijs, balneis. Ab exercitationibus plurimis, et uehementioribus abstineant. Aestatis idcirco tempore citius lauare, et post cibum denud, debent. Gelida his prodest potio. Siccioribus temperamentis infestissima uenus est: eis lassitudine, et sollicitudinibus, uigilijsq; maximē abstinendum. Temperamenta humida in puerili etate affectionibus, quæ causæ rationem ex defluxione, plenitate, et putredine habent, tentantur. Quare exercitationibus multis, et exquisita uentris concoctione, atque per lotium secretionem, egēt. Hisce iterum atq; iterū prius quam cibum capiant lauare, et thermis naturalibus uti, plurimum subuenit. Eorum autem quæ à corpore desinunt, cura habēda est, tum balneis, tum exercitationibus multis, tum his quæ per uentrem et urinas excernuntur. Nihil etiam obstat apoplegmatisms interdū atq; purgationibus, edulysq; boni succi, ac uino deniq; urinam ciente, uti.

Quomodo frigida intemperantia corrigantur. Cap. 71.

Gelidarum intemperierū tria habentur discrimina, quarum omnium quidem insaluberrima est arida. Nam quod in etatis processu grandioribus natu accidit, id ab initio statim tales infestat. Proinde humectandi calfaciendiq; sunt eiusmodi. id quod pulchrē quidem exercitationibus modicis, cibis humentibus ac calidis, uini calidioris naturæ potu, somnoq; prolixiore, conficitur. Nobis interim, ut omnes quæ singulis dieb. in corpore gignuntur redundantia euacuentur, prospiciendū. Venus aridiorib. uniuersis officit, potissimum si cum siccitate frigidi sunt: solis autem calidis et humidis

inno-

innocua. Vitiosæ quoq; temperaturæ censentur, cum humiditate frigida, & agrotationibus, quæ ex defluxionibus oriuntur, sunt opportuni. Talibus balneorū abstinentia, exercitationes crebræ, tenuior nutritus, & unctiones moderatè calfaciētes, prosunt. Qui aut frigidiores natura existunt, modū uerò sicca ac humida tēperaturæ iustū obtinent, horū calor tū excitandus, tū roborandus est. In humiditatis uerò siccitatisq; specie, uniuersa uiuendi ratio mediocris eligatur.

Siccarum intemperierum in uentriculo, exempli loco, mox reliquarum etiam intemperaturarum curatio. Cap. 72.

Aridorum distemperamentorū, aliud in similaribus solidæ essentiæ partibus siccioribus redditis cōsistit, quod deploratum curationē non recipit. Aliud uerò, partiū quæ ex substantia ex humore cōcreta constant, existit. Est etiam et tertium præter hæc, quum propria humiditas unde partes aluntur, penitus absumpta est, quæ in omnibus animantis partibus consistunt, roris instar eis inspersa, quæ sine cibo in partibus reponi non potest: quapropter difficilima est omnium talium affectuum curatio. Siccitatibus uerò, quæ in exilibus cū arterijs, tū uenis consistunt, succurrere expedit: uicinis ratione humedante, quæ singulas similarium partium peculiari humore impleat. Non alienū itaq; fuerit, ægrotantē in aqua balnei mediæ tēperaturæ diutulè immorari. Post lauacrum illico lac asininum recens emulctum propinare, mellis tepidi nōnihil lacti confundere: deinde quieti ad secundum usq; balneum permittere: tum moderatè ac pinguius conficere, si exhibitum lac exquisitè fuerit cōcoctum. Id quod non ex rubrib. modò, uerū ex uētriculi etiā mole, licet colligere. Modicū uerò temporis interuallū, quatuor uidelicet aut quinque horarum æquidialū, inter primum atq; secundum balneum interponatur, si tertio hominē lauare institueris: sin uerò minus, pluriū. Porro à singulis quibusq; balneis, oleo, priusquā uestib. amiciatur, obliniendus est homo. Quin à secūdo quoq; balneo

balneo lac magna cum utilitate exhibebitur, si eo delectetur: sin secus, ptisana accuratissimè elixata, uel chōdrus ptisanæ modo cōfectus. Deinde trāquillitate denuð interposita, uel ad tertium lauacrū, uel ad cœnam illico ducemus. Panis autem egregiè præparatus, probeq; in clibano assatus, & sincerus esto. Obsonij loco sumātur pisces saxatiles, siue asellus è iure candido. Atq; ut summatim cibariorum caput perstringam, cōcoctioni non renitātur, nutrimentū sint exquisiti, neutiquam glutinosa, aut plurimi retrimēti. Potus sit uinū aquosum, colore candidū, purum, quod paucā aquæ mixtionem tolerat, modica adstringendi facultate donatū. Summa quidem siccitatis remedia hæc sunt. Mediocris uerò, non tam exactam uidus rationē desiderat, nec pleniorē nutritiū abhorret. Ponatur autem in medium ariditas, superiori neutiquā absimilis, cui mediocris quædā fuerit copulata frigiditas, in qua ad calfacientium materiā transeundū est, prædictis iam adiyciendo, lactis quidem usui, plusculum mellis, uinū uerò meracius quā prius exhibebimus. Quin & cibaria calidiora non naturalibus modò temperamētis, sed nuper etiam accersitis qualitatibus, administrare cōuenit. Nardinum insuper, aut mastichinum unguentum iugiter illiniendum est. Si uerò plurima frigiditas cum siccitate excesserit, temperamentum ut multò difficillimum iudicatur, ita cum primis correctioni renititur. Verū eisdem ei medicamentis, uel melle per se elixato despumatoq; succurritur. Vinum quoq; admodum uetus eligendum est. Saluberrimum ita affectis medicamentum est, quod picatores iugiter usurpāt, si uentriculo illitū auellatur, priusquā refrigeretur: dormire præterea cum puerulo habitiore, ita ut abdomen perpetuò attingat, proficit. Vbi uerò ariditati mediocris caliditas cōmiscetur, in hac intemperie primam educationis rationem obseruare conuenit, ne mellis uel tantillū degustetur, uinū uerò minimè uetustū hauriatur. Cæterum edulia tepida ac lactea offerre, et uentrem cum omphacino,

phacino, tum melino perlinire conducat. Verum immodicæ eos qui ita afficiuntur in frigidare, fonticū est: quoniam febris quodāmodo naturā, hic status, ubi calor modum excesserit, æmulatur. Supponamus ediuerso calidam intemperie excedere, sed ei humiditatē annexi. Huic intemperamēto, aquæ gelidæ potu opitulabimur. Salutaris etiam huic cōstringentium esculentorū usus, sed quæ absq; calfaciendi potentia sint austera. Si humidum distemperamentum solum fuerit, are facientia alimenta, quæ neq; insignem calfaciendi, neq; refrigerandi uirtutem habent, præsidio sunt. Cōsuetæ itē præstat potionis defraudatio. Humidæ intemperiei cū frigore copulatæ, optima subsidia sunt, quæ acrimoniā præferūt, admixtis interim sine euidenti uirtute frigorifica adstringētibus. Eximium quoq; talibus auxilium, modica potio, uinorum præsertim apprimè calfacientium. Eiusmodi igitur sunt intemperierum, quæ in qualitatibus cōsistunt, remedia. Quoniam aut humor qui in sinuoso uentriculi loculamento continetur, uel tunicis ipsius impactus est, distemperamentum subinde procreat: haud absurdum fuerit, de ijs quoq; sermonem facere. Quare si prior affectus semel cōstitit, euacuato uomitu humore facile compefcitur. Si rursus ex alia quadam, aut alijs proueniat partibus, ad amussatā cognitionē requirit, quam protinus curatio excipit. Eam quippe uniuersam affectæ parti adhibere oportet: suscipienti uerò interim prospicere, ne procliue quod influit, suscipiat. Quam quidem prouinciā non adstringentia solum, sed ea etiam quæ bonam corporis totius habitudinem cōciliant, pulchrè absoluunt. Vitiosos uerò in uentriculi tunicas absorpos humores, medicamentis molliter purgantibus educere expedit: è quorum numero est aloë, & quod inde præparatur medicamentum amarum, pī cra appellatum. Lentus uerò simul humor pituitosus uentrē impactus, primò incidētibus dissecandus, deinde expurgandus est. Si quis accommodus uidebitur, citetur uomitus radicular.

Sin neq;

Sin neq; glutinosus, neq; crassus humor infestat, satis fuerit uel ptisanæ cremore, uel mulsæ uomitione ciere, aut absinthij succu ex mulsæ sumere. Pari insuper ratione & reliquorum deinceps membrorum intemperaturis medendum est, humoribus ad commodos meatus deriuatis. At si qui sensu percipi queat, meatu pars destituatur, redundantes in ea cruores saniosos siue humores, ueluti spiritum quoq; flatuosum, inibi contentum, in halitum redactos, discussosq; uacuare conuenit.

De alimentorum uiribus. Cap. 73.

Super alimentorum facultatibus orationem, quæ bona pars operis, corpori hominis tuendo dicati, esse uidetur, rebus iam memoratis subnectere cõsentaneum est, si antequam eius cõmemorationem membratim aggrediamur, pauculis antici paucrimus. Oportet etenim alimentorum uires, si quicquid aliud, pernosse. Epulæ igitur quæ extenuatoria facultate polent obstucos recludunt meatus, lētores impactos extergunt, crassa diffecāt, attenuātq;. Diuturnior tamē eius facultatis alimētum usus, cum serosa, tum biliosa excrementa cõgerit. Quæ si largius ingerātur, atrebilarium sanguinem efficiunt. A iugi propterea ipsorum usu tēperandū est, præcipuē ijs qui biliosiorē naturæ statū sortiti sunt. cõducunt namq; his tantummodo, qui pituitæ, crudiq; uiscidi et crassi humoris struicem acceruerūt. Cæterū quæ impinguitis naturæ sunt, sufficiens nutrimentū suggerūt. Et si in uentriculo et iocinore expeditè cõficientur, inculpatum sanguinem pariunt, lienis uerò iocinorisq; meatus obturant. Horum uerò alia quidē crassioris duntaxat succi existūt: uerbi gratia, lens; alia uiscidi, uel uti maluæ: nōnulla utriusq; sunt participes, cum crassi, in glutinosi humoris, ut quæ testa integuntur. Ad tuendā igitur ualetudinem tutior extenuans uicius est, quàm qui crassiore succo impinguandi uim possidet. Sed quoniā exiguē alit, nihil neq; firmitatis, neq; roboris corporibus præbet. Et oportet nōnunquam cum inedia quēpiam pressit, escas quæ plurimum nutriunt.

triant, mediocriter offerre. Potissimū uerò absq̃ discrimina-
tali uicū utentur, exercitationibus additi, & qui ex senectia
sua somni quantū uidetur, capiunt. Quibuscunq; autem ante
quā cibum sumant, exercitationibus operā dare non est in-
tegrū, dapes crassieris succi uiuent. Neq; ocio dediti, unquam
id genus alimenta admittant. Porro ut perpetuū ocium ad tu-
telam sanitatis summè officit. sic agitatio cōmensurata ad tu-
endam ualitudinē summè proficit. Medicæ uerò materiæ ci-
bi, omniū præstātissimi iudicari debent, utpote qui mediocris
essentiæ sanguinē generāt. Vt igitur eius farinæ corporibus
nostris cōmodissima sunt esculēta: ita quæ uitiosos humores
procreāt, summo sunt dispendio, eōq; semper uitari debent.
Arcenda etiam, tanquam cōcoctioni rebellis, eduliorū uarie-
tas est, potissimum si cōtrarijs fuerint facultatibus prædita.

De oleribus esculentis. Cap. 74.

Lactuca liquidò cū refrigerandi, tum humedandi facul-
tatem obtinet, quo nomine etiam somnum conciliat. Hæc
ut inter olera eximie nutrit, ita egregie etiā succi sanguinem
producit. Inuibz refrigerandi quidem & humedandi fa-
cultatem, sed lactuca inefficaciorem, possidet. Malua frigo-
rificæ quidem uirtutis est, sed obscuræ: efficaciorē uerò ha-
bet humedandi potentiam, unde & propter genuinū lento-
rem aluū facili subducit. Beta abstergerendi facultate aluum
irritat: proinde si largius estur, uentriculi os, qui stomachos
Græcis appellatur, lancinat: iecoris & lienis obstructiones
aperit. Brassica recocta si edatur, aluum cōprimi: semel ue-
rò, ac ne tum quidem impensius elixata, cum oleo & garo, sa-
le ue comesta, uētreū potius lubricat: perinde atq; succus i-
psius, lentis cremorē purgandi facultate præcellit. Hæc uerò
brassica marina aluū adhuc euidentius præmollit: nam salis
laginem, subamarulentum que saporem præfert. Halimon
idem facit, sed amplioris salcedinis cōpos, uentrem subducit.
Ceterū quā brassica stomacho accommodatior, eo quod
medio

mediocris astringentis uirtutis particeps. Lac porro semper
prolificum auget. Blitum et Atriplex humidiora quidem
sunt, aliumque molliunt, sed pauxillum alimentum præstat. Acu-
leata omnia, cuiusmodi carduus, fuscus agrestis, et huius clas-
sis alia, stomacho summopere conueniunt, depta cinara, pra-
ui namque succi, quum durior euaserit, habetur. Quare præstat
utissimum fuerit, elixæ oleo, garoque, et coriandro comedere.

Apium satium, olusatrum, sium, smyrniū, omnia quidem pro-
ritandi et impellendi lotij potestate obtinet. Cæterum smyr-
nium odore et acrimonia præstantius est, et urinam pariter
ac menses commouet. Apia suauiora sunt, ideoque stomacho ma-
gis idonea. Bruca magnam excalfaciendi uim obtinet, et
genituram efficit, et ob id in uenere stimulos addit, capitisque
eum dolore, quam cephalicam nominant, inducit. Nastur-
tium, ocimū, sinapi, calida quidem sunt et acria, præsertim
nasturtium: concoctioni resistunt, stomacho noxia, et prauos
humores pariunt. Vrtica maximè tenuiū est partium, uen-
trem subducit, et parcius alit. Bisacutum, quod gingidion
appellant, scandici non absimile, plusculum astringentis quali-
tatis, amaritudinisque retinens, aptius est stomacho: ita quidem,
ut cibum fastidientibus appetentiam reuocet, cum aceto sum-
ptum, sed exiguum corpori alimentum præbet. Quæ uero syl-
uestria olera dicuntur, pestilētissimum omnino succum gene-
rant. Capparis quoque cibi appetitum excitat, meatuum io-
cinoris et lienis oppilationes recludit, pituitam educit. Vfus
eius ante escas alias ex oxymelite, uel oxelæo commendatur.

De asparagis: Cap. 75.

Blitum, lactuca, atriplex, malua, betaque, stirpem quidem huius-
modi habent, asparagum uero (cymam Latini uocant)
siccū. Raporum contra sinapis, radicle, nasturtij, pyrethri,
brassicæ, et omnium aliorum caloricam uirtutem habentium,
planta quidem arida, cyma uero humida est. Cæterum à spi-
nosissimis plantis, hortensis, et quæ in harundinetis, uliginosis ue-
locis

nascuntur cyma, quæq; à bryonia decerpuntur, stomacho quidem accommodatæ sunt, et lotium cient, parū tamen nutriunt: et si probè concoquantur, olerum asparagis in nutriendo efficaciores sunt. Pari etiam modo et chamædaphnes asparagus.

De iis quæ edulibus prædita sunt radicibus. Cap. 76.

Napus atq; rapa denuò elixa, non minus alimēti quàm reliquæ stirpes præbent. Cum uerò assiduè eduntur, crassum succum generant. Bulbi, astringentis abstergentisq; naturæ sunt, appetentiam cibi proritant, stomachū roborant, uiscidos è thorace humores educūt. Si bis decoquantur, uberius quidem nutriunt, sed nihil educūt. eo enim pacto ipsorum propulsatur amaror: semē præterea prolificū produciunt, libidinem accendunt, si crebrius sumātur, inflationes cōciliant, torminaq;. At qui ex garo, oleo, et aceto comesti, dulcissimi sunt: flatu carent, optimi alimenti faciliq; decoctionis sunt. Pastinacæ, dauci, cari radices, minus alimenti, quàm rapa præstāt: præcalide uerò sunt, et euidenter odoratæ, lotiūq; impellūt. Si abutare, prauos succos generant: cōcoctioni rebelles, cōmuni radicū ratione, existunt. Sunt qui syluestre pastinacam, daucum nuncupent, quòd multo uehementiore uel lotiū promouet. Radicis la, attenuandi adurendiq; potestatem habet: edenda in prima mensa est, ex aceto, seu garo, uentris subducēdi gratia: in secundis uerò mensis nequaquam. Cape, allium, porrū, acredine prædita, corpus calfaciunt, extenuant et dissipant crassos in ipso humores. Bis quidem elixa exigui, cruda uerò nihil alimenti sufficiūt. Allium acrius obstructiones discutit, dissipandiq; potētia regnat. Efficaciores porris arefaciēdi uires habēt amelo prassa, ueluti syluestria. In summa, olera simul uniuersa, coctionē non experta, si edātur, deterioris succi sunt, quàm elixa, multoq; magis superflua humiditate participāt. Quæ uerò muria uel oxybalme cōdita reseruātur, stomacho magis cōueniūt, et cibi cupiditatē excitāt, crudos humores disijciūt, ægrè uerò conficiuntur. Et abutētibus uitiosos humores procreant.

D De tu

Tuber nullum manifestæ qualitatis ex seipso liquorē, frigidiorē uerò & crassiorē exhibet. Fungi autem gelidi, pituitosi, & uitati humoris sunt. Omnium innocentiores habentur boleti, qualitatis expertes, probè elixi. Qui uerò ammanitæ uocantur, secundum post boletos bonitatis locum obtinent. Ceteri omnino uitandi sunt, pars quippe magna ex ipsis lethalis est: quinetiam ipsi quoque boleti, nisi exquisitissimè elixi edantur, auctores periculi subinde existunt.

De frumentaceis. Cap. 78.

Ex eis quæ frumentacea dicuntur, chondrus egregiè nutrit, et glutinosos parit humores: sed ablutus pestilens est, eo quòd pròptè crassescēs incocta permanet. Præfertur potius cremor ex integro chondro exactius ptisanæ instar decocto expressus.

Alica in cæteris quidē chondro similis est, sed aluum intensius moratur. Triticum, elixum, comestū, ægerrimè conficitur, flatus generat: ubi autem concoctū fuerit, alimētum præstat ualidissimū. In panem uerò redactum, inflandī facultatem, & concoctionis difficultatē exuit, eo quòd fermenti salisq; particeps sit. Siligineus, uerò panis omnium firmissimus est, post hunc similagineus, deinde cui secerniculo nihil ademptum est, quem syncomiston Græci uocant. Sordidus, hoc est, cibarius panis, minus quidem alit, sed promptius per aluum deijcitur.

Amylus, minimi alimenti, non aliter atq; panis elotus est.

Hordea frigoris et absterforia sunt potentia: elixa instar ptisanæ, humectant: frigida ad modū polentæ, arefaciunt.

Polenta in æstate ante balneū cum aqua pota, siti subuenit.

Hordaceus panis frigidior, et exigui alimenti est. Maza ægrius conficitur, & amplius quàm hordeaceus panis inflat: cum melle uerò subacta, per aluum facile descendit. Avena calida est, & parum nutrit. Milium ac panicū refrigerandi, siccandiq; & exiguas in nutriendo uires possident, aluumq; morantur: præcellit autem per omnia milium panico. Oryza
conco

LIBER PRIMVS.

51

concoctionis rebellis, & exigui nutrimenti est, & aluum com-
pescit. Coquitur autē ptisana hoc modo: Vna etis pars in quin-
decimaque partibus, paulillo olei adiecto, elixatur: etcū ebul-
lierit, aceto: ubi iam ad unguē decocta fuerit, sal friatus supera-
inijciendus est. In quibusdam ei porrum et anethū admiscetur.
Caterū auena chondrusq; , perinde atq; ptisana coquuntur.

De legumentis. Cap. 79.

Inter legumina lens vitiosus liquoris est, humoremq; melan-
cholicum gignit, aluum compescit. potissimum bis cocta. Ius
uerò ipsius cū oleo & garo sumptum, uentrē soluit. Admiscerē
autem lenti, quoniam inflat, uel satureia, uel pulegium debet.
Fabæ leues sunt, fluius pariunt, & abstergerendi potestati re-
tinent. Aegyptia uerò faba, nostra humidior censetur, & plus
retrimenti relinquit in corpore. Pisum laxum quidē, sed non
adeo flatuosum. Cicera inflationes pariūt, abstergunt, sement
prolixiū gignunt, libidinē excitāt, lapides comminuūt: frigida
inflandi uim deponunt, sed uix in stomacho cōficiuntur. Lu-
pini quoq; concoctioni resistunt, & ægrē transmittuntur, cri-
dumq; succū procreant. Fænoegræcum calfacit, uentremq;
subducit, ante dapes ceteras sumptum. Bruiliæ & phaseli
macerati, quoad radices promicant, si ante cibū ex garo edunt-
tur, aluum soluunt, & maiores alendi uires quàm fænoegræ-
cum obtinent. Phaseli & dolichi integri cum lobis, uiridesq;
sumpti, excrementicij magis euadunt.

De fructibus horariis, fugacibus ue. Cap. 80.

Curbita refrigerandi & humedandi uim obtinet, uena-
remq; subducit, sed alimentum præstat perexiguum.

Pepon prauis omnino succi, gelidus, udus, ac uomitorius est:
non concoctus, affectum cholicum inducit. Semen eius ciedæ
urina, & frangēdis renum calculis natum, atq; in totū abster-
git abundē. Melo pepon minore efficacia omnia hæc possi-
det. Cucumis minore frigiditate & humiditate quàm pepon
prædita est, sed maiore ui lotiū proritat, difficilis cōcoctus: et si

D 1

conco-

concoquatur, uitiosum tamen corpori succum præbet. Vno uerbo: Omnes fructus temporarij, frigoris et humentis naturæ, imbecillis alimenti, prauiq; succi sunt.

De arborum fructibus. Cap. Si.

Ficus & uuae primas inter fructus autumnales meruerunt, quando succus ipsorum culpa tantum non omni uacat, et alimenti ualentioris sunt. Cæterum ficus honore & bonitate succi, uuas præcellit, & ualentius nutriunt: aluum urinamq; cient, et renes purgant, præcipue exactam cōsecutæ maturitatē. Pari etiam modo caricæ, et si flatu interim sanguinemq; uitiatum pariunt, ideoq; pedunculos assiduis earundē usus conciliat. Uuæ retentæ, non conficiuntur in uentriculo, & crudum succum faciunt: deiectæ uerò, moderationes redduntur. In uuis passis maior calfaciendi uis est: conueniunt etiā magis quam uuæ stomacho, neq; tam exigui alimenti sunt, sed imbecillius aluum deiciunt.

Mora, quæ & sycamina dicuntur, uehementē humedandi, mediocrem refrigerandi facultatē obtinēt: ante alios cibos deuorata, aluum subducunt: neq; admodum stomacho aliena, sed nutrimenti ferè nullius. Ex cerasijs dulciora aluum quidem subducunt, sed stomacho officiunt. Quæ uerò accerbitati participant, stomacho minus obsunt, neq; aluum promouent. Atq; hæc ratio nō tam uis ac moris, quam alijs compluribus congruit. In summa, si adstringēdi ui prædita, in prima mēsa eduntur uel bibuntur, aluum cōprimunt. Quicūq; aluum ob imbecillitatem astrictū nati sunt, hos quod eam lubricet, uerbi gratia, olera, siue pisces, siue eiusdē farina cætera, præmittere: deinde quod conspissandi facultatē habeat, sumere oportet: quæ dum aluo robur adferunt, deorsum impellunt, atq; ad deiectionē excitant.

Nux pini, quæ & strobilus appellatur, probum crassumq; succum continet, edendo quidem, sed difficilis decoctionis est.

Persica praua acidiq; succi sunt, & corrumpuntur ocysimè: proinde in prima mēsa sumantur, quod deiciantur promptius, neque diutius cunctando uitientur in uentriculo. Præcocia porro,

porrò, & doracia, seu Rhodacena, & armenia, potiora sunt persicis, quoniã neq; acescunt, neq; similiter corruptionem sentiunt, & gustu delectant amplius. Ex malis, dulcia quidem maioribus reliquis in calfaciẽdo uiribus pollẽt, facile trãsmittuntur, maximẽ assa, uel elixa. Acida magis refrigerant, et humores in uentriculo diffecant. Austera stomachum roborant, aluũ supprimunt, cãteris tamen magis cotonea. Piorum parietũ modo grandiora atq; matura, eandem quidẽ facultatẽ seruant, sed uberius nutrimentũ sumẽtibus suggerunt.

Mala punica frigoris uirtutis sunt, & paululũ alimenti præbent. Mespila & sorba uehementiores in astringẽdo uires retinent, idcirco lubrica aluo accommodata sunt. Pales mulæ stomacho utiles sunt, nisi præpingues extiterint: uẽtrem cohibere, crassos, glutinososq; humores gignere, & capitis dolorem inducere solent. Oliuarum drupæ stomacho efficiunt, & crassum succum pariunt. Muria condita, & colymbades ante alia edulia comestæ, appetẽtiam cibi reuocant, aluũ difficile leniunt, idq; magis cũ uel aceto, uel oxymelite præparentur. Ex nucibus iuglãs auellanis minus alit, stomachoq; utilior est. Virides nuces humidiores sunt, uentremq; subducũt.

Aridæ in aqua macerata, & ab interiore putamine purgata, recentioribus potẽtia nihil cedunt. Amygdala diffecãdi, extenuãdiq; uirtute prædita sunt: quocirca tum uiscera, tum thoracem, sed efficacius amara, purgãt. Assimilem sanẽ potestãtẽ habent & pistacia, sed hepatis cõstipationes maiore efficacia laxant. Damascena, si in prima mēsa edãtur cũ cruda, tum in mulsæ elixa, uentrẽ molliunt. Syrica concoctũ difficilia sunt, stomacho hostilia, & exigui nutrimenti. Siliquæ agerrimẽ coquuntur, aluũ cohibent, & uitiosum succum possident. Sycomora euidenter refrigerant, & humedant.

Medici mali extrema pars acedine sapit, & concoctioni resistit: instar carnis, & si edẽdo sit, tamẽ a quẽ cõcoctioni resistit. Medulla uerò, siue acida, siue aquea fuerit, abundẽ infri-

gidat. Glandes non inefficaciores frumentaceis in alendo, sed ad coquendum contumaces, & crassioris succi sunt, lenteq; transeunt. Castaneæ per omnia glâdibus præstatiores existunt.

De animalibus, primitusq; de uolucris. Cap. 82.

Aves imbecillius quidem quadrupedibus, potissimè suis, alunt, sed concoctrici facultati præoptius obtèperant, præcipuè perdix, attagena, columbarum pulli, gallinæ, & phasianus. Sed turdi, merule, passeruli, et inter hos pyrgitæ, solidiorem alimoniam præstant; & his etiam magis turtur, palumbus, & anas. Sed multo ad coquendum contumacior, durior, ac fibrosior pauus est. Anserina porro & struthocamelina caro excrementosa magis, omnibus prædictis difficilius cõficitur: exceptis alis, quæ succi bonitate reliquis auib; minimè cedunt. Gruum caro referta fibris, et durior est. In summa, iuniora ueteribus semper humidiore sunt, minus concoctioni resistunt, plus alimenti præbent, & per aluum procliuus descendunt. Elixæ ab asis, & in sartagine fixis pari interstitio dissident. Quæ in arenis atq; montanis regionibus degunt, ijs quæ in uliginosis aluntur, concoctioni minus obluantur, & minus superfluitatum relinquunt.

De ouis. Cap. 83.

Gallinarum & phasianorum oua, primi meriti sunt, sed anserum & struthocamelorum ultimi. Longè autem recentia ueteribus præstant. Tremencia magis nutriunt, sorbilia facilius descendunt, & gutturis asperitates leniunt. Reliqua ad unum omnia cõcoctioni obstinatè repugnant, & lentius permeant, crassiq; omnino succi sunt, demptis ijs quæ præfocata dicuntur, quæ fiunt dum cruda in garo, uino, et oleo irrigata, in uase ad moderatam consistentiam densantur: nam hæc coctæ facilia, succiq; inculpati creduntur. Fricæ autem in sartagine, omnium sunt nocentissima.

De his quæ pedibus fidunt animalibus. Cap. 84.

Pedestrium animalium, suillæ carnes omnium aliorum esculentorum efficacissimas in nutriendo uires obtinet, eo quod cum

cām gustu, tum odoratu peculiarem quandam germanitatem humana carnis amulantur: ueluti à quibusdam qui per imprudentiam, humanam carnem degustauere, animaduersum est. Nutrimentū quod inde contrahitur, glutinosum est, et agrè in corpus dissipatur. Ouilla excrementosa est, perditosq; succos generat. Caprilla, acredo succusq; minimè bonus inest.

Hircina deprauatissima est, siue succum eius malignū, siue concoctionis difficultatem respicias. Bubula atram bilem efficit. Leporina crassum quidem succum habet, uerū in hoc à bouina & ouilla uincitur. Ceruina duri & coctū difficilis alimentū est. In uniuersum, recentiora omnia ueteribus humidiōra, molliora, & coctū faciliōra sunt. Pari modo et castrata, testiculatis: & bene habita, strigosius præferuntur.

De animalium partibus, & eorum quæ pedibus
adant. sanguine. Cap. 85.

EXtimate animalium partes ueruosæ sunt, pinguedine carneq; euacant: quapropter & uiscida sunt, & exigui nutrimenti, & alui ciendæ efficaces: demptis autē (quod impendit siccae sint) partibus. Rostra & aures cartilaginosa, concoctūq; difficilia sunt. Lingua laxa exanguis, & alimenti exigui est. Glandulæ suauis sunt atq; tenuis. Suauiores uerò mamillæ sunt, præsertim fucularum, dum uidelicet lacte infarciuntur, neque imbecillius quàm carnes alimentum præstant. Renes atq; testes uirosi, et ad coquendū pertinaces sunt. Sed gallinæ eorum alulium testiculi suauis sunt, & inculpatum corpori alimentum præstant. Taurorum econtrario, hircorumq; et arietum testes, uix tandem concoquuntur, & improbum succum faciunt. Cerebrū pituitosum, crassi prauiq; succi, lenti transitus, concoctioni renitens, stomacho infestum, & nauseosum est, coctū uerò exadus satis alimenti præbet. Medulla, pinguis, & suauior est cerebro, in cæteris nullo ab eo discrimine dissidet. Sæbum & adeps parum alunt, & uentriculo obsunt. Cor et hepar crassum habent succum, agrè coquuntur.

tur, lentè transmittuntur, sed suillum iccur bonitate reliquis præstat. Lien prauus succi est, & atram bilem generat. Pulmo utrisq; cum laxior, tum coctus facilius, pituitam auget, & minimum alimenti præbet. Ventriculus, locelli, & intestina, dura sunt, & cōcoctioni obducantur, pituitaq; pariunt. Vno uerbo: Feræ sicciore sunt alimonia, quam cicures, neq; tantum retrimenti relinquunt. Sanguis uniuersus coctus difficilis est, maximè uerò crassus, atq; atrebiliarius, cuiusmodi iudicatur bubulus. Leporis autē, utpote suauissimus, primi meriti est, quem multi cum iocinore coquere solent, nonnulli uerò simul cum reliquis quoq; uisceribus. Estur & à quibusdam iuuenis porcelli sanguis. Caprillum quibusdam esculentum fuisse, ab Homero proditum est.

De lacte. Cap. 86.

Lac coctum egregiè quidem alit, sed gingiuas et dentes afficit: proinde simulatq; ingestum fuerit, primum quidem mulsus, deinde uino acerbo os colluendum est. Præterea capitis dolorem infert, præcordiorum & uentriculi, quæ ex flatibus oritur, distentionem conciliat, renum calculos procreat. Liquequidius imbecilliter quidem alit, sed intentius uentrem soluit: crassius contra efficaciores nutriendi uires habet, & gruius uerò per inferiora descendit. Caprinum mediocris essentia est. Ouillū ediuerso crassioris, statimq; post partum tenuius, progressu temporis crassius, deteriusq; euadit.

De lactipotatione. Cap. 87:

Qui lac potaturus est, à reliquis esculentis abstineat, donec in uentriculo conficiatur, & per inferna deiciatur. Satius autē est ipsum recens mulctū circa aurorā ingurgitare: & insuper non à cibus modò, uerum ab exercitationibus uehementibus temperare, eo quòd in laborantibus necessariò acescit. Sed lentè obambulare præstat, et uigiles interim quiescere. Ad istum enim uero modum patranti, statim per aluum decedit, post deiectionem aliud repetendum est: quin si illud quoq; deiciatur, aliud.

aliud. In primis enim non sine utilitate purgat, haud ita sanè multum ex reliquarum corporis partium mole, sed quæ in uentre deprehendit. Post hæc uenas illico subit, et alimentū præbens præstantissimum, non amplius descendit. In biliosis præterea fluxionibus, & ubi colliquamenta corporis ad uentrem confluunt, lac coctum propinabimus. Atqui ad hanc rationem decoquendū est. principio quidem leniter sensimq; ita ut partim exhalet, partim concoquatur: mox incunctatè etiam atq; etiam coquito. Prospiciendum uerò, ne uel uestionē sentiat, uel in cascum coalescat. Optimè id fiet, si clementer lac ipsum coxerimus, & agitando, quod abscefferit, circūquaq; detraxerimus. Ferula autem polita ac tereti agitandum: & si quid in labys ollæ efferbuerit, id sponsia purgandum: inde nanq; non rarè reliquum lactis corrūpitur. Quapropter lac quemadmodum docuimus coquito, quoad crassius, & crudo lacte suauius reddatur. Silicibus porro marinis candentibus lacti immisissis, quicquid in eo tenue est ac serosum, ebibitur, insumiturq;. Idq; uentris fluoribus, potissimè uerò biliosis conducit.

De lacte fissili. Cap. 88.

Silac ad immodicum ignem citra fumum impensius decoquatur, serosum eius à caseaceo discernitur. Mox exactè per colum panniculum ue coletur. Confunditur autè sero mellis, uel aceti mulsi, uel aliorum modicum, & alui subducendæ gratia exhibetur: adultis quidem usq; ad duorum sextariorū mensuram, minoribus uerò non minus sextario. Quod calculis marinis ignitis, aut candenti ferro immisissis, incrassatū lac fuerit, contra dysenteriam & alui profluium redè propinatur.

De caseo. Cap. 89.

Caseus omnis acris & sitificus est, concoctioni renititur, prauum humorem & calculum creat: minus autem officit non uetus, laxus, minimè durus, suauis, & modici salis compos. Qui aliter habet, perniciosissimus est.

D 5

De

OMnes pisces frigidioris humidiorisq; temperamenti esse, perspicuū est: saxatiles uerò appellati, reliquis salubriores habentur, quia cōcoctioni minus aduersantur, & probum succū relinquūt: moderatè humectāt, nisi solidiore carne constent. Non autē saxatiliū, maritimi plurimum discrepāt ab ijs qui in limo degunt, aut ubi flumina irruunt. Sed omnīū insaluberrimi stagnatiles atq; palustres sunt. Speciatim uerò capito, si marinus sit, mediocris suauitatis est, et coctū minus difficilis, succiq; minimè mali, sanguinē uerò tenuiorem atq; imbecilliozem gignit. Eiusdē clāssis lupus est. Mulus quoq; in pelago nutritus, durior, et friabilior cāteris piscibus est, ad coquendum promptus, plurimi nutrimēti, suauis, et pinguedine carēs.

In uniuersum, pisces quibus testaceū operimentū est (ostracoderma à Græcis dictū) salsum crudumq; succū generant. E quorū numero, ostrea molliſſima carne constant, et promptius per aluum decedunt. Chamæ præterea, & purpuræ, ungues, spondyli, buccinæ, cochleæ, & alia quæcūq; id genus durat, & quæ malacostrata uocantur, utpote grāmari, paguri, cancri, locustæ, squillæ, ualentis sunt materiæ, sed concoctioni resistunt, aluumq; cohibent, si subinde in aqua dulci elixentur. Cremor omnium quæ testis integuntur, uentrem promouet, quamobrem terrestris quoq; cochleæ: sed quum dura carne, coctūq; difficili sint, mensis quidem conueniunt, prauī tamen humoris efficaces. Sunt qui iure ipsorum cum oleo garoq; condito, alui deiectionem moliuntur. Echini modicè frigorigici, exiguūq; alimenti sunt, & lotium proritant.

Molles tergores pisces, puta polypi, sepia, lolligines, duri, atq; concoctū difficiles sunt: præ cāteris uerò polypi. Salasī uerò succi momentum habent: sed concoctionem experti, nutrimentum non exiguum corpori præstant.

Planorum pisciū, quos cartilagineos dicunt, torpedinibus, pastinacis, mollis persuavisq; caro est, quamprimū subiecta, coctū facilis mensisq; idonea, & alimentosa. Raia, leuiraia, squatina, atq; huiusmodi alia, duriora sunt, coctioniq; renituntur, et uberius alūt. In summa: Duræ carnis animalia, ægrius concoquuntur, & ualentius nutriunt. Concoctionem uerò ex perta, plenius solidiusq; alimentum suggerunt.

De grandibus, cetaceis ue. Cap. 94.

Ingentes, uerbi gratia, balenæ, phocæ, libellæ, delphines, ihunniq; immanes, durā, coctūq; difficilē, et crassi humoris carnē obtinent. Quum uerò sale condiuntur, ad mediocritatem reducuntur. Ex piscibus humidiores, excrementitūq; magis, ad succidiam accommodatiores sunt. Salsamētorum porrò diuersitas, piscium ē quibus conficiuntur, differentias imitatur.

De uirtutibus uini. Cap. 95.

Voletudinis secundæ studiosum uini potestas fugere non debet. In totū igitur: Omne uinū alit, sed rubrū ac crassum magis: sed deterioris succi est efficax. Suaue uerò, nutrimenti quidē alicuius est, stomacho uerò minus conuenit. Austerū stomacho quidem amicum, sed lenti meatus, neq; tantū nutrimenti præbet. Atq; adhuc etiam minus candidum. Primū omnium bonitatis honorē obtinet, quod colore uermiculū est. Peruetustū plus caloris ariditatisq; insitū habet, quā recens. Sūmatim quidē uini potētia hæc est. Omnino uerò uinū, insitū corporis calorem suscitatur, unde & cruditas corrigitur, et sanguis emendatur, alimentū (quandoquidem proptē penetrat) per uniuersum corpus deducit: cuius ergo ex ægritudine aliqua emaciatis bonā corporis habitudinē restituit, fastidiosis cibi appetētiā reuocat, pituitosum humorem extenuat, bilē per lotiū euacuat, coloris gratiā inducit, animo lætabundā alacritatem iucunditatemq; conciliat, corpus quoq; robustius efficit. Eiusmodi igitur commoditatū autor est uinum, modèrate ingestum. Inurgitatum

gitatum uerò præter modum, incommoda contraria adfert, inde ebrj evertuntur, furiunt, et sopore impetuntur. Vitanda itaq; est immodica uini potatio. Quanquã per longa id temporum interualla liberalius potare, cõmoditatem adferat: nam urinas largius proritat, sudoresq; profundit. Optimũ uerò est protinus aqua mulsa sumpta ipsum uomitu eycere, ne uel paululum noxiæ inferat. Quisquis igitur sese mero prolixius inuitare uoluerit, ab aliorum ciborũ satietate abstineat, atq; inter potandum brassicã coctã, bellariaq; sumat, maximè ex amygdalis confecta. Hæc quippe capitis laborẽ mitigant, neq; ulla uomentes molestia afficiunt. Vincit autẽ absinthij macerati dilutũ ante potationẽ bibere: omnium enim maximè hoc crapulam arcet. Quod si quos uinũ uellicet, gelidã hauriant, postera die absinthij dilutũ repetãt. Deambulationibus præterea, frictionibus item ac balneo, exiguoq; nutritu reficiuntur.

De melle & aqua mulsa. Cap. 96.

MEL coctum ualentius alit, quàm aluum subducit: Crudum econtrariò. Gelidis præterea ac humidis tẽperaturis magis expedit, calidis in bilẽ uertitur. Aqua mulsa, biliosos nihil ferè adiuuat, quoniã in ipsis facile in bilẽ transit. Utile sit igitur, ipsam illiusmodi naturis dilutiorem miscere: nec ijs qui aliquo modo uiscerũ affectibus obnoxij sunt, satis cõuenit. Sed hac ratione mulsa cõficiuntur: Octuplũ aquæ melli miscetur, et quoad nihil amplius spumæ eyciat, decoquitur. Oportet autem spumam è medio, simulatq; exoritur, identidem tollere.

De somno. Cap. 97.

Consequens est, ut posteaquàm de ratione uictus omnia tradidimus, de somno quoq; nonnihil perstringamus, eo quòd hic omnium postremus cætera plerunq; suscipiat. Somnus itaq; (ut nõ citra formulã eloquar) nihil aliud quàm animalium facultatum requies est, à bono humore cerebrum irrigatè proficiscēs. Huic qui rectè indulget, eum plurima comitatur emolumenta. Nam alimenta cõficere, succos digerere, dolorẽ mitigare,

gare, lassationes solari, distenta relaxare, animi & gritudines obliuione abolere, menteq; captos emendare cōsuevit. Tempus autē somni opportunissimū à cibo est. Sed meridiari haud omnibus expedit. Nō enim sufficit ad exactā ciborum concoctionem tempus in quo somnū capiūt. interrupta namq; ante suam horā cōdione, meridie experrecti, sæpius acetosa crudatione infestantur: sæpius itē spiritibus infarciuntur. quin & fluctuationibus tētantur aliqui, nisi uel ex consuetudine. uel quia satis steterint, eiusmodi casus nō eueniāt. Nocturni somni omnium innocētissimi sunt, siquidem nox humiditate et quiete sua somnum inuitans, cōdionem omnibus numeris absoluit. A somno quippe nocturno plerūq; ad alui oneris excretionē urgemur. Esto autē debiti somno temporis limes, absoluta ciborum cōdicio, quæ non tam crudationibus, quàm uentris cōniuentia deprehenditur. Post quam uigilantia perutilis est, quod concoctionis retrimenta ad secessum proritet.

De uigilia. Cap. 98.

Quoniam pacto uigilys, quæ aduersa iam ualetudine correptos, uel præ dolore, uel febris, uel quocunq; alio acutiore casu molestant, succurrendū sit, in uolumine de Febris persequemur. In præsens de ijs modō uigilijs quæ bene habentes infestant, agendū est. Quocirca si quis uel ex mœrore, uel solitudine, seu alio quouis animi affectu somnū subire nequeat, ante omnia quidē mœritia quæ affligit, pro uirili profliganda est: mox suauū sonorū auscultationibus mētis cōsiderationem proscribere expedit, id quod lenibus aquarū susurris quidam machinantur: qui ita permulsi sunt, somnū facile subeūt. Balneis præterea sub uesperam maximè, peracta iam cōcoctione, utūtur, edulys q; humectātibus, puta lactucis. & id genus alijs. Papaueris etiā atri uiridia folia obsonijs nonnunquā adyciūt. Piscibus, qui cōdiantur nihil obfistunt, uel sci: uinū tenue, minimè uetus potare cōgruit. Somnū initari, caput rosacco, aut oleo in quo uel papaueris capita, uel mandragoræ elixa fuerint, perungant.

ungant. Quin & anethinum non antiquum, somnificum est. Scimus porro quibusdam à labore statim facta tranquillitate, somnū obrepisse. Coitus quoq; moderatus hunc ipsum nō raro conciliauit. Nec desunt, qui capite ac pedibus infrigidatis somnum accersunt. Si qui ob alimentorum copiā, uel uitii, st. maacho onerato uigilauerint (id quod usuuenisse comperi) ueluti contrā alij præter consuetudinē inedia usi, aut cibis parcius indulgentes, somnium oculis non cernunt, considerare id, & causam abscindere conuenit.

De ueterno, siue sopore. Cap. 99.

SI contrā, profundi ac ueternosi sopores, quæ cataphoræ à Græcis dicuntur, infestant, lauacra continua, undioniq; frigorifica interdicens sunt, apophlegmatismis utendum: & in totum nutritio cum calidior, tum siccior, tenuis in nutriendo potestatis offerenda. A' gelidior quippe & humidior cerebrum madefaciente materia, eiusmodi affectus plurima ex parte contingit.

Dioclis epistola, de sanitate tuenda. Cap. 100.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

QVandoquidem tibi Antigone, maxima omnium regū eruditio, atq; grandæua iam ætas, omnisq; philosophiæ peritia, & mathematices deniq; studij palma contigit, haud alienam à regia maiestate fore putavi, eā philosophiæ quoq; partem, quæ incolumitatē tuæ docet. Eoq; tuæ maiestati hac epistola uolui, undenam mortalibus ægritudines proficiantur, quibus præcedentibus notis, & quibus remedijs talibus succurrendum sit, describere. Quemadmodū enim cæli tempestatem nunquam nō signa quædā manifesta præcedūt, quibus nauæ ac cæteri multarum rerū periti homines, quid ipsis agendum, quod tutiores sint, colligūt: sic neq; ullus præter naturā affectus unquam hominis naturā nullis præcedētib; præfagijs tētat. Tu itaq; nostris hisce præceptiunculis cōfusus, absolutā earum rerum cognitionem assequeris. Diducimus hominis corpusculum in

lum in partes quatuor, caput, thoracem, uentrem, atq; uesicam. Cum igitur aliquid morbi caput laesurū est, hæc portēta solēt magna ex parte præcedere, uertigo, dolor capitis, superciliorum grauitas, murmur aurium, stimulatio temporum, oculi matutino lachrymant et caligant, odoratus hebetatur, dentiū gingiue attolluntur. Cū ergo eiusmodi quiddā præsenferis, caput cōfestim euacuandū ducito, nullis sanè medicamentorū præsidys, uerū sumptis hyssopi aut orygni capitibus tritis, et in aulula ebullitis, cū passo uel defruti hemina dimidiata, quibus os ieiunus abluito, atq; quoad pituita deducitur, gargarizato. Hoc quippe affectionū capitis facillimum est præsidium. Saluberrimum quoq; fuerit, sinapi aqua mulsa calida maceratū in ieiuno sorbere, et gargarizando à capite humorem deducere. Oportet autē caput antea tegumēto calfacere, quod liquefacta pituita sine impedimēto effluxioni obtēperet. Quū hæc floccipenduntur indicia, eiusmodi ferē morbi succedere consueuerunt, ophthalmiæ, glaucomata, aurium eruptiones, strumæ in ceruice, cerebri tabes, grauedo, angina, nocturna, teredines, uua, profluuium capillorū, ulceratio capitis, dentiū cruciatus. Cum autē mali quid thorax passurus est, his signis portenditur: sudor toto corpore manat et thorace, lingua crassescit, sputum falsum eijciunt, uel amarū, uel biliosum, in lateribus ac scapulis dolores citra occasionē oriūtur, oscedines crebræ, uigiliæ, suffocationes, sitis ex somno, animus tristior, algores perioris, brachiorū et manūū tremor, infestant. Quibus non imprudēter ad hunc modū succurritur: Vomitus à cæna nō crapulosa quā probè fieri potest ciere cōuenit, absq; medicamento. Prosumt etiā ieiuni uomitus, quos aliqui syrmaismos nuncupant. Cui igitur sic placet uomere, radículas tenues, nasturtiū, erucam, sinapi, portulacā deuoret, deinde aqua tepida hausta, euomat. Qui dicta præsagia spreuerint, has affectiones metuant: pleuritim, pulmonariā, melancholiā, febres acutas, phrenitim, ueternū, et cū singultu febrem ardentē. Siquis uentrem

morbus

morbus occupaturus est, his signis præfagiri potest. uenter prius
 mitus conuoluitur, & in sese ipso turbatur, esculenta cum po-
 culentis amaritudine præferunt, genuum grauitas, lumborum
 rigor inflexilis, uniuersæ molis corporeæ lassitudo, sine occa-
 sione, crurum stupor, febricula exiles, afficiunt. Vbi hæc notæ
 apparuerint, uenter nullo medicamento, sed uicinis ratione molli-
 ficandus est. Tutius est enim ijs uti, quibus delinqui facile non po-
 test: è quorū numero sunt, beta aqua mulsa decocta, allia elixa,
 malua, rumex, mercurialis, et ex melle dulciaria. Cūcta enim
 hæc aluum deiciunt. Quod si præfagiorū aliquod intendatur,
 cnicī liquorē omnibus decoctis cōfundito: suauior namq; et tus-
 tior est. Vtilis iū fuerit leuis brassica in copiosiore aqua elixa,
 eiusq; succus quatuor heminarū mensura cum melle ac sale po-
 tui datus. Ciceris aut erui decocti aqua in ieiunio epota, eūdem
 effectū obtinet. Hæc signa paruipendentibus, huiusmodi affe-
 ctiones superuenire solent: uentris fluor, tormina intestinorum
 & leuitas, uoluulus, coxendix, febris tertiana, podagra, apo-
 plexia, hæmorrhoides, cruciatus articularis. Quando autem
 uesciæ malum imminet, his notis deprehenditur. post exiguum
 etiā cibum pleni uidetur, inflationes, crūditationes, uniuersi
 corporis pallor, somni graues, lotia lurida, & ægerrimè ema-
 nantia, & circa pudendi tumores affligunt. Quum hæc appa-
 ruerint, odoratis lotia impellētib; opē ferre sine periculo con-
 uenit. Sunt uerò fœniculi apijq; radices in uino albo odorato
 macerandæ, unde ieiunus in matutino quotidie duos sumat cya-
 thos cū aqua dauci, smyrniz, enula cāpanæ, quodcunq; horum
 ad manum sit, iuxta enim singula iuuant: cicerum quoq; mace-
 ratorū aquā si cum uino potauerit, idē consequetur. Qui uerò
 dictas notas negligenter præterierit, hos morbos expectet: hy-
 dropem, lienis magnitudinē, hepatis dolorem, calculū, renum
 affectionem, lotij stillicidium, distentionē uentris. Cæterū in
 omnibus his quæ hæcenus proposuimus signis, infantibus qui-
 dem clementiores, grādiōrib; uerò natu acriores medelas ex-
 bibebimus.

hibebimus. Anni porrò solstitia, in quibus omnia eiusmodi incidere consueverunt, & quibus in unoquoque alimētis sit Tuae Maieſtati uel utendum uel abſtinendum, perſtringemus, à solſtitio brumali exorſi.

Solſtitium brumale.

Solſtitij brumalis tēpore augetur in hominib. catarrhus, & humiditates, uſq; ad uernum æquidiale. Calidiora itaq; eſſe, meracius prolixiusq; atq; ab origano bibere, ueneriq; indulgere cōuenit. Sunt aut uſq; ad æquidiale dies nonaginta.

Æquinoctium uernum.

Ab æquinoctio uerno uſq; ad uergiliarum exortum, pituita & dulcis ſanies ſanguinis mortalibus, creſcunt: idcirco quàm maximè ſuccoſis acribusq; utendum eſt, corpus exercitandum, concubitus indulgendum. Numerantur uerò uſq; ad uergiliarum ortum, dies ſex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

Hoc tempore creſcit in hominibus bilis fulua, et amara ſanies, ad ſolſtitium uſq; æſtiuale. Tum ſuauiſſima, alium cientiā ingerere, & ueneri minimū indulgere conuenit. Numerantur autem ad ſolſtitium uſq; æſtiuum dies quinque & quadraginta.

Solſtitium æſtiuale.

Solſtitij æſtiui tempus, atram bilem in hominibus, uſq; ad æquinoctium autumnale procreat. Utendum itaq; gelidis uindis, odoratisq; omnibus: uenus uel omnino uitanda, uel innocentius ſaltem quæ de ipſa tradita ſunt, admittenda. Sunt autem ad autumnale æquinoctium dies tres & nonaginta.

Æquinoctium autumnale.

Hoc anni tempore pituita, & tenues fluxiones in hominibus abundāt, ad uergiliarum uſq; occaſum. Oportet ergo humores ex alto deducere, ſeu fluxiones cohibere, & acerrima quaq; ſuccoſiſſimaq; eſitare, quàm minimum uomere, exercitare, & concubitus fugitare. Numerantur autem ad uergiliarum occaſum dies triginta ſex.

Vergiliarum occaſus.

Sub uergiliarum occaſu in hominibus humor pituitoſus ad
B ſola

solstitium usq; hyemale augetur. Sumenda sunt igitur quæq;
acerbissima, uina dulcissima; utendum pinguibus & exerci-
tio. Sunt uerò ad brumam usq; dies quadraginta quinque.

LIBRI PRIMI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI SECUNDI.

Nhæc uolumine totius operis secundo, de Febribus potissimè
I agitur. Primò quidem de iis, quæ ad notas, uniuersamq; ipsa-
rum curandi rationem animaduertenda incidunt: deinde su-
per uniuscuiusq; febris specie: origine atq; curatione: tertio de
iis quæ febrem comitantur symptomatis.

CAPITA SECUNDI LIBRI.

Præfatio libri de febrib. Cap. 1	2	redine humorum accensas a-	2
Quoniam & quæ principalia in	3	gnoscamus.	17
morbis præcipue febrib. di-	4	Curatio febrium, quæ in humo-	18
scutienda sint.	5	rem putredine accenduntur.	18
Quid nam morbi principium di-	6	Tertianæ indicia.	19
cendum sit, ex monumentis Ga-	7	Quo pacto tertianæ mededum	20
leni.	8	lit.	20
Vnde, tutus ne sit, an periculo-	9	Tertianæ nothæ curatio.	21
sus morbus, cognoscatur.	10	Quartanæ indicia.	22
Quibus notis acutum & danti-	11	De quartanarum febrium cura	23
nū morbum deprehendamus.	12	ratione.	23
Quemadmodū præfieri possit,	13	Quotidianam febrem quib. in-	24
quo pacto morbus soluendus	14	di. iis deprehendere possit.	24
sit.	15	Curatio febris quotidianæ.	25
De diebus decretoriis.	16	De febre Epiala.	26
Decretoria signa si in principis	17	De continuis febribus.	27
morbis appareant, mala esse	18	Qui continuæ febres deprehen-	28
Quemadmodum futura crisis	19	dantur, quibusq; præfidiis cu-	28
prænosceda sit.	20	rentur.	28
Instans morborū iudiciū quæd-	21	Æstuantium febrium cognitio	29
modum sit agnoscendum.	22	Æstuantium febrium curatio.	30
Qui ratione optime iam pera-	23	Febrium ab Erysipelate notifi-	31
ctam crisin agnoscamus.	24	catio atq; medela.	31
De pulsibus, ex Galeno.	25	Quemadmodum hæc febres	32
De alui excrementis.	26	deprehendantur.	32
De urinarum significatione.	27	Hæticarum febrium medela.	33
Quid circa sputum consideran-	28	De semitertianis febribus.	34
dum.	29	De publice grassantib. morbis	35
Diariarum febrium agnitio at-	30	De peste, ex monumentis Ru-	36
que medela.	31	phi.	36
Quemadmodum febres ex pu-	32	De	36

LIBER SECVNDVS.

De his qui plenitudine crudo-	De sternutamento.	67
rum humorū mentis deliquio	De ciborum auersione.	49
tentantur.	37 De bulimo, quod est fame pre-	50
De his qui pretenibus humo-	grandi	52
ribus defatigati concidunt.	38 De canina appetentia.	52
De aliis occationib. in quibus	De siti.	53
contingunt syncopæ.	39 De lingua salebrosa.	54
De dolore.	40 De nausea.	55
De liquefactione.	41 De uomitione biliosa	56
De uigiliis febricitantium.	42 De singultibus	57
Curatio cataphoræ.	43 De aluo dura ac lubrica in fe-	58
Medela doloris capitis in febr-	bribus.	58
bus.	44 De stillicidio sanguinis, & eru-	59
De curatione stomachi.	45 ptione eiusdem ex narib.	60
De immoderatis febrium frigo	De animi defectione.	60
ribus rigoribusq̃.	46 Medela exulcerationis que os	61
De sudoribus.	47 sacrum infestat.	61
De tussi q̃ febricātes infestat	48	

FINIS

PAVLI AEGINETAE


LIBER SECVNDVS, DE FEB-

bribus ex Galeni, cæterorumq̃ complurium

monumentis depromptus. Albano

Torino interprete.

Præfatio libri de febribus. Cap. I.



ostquam tuendæ sanitatis disciplinā per-
strinximus, quemadmodum malè iam ha-
bentibus succurrendum sit persequemur:
sumpto à similarib. ueluti simplicioribus
morbis auspicio. Cuius generis potissimè
habentur, qui cognomento Febriles appellantur. Rursus igē
tur et nos cōpēdiaria scribēdi ratiōe utentes, Oribasij Epito-
mæ ex Galeni præsertim, et cæterorū insuper plurimorū li-
cubrationib. decerptæ, paucula q̃dā illi præterita addemus.

Quotnam & quæ capita in febrilibus præcipue morbis
discutienda sint. Cap. 2.

Nte omnia quidē indagare conuenit, salutaris ne, an exi-
A tialis ægritudo existat. Deinde si salutaris, num acuta, an
B a diuturna.

diuturna. Hæc quippe in alijs quoq; morbis uehementibus inuestiganda sunt. Tertio, unânè uice decernat, quod febribus peculiare est, an particulatim soluatur.

Quale morbi principium dicendum sit, ex Galeno: Cap. 3:

Neq; sanè capitis dolores, & febres idem sunt: sicut neq; uigilia, à cibisq; appetitus auersio, & uniuersi corporis grauitas, aut lassitudinis sensus. Sed unumquodq; horum à febre diuersum quippiam existens, eandem tamen præfagit. Febris dum quempiam inuadit, præsertim acuta, neq; nos latere, neq; quenquam uel imperitum potest. Bsto autem, si uidetur, quod lateat: mirabor utiq; si diutius hora laborantem latuerit. Proinde illud tempus principium morbi appellamus, cum iam manifestò febrile orsi, decubuerint.

Vnde, spem ne, an pericula morbus ostendat, cognoscendum. Cap. 4.

Igna quidè lethalia dicuntur, uultus cadauerosus, nasus acutus, oculi concaui, & alia ab Hippocrate commemorata: nisi uigilijs hæc, aut uehementi uentris solutioni, aut inedia deniq; succedant. Lucis præterea fuga, lachrymæ partim citra aliquam occasionem externam, partim oculis nulla peculiari affectione correptis, fusæ. Ad hæc, si alter ex oculis minor appareat: quæq; in ijs alba esse oportebat, rufescunt, pallescent, & nigricant: sordes concretæ angulis inharēt, & per somnos oculorum alba cernuntur, palpebris extrinsecus non commixtis, nisi uehemens alui fluxio præcesserit, uel id quis facere consueuerit. Dentibus stridere, mentis inopem esse, flocos stragulis auellere, & festucas paleasq; excerpere, perniciem denunciant. Attendendus item est decubitus. Nam supinum & tanquam resolutum cubare, perq; cubile deorsum ad pedes delabi, summæ imbecillitatis est indicium. Adhuc uerò magis exitiosum, gelidus cum ex naribus, tum ex ore elisus spiritus. Pulsus obscurus, densus, & intercisus, sudor item animi deliquium inducens, periculosi sunt. Quocirca si uel uniuersa quæ recensuimus indicia, uel ex his pluriâ cōpareant, sine

sive pauciora quidē, sed peiora, nulla salutarī nota comitante, mortem præsentiſſimā portendunt. E diuerso expedita spiratio, pulsus inculpatus, mente constare, & bene se ad illa quæ offeruntur habere, uultus inde & cubatio bene habenti um nequiquā dissimiles, nullā perniciē, sed salubritatē præsagiunt. Vno uerbo: Quæ à naturali habitu maxime sunt aliena, pernicioſa: quæ uerò amica, salubria sunt. Porro q̄ à lotio, oletulo, spūtoq; sumantur præsagia, paulo post exequemur.

Quibus notis diutinum morbum deprehendamus. Cap. 5.

Diuturnitas ægriitudinis quatuor notis deprehenditur: motu morbi, languentis habitu, pulsu, & febriū specie. Ex motu quidem morbi ad hunc modū: Si quatuor particularis accessionis tempora, ocys minimoq; temporis momento inuaserint, morbus acutior erit, cuius extremus terminus est septimana: magna uerò ex parte die quarto soluitur. Quod si longius quidem procrastinetur, neq; tamen duodecim horarum spaciū excedat, acutum esse morbum indicat, qui intra diem decimumquartum plerunq; decernit. At si pluribus horis prorogatur, ita ut principium duntaxat & incrementum longiore diei ac noctis tempore absoluat, eiusmodi morbus diutinus adpellatur. Sin exacerbationē morbus particularē nullā obtinuerit, uerū ab initio ad finē usq; tāquam una ac perpetua exacerbatio infestat, ceu in continuis, et hoc quodammodo indicium dicitur esse acuti. Ex habitu uerò ægri hoc pacto deprehenditur: siquidem uultus confestim, aut reliquum etiam corpus uniuersum collabatur, acutum morbum præsagit. Si omnino nihil macrescit, diutinū. Materię enim longo tempore concoquendę, copiam significat. Ab arteriarū motu hoc pacto cognosces: Pulsus magnus, uehemēs, uelox, densusq; acutum morbum indicat: cōtrariū uerò, longum. Ex febriū deniq; specie, quatenus calidę & urentes, morbum acutum testantur: mitiores uerò, quasiq; languidiores, diuturnum.

Quo pacto præsciri possit, an decretorium siue solutionem morbus habiturus sit. Cap. 6.

ID quoque ex his quæ mox enumerauimus, constat, è febris-
um uidelicet specie & tempore: proprius tamen omnino à
febris specie. Calidæ namque et perueriæ febres breues sunt,
& per excreta libenter decernunt. Clementiores uerò mitio-
resque, diutinae sunt, et magna ex parte in abscessus finiuntur.
Ita liquet ex his quæ dicta sunt, non modò quando, sed quo eti-
am pacto morbus soluetur. Vt enim in acutis per excretiones
decretorium magis perficitur, ita in diuturnis per abscessus.

De diebus decretoriis. Cap. 7.

EX diebus decretorijs quidam sanè crebrò, cum fide, salu-
briter, exactè, euidenter, & insignitè admodum soluant.
Quidam ratione his admodum diuersa. Tertiusdecimus medi-
um inter utriusque dierum genus, ordinem seruat. Sunt uerò ex
ipsis, qui simul atque exiguum modò naturæ impetum adepti
sunt, decernunt, uerbi gratia, septimus & decimus quartus.
Plerique tamen in uehementioribus naturæ motibus morbos sol-
uere nati, aliter decernere nequeunt. Cæterum neque qui probi
sunt, omnes iuxta probi sunt: neque omnes qui prauis, omnes
pari ratione prauis: uerum neque certa cum serie bonitatis pra-
uitatemque obtinent. Qui primæ sortis, hoc est, ex bonorum
sunt catalogo, isto pacto se habent. Primum ac præcipuum
bonitatis locum possident, septimus & quartusdecimus. Se-
cundum, nonus, undecimus, & uigessimus. Proximi his boni-
tate sunt, septimusdecimus, atque etiam quintus. Sequitur hos
quartus, hunc uerò tertius & duodeuigessimus. His contrarij,
secundæ sortis sunt. Nocentissimus omnium, qui cum discrimi-
ne & obscure morbos iudicat, tanquam ex diametro septi-
mo oppositus sextus est. Eiusdem notæ sunt octauus, deci-
musque. Post quos deinde sunt duodecimus, sextusdecimus, &
undeuigessimus. Tertiusdecimus mediam inter hos ordines ra-
tionem obtinet, neque perinde repudiandus, ut hi qui secundi
sunt ordinis: neque utique sic morbos soluere potest, sicut ij qui
prio

primæ clāssis esse censentur. Et hunc quidem dignationis indicatoriorum ordinem Galenus usurpauit. Secundū numerorum seriem boni iudicantur, tertius, quartus, quintus, septimus, undecimus, quartusdecimus, decimus octauus, & uigessimus. Mali uerò, sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, & unde uigessimus. Mediā sibi inter bonos prauosque sortem decimus tertius uindicat. Indicatoriorū porro alij aliorum indices sunt, quos contemplatorios nuncupauit Hippocrates, eo quòd, quæ sequenti decretorio die futura sunt iudicia, præ sagire ac contemplari in ijs possumus: quemadmodum quartus, futurum in septenario decretum de morbo prædicat, puta sudores quospiam aut madores, uel particulares huiusmodi inanitiones nonnullas excitans, uel significationes insolentes, uel cōcoctionis denique indicia, portendens. Verum Galenus sexti etiam (quāquam mali) quartum indicem esse asserit. Undecimus quartumdecimum præ se fert, & decimus septimus uigessimus. Et ad quartumdecimum usque, effuscissima redduntur super morbis decretoria. Proxima his sunt, quæ usque ad uigessimum sequuntur iudicia. Quæ post uigessimum usque ad quadragesimum, pedetentim uehementiam remittunt. Primum tamē honoris locum uigessimus septimus, trigessimus quartus, & quadragesimus obtinent. Post hos succedunt uigessimus quartus, trigessimus primus, & trigessimus septimus. Qui inter hos à uigesimo ad quadragesimum usque indicatoriorū dierū numerus habetur, totus iudicij expers est: quemadmodum à quadragesimo ad unum omnes planè sunt languidi, concoctura magis & abscessibus, quàm iudicationibus morbos soluentes. Quare alios omnes, qui post diem quadragesimum succedunt, Hippocrates negligere uidetur. Sexagesimum tamen & octogesimum, centesimumque respicit. Post hos alios quidem morbos septem mensibus, alios septem annis iudicari asserit: alios, ut uerisimile est, binis & ternis annorum septenarijs.

Quod decretoriae notae, si in morborum initiis compareant, uisiosae sint. Cap. 8.

Ignis concoctionis nunquam in auspiciis cernuntur: quod omnis concoctio natura uisrice perficiatur, eoque nunquam non salutaris habetur. Sed decretoriae notae aliquando sinistre compareant, quoniam iudicium ambigit, nunc quidem bonum, nunc ediuerso malum succedens, ceu mihi iam ante de iudicatorijs diebus ostensum est. Quapropter neque in morborum principijs, neque incrementi tempore dextrè conspiciuntur, sed in declinationis tempore, quum uidelicet natura ualentior morbum superat.

Quemadmodum futurum iudicium praenoscendum sit. Cap. 9.

Si morborum exacerbationes intenduntur, et sese anticipent, multoque uehementiores reddantur, ac per tertium quenque diem significationem sui exhibeant, indicia praeterea concoctionis in lotio, oletulis, et sputo appareant, omnium ocysimè morbus decernet. At si exacerbationes cunctanter moueantur, eodemque tempore aggrediuntur, singulisque diebus infestent, post longius temporis spacium de morbo iudicium expectabis. Qui porro cum concussione commotioneque corporis, quod Graeci rhigos uocant, maximè febriunt, fieri nequit ut prius his morbus finiatur, quam rigor mitigetur. Nam hic si nihil remittat, fieri non potest ut iam ad uigorem morbus, nedum ad inclinationem peruenerit.

Imminens morborum crisis qua ratione agnoscenda sit. Cap. 10.

Rarus omnino atque molesta nox, omne decretorium, quod interdum aduenit, semper praecedit: quod uero noctu agitur, dies antecedit iniqua. Supueniunt uero casus: capitis dolor, qui nunquam antea fuit, ceruicis dolor, praecordia ad superna trahuntur. Spirandi difficultas derepente oboritur: necnon et alia quaedam molesta symptomata, quae aegrum prius nunquam affligerunt, apparerent. Quin si ijs incidentibus pulsus non concidant, sed altius attollantur, et uehementiores reddantur, symbolumque decretorius dies supersus exhibens, maximè ex bene iudicantium

LIBER SECVNDVS.

73

cantium numero existit, non futuram modò iudicationē, ue-
rū salubrē etiam sperato. Percussus aut in his minimē fue-
ris, neq; si desipere hominē, aut exilire cōspexeris. Nam hæc
superiora humores petere indicāt: ueluti cōtrariō alia signa
sunt, quæ succos inferiora subire portēdunt: suminis scilicet
morsio, circa umbilicū torsio, lumborū dolor, et uētris mur-
muratio: sæpius alia quoq; his cognata indicia apparent. Ad
hæc si ægrotūs per hæmorrhoidas euacuari cōsuevit, eiūq;
uacuationis periodus incidit. Pari modo in mēstruis purga-
tionibus, si mulier est quæ lāgueat, nihil absurdū, per illius-
modi uacuationē morbi crisi cōtingere. Porro sudores non
ex corporis modò, qui antecesserūt madorib. ut par est, præ-
sertim in die contemplatorio, sed etiā meatuū laxatione præ-
scire cōuenit. Decretoria uerò quæ supernis euacuationibus
perficiuntur, ex ijs potissimum deprehendes. Contemplan-
dus quippe præter hæc, quæ mox retulimus, laborātis etiam
uultus: Et si quam eius partem palpitare, uel uenas tempo-
rum percutere, genas, nasum, oculumq; solito magis rubesce-
re cōspexeris, per superna potius uacuationem expectabis.
Quod si præter uoluntatem illachrymant, uel splendores se
intueri imaginantur, manuq; ad nares ceu scilicet gratia
tulerint, tū haud amplius morari, sed iam manantē sanguinē
cernes. Semel enim atq; iterū uel leniter fricantibus, prorum-
pit. Rosio oris uentriculi, inferiorisq; labij tremor, iudicium
per uomitum fore multotiens insinuant. Sed de his hæcenus.
Accedunt etiam quæ spem nostrā confirment, ægrotantis æ-
tas, natura, et insuper anni tempus, et præsens aëris consti-
tutio. Vbi enim adolescens fuerit ægrotās, aut aliās naturæ
calidæ, aut sanguineus, tū maior habenda spes est. Si iam an-
tea eidem siue benè siue malè habenti, sanguinis uacuatō fa-
cta est, ceu suprā retulimus, hoc uel solum ad profundē san-
guinis spem exhibēdam, abundē est. Si uerò anni tempus æ-
stas sit, uel si æstas quidem non sit, sed aliās præsentis status

E 5

aëris

aëris calidus, et sæpe illo tempore sanguinis fluore iudicati sunt, refertūq; sanguine corpus, et solēniū excretionū retēsiō sit, hæc quoq; maiorē ubi spē exhibuerint. Pariformiter in reliquis quoq; euacuationib. ratiocinandū est. Quod si horū nihil conspiciatur, sed æger in aliquo iudicatoriorum, qui a uigesimo maximē sūx, dierum, discruciat, ac morbo in summo iam incremento existente, dolores in aliquo articulo-
 lorum, aut circa aures, aut in alyis quoq; partibus hæcant, uel nulli quidem dolores, sed sudores particulares in mēbris aliquot iugiter exudāt, per abscessus iudicium fore sperabis. Qui ea corporis præcipuē particula prorumpet, quam sudores, dolores tumoresq; exercuerunt.

Quemadmodum optimam iudicationem peractam agnoscamus. Cap. II.

Si expediens a cōcoctione euacuatio peracta est, et febris iudiciū expertus liberatur, ab alyisq; accidētib. uindicatur, et maior colori pro uacuationis ratione gratia accessit, uegetiorq; pulsus, ac sese erigēdo robustior est redditus, quodq; in primis periculo uacat, facilis hæc mali toleratio comitatur, saluberrimū hoc sanē decretoriū habetur. Verū si quo horū deficiat, tātū aberit ab optimo, quātū præ pollet id quo deficit.

De pulsibus, ex Galeni commentariis. Cap. 12.

Pulsus est cordis et arteriarū motus, qui insurgēdo cōciden-
 doq; cōfiscitur. Vsus ipsius duplex est. Bleuatione etenim (Græcis diastole uocatur) quasi ex pāsiōne quadā extēsiōe q; arteriæ, gelidus aër ingreditur, qui robur uitale, n̄de spiritus quoq; animalis gignitur, excitat et recreat. Cōtractione autē (systolē Græci nuncupāt) qua arteriæ extremis ad medium sui subsidentib. et cōnientib. fuliginosarū superfluitatū excretio fit. Sunt autem arteriæ oblōga quā dā uascula, uenarum modo cōcaua; uerū propter memoratā motionem, et quoniā sanguinem cum spiritu cōtinent, duabus tunicis munita. Quæ è corde quā dē originem trahūt, sed per singulos corporis artus mēbratim diffunduntur ac propagātur. Omnes itaq;

itaq; arteriæ pari percutiendi ratione, sibi inuicē et cordi re-
 spondent. Quare ex unaquaq; ipsarū, cæterarū etiā omnium
 modus colligi, non tamē uniuer sarū æqualiter motus percipi
 potest, sed prōptius quidē in partibus corporis carne exorti-
 bus, obscurius uerò in carnosīs partibus. Nullas quippe decen-
 tius, aut usu cōmodius, quā quæ brachialia perreptāt arte-
 riis attigeris. Est igitur primū pulsū genus, quod motus tē-
 pore tā in extēsiōe, quā remissiōe arteriarū perpēditur.
 Differētiæ ipsius sūt, citus, lētus, et mediocris. Quicquid enim
 motui accōmodatum est, aut præcipitāter, aut cūctāter, aut
 maturē pro tēporis ratione mouetur. Citus autē est, qui breui
 tēporis curriculo, motu plurimū emittitur spaciū. Lentus autē,
 qui lōgo admodū tempore, modicū absoluit interuallū. Me-
 diocris uerò, qui mediū quendam motū inter utrunq; cōficit.
 Alterum uerò pulsū genus in quāuitate extēsiōis cōsistit.
 Quum enim quoduis corpus tribus dimensionib. constet, lon-
 gitudine, latitudine, et profunditate, arteria autē sit corpus,
 necessum est, ut eadē quoq; tria sortiatur interualla. Verūm
 in animante secundum naturā se habēte, mediocriter ipsam
 undiq; eleuatā reperiēs. In eo autem quod præter naturam
 affectum est, interdū quidem in aliquo horum interuallo defi-
 cit, interdū uerò excedit. Vbi recordari congruit, cuiusmodi
 naturalis arteriarū fuerit pulsus. Nā si latitudine excellere
 deprehēdatur, ab eadē distātia Lati nomen adipiscitur: si lon-
 gitudine, Lōgi: si altitudine, Alti nomine gaudet. Liquet autē,
 quod illis cōtrarij et naturalib. exiliores percussus, compari-
 modo, alius angustus, alius breuis, alius humilis deniq; appel-
 landus est. qui uerò in singulis dimensionib. ex æquo à natu-
 rali cōstitutiōe in cōtrariū permutātur, ex ijs alius ita dimi-
 nutus, paruus, alius uerò aduētus magnus nūcupatur. Terti-
 um uerò pulsuum genus ad robur uirtutis exigitur. Differen-
 tiæ ipsius tres sunt, uehemēs, debilis et mediocris. Vehemens
 est, qui uiolenta percussione ferit tactum medici. Debilis, qui
 inuali-

inualidum atque imbecillū percussū efficit. Mediocris, qui mediā quandam proportionē seruat ad utrūq; quem quidam naturalē esse autumaue. Nam ira et exercitationib. pulsū qui naturæ modum excedit, uehementiorem fieri produnt. Quibus Galenus utiq; occurrit, pulsū inquiēs, qui ex causis non naturalib. uehementior euadit, non firmum, sed promptē mutari. Quisquis igitur uehementior pulsus haud incunctanter transmutatur, is naturalis et moderatus estimandus est. Quartū pulsū genus à statu instrumenti, arteriæ inquit corpore sumitur. Sunt uerò et huius generis differētiæ tres. Aut enim durius, quàm natura ferat, instrumentū est, et durus appellatur pulsus; aut mollius, et ob id mollis dicitur; aut proportionē ex æquo habens ad utrūq;, et inde moderatus nuncupatur. Quintum genus pulsū à quantitate infusionis humoris arteriæ cōstituitur. Et hoc quoq; tribus differētijs dirimitur. nam alius plenus est, alius uacuus, alius moderatus. Quandoquidē totū uasculū aut plenum est, aut uacū, aut humore mediocriter refertum. Plenus itaq; pulsus est (quemadmodum definit Archigenes) qui pleniorē præ se fert arteriā, et submissionē succo impedit. Vacuus autē, qui bullæ instar arteriæ eleuationē efficit, ut impressione digitorum uacuitas quædā loci subsidat. Hæc igitur quinque pulsuum genera uno arteriæ motu cōstituuntur. Quoniam autē caloris qui in corde cōtinetur qualitas, uidetur quodāmodo euidentius ex arteria apparere, cōsuerunt hoc sextū etiā pulsuum genus inter prædictorū seriō cōnumerandum. Reliquorū uerò generum, quæ tū uno, tum pluribus percussib. cōstant, aliud sanè tēpore quietis, aliud numero, aliud æqualitate et inæqualitate, quodam etiā ordine et ordinatione constituitur. Quod igitur secundū tēpus quietis septimū à primo est, partitur in densum, rarū et mediocrē. Nam quā arteria gemino agitetur motu, ex contrarijs motionibus cōposito, necesse est duplicem contingere quietem: alteram quidem post eleuationem ante compressionē

pressioe

pressionē, alteram uerò post compressionē ante eleuationem, quā pleriq; sensu percipi nō posse autumauerūt, ut inter duos motus quies aliqua intercipiatur. Cui itaq; longm quietis est tempus, hic appellatur rarus: cui breue, densus seu creber: cui mediocre, moderatus. Octauū genus pulsum ad rhythmum spectat. Est uerò rhythmus in summa quidē, habitus, siue tēporis ad tēpus proportio. Ceterū in pulsu, secundū quosdam, temporis motus, ad tēpus quietis, puta distentionis, et cōra-
 ctionis ad aliquā quietē intercedentē. Iuxta alios uerò, tēporis motus ad motionem, ueluti distentionis ad cōpressionē, siue quietis ad quietem, utpote interioris ad exteriorē, proportio. Differentie aut rhythmi principes sunt duæ. Eurhythmus, et Arhythmus, quasi pulsus boni rhythmi et nullius rhythmi dicas. Arhythmō, non sanē nullū rhythmū habentē, hoc quippe fieri nequit, sed inconcinuū rhythmū, ceu aphonō et atra-
 chelon, id est mutū et truncum, dicimus, hunc qui uitiatā cer-
 uicem, illū qui uocē sortitus est obscurā. Iam uerò arhythmus trifariam dirimitur. pararhythmus enim alius est, qui medio-
 crē boni rhythmi peruersionē habet. alius heterorhythmus, qui lōgus à bono præuaricatur. tertius uerò ecrhythmus, qui omnē concinnitatē rhythmi corrūpit. Veluti cum passionem indicas. Peculiaris quippe puerili ætati pulsus iuxta rhyth-
 mū eurhythmus nuncupatur. Vigenti aut ætati, heterorhyth-
 mus. Qui uerò huius penitus nihil seruat, ecrhythmus appel-
 labitur. Nonū genus pulsuū est, quod in omnibus generib. su-
 pradiis deprehēditur, iuxta æqualitatem et inæqualitatem
 prognatū, quod uel in uno dūtaxat pulsu, uel in plurib. contē-
 platur: quod etiā systematicū nuncupāt. Quo de in primis, uo-
 luti de lucidiore, differēdiū est. Aequalis pulsus est, qui ordine
 par est, siue magnitudine, siue robore, aut celeritate, aut reli-
 quorū aliquo, siue etiā omnib. Inæqualis, qui seriæ impar est.
 nā si deinceps uniuersi magnitudine qualicūq; pares incide-
 rint, æqualis huiusmodi pulsus appellabitur. Quod si pri-
 mus et

mus et secundus atq; tertius pares uidebuntur, quartus uerè impar, is nimirū inæqualis secundū magnitudinē pulsus nomen habet. Cuius generis sunt, deficientes et intercidēs. Haud enim in uno solum, aut plurib. etiam magnis unus minor apparet, sed nonnunquā penitus omnis motus aboletur, et uocatur pulsus deficientes: quemadmodum aliter cōtrarius huic intercidēs, cū in medio expectatæ quietis percussio quædam ueluti superflua incidit. Sin autē secūda paulo minor quā prima facta sit percussio, tertia uerò exilior secūda, quarta, tertia æqualitate, et sic deinceps usq; ad quamplurimas, huiusmodi pulsus myuri zōtas et myuros appellāt, de figurarum ratione, quæ in mucronē definiūt, appellationē mutuātes. Ex his uerò qui perpetim diminuūtur, neq; unquā ab eiusmodi defecōe cessant, in absolutā deniq; immobilitatē finiūt, hos uulgò deficientes nuncupamus, myuros. Quotquot uerò cessāt, duplex habēt interstitiū. Quidā etenim initā semel paruitatē, semper ueluti mordicus obseruāt. Quidā uerò augētur denud, aut scilicet in parem priori magnitudinē, aut in minorem aut in maiorem reuertentes, quos myuros recurrentes uocitāt. Fiunt autē pulsus myuri, nonnunquā in unius pulsus inæqualitate, super quibus haud multo pōst pressius agetur. Eiusmodi utiq; pulsū quædam inæqualitas est, quæ systematica appellatur. Quæ uerò uno percussu, aut una etiā arteriæ parte, aut diuersis deniq; accidit, quemadmodū in motu, unius sanè arteriæ partis inæqualitatis nomē sortietur. cum sub uno digito aliter cæperit, aliter uerò defierit agitari arteria, incipiēs multo quidē celerior, finiēns uerò segnior, uel è diuerso. Accidit autē hoc trifariā: aut motu indefinenter persistente, at euanescente, aut reuertente, et quasi geminato percussu feriente. Quapropter si cōtinuò perseverans et nō intercisus à ueloci in segniorē aut cōtrā, permutetur, eiusmodi pulsus à re ~~et~~ nomine anisotachys, id est, inæquiuelox existit. Sin autē interuallatus conquiescat, cætera uelocior appareat, dorcadizon, quod est, caprisans

prisans uocatur, à caprea animâte sumpta metaphora, quæ saltando sublimis in aëre hæret, atq; alterū quēpiam inopinatum priore celeriorē perpetratsaltū. Quod si percussus à diastole recurrat, et priusquam omnino cōtrahatur, rursus tactū feriat, dicrotos à Græcis, à Latinis bis pulsans talis appellatur. Huius rei imaginē quandā uidere licet in incudibus, cum uidelicet mallei semel quidem per manū sublatis in ipsas uerberant, refrabrâtes ex incudis renixu iterū atq; iterū percutiunt. Cæterū non solū in motus tempore, uno in iāu, unaq; arteriæ particula possibile est inæqualitatē cōtingere, uerū in robore etiam uirū, non tamē in quantitate interuallorū. nequit enim idē pulsus in eadem particula magnus ac paruus fieri, neq; etiā in alio genere, sed in diuersis partib. In uarijs porrō particulis, unoq; pulsu inæqualitas fit duplex. Nunc quidem cū motus perpetuū manet, et arteria sub aliquot digitis ocyus, sub aliquib. uerō cunctatius mouetur. Nūc uerō motu intercepto, ita ut digiti quidā motū apprehendant, nōnulli uerō minimē. Secundū item quantitātē distēctionis, in permultis partib. inæqualitas euidenter apparet: cuius farinæ sunt myouri, uno in iāu nutantes et circūnutantes, à Græcis epineuēcotes et perineuēcotes appellati. Nam si iuxta interiorem digitiū magnus pulsus incidens, et curuatus ex ratione dēminueretur, ita ut ab exteriorē arteriæ parte, qua laborātis pollicem spectat, minimus appareat, myuros nuncupatur, ad instar caudæ animalculi muris, id est, τὸ μυρὸς, aut meiueros, quod in modum caudæ minuatur. Sin atem sub medijs digitis magnus subincidens, atq; eleuatus, utrobique minuatur, minor apparens, hūc Archigenes nutantē et circūnutantem appellauit: uolens perspicuē significare breuitatē diastoles, cum ea quæ est ab utrisq; limitibus puta inclinatione. haud enim tantā abscisis statim, sed perinde atq; inflexis utrinque partib. in arcū contractus est, cū sit myuros magnitudine ex utrisque partib. Si inæqualitatem iuxta magnitudinē modō celerius

modo

modò tardius assumpserit, pulsus undosi et uermiculâtes oriū-
 tur. Sin aut et eam quæ in situ existit, acceperint, conuulsorij
 et turbulenti appellati, cōstituuntur. Ordinādū itaq; ab undo-
 sis, in quibus nō simul in istiusmodi inæqualitate, tota arteria
 apparet distēta, sed pars illius alia primū, mox alia, dein ter-
 tia, postremò quarta, motu cōtinuo perdurante, instar sese e-
 leuantium undarū. Nōnulli quidē in rectum omnino fluctum
 meantē habēt, aliqui uerò in obliquū declināt, aliqui in bre-
 ui longitudinis distantia altitudinē magnā obtinent, quidam
 autē diuerso. Quidam latitudinem, quidam item angustiam.
 Pari etiā modo et iuxta celeritatē atq; robur inæqualiter se
 habent. Undosus totus in paruitatē decrescens, uermiculans
 nūcupatur, uermiculari incessui persimilis. Quēadmodū ue-
 rò pulsus undosus minorē effectū uermiculans excipit, ita
 uermiculatē formiculans, quādo uidelicet abolitis motionib.
 permultis, in unam atq; eandē perquā exiguam omnino finie-
 rit. Inditū aut et huic pulsui à similitudine formicæ animan-
 tis nomen est, cū propter paruitatē, tum propter motionis
 speciē. Est enim uehementer pusillus formicans, ut quo nō est
 minor alius, cōsimiliter et omnium obscurissimus, frequentissi-
 musq; minimè tamen, iuxta Archigenis sententiam, uelox.
 Cōfinis huic pulsus est heclicus. Quēadmodū enim febrium
 una species est heclica, ita et pulsus habetur heclicus, qui nul-
 lā ingentē mutationē admittit, sed perpetim in eodem tenore
 persistit, trahitq; ut ab initio cœpit, neq; unquā soluitur, toto
 habitu in morbi cōuerso. Pulsus aut conuulsorij utrinq; ex fi-
 nib. extremitatū retrahere, extēdere, et cōuellere uidētur, in-
 star chordæ alicuius extēse sensum præbētes. In turbulentis
 aut nihil istiusmodi reperitur. Sed maior in his est eleuatio,
 ut partim quædā arteriæ sursum ferātur, uno eodēq; tēpore
 motumq; ipsarū iaculis rectissimè a simulaueris, quæ uiolēter
 emissæ ocyssimè ferūtur uibrata. Serratus pulsus est, cū alia
 quidam arteriæ pars elata, alia non, ob duritiē nimirū suam
 esse

esse apparet. Habet autem quandam etiam turbulentiam pulsus iste, & celer quidem creberque, non semper tamen magnus, existit. Decimum pulsuum genus ex praedictis est, quod ex inaequalitate iuxta ordinem & inordinationem nascitur. Ordinatus enim & inordinatus, sed in aequali in aequalem pro ratione circuitus, atque omnino etiam in disparem, ex utraque sectione, originem ducunt, puta ex circuituum paritate ordinatus: ab exacta uero imparitate, inordinatus. Aequalis enim uero pulsus ad unguem etiam ordinatus est, siquidem impari subsequencia ipsum diximus. Inaequalis autem non omnino inordinatus est. Si enim aequalitatem corrumpit, circuitum uero aliquem seruat ut in quantitate dilationis si forte contigerit duos fieri magnos & unum paruum, inde uero rursum duos paruos et unum magnum, & sic consequenter, nuncupari possit eiusmodi inaequalis quidem, sed ordinatus. Sin autem praeter hoc quod aequalitatem destruat, nullumque inaequalitatis ordinem seruet, praeter imparitatem, inordinatus etiam talis existit. Pari modo & in alijs horum generibus se habet. Ex inordinatis porro nonnulli sunt per omnia inordinati, ne pusillam aliquam seruantes periodum: alij uero secundum periodos ordinati. Quatenus enim continenti ordine destituuntur, inordinati uocentur: quatenus autem periodum seruant, secundum periodos ordinati dicentur: ueluti si contigerit duos magnos fieri atque duos etiam paruos, inde tres magnos et totidem paruos, ite quatuor magnos et totidem exiguos: et rursum tanquam reflectentes duos magnos, et duos paruos, et tres magnos cum totidem paruis, et sic deinceps in alijs similiter. Sciendum autem, quod inter alios contrarios singulos est aliquis medius, aequali autem & inaequali nullus est medius. Neque inter ordinatum etiam & inordinatum quispiam habetur medius, nisi uolueris secundum circuitus ordinem seruantem, medium inter ordinatum & inordinatum dicere. Et ceterorum quidem medij sunt secundum naturam, praeterquam eius qui in uehementia et obscuritate, quem admodum ostendimus, constituitur. Ex eorum autem albo solus

F aequalis

æqualis secundum naturam est, reliqui præter naturam, tum
 inæqualis, tum ordinatus, tum & inordinatus. Hæc itaq; sunt
 genera pulsuum uniuersa, & generalia ipsorum discrimina.
 Quid im tamen his & alia duo adnumerauerunt. Primū qui-
 dem à situ arteriæ pendet, quatenus sursum ac deorsum, in de-
 xtram aut sinistram deducta uidetur. Alterum genus quo ma-
 turius, uel lentius moueatur: è quorum numero esse undosos &
 turbulentos pulsus diximus. Hactenus quidem simplices tantum
 breuitatis causa pulsuum differentias perstrinximus: è prædictis
 autē, si cōiungamus has, facile & cōpositas inueniemus. Dein-
 cept uerò super causis, quæ pulsibus cōueniunt, differendū est,
 quas comitatur etiā præsigium ab ipsis desumptū. A magni-
 tudine igitur, quæ cæteris magis est perspicua, exordium sume-
 mus. Magnus itaq; pulsus efficitur aut propter necessitatē ur-
 gentē, quæ est utiq; in corde plus iusto redundans caliditas ex-
 ternum gliscens refrigeriū, et ueluti stabiliū: aut propter cor-
 poris gracilitatem, quemadmodū paulo pōst indicabimus. Au-
 getur uerò calor uel ex causis naturalibus, puta ætate florida,
 aut puerili, aut simpliciter calida, anni tēpore, regione, tēpera-
 tura calidiore: aut causis non naturalib; ueluti aëre, qui nobis
 circūfunditur, calidiore, lauacris calidis, exercitationib; escu-
 entis, poculētis, medicamētis, calfaciendi facultate præditis.
 Vel causis naturæ cōtrarijs, uerbi causa, distēperatura calida,
 aut humorū putrefactione, aut ira, aut id genus alijs. Discer-
 nes autē singulorū pulsuum hoc interstitio, q; causæ naturales
 magnitudinē ipsius faciunt stabilē & ægerrimē mutabilē. Cæ-
 teræ uerò, quæ procliuius permutari queat, ut etiamdū manu
 pertractate, aut certē nō multo pōst subsidat. Iam magnis qui-
 dem pulsibus, qui ex calidis balneis proueniunt, mollities acce-
 dit: quemadmodū etiā his qui ex calido, præsertim cū aridita-
 te, distēperamento magni sunt, durities. Qui autē exercitati-
 bus moderatis nauant operā, et perfriantur, medium quēdam
 statum habent inter duritiē & mollitiem: sed quæ pectori sunt
 uicina,

vicina, calidiora sunt, id quod etiā ira percitis usuuenit. Nonnullis uerò propter cibi aut uini usum, aut furorē, ad magnitudinem et uehementiā pulsus accedit. Porro qui iram, aut aliud quoduis cōtra præsriptū medici facinus celare conātur, uerbi causa, calidū medicamentū sumptū, et medicū, cum manum mittit in carpum sciscitantē, occultare cupiunt, ijs præter magnitudinem etiam euident inæqualitas accedit. Ad hoc autem et languentis ingenium, moresq; et consuetudo non parum opis ad pulsus cognitionem ferunt. Consuetudo quidem si uehemēter erga medicamēta affectus sit. Ingeniū uerò, stupidum ne nactus sit, an callidū n, et opinionis eximēdæ peritus sit. Quā uerò pulsus magnus ē putredine humorū factus est, præter magnitudinem systolen etiam magis acceleratētem habet. Sed quod pulsus magnus reddatur, nō satis sunt quæ ad usum tantummodo spectant, uerū oportet etiam uirtutis ministeriū, et instrumenti symmetriam inter duritiem et mollitiem accedere. Cum igitur cordis auctus fuerit calor ex quacūq; prædictarū causarū, primū quidē pulsus redditur magnus. Vbi uerò ad usum magnitudo non suffecerit, protinus ei uelocitas quoq; accedit. Quod si etiam tum quippiam desiderabitur, crebritatē quoq; assumit. Parui uerò et tardi, et rari pulsus itidē à contrarijs fiunt. Cæterū quotiescūq; à magno, celeri, ac crebro, in oppositos sit trāsmutatio, usu uidelicet postulāte, neq; amplius quod primū in pulsu factū est, primū quiescit, sed quod posterius entum emicuit, id primū abicit, redditurq; protinus rarus, deinde tardus, postremò etiā paruus. Quod si ad maiorē tarditatem paruitatēq; peruenerit, rursus raritas in frequentia demigrat, ut per ipsam, quæ usui sunt, absoluatur. Hæ igitur magnitudinis, uelocitatis, crebritudinis, et contrariorū ipsi pulsu habentur causæ. Annecēdæ etiā his, quæ una dūtaxat dimēsiōne constat pulsus deprauatio. Latitudo itaq; nō nisi per humorē plus iusto superabundantem augetur, siue id secundum naturā, siue ab externis occasionibus contingat. Quemadmodum altitudo

F 2

propter

propter instrumēti tantum mollitudinē, addita in hoc interim etiam uirtute. Lōgitudo autem ab ariditate et carniū circumiacentiū liquefactione palām innotescit, alijs dimensionib. collapsis: neq; enim fieri potest, ut prolixior, quā natura fert, ipsa reddatur arteria, & magis propriē quis gracilē huiusmodi appellet pulsum: quamadmodū huic cōtrarium qui latitudine modō auctus est, & profunditate plenum. Affectionibus uerō horum cōtrarijs pulsus interdū incidit, & secundum aliquam aut aliquas distātiās prohibetur, humilis aut strictus, aut breuis apparens, cū tamē talis nō sit, sed propter pinguedinis cuiuspiam, aut carniū, aut membranarum oppositarū crassitiem. Nonnunquā etiā totus exiguus uidetur, cum nō sit uerē exiguus, et obscurus similiter. Quid hęc recēseo? sēp numero quibusdā nullus omnino in omnib. arterijs uidetur esse motus: cum tamen re uera minimē sit, & præcipuē ijs qui minus accuratē tangūt, uerūm si propter copiā carniū latitat motus uerē obscurus. Nemo itaq; sibi persuaadat exactā asphyxiā homine etiam dum superstitē unquā usuuenire posse: quēadmodū ediuerso in mēbris excarnibus, etiā exiles pulsus magni uidentur. Emaciato igitur uehemēter corpore, arteria quæ spinā excurret, sēpe tāgentibus abdomē, motū præ se fert: nōnullæ etiam earum, quæ in mēbris prius obscuræ latebāt. Proinde singulæ causæ sunt exactā diligentia rimandæ, ne nos ipsorū subterfugiat cognitio. Vehemens aut pulsus à potentia uirium prouenit, nulla alia cōtrā moliente causa, usu nēpe dissoluto, aut instrumēti duritie. Obscurus uerō pulsus imbecillæ atq; infirmæ uirtutis, & huiusce etiam solius proles est, etiam si nihil aliud præsto sit. Vehemens etenim pulsus omnibus eget ad sui generationē causis. Obscure sola etiā debilitas parens est. Qui ergo ab initio statim uehemēs existit, ætates, anni tēpora, regiones, moderatasq; tēperaturas comitatur, obscurus autem immoderatas. Sed qui ex obscuritate transilit in uehementiā, à uirtute cōualescente ex præterita uoletudine aduersa efficitur: conualescit

Iescit autem uel beneficio eorum quæ in ipso corpore continen-
 tur, uerbi causa, humorũ cõcoctione, aut excretionẽ, aut furo-
 re: uel quæ foris adueniunt, puta uino, cibo, exercitationibus, et
 alijs quæ intemperaturã corrigunt. Vires porrò demoliuntur,
 inedia, uigilia, euacuationes immoderatæ, mærores, curæ, et
 dolores, præsertim animæ deliquiũ inducẽtes, & quæcunq; id
 genus uitiosum tẽperamentum conciliant. Quidã imperiti &
 inexercitati pulsum durũ, uehementẽ existere putauerũt, quod
 exercitatu cum ratione, tum tactu minimẽ potest effugere. Ve-
 hemẽs etenim magna ex parte cum magnitudine in altũ attol-
 litur, tactum ualidẽ ac uiolẽter feriens. Durus autem, magnitu-
 dinem nullus, propter contumaciam arteriæ, admittit. Durum
 igitur pulsum instrumenti duritia maximẽ reddit: quã quidem
 uel frigus supra modũ intẽsum, uel ariditas, uel tẽsio ab inflam-
 matione profecta, aut conuulsio deniq; procreat. Protinus au-
 tem duritiæ paruitas quoq; et celeritas interdũ, & crebritudo
 magnitudinis loco, propter usum succedit, quemadmodum &
 mollis pulsus humiditatẽ arteriæ comitatur, quã humidiorẽ
 efficiunt ex rebus quidẽ non naturalibus esculenta liquidiora,
 lauacra frequentia, somni prolixi & immoderati, uidus præ-
 terea ratio delicatior, et animi delectatio. Ex ijs uerò quæ præ-
 ter naturã sunt, maligni sopores, ueterni, aquæ inter cutem, et
 reliqua pituitosa. Plenus autẽ pulsus, aut humorum plenitudi-
 nem, aut nimiam cibi aut potionis uini præfert redũdantiã:
 quemadmodũ uacuis contraria, puta famem aut inanitionem.
 Porrò si corus arteriæ calidius occurrit, uehementẽ cordis cae-
 liditatẽ, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quan-
 dam arteriarũ uiolenta cõmotione incalescentiũ dispositionem
 insinuat. Archigenes autẽ asserit locũ arteriæ peculiariter in
 grauioris somni sopore (quod mali genus catochon dicunt) ca-
 lidiorẽ inueniri, quemadmodũ in ijs qui cataphora, id est graui
 in somnum delatione conflantur. Pulsus autem quem secun-
 dũ rhytmũ fieri diximus, si in motu & quiete fuerit æqualis,

in culpatam totius corporis temperiem significat: quantum in semetipso, uel exiguam à bono deprauationē ceu in ætate puerili, & alijs temperatis corporibus. Si uero plus temporis in quiete quàm in motione cunctetur, calorē superare portendit, quemadmodū & in ætatis flore, aut huic etiā ætati proximis, liquidò datur cernere, nō aliter quàm in senū corporibus æqualiter gelidis diutius multo moratur in quiete tempore. Illud uerò latere neminem debet, quod rhythmus in æqualitas, intra modū celeritatis et frequētiæ consistit: hæc uerò solū materiæ rationē ad rhythmū obtinet. Deficientes porro et intercidentes pulsus, oppressa et tanquā grauata uirtute redduntur. Intercidentes quidē minus nocuent, deficientes uerò noxiam maiorem faciunt: et in uniuersum, uirtus oppressa grauataq; pulsus ad inæqualitatē & inordinationem traducit, cum quamcunq; aliam, tum eam quæ in uehementia & magnitudine sita est. Ex pulsibus autē myuris, quos duplices genere esse demonstrauimus (aut enim in ea inæqualitate, quæ systematica appellatur: aut in ea quæ uno idu deprehenditur) deficientes quidē extremam uirtutis interuersionē declarant. Repetentes uerò et recurrentes, & hi quidem imbecillā sed etiamdum repugnantē, resistentem, et renitentē uirtutem præfagiunt. Myuri autē unica plaga, & inclinātes, qui epineneucotes, uel perineneucotes appellātur, potissimum ipsis fiunt, qui sensim contabuerūt non solum inflammationibus. Iam uerò & in plurimis quomodocunq; emaciatis, dū partes quæ circa arterias sunt, emarcescunt. Cæterum inæquieloces, et caprizantes, maxima ex parte feruores febricitantium, comitantur. Quod si primordia diastoles pulsus dissolueris, prope extremū ipsius, et systoles exordium maturauerit, putrefactionis abundantia inuuit, ad excretionē fuliginosa recemēta impellente natura. Si autem cōtrā, systoles quidem principium soluerit, sed ad diastolen magis festinet, cito calorē supra modū auctū refrigeriū affectare. Est autē horum in febre plerūq; frequētia comes, nonnunquā etiā magnitudo, nisi

nisi uirtutem durities instrumenti impediat. Quando autem arteriæ durities uirtute integra & robusta intenditur, pulsus dicatos, id est bis feriēs, accidit. Fluctuās insuper, siue undosus, humidus plurima ex parte ægritudines comitatur: sed ex his potissimū. Anasarca aquæ intercutē, ueternum, & peripneumoniam. Verū ubi iam uirtus languere cœperit, sed etiā dum paululum resistit, fluctuans in uermiculantiē transilit. Vbi extremē collapsa fuerit, etiā hunc formicās excipit. Hædicus peculiariter aliqua tabescentibus parte, et aliās liquefactis præfidet. Conuulsorius, quādo neruorū origo, inflāmata quadam affectione infestatur: quemadmodū in phreneticis, morbo comitiali grauius correptis, dum uidelicet in eo malo cōstituti, etiā dum calidi uitā in mortē cōmutant, cōtrario planē modo ijs qui animi deliquio cōcidunt, illi sanē uehementer gelidi, superstites tamen permanēt. Turbulētus aut pulsus fit, cum usus magnā diastolen expostulat, & robur uitale functione sua defungi potest. Nihil autem præter arteriæ corpus, quā minus possit præ duritia in magnā extolli eleuationē, sicut in magnis inflāmationibus, et diutinis obturationibus, impotens refragatur. Serratus uerō pulsus in uniuersum inflāmationis index est, et præcipuē neruosarum quarundā partiū: maximē uerō costali morbo proprius, remittēs quidem mollis & cōflu facilis, extensus uerō difficilis et cōcoctioni renitens. quæ cum uirtute quidem debili, subitō in periculū præcipitat: robustis uerō uiribus longo temporis spacio cōcoquitur. aut enim in suppurationem purulentā subinde transit, uel marciāda tabes ipsam excipit. Neq; ignorandum, quōd inæqualitates comitatur inordinatio: rarō enim pulsum inæqualem ordinatū reperies. Inæquales itaq; & ordinatos pulsus, minores offensæ uirtutis quales & inordinatos, maiores faciunt. Hæc quidem simplices pulsum causæ, & præcognitiones sunt. Ex his uerō et cōpositas (quemadmodū in sermone de ipsorum discrimine docuimus) haud negociosum est assequi.

Diectionum optima quidem mollis est et compacta, et tem-
pore quo in secunda ualitudine deſci conſueuit, oletata,
Cuiusmodi fuerit ſubrufa, cū conuenienti craſſitudine, neq; ad-
modū odore fædo: quæ talis non eſt, inſalubris iudicatur. Quæ
igitur his quæ aſſumuntur colore reſpondet, tenuis, liquidior,
aut nimis fætida, ocuſimeq; tranſiens, cruda cenſetur. Ruſum
oletum et meracū, per exordia quidē bilem morbi parentem:
ubi uerò declinationis quoq; tempore eiſmodi egeritur, pul-
chrè corpus expurgari portēdit. Viride, cruginoſæ bilis: nigrū
uerò cū atræ, tum ſaguinis cuiuſpiā indidem torrefacti indi-
cium eſt. Liuens algorē quendā, uſcerisq; alicuius mortifica-
tionem notabilē denūciat. Pingue oleaginuq; liquefactionem
pinguedinis quæ in corpore cōtinetur ſignificat: quemadmo-
dum et glutinoſum, pingui deterius, animantiū partes tabe con-
ſumi inſinuat. Graueolentius ualde, non exiguā putrefactionē
declarat. Inter omnia autē hæc, ſi qualitas excrementorū his
quæ ingeſta ſunt edulys non conueniet, tum pari modo diſpoſi-
tio quoq; conſideranda eſt. Omnium deterrimum letiferumq;
habetur atrum, liuidum, pingue, et celeriter deſcendens.

Quæ ſint urinarum notæ. Cap. 14.

Perinde atq; in oletulis, ſic in urinis quoq; regula ſanorum
uſi, agitata etiā ualitudine degentiū, notulas exequemur.
Lotium itaq; ſaluberrimū eſt, quod urinis ſanorū ſimillimum,
cuius generis ſubrufum et ſubſlauū ducimus: conſeſtim uerò
hoc à miſtione, craſſitudinē moderatā poſſidet. Quum uerò lo-
tiorum turbidorum tria ſint diſcrimina, (aut enim miſta talia
paulo poſt reſident, aut quā diutiſſimē ſimilia manēt: aut lim-
pida quidē eminguntur, poſtea uerò cōturbantur.) pernicio-
ſum eſt quod tertio, ſalubre quod primo loco poſuimus: mediū
inter utruq; locū, ſecundum obtinet. Extremē autem crudum
exaſtè aquoſum, ceu deploratæ coſtionis uenoſi generis acci-
dens eſt. Quando uerò ocuſus prorumpit, impotentia lotij reti-
nendi,

mendi, qui affectus diabetes appellatur, nascitur: uerum omnium ex crudis lotijs illud multo deterrimum est. Post hæc tenue admodum, et instar aquæ candidum succedit. His uicinum est alterum lotium, quod plerisque in morbis apparet, tenui alboque perquam propinquum. Post hoc sequitur subpallidum, quod pallidum atque leuiter rufum modò reddetur, concoctione iam quandam colore præfert. Est autem, quod crassitudine tantum ab aqua, quantum et colore secedat, si probè concoctionis munus absolueri debeat. Quod si urinae colore nihil ab ea quæ secundum naturam est recedenti, sedimentum candidum, leue, æquale, et multum denique insit, absolutæ concoctionis indicium puta, plurimum autem crudi humoris expurgari portendit. Non tamen si crassior modicè cum sedimine aliquo fuerit, crudam iam prorsus iudicabimus. Nam si crassiusculæ farinae, aut squamulis similia, aut furfuræ, aut atra, aut lurida, aut uiridia, aut graueolentia denique in lotio subsideant, præterquam quod unumquodque tale cruditatem notat, etiã letiferum est. Cæterum boni coloris lotia, in quibus uel candida, leues, et æquales hypostasæ, aut nebulæ aliquot pares, aut sublimia continentur, omnium saluberrima sunt, præsertim ubi subsidens fuerit istiusmodi. deinde si suspensæ: tertio, si nubeculae, et ut simpliciter dicam, quæ urinis probè innatant, tantumque bonitate præstāt, quāto magis ad inferna subsident.

Quæ sputi sint notæ. Cap. 15.

Putat subflaua, subrufa, subspumea, et tenuia, nihil præter cruditatem insignis præferunt exitij. Sed exactè flaua, rufa, spumosa, porracea, uiscida, rotunda, et omnium maximè atra, perniciose censentur: præter enim sanguinem, quicumque reliquorum humorum syncerus fuerit, improbum statum ex feruido calore prægnatum insinuat. Cruenta igitur sputa, moderata sunt: flaua, aut atra bile tincta, periculum minatur. Consideranda est præterea screddi ratio. nam si procliuius excrecentur, liquidò iam constabit, eiusmodi sputa minimè mala: contraria uerò, perniciose existere. Exactæ porro concoctionis augurium est, spumum leue,

F 5 tum leue,

tum leue, album, æquale, consistentia neq; liquidum, neq; uehementer crassum: cruditatem uerò summam testatur, si ne tantillum quidem expuitur. Quod si excreetur quidem, sed tenue, concoctionem imbecillam fatetur: si autem sincerè quod screatur rufum aut flauum fuerit, malum. Si liuens deniq; aut rubiginosum, aut atrum, perniciosissimum est.

Diatarum febrium agnitio atq; medela. Cap. 16.

Diatarum autè febriū peculiaria atq; inseparabilia signa sunt, urinarum in primo statim die cōcoctio, suauitasq; calor. Atqui post primā febris solutionē fidelius earū signum exeritur. Nā arteriarum motio in hac febre per omnia sanorum motui respōdet, nulla aliarum febriū in naturalem dispositionem reuertente. Et quod tolerat facile morbum ægrotus, summum diariæ febris habetur indicium. Prōptius autem id genus febribus corripuntur, in quorum corpore quod transpirat, halituosum non est, sed acre & mordax, quasiq; fuliginosum: è quorum classe dicuntur, calidæ & siccæ temperaturæ, & in summa biliosi homines. Qui igitur ex lassitudine febricitant, pinguius et molliter confricādi atq; lauādi sunt. Sed qui ob ariditatem ephemera infestantur, hos minus quidē fricare, sed liber alius lauare expedit. Quibus ex sollicitudinibus, mœroribus, uigilijs, ira, febris oboritur, lauādi y quidē rarius, sed oleo copiosiore tepido, minusq; adstringēte, tum pauxillulum perfricādi, tum etiā pro cōsuetudine lauandi sunt. Quibus febrem æstus intulit, his maturrimè ab initio statim frigoricis, lauacris quā plurimis, minimè uerò abundantu oleo, neq; frictione crebra, succurrrendum est. Sinto aut quæ refrigerent, rosaceum, omphacinumq; oleum, sine salibus. Quib. uehementer refrigeratis sinciput perfundatur: inclinante uerò febre, lauare conuenit. Si uerò quispiā algoris iniuria affectus, febricitet, & is in declinationib. in balneum ducendus est. Si autem febris unā cum catarrho & grauedine accendatur, ante horum concoctionem lauacrum uitare expedit. Quibus æstus fe
brens

bre excitat, ei his etiamdū præsentiſſibus lauandi ſunt. Algor
 re autem quicūq; febricit, modicè calorificis caput eorum, pu-
 ta, irino uel nardino unguine irrigato. Quib. uerò ex cutis den-
 ſitate febris cōtrahitur, his dulcium aquarum temperatarū la-
 uacrum cōfert: necnō & ea quæ rarefaciendi uim obtinet fri-
 catio: exercitationes, uicūq; boni ſucci & alimenti. Si uerò
 ex ſurſigine cibiq; abſtinentia febris originē habuerit, hi pri-
 ma ſtatim acceſſione remittiēte, in balneū ducantur. tepenteq;
 oleo largiſſimè perſuſi, leni manu perfricentur, in calidaq; ci-
 ſterna multum diuq; uerſari debent. A balnei ſtatim exitu, re-
 uocatis uirib. denud in balneum ducendi ſunt: deinde aqua cali-
 da potui exhibenda: piſana item cremor, nonnunquā & la-
 ctuca, & aliquid piſcium mollioris carnis, ex albo iure. Com-
 munis autem omnib. eſto uiciuſſe ſpecies, inculpati ſucci, & fa-
 cilis concoctionis, & quæ nuſquā in meatibus hæreat. Vinum
 cū aspectu, tum potentia aqueum, miſcendū eſt. Oportet autē
 nonnunquam in ipſa ſtatim primæ acceſſionis inuaſione, & gro-
 tantes aliquos cibare, in quib. ſcilicet corporis intemperatura
 ad calidum & ſiccum cōuerſa, febres accendit. Qui ex ingui-
 num inflammationib. febre contraxerunt, ne medicum qui-
 dem quid agendum ſit, conſulāt, ſed ulceri quod in inguinibus
 ortum eſt, proſpicientes, circa remiſſionem acceſſionis, lauāt.
 Ex re illis uſuq; fuerit, uinum, donec inflāmationes ſolutæ fue-
 rint, interdicare, & tenuiorem uiciuſſe rationem præſcribere.

De putridarum febrium agnitione. Cap. 17.

Ebres ex putredine euenientes deprehendimus, quòd nulla
 ipſas extrinſecus cauſa initiatrix præcedit: et quòd à rigore
 inchoant, neq; aſtu neq; frigore uehemēti prægreſſo, quod
 peculiare febrium, quæ ex putredine humorū accendūtur, in-
 diciū eſt: quemadmodū & pulſuū oppreſſio. Sic autē nomināt,
 quādo auſpicāte acceſſione, uegrādes admodū atq; in quales
 pulſus obtinēt. Priuatim quippe huic febrī generi hoc præci-
 puū exiſtit. Maximū autē febrī putridarū indicatiū eſt, caloris
 qualitas,

qualitas, tam fuliginosa, ut tactum erodat. Singularis etiā harum febrium nota est cruditas urinæ, hebesq; concoctio. Magnum uerò & memorabile concoctionis signum, in primis locis nunquam in huiusmodi febribus apparet.

Curatio febrium putridarum. Cap. 18.

Um uires eius qui ex putredine febricitat, ualidas exploraueris, incunctanter uenam incidere conuenit, nisi uentriculum cruditas infestet. Vbi uerò robur imbecillum, uel ætas impedimento fuerit, à missione sanguinis abstinendum. Sanguine euacuato. putridi humores per urinam, aluum, & sudores expurgentur. Si ultro impetum in uentris hostiolum fecerint, etiam per uomitum. Alioquin non conuenit ea præter naturam irritare. Eligendæ uerò sunt materiæ, quæ citra ualidam calfactionem & exiccationem dictarum euacuationum munus subire ualeant: cuius farinae sunt, ptisanæ cremor, mulsa, oxymeli, apomeli, & apij radix. Si alius non respōdeat, ex aqua mulsa cum oleo clyster inijciendus est. Vniuersum corpus, nisi prius euacuatum fuerit, rarefacere non expedit. Euacuatum uerò, rarefacere tepidi caloris oleo conuenit: cuius classis chamæmelinum existit. In hoc tempore uinum aquosum potui datum, uniuersas excretiones promouet. Lauacrum item temperatum ex aqua dulci. At si febris magnitudo obstiterit, neq; uino, neq; balneo, neq; rarefacientibus ungentis utendum est. Aqua frigida in his febribus hausta, nisi quippiam hanc quoq; prohibeat, utilis est. Proinde si quidem uires quæ corpus regunt, omnes robustæ fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis notæ euidenter appareant, frigidam cum fiducia exhibebis. Si uerò qui laborat, corpore quadrato sit, cōstitutioq; cœli calida & sicca, si hunc in frigidam natationem posueris, nequaquam offendetur. Modica autem febre infestante, si uires non ualidæ, cum probæ cōctionis indiis, talibus bálnea, uiniq; potus, & quæcunq; arefaciendi uim obtinent unguenta, conducunt.

De

De cognitione tertianarum. Cap. 19.

Febbris tertiana, flauæ bilis agitatae soboles, circa primordia statim cum uehementi rigore inuadit, à quartana rigore sic dissidens, q̃ pungere et corpus sauciare uideatur. In quartana uerò, accessionis insultus perfrigerationem uehementem habet. Quotidianas autem nullus omnino rigor præcedit, sed perfrigeratio sola infestat. Est etiam in tertiana pulsuum exactus ordo. Eadem sitim circa summum uigorem magnam inducit, & hominem exurit, neq; multo post in uigore consistit, & calor æquabiliter quaquaversum extenditur. Quod si manum apposueris, primo quidem contactu calor ingens et acris, ueluti cum uapore quoddam elatus, occurrit: qui paulo post à manu superatur. A potu uerò, continuò permultum uaporis calidi per cutem emergit, sudoris nunciū. Bilis uomitio superuenit. Aut uenter soluitur, & uesicæ excrementa prorumpunt biliosa. Præter hæc ad integram febris quietem finitur, cum exacerbationis tempus duodecim, nō plurium horarum, expedierit. Febrem ergo quæ intra duodecim horas desinit, exactā tertianam appellabimus. Quæ autē diuturniorē accessionē habuerit, illi simpliciter tertianæ appellationē indemus. Quæ uerò longissimè productum paroxysmum seruauerit, paululum uerò interualli, hanc rursus tertianam extensam nominamus.

Quomodo tertianæ medendum. Cap. 20.

Tertianæ exquisitæ, tanquā morbo à flaua bile originem habenti, humedantibus & refrigerantibus occurrendum. Quicquid in uentriculum repit, per uomitum: quod uerò ad inferiora, per infernā excretionem euacuandū. Idem per lotia quoq; & sudores eliciendū. Alium itaq; molliētibus enematis ciere, lotia cum apio et anetho proritare expedit, in potionibus simul maceratis. Quod si cōcoctionis apparuerint indicia, cū fiducia iā absinthii præbeto. Balnea ex aqua quæ bibendo sit calida, congruunt, quib; neq; nitru, neq; salia, neq; sinapi adicias: sed oleo ægrū summo pere calido perfusum, in lauacrum descendere

descendere iubeto. Bos autem qui præcupidi sunt lauandi, si bis in die laueris, non delinques. Si cōcoctionis notæ ostendantur, tunc etiam si pluries laueris, nihil errabis. Vino autem is totum, quoad morbus concoquatur, interdicito. At ubi concoqui iam cœperit, tenue, aquosum, parçè primùm cum edulys, quæ cum humedandi, tum refrigerandi facultatem obtinent, utiliter exhibetur. Abstinentum à melle, sinapi, salsamento, et acris cunctis, & uinis perquàm antiquis, et natura calidis. Nihil porro mirum, si in hominib. qui se olim exercere, et frugalissimè uiditare consueuerunt, nunc autem ordine conuerso, ocio uentriq; deditis, pituita bilis plurima ex parte cōmixta deprehendatur. Proinde complures tertianæ aut sine rigore, aut cum perquàm exiguo rigore inuadunt, & propriâ medendi rationem requirunt. Neq; enim lauacrum, neq; plenior aliquis cibus ante concoctionem tertiana laborantibus congruit: quoniam ne mica quidem panis, & oua, & consimilia.

Tertianæ notæ curatio. Cap. 21.

Lauacra in tertianis spurys circa initia statim non probantur, sed dum iam ostenduntur cōcoctionis indicia. Neq; singulis dieb. sed alternis tantum alendi sunt. Quies ipsis, et circa præcordia fatus confidunt. Facilis itē cōcoctionis sorbitiones, clysteresq; non admodū molles aluo inditi. Et si etiā sanguinis detractio desideretur, caue ne prætermittatur. Vniuersa uerò uidus ratio neq; frigorifica ex toto, neq; humedans esto: sed modus q magis incidat potius, assumatur. Sumè uerò profuerit ipsis ptisanæ cremor, adiecto pipere, aut hyssopo, aut origano, aut spica nardi. Mulsam etiam aquā, in qua piper elixatū sit, potui dare expedit, et alia quæcunq; loti proritandi naturam habent, exceptis uehemēter calidis & aridis. Maximè uerò à septimo die, aquā in qua absinthium maduerit, administrabis. Iam uerò et oxymeli epotum, multis manus auxiliares præstitit, et aliqd eorū quæ leuiter aluum deiciunt. A cibis statim uomere, in hac febre diutius perseverante præsentis, est præsidio.

Quarta-

LIBER SECVNDVS.

Quartanarum deprehensio. Cap. 22.

Quartana multo cum frigore impetuose ingruit, ut quæ ex gelido atra bilis humore originem ducit, sed feruorem æstumq; fel. lem instar tertianæ non habet: quin nec bilis uomitibus eandem comitatur. Inter hæc si tenuia, cædidi coloris, et aquea lotia compareant, quartana erit febris. Præcipuum autem eius indicium est, pulsus paruus atq; rarus. Autumni uerò tempore potissimum oritur, erraticis succedens febribus. Certe nonnunquam in quartum diem maximè typum constituit. Sed non rarò plurium dierum interuallo secundum quasdam periodos accessionem habet.

Curatio quartanarum febrium. Cap. 23.

Quartana laborantes, leniter tractare cõuenit; neq; medicamentum ullum uehemens admouere, neq; euacuationem moliri, nisi fortè sanguis insigniter redudare uideatur. tum uena aperienda est. Vidu flatuosum ac utilem minimè offerre, cõsuetisq; uentrè emollire expedit. Si hæc nihil cõferant, clysteribus inter initia quidè mollibus, posterius uerò acriorib. utendum est. A porcinis carnibus, & ab omnib. quæ uiscida et tardi transitus sunt, infrigiditantib. item et humedantibus edulys omnibus abstinentum est. Vinum tenue, album, & moderatè calidum, salsamentumq;, et sinapi ex usu sunt. Medicamentum item quod è tribus piperum generib. cõstat, aut diospoliticum diebus aliquot assumendū. Et si diebus singulis pipere sine aditamento ex aqua utatur, rectè fecerit. Si ægrotās in summo morbi uigore sit, nutriendus fuerit q̄ tenuissimè: protinus uerò ut quiescat quàm diutissimè, præcipietur: uiscerib. ad hæc per mollicantia renitentiaq; consulendum. Deinde medicaminibus quæ urinam proritant, utendum: mox cõcodionis notis apparentibus, magna cum fiducia ijs quib. atros humores exhauriunt: nō semel modò, sed crebrius utere. Post uerò uehementem purgationē, etiā pharmacum ex uiperis exhibendum est, et id genus alia, quæ aduersum eiusmodi febres approbatur. Inter-

quæ

quæ in solenni usu habemus præ cæteris laudatissimum, quod
 è liquore Cyrenaico constat.

Quemadmodum quotidiana cognoscatur. Cap. 24.

Quotidiana nunquam cum rigore, primo statim die inuadit, sed progressu temporis alior potius quàm rigor inest. Cum difficultate calor in ea accenditur, et diuturnum habet augmentum: uerùm tamen non comburit laborantes, neque ad multam ac crebram respirationem cum angustia quadam compellit, neque efflare aut gelidam bibere cogit. Accidunt autem uomitus pituitosi, et quæcunq; per aluum euacuantur, frigidiora, crudiora, et aquosiora in his febribus reperiuntur. Sudores circa primos dies minimè erumpunt, neque ad infebri citationem desinunt, color cum pallore albicat, urinas emittunt tenues et albas, uel crassas, turbidas atq; rufas.

Curatio quotidiana. Cap. 25.

Quotidianam curantes, oxymelite primis statim diebus utimur, et iis quæ lotiū egregiè proritant: uniuersa ad hæc uictus rationis forma incidendi facultate sit prædita. Circa summum uerò morbi uigorem prouidendum est uentriculo, præcipuè ipsius hostiolo: deinde ægris, ut radiculis, cibarijsq; sumptis, euomant, præcipiendum. His item quæ pituitam subducunt, tantisper dum febris cessauerit, utendum.

De febre Hepiata, et rigore qui difficulter incalescit. Cap. 26.

Vum pituita uitrea, omnium aliarum frigidissima, cruda, Quæcumque putrefacta uniuerso redundauerit corpore, tantum non inexpugnabiles ullo calore, cum tremore algores sine febre excitat. Nam in febrib. quæ ex humorib. accenduntur, putrefactio maximè febrilem calorem suscitatur. Quod si tota hæc pituita cõputruerit, quod tamè propter immensam frigiditatem rarenter cõtingit, quotidiana febris causa fit. Si uerò non tota æqualiter, sed ex dimidio, aut aliquæ partes putruerint, aliquot putredinem non sentientibus, hepialum febrem hanc efficit, in qua rigescunt simul, et febricitant. Partes quippe humoris

LIBER SECVNDVS.

moris eius quæ nondum putruerunt, per uniuersas corporis uenas, aut reliquam corporis molem sparsæ, rigores excitât, sed putredinem expertæ febrem accendunt. Sortita autem nomen est hepialos, uel trāslatione à sale, dico autem mari, quod hepiō quidem, id est, tranquillum uidetur, ab initio autem turbulentum fuerat, mutuata: uel ab ἥπιος, quod est leniter, et ἀλαίειν, hoc est excalfacere, ac si dicas, quoniam teporem tantum inducit. Et hæc febris de quotidianarum genere existens, ueluti à pituita ordiens, illarum curationi speciatim subiicitur: nisi quodd tanto cōmemorata quotidiana calidioribus, magisq; incidentibus indiget præsijs, quanto et pituita frigidity illam excedit. Cæterum in hepialo rigor calore inextinguibilis fermè, adhuc multo uehementioribus calorificis opus habet. Quocirca quod è tribus concinnatur piperibus medicamentum, et diacalaminthe, item quod succum Cyrenaicum recipit, his accomodatatum est. Iam uerò et quæ ex castoreo, et id genus alijs præparantur auxilia, competunt. Prolixior rem autem horum curationem comperies capite quadragesimo sexto, quod de febrium rigoribus immodicis et frigoribus est. Lypyræ insuper, ac Tiphodes, et quæcunq; alia præter memoratas dicuntur febres, cum sint ex relatarum grege, diuisin illis, dicendasq; remediorum suppetias expetunt.

De continuis febribus. Cap. 27:

Febres continuæ intermittentibus singulis congeneres sunt, tertianæ quidem exquisitæ, ardens: quotidianæ uerò, eaque singulis diebus accessionem habet, neq; ad integram febris quietem desinit. Pari etiam modo quartanæ, quæ quarto quoq; die ingruit: quandoquidem exactus causos omnia tertianæ exquisitæ alia indicia seruans, non alio discrimine ab eadem dirimitur, q̄ quod neq; cum rigore accedit, neq; ad infectionem peruenit. Qui uerò singulis diebus accessionem facit causos, omnes similiter absolutæ quotidianæ febris notus obtinet. Sed quod cum integra febris quiete non cessat, a

G cognata

cognata quotidiana disidet. Eadem ratione et quæ quarto quoque die accedit, nec tamen ad integritatem finit, quartanæ finitima est. Continua igitur febris est, quæ non antè quàm ex toto fuerit soluta, desinit ad infirmitatem. Cæterum quæ nullam remissionis notam præ se fert, confinis hæc ardentibus est, à quibus sola acrimonia discernitur.

Agnitio & curatio continentium febrium. Cap. 28.

Continentes febres ex sanguine oriuntur, nunc quidem ex feruescentia duntaxat, nunc uerò ex putrescentia etiam propter obstructionem: quapropter accessio ipsis ab initio ad finem usque una est. Notæ uerò sunt, pulsus maximi, uehementes, ueloces, frequentes, æquales, minimè mordaces. Lotia non multum à naturalibus urinis deficiunt. Curatio est, sanguinis usque ad animi deliquium detractio. Quicumque enim in hac febre constituti, uenam secare superfederint, in summum uitæ discrimen perueniunt. Quod si euacuationem quæ incisione uenarum fit, res prohibeat aliqua, alijs certandum est præstidijs, quæ meatus recludunt, multitudinem materiei euacuant, feruoremque febrilem placant. Si quando autem in talibus concoctionis humorum indicia conspexeris, neque in principe aliqua corporis parte phlegmone quardam, aut tumor œdematis speciem præferens, aut scyrrhus fuerit, neque aliqua particula adeò gelida, ut in hanc nocumentum incidat, magna cum fiducia frigidâ exhibeto, præsertim si gelibibulus ægrotas fuerit.

Æstuantium febrium agnitio. Cap. 29.

Aufos, id est, ardentes febres hæc comitantur symptoma: Cuius lingua arida, scabra et nigra, rosio uentris, alui excrementa pallida, sitis uehemens, iugilis, quandoque etiam desipientia.

Æstuantium curatio. Cap. 30.

Ad perfectam huius mali solutionem, alterum fieri necessarium est: aut biliosos humores excerni, aut extinguui. Excernuntur itaque per sudores, aut uomitus, aut uentrem inferiorum.

rem. Extinguuntur autem frigida potu, quo nos semper ar-
dentes febres curauimus. Nutriendi autem sunt hac febre cor-
repti, nō aqua dūtaxat, neq; mulsa solum, sed diluta mulsa co-
cto propinata. Oportet enim eos q̄ his morbis cruciātur, solis
potionib. enutrire. Lauacrum uerō his tantūmodo expedit, q̄
nullo tumore inflāmatorio, aut erysipelatoso infestātur. Quōd
si cōcodionis etiā notæ compareāt, multo magis ex re atq; u-
su fuerit. Qui uerō ex falso humore, ardētī febre conflātur,
eis aliena sunt balnea. Hi & ptisana cremore sustinendi sunt.

Febrium ex erysipelate medela atq; cognitio. Cap. 31.

Febres quæ ex erysipelatoso uiscerum affectu originem tra-
hunt, tum ex interno feruore immodico, doloreq; uehemen-
ti, tum ex siti & astu immoderato, & ut summatim perstrin-
gam, acerrimæ bilis notis, cum exiguo sanguine putrescentis,
agnoscuntur. Medendum uerō ad hunc modum. abstinere à
balneo oportet penitus, aqua gelida uigente morbo horridissi-
ca, quod est frigidissima, utendum, inter morbi uerō initia mi-
nimè. Extrinsecus frigorifica applicentur: quæ si nihil contu-
lerint, intra corpus sumere cogentur. Præcipue uerō expedi-
unt lactuca, & quæ his compari potestate respondent. Foris
ipse quoq; lactucæ succus idoneus est. Quin & semperuiui, &
quæcunq; alia frigorifica sunt potētia. Sed preciosissimo ma-
gna ex parte utimur: liquorem enim in frigidantis alicuius ex-
pressum, pilæ cum portulaca inycimus, deinde contusum ex-
primimus. In usu uerō momento polenta admixto, & in aqua
frigida merso, refrigeramus. Linteolū præterea duplicatum
in eo iure rigatum à foris hypochondrijs superintēdimus, non
sinentes perēnare diutius, sed aliud frigidius imponentes. Con-
fundimus uerō nonnunquam & olum omphacinum.

De agnitione febrium hæticarum. Cap. 32.

Hætica febris non in humoribus modò ac spiritu, sed in so-
lidis etiam partibus consistit, dolorisq; expers existit: quæ
occupati, nequaquam se febricitare autumāt: neq; enim ardo-

rem sentiunt, omnibus ad unum corporis partib. iuxta nō admodum calentibus. Duplex uerō heëicarum febrium species est. aliæ quidem ardentibus febribus ut plurimum superueniunt, quæ tantum prorogantur, ut longitudine temporis mado rem qui in cordis corpore existit, consumant, uel plurima ipsius parte seruata adhuc permanente. Quæ uerō persistente adhuc humiditate generantur, ubi corpus cordis occupauerint, hinc maximè accenduntur. Iam una quidem heëicarum febrium dicta est origiatio. Reliqua est, quum à principio statim inuadunt, primū originem febrib. diarijs minimè dissimilem, ex tristitia, ira, lassitudine maiore, unā cum aestu solis sortitæ. His quippe non est arduum mederi: atqui si in marcorem, quem marasmm nuncupant, heëicæ perueniant, nullo medicamento uincuntur. Hæc sanè febris heëica coincidens marasmo, prōptissima est cognitu. Oculi nanq; perq̃ immensam cōcauitatem præferunt, & hærent lemæ in circumferentia sicca, & squalida quædam elucet dispositio. Vitalis flos coloris ipsorum emarcuit, frōs arida est, atq; intenta: hac detenti, dormituri entium more identidē cōniuent. Nec est affecto somnus, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, et quid aliud q̃ ossa & cutem præferunt: aded ut si nudato corpore in partes ad uentrem attinentes oculos intendas, neq; ex intestinis, neque ex uiscerib. aliquod superesse censueris: præcordiaq; uehementer sursum cōuelluntur. Cutis summè resiccata est: pulsus tenuis, frequens & durus. Calor autem, cum primū manus inijcitur, obscurus est: paulo uerō pōst, asperitatem & rosionem exhibet. Quandiu igitur humiditatis quippiam superest, heëica modò febris appellatur. Cum uerō piculum est, ne tantillum humoris supersit, exquisitus iam marasmus cōstituitur.

Heëicarum febrium curatio. Cap. 33.

Hæc febre correptos inter initia statim, propter mordacem humorem, ali oportet. Saluberrimum uerō his præsidium, humedans ratio uideus, est. Cōgruit itaq; in primis cūm ptisanæ

ptisane cremoris, tum alicæ sorbitionibus, et pane postea ob-
lato, moderatoq; frigida potu languentem mederi; si neq; pble
gmone, neq; humorum ulla putrefactio complicatur. At si plu-
rimum inde periculi fore coniceris, frigida abstinere conue-
nit. Foris uerò epithematis frigorificis utendum. Et balnea in
bac affectione constitutis, quouis tempore conducunt.

De semitertianis. Cap. 34.

Voniam tertiana cum rigore, quotidiana uerò citra illum
Qingruit, ex ambarum mixtura constans, horrorem indu-
cit, qui tanto mitior quidem est rigore, quanto uehementior est
perfrigidio. Cum igitur horror ex utriusq; extremis simul con-
temperatis constet, haud ab re semitertianæ nomen huiusmodi
febri est inditum. Modus autem generationis duplex est. uel eo-
nim duabus exacerbationib. simul cōgredientibus, aut inter i-
nitia statim utrisq; inuicem contemperatis efficitur. Quum i-
gitur tertiana superat, horridior febris inuadit, & per acces-
sionem aliquid rigoris assumit: statim uerò et calidior est eius-
modi febris, & ardentior, atq; bilis quendam uomitum, aut al-
uum, aut madidi uaporis exhalationē adfert. Sed cum altera
pituitosa præcelluerit, frigus extremitatum præpollet, horro-
resq; pauci exercent: neq; sitis premit, neq; ardor affligit. Cū
uerò æquales magnitudine tertiana intermittens, & quotidiana
na cōtinua existunt, insultus accessionis cum horrore fit. Vbi
uerò quæ ex pituita est, præualuerit, pulsuum cōtractiones at-
que horrores accidunt. At si calidior prædominetur, protinus
incalescunt uehementer. Talis quidem exquisita semitertiana
est, ex æquè pollente duarum febrium temperatura, tertiana
uidelicet intermittente, & quotidiana cōtinente proficiens.
Sed quæ exquisita nō est, aut bilē, aut pituitam exuperantem
possidet, quæ sanè facilius medelis eliditur. Promptius quippe
paucus humor, copiosioris excellentia artisq; præsidio uinci-
tur. Si pituita præpotētiore fuerit, remedijs q̄ in quotidiana re-
sēsumus, potissimum utemur. Sin flaua bilis præualuerit, ure
G 3 genti

genti necessitati in totū incumbētes, is quorū in tertiā mē-
tionē fecimus. Sed ita, ne alterius curam prorsus abijciamus.

De passim uagantibus morbis. Cap. 35.

Morbos publicē in plurimos grassantes, populares, et com-
munes appellant. Quorum quemadmodū origo, ita &
causa communis est. Cōmunis itaq; alimentorū prauitas istius
modi aggritudines generat, publicus uē aque uitiosae potus, la-
bores uel nimii immoderati, uel prater consuetudinē omīsi,
fames ob penuriam, & satietas quae ingentē annonae prouen-
tum succedit, & regionum naturae, communes morbos saepe-
numero intulerunt, quae interdū paludem uicinā, interdū uerō
barathrum finitimum habentes, letalē uaporem & pernicio-
sum expirāt. Haec igitur frequenter euenire solent. Ceterū
circūfusus nobis aer, tēperaturas corporū euerit, plus a quo
uel calidior, uel frigidior, aut humidior redditus. Ceteris nāq;
causis nō pariter omnes obycimur, neq; uniuerso die in is uer-
samur: sed quia nos continens aer, omnibus circūfusus est,
& per respirationē attrahitur, necessariū pro temperamenti
immutationibus animantiū corpora simul afficit. Qui igitur
haec cognouerit, non solū morbos ex quacūq; aeris dispositio-
ne futuros praecognoscet, uerū etiam ne fiāt prohibebit, con-
trariam distemperatis circūflui aeris dispositionibus uicius
rationem constituēs. Quae igitur ob suam intemperaturā mor-
bis uicina sunt corpora, haec à simili circūdātis nos aeris tem-
peramento arguuntur. Sed quae cōtrarij quā cœlum tempe-
ramenti sunt, prater hoc quod nihil leduntur, adhuc melio-
ra euadunt, ametriam temperamenti cœli contraria ametria
castigante. Quisquis haec percalluerit, optimus incolumitatis
custos habebitur, corporibus contraria semper accommodās:
nonnunquam refrigerando uidelicet: interdum, si ita oportue-
rit, calfaciendo. Aquae inductionibus aut superfusione refrige-
rans, ocio item & ciborū abstinentia, prolixioreq; potu: calfa-
ciens uerō amictu ac tegmine. Exercitationibus item & cibo
abundans

abundantior, quandoq; etiam tenuior. Porro si quispiam in gentem lignorum struem accenderit, egregie quidē udum aëra in calidum & siccum poterit conuertere, quemadmodum & Acronem Acragantinum fecisse perhibent.

De peste, ex monumentis Ruphi. Cap. 36.

Febrem pestilentialem uastissima quæq; urget, nihilq; in ea, quemadmodū in alio quouis morbo, latet. Accidunt enim deliria, bilis uomitiones, præcordiorū intensiones, labores, exuberantes sudores, extremarū partiū perfrictiones, fluores alui biliosi, tenues, flatuosi: urinæ aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, sedimentis prauis, suspensionibus deprauatissimis: stillicidia narium, ardores pectoris, linguæ combustæ sitibundæ, anxij moerores, uigiliae, cōuulsiones uiolentæ, et alia praua compluria. Quod si quis uenturam pestilentia præuiderit, contemplando pernicioſa anni tēpora, et studia quæ secundæ ualeitudini non conducunt, & brutorū quæ antea perierūt obseruatione. Quibus in animo cōsideratis, et illud perpedito, cuiusmodi sit præſentis temporis status, simul & uniuerſi etiam anni, è quib. sanè optimè licebit uniuerſam uictus rationē odorari. Verbi gratia, si tēpus anni quod pro suo naturali statu oportebat eſſe ſiccum, humidius eſt redditum, neceſſum fuerit ratione uictus, ad ſiccitatē cōuertere, quo exuperās humiditas exiccata cōſumetur. Cura etiā adhibenda eſt uētri, ſi in ſuperiori uētriculo pituita ſit, uomitionibus euacuato: quibus ſanguis exuperat, uena ſecta ſanguinē detrahito. Confert & per urinas ductio, & quæcunq; aliæ ex toto corpore purgationes. Quod ſi febre ardente ferueat lāguidus, flāmaq; thoracē obſederit, haud alienum fuerit refrigerantia pectori admouere, atq; gelidam potionem nō paulatim offerre (incendit enim uehementius) ſed cōfertim, ut flāma obruta extingatur. Si aſtuet ardore interioris, extimæ uerò partes, cutisq; ſuperficies frigēſcāt, præcordia cōtendātur, uenter colliquamenta aliàs per ſuperna, aliàs per inferna ceciat, uigiliae infeſtāt, deliria nē, & linguæ ſcabri

cies, his calorificis opus est, quo caliditas per totum corpus diffundatur, & si qua alia ratione calor è profundo ad corporis superficiem reduci poterit. Utendū præterea propinatione, quæ aloes partibus duabus, ammoniaci thymiamatis partibus totidem, myrrhæ parte una, constat; hæc simul in uino fragranti lauigata, dimidio quotidie cyatho propinantur. Haud scio, inquit Rumphus, an quispiam hac potione usus, pestem non euaserit. Hæc uero quidem Rumphus. Galenus uerò tradit, contra pestilentes putredines rubricam armeniacam potu sumptam, excellentissimum esse remedium. Pari etiam modo ex uiperis theriacam magnū. Graßate quippe Romæ pestilentia, quibuscunq; inquit, horum alterū non profuit, ad unum omnes perierunt.

De his qui ob crudorum humorum multitudinem in syncopem delabuntur. Cap. 37.

IN nonnullis febres ob ingentem crudorum humorum collectionem, ore uentriculi simul offenso, accenduntur. Intumescunt his præcordia, & in grauiorem quàm secundum naturam sit molem, uentris osculum augetur. Color quidem ad albidius, & æqueum magis, quibusdam uerò in nigrius mutatur. Nemini horum sanguis absque summo dispendio detrabitur. Inanitione quidem indigent, sed neque sanguinis missionem, neque expurgationem sustinent. Ut pote qui etiā sine his syncope subito periclitantur. Succurrendū est igitur talibus cum frictione. Auspicandum autem confestim à morbi exordio. Principio quidem à summa crurū parte deorsum, cum linteis modicè asperis, deinde et tota brachia à supremis ad infimas usque partes fricanda sunt. Vbi uerò artus satis calere uidentur, et lassitudinis sensum metuimus, oleo relaxante utendum, ab adstringentibus cauendum. Hyberno tempore etiā aliquo quod per halitū digerat, uti expedit; cuius generis est sicyonium atque chamæmelinum. Confrictis uerò iam eximie membris, oleoque insuper deterso, ad spinam inde dorsi totū te conferas, et hanc pari modo confricato. Post hæc rursus ad crura, inde denuo ad brachia, mox ad scapulas,

pulas, tergiq; spinam remeandum, idem tota die repetendum.
 Aqua mulsa in qua byssopus ebullierit, his est commodissima.
 Porro neq; alimenū, neq; sorbillamentū, neq; aquam propi-
 nabis: neq; omnino liberalius bibēdi potestas permittenda. Ve-
 rū abunde est mulsam solū, per primum triduum præbuisse,
 ordine quemadmodū tradidimus perfricando. Si autem firmi-
 tudinem mediocrē adhuc ægrotās pulsu moderato præferat,
 & alius sua spōte nequiter respondeat, clysterem confidenter
 per aluum infundito. Si uerò maior quā conueniat retrimen-
 torum ad imum uentrē impetus fiat, principio quidē amplius
 mulsam decoquito, quoniā sic minus subducat. Si autē largius
 quā par sit alius deiciat, sistenda quidem nō est, sed exhiben-
 dus mulsæ loco ptisanæ cremor est. Quod si pergat fluxus, a-
 licæ sorbitione alito. Si uerò per imbecillitatem pulsus etiam
 collapsam uirtutem deprehendimus, panem ex uino diluto of-
 ferre expedit, si neq; uenter, neq; iccur phlegmone infestetur:
 qua si laborarint, corpore crudis humoribus referto, deploras-
 tus erit ægrotans. Vbi uerò crassiores omnino humores adesse
 comieceris, oxymeli pro aqua mulsa assidue propinabitur. Si
 tempestas fuerit æstiuā, & calidus gelidæq; potator lāquidus,
 huic oxymeli frigidum misceto, hyeme uerò calidum. Infestissi-
 mæ sic affectis sunt balneæ. Ad eos autem quos iam syncope
 oppressit accersitus, partibus, de quibus modò mētionem feci-
 mus, non inflammatis, panis buccellam ex uino præbeto. Illis
 coq; inde ad frictionem accedendum, modoq; iam tradito uten-
 dum. Quibus uerò ob flauam bilem ore uentriculi affecto, syn-
 cope accidit, his gelidum assumere potum, uinumq; tenue, co-
 lore uermiculo, atq; uetustum, alienum non est.

De his qui præ tenuibus succis syncope periclitantur. Cap. 38.

Vi humorum tenuitate exoluuntur, superiorum contrarijs
 Omnino præsidjs medendi sunt. Enimvero signa quibus di-
 scernuntur, illorum deprehendes contraria. Alendi igitur
 sunt paulatim iugiter, illos autem nullo remedio curari posse
 ducito.

ducito, quorum uirtute iam languente, hepar aut uenterculus inflammatione laborat. In eiusmodi affectionibus, breui cada uerosa in uuln constitutio apparet. Tum quidem nutriendus est æger necessariò. Extimaq; cutis perinde densanda, atq; priora rarefacienda, cubiculiq; aër refrigerandus. Adstringentes præterea inunctione illinendæ sunt. Alimenti quæ non tam promptè diffluunt, utendum. Exhibendus itaque panis, & ex chondro sorbitiones, & fugaces fructus, austeri, & corruptioni resistentes, non tam ipsi per se, quàm cum ipso etiam pane. Vinum item aquosum statim inter initia à cibo sumptum, q̃s accommodatissimum est.

De aliis occasionibus e quibus contingunt
syncopæ. Cap. 39.

Sunt porro aliæ occasiones quibus syncopæ succedunt, quatuor: dolor uehemens, uigilie, uacuatio immoderata, & in his qui in sermone errant interdum commotio. Quintam, si uidetur, distemperaturam uidelicet principiorum, adyce. Celerissima itaque internecio, corde, mox cerebro, neq; ita multo post etiam iocinore affecto, accidit.

De dolore. Cap. 40.

Reditur itaq; dolor è gelido affectu stupidus. Pulsatorius uerò, immani phlegmonæ peculiaris est. Si uerò tanquam palo infixio, aut ueluti à terebro perforari locus uideatur, crassus intestini doloris species est. Punctuosus, circa mēbranas consistit. Cū impetu uerò discurrens dolor, in uehementissimis non solum hemicranicis, sed & cephalicis accidit. Est aut impetuosè discurrens dolor, cum tanquā à radice primitus affectæ particulae ordiens, curriculum ad uicinas defertur. Distendentes aut utrinq; neruorū dolores sunt, quum & laborant, et ad utraq; extremitatū fines tenduntur. Minimè uerò afficiuntur nerui, in latitudinē distracti. Extensorios porro et stupidos dolores, infert mēbrana sub cute distēta: quæ uerò inter carnē existit, ueluti dilaniantē dolorē. plures nāq; sunt, quæ inæqualiter in
hære-

herescunt, & carnem ipsam amplectuntur. Osium uerò membranas obsidētes cruciatus, in profundo delitescent, ipsorumq; osium ueluti dolentium opinionem inducunt. Quando igitur nulla foris occasio doloris ostenditur, præcedentem uicis rationem considera, num insolenti ocio emarcuerit: aut cibus largioribus, maximaq; in nutriendo potestatis, usus fuerit homo: aut solita excretio remoretur. Nam si quid horum, aut omnia appareant, repletio doloris causa est, & proinde homo extemplo inaniendus. Ita namq; licebit remedijs, quæ fluxus dolentium partium repellant, summa cum securitate uti. Sanguinis igitur copia adeò ut distendat, peccāte, uena sine mora, maior, affectam propè particulam, secanda est. Si uerò deprauati duntaxat humores affligunt, expurgandi sunt. Coëuntibus autem utrisq; utraque euacuatione, sanguinē prius detrahentes, utemur. Quòd si his peractis, dolor persistat, constabit, mēbro affecto noxium humorē impactum esse. Liquet etiam, curationem cum his quæ per halitum digerunt, esse molliendam. Pari curandi ratione ex flatulēto spiritu prognato dolori medemur, in ipso opitulantes potius attenuantibus edulys. Infusis item per anum, & cataplasmatibus, adspersionibus, fomentisq; ambients ipsum corpus rarefacientes. Quòd si tumor grauans aut contundens dolorem causauerit, tumori succurrendum est. sin permordax humor cruciatum excitet, aduersissima huic sunt, quæ attenuandi & excalfaciendi uim obtinent. Anethum oleo elixum, & dolorem sedat, & somnum conciliat; & uiride efficacius, quàm aridum.

De colliquatione. Cap. 41.

Cum per aluum quippiam excernitur, quod neq; ex alimentis, neq; ex his quæ bibita sunt, sed ex humoribus è corpore in aluū defluentibus, procedit, asimile quidē flauæ bili, quæ tū per uomitū, tū per alui secessus iugiter reuicitur. Disidēs tamē ab ea, quòd grauiter olet, et quòd rufius sit excrementū, et crassitudine strigmetitia uiscidū, nōnunquam & oleagineum, tum

tum pinguior et recentior caro, à febre urente resoluitur atq; liquefcit. Si malum in uetustate incidit, nonnihil etiam solidarum partium tabescit. In hac difficillima febre, exhibenda gelida potio est, ex fonte frigidissimo. Eiusdem etiam qualitatis esse oportet cataplasmata, et epithemata, thoraci atq; præcordijs applicata. Bsculenta adhuc frigorifica exhibenda sunt.

De uigilia quæ febricitantes infestat. Cap. 42.

SI uigiliæ excefferint, crura manusq; uincire, hora maxime somno capeffendo consueta præcipimus, et excitari. Cogimusq; interdum genas aperire, uel cõnuere, donec abundè defatigentur. Extemplè inde uinculis solutis, lucernaq; sublata, si lentum altum mandamus. Grauius autem persistente uigilia, facies calyci atri papaueris decocto in acceffionis declinatione lauanda est. Odoramentum præstat, papaueris candidi calyx torrefactus atq; friatus, et mandragoræ radicis trita tantumdem cum uino. Ex rosaceo quoq; malagmate concinnato, frontem oblinito, et serpyllo cum meliloto in passo elixato. Quo quidem et in acceffionibus utendū: aut leuigatis papauerū capitibus pane exceptis, cum rosaceo aut cerato applicamus. Nutricatus itè accuratior quodammodo, ac magis exquisitus probatur. Adiciatur aut sorbitionibus capitum nitidi papaueris, quantum capiunt cochlearia tria: sed holeribus cõmisceatur papaueris nigri, si folia quidè fuerint uiridia, quantum tribus digitis cõprehendi potest: sin minus, tum tria aut quatuor papaueris capita arida simul elixa seligantur. Si ne sic quidè profecerimus, lachryma papaueris aut mandragoræ succo obliniatur. Ex papauerū calyculis cõfectum eclegma, præcipuè ex defruto epotū mēsurā cochlearij unius aut dimidiati, potiū, somnū sæpe numero illexit. Si caput alicuius destillationibus obnoxium non sit, huiusmodi utendū in febris remissione suffitu. Accipe folij amomi, costi, arnabo, singulorū uncia, carpobalsami libra, styeracis, amomi, ammoniaci, bdellij Scythici, mandragoræ radicis, lachrymæ papaueris, suffitū sup lignis cupressinis facito.

Catac

Cataphoræ, id est, improbi soporis curatio. Cap. 43.

Abstergenda est facies posca, modicè lactis instar tepida. Extremæ corporis partes ualidè ligamētis cōprimendæ. Narib. odoramēta quæ dissecādi uim habeāt, adhibēda. In remissionib. cucurbitula scapulis atq; spina strenuè adglutinentur. Morbo perseverāte, sternutamēta in accessionū remissionē, admoueantur. Alimentorū materia, incidēdi ac diducendi facultate sit prædita. Ceu libro de tuēda uoletudine exposuimus.

Curatio doloris capitis in febribus. Cap. 44.

Si caput febris ratione dolet, post conuenientē febrium euacuationē, in accessionū remissionibus obliniatur. Principid cōmuni oleo, è nondū maturis oliuis expresso, aut rosaceo cum momento aceti tēperato: in æstate quidē, & febris ardente, frigidus: hyeme uerò, & febre non æstuate, calido aut tepido. In oleo nonnunquam tum serpylli, tum polygonij succus elixetur. In æstate etiam papaueris capita, aut papauer ipsum, quæ admodum hyeme peucedani moderata portio. Perseuerāte uerò dolore in frōte nudo pilis sincipite, cataplasma huic ex ueteri polenta et poligano, aut ex pane pariter et rosis, aut exigua myrto, siue serpyllo, inducendum. Nōnullos pulegium magis, emplastri modo adhibiti leuauit: neq; desunt quibus igneo etiam sensu existente, psyllium cum polenta temperatum auxilio fuit. aut ipsum per se elixatione in uiscum redactum, & identidem mutatum. Facit idem coriandrum polentæ permixtum. Aloë præterea cum aceto illinitur. Myrrha item et amoniacum, pari modo & crocomagma. Pulsatiles autem dolores, ruta & mentha cum pane, rosaceoq; adiecto discutiunt. Quod si cōmemoratis remedijs dolor manum non dederit, prius quidem caput ad cutem usq; attondendum est, deinde pinguioribus embrochis totum inspergendum: post hæc cucurbitula occipiti imponendæ, partes insuper extremæ ligandæ, et manibus palpandæ. Prosunt præterea birudines affixæ. Si quis ad destillationē aut grauedinem capitis dolorē refert, ijs quæ

quæ suo loco describitur, succurrendum est præsidys. Si à regionibus oris uetriculi, uapores sublatis caput afficiunt, his etiam quemadmodum subordinauimus, prospiciendum.

Quæ stomacho adhibenda sit curatio. Cap. 45.

Imbecilli stomacho, cataplasmatibus roborandi uirtute præditis cōsulendum, qualia ex palmulis, uino, polenta, croco, masticha, et aloë componuntur. Oleris item ex absinthio, melino, mastichino, nardino, uino irrigare conuenit. Si plus satis incaliscat, refrigerantium quiddam admisceatur: uerbi gratia, succus cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani, sereos, labruscæ. Quod si inflammatio in uisceribus appareat, relaxandi facultatem habentia adijciantur: aspersioibus nempe, oleum chamæmelinum, cyprinum, adipem gallinæ aut anseris, et bdellium, uel ammoniacum, et consimilia. Cataplasmatibus uerò seminibus aliquid, apij, fœnogræci, floris alibæ, et chamæmelorum, atq; ut summatim eloquar, compositam habeant potentiam, relaxantem tenuium partium, amaramq; et stypticam.

De immoderatis febrium frigoribus & rigoribus. Cap. 46.

Algoribus cum tremore qui diebus decretorijs accidunt, neq; occurrere, neq; naturæ certamen dirimere cōuenit. Et frigus quod ex sudore cōtrahitur, promptè remittitur, neq; quicquam infert molestiæ. In solo autem rigore, uel frigefactione, quæ ex gelidioris atq; copiosa maximè pituita accidit, principio quidem membra multis modis constringenda sunt: deinde oleo chamæmelino, aut cyprino, aut irino inungenda. Quod si uehementiore opus sit præsidio, piperis aliquid oleo cōfundito, aut cæchryos, aut adarcæ, aut castorei, aut frictione molli uersum corpus demulceto. Ne autem procliuius oleosum illud auxilium defluat, haud absurdum fuerit et ceræ pauxillum colliquefacere. Si uerò algor cum tremore, nullo calore uinci possit, adhuc etiam efficacioribus ex his factis acopis, atq; dropacibus et sinapismis utendum est: aliæq; fomentationes affa
bre

bre machinata, ad mollienda: & acutiora odoramentis peridanea, nepeta, pulegium, byssopum. Propinanda ante accessionem mulsa, in qua elixa sint piper & ruta. Adhuc praterea succum cyrenaicum quantitate mly melli decocto formatum, duabus horis ante paroxysmum exhibebimus. Pari etiam modo liquorem silphij, item quod in quartanis cum succo cyrenamico temperatur, multis manus prestatit. Iam uero in oleum largius percalidum descendentes aliqui, contumacissimos rigores abegerunt, quemadmodum tradit Archigenes. Ceterum Galenus ante initium accessionis, cutem abrotono, aut nepeta sicca, aut cunila tum folijs tum floribus, aut costo, aut pyrethro, utroque horum cum oleo, perfricandam edocet: atque ita uel omnino nunquam, uel certe minus rigore infestabuntur.

De sudoribus. Cap. 47.

Sudores decretorios excipere conuenit, usque ad sufficientem euacuationem: adiuuare item fetu mediocri, et quiete. Cuius ergo non abstergerendi: alius enim alium quoque proritat. calido item clystere, sorbimento, & somno. Ceterum in remissionibus sudores erumpentes simile iudicarijs subeunt ministerium. Atqui de his quae sudorem eliciunt praesidijs, in superiore uolumine, capite duodequingagesimo satis est proditum. Vbi uero sudores largius eruperint, absterge, & subleua ad refrigerandum operimenta. Nam si plus iusto promanauerint, adeo afficiunt, ut & animi defectionem saepenumero inducant. Leui igitur stragula, udaeque operiantur: admittatur aer frigidior, somnus, & flabello uentulus. Myrtus nigra in farinam trita, corpori inspergatur, et galla consimiliter. Cortex piceae, electrum praterea, et polenta, cum uino adstringente, membris sudores recipientibus imponantur, spongiaque posca madefacta facies permadescat. Archigenes uero calcem uiuam, et flocces uini coctas, tum in his, tum in nullo calore expugnabili rigore suscipit: ambo enim, inquit, igne fota exarescunt. Irrigare porro media corporis loca praecipit succo plantaginis, aut coriani, aut portulacae

tulacæ, aut brassicæ, quod astricta sudores intus coherceat. Tempore uero somni, creta cimolia in aqua dissoluta, dorso atque thoraci subdita eximie prodest. Vniuersum præterea corpus rosaceo, aut melino, aut myrteo, aut lētiscino oleo, aut quæ ex illis concinnatur ceratis, delinendum est. Accommodatiores his quippe sunt iniunctiones, quia abditos meatus obturant, et humoris transitum impediunt. Neque quæquam fugere potest, quod talibus alimentis aridius summo pere conducit, et uina moderate. Verum à copiosis ingurgitationibus, et præcipue humidioribus, frequentibus, iit clysteribus abstineat. Quod si fieri potest, gestationibus indulgeat in gelidioris aeris constitutione. Extremaque his corporis partes quam maxime in frigidetur. Qui compressu uero, quasi per pelisum sudores fiunt (istiusmodi aut in doloribus, aut in conuulsionibus eueniunt) deligatura et fotu extremorum, et refrigerio, regculis laneis accersito, leuiter curatur.

De tussi quæ febricitantes infestat. Cap. 48.

T Vbi quæ in febribus accidit, maxime uero cum rigore ingruentibus, occurrendum est. nam tussis intensione, febris declinans erigitur. Aduersus quod malum hypoglottia, id est, globuli qui sub lingua tenentur, ex melle cocto et coacto porrigenda sunt: lingua uero subiecta liquefiunt, et impedimenta facilius spiritus discutiunt. Tempus uero exhibendi opportunum circa summos accessionum uigores, et usque ad imminuentem accessionis articulum, existit. Præbeto quoque hydromeli excoctum. quibus autem de nervoso genere non timetur, his temporis progressu, cum fiducia et oxymeli propinato: si hoc displiceat, hyssopi decoctum, quod ipsis etiam cum tremore algoribus subuenit. Præterea castoreum si febris non fuerit ardens, hoc nervosoque generi auxiliatur. Eclegmata adhuc è pineis confecta, et earundem nucleis, iride, semine lini, amygdalis amaris, et urtica semine. Eiusmodi plurima ex parte alimentis quoque simul adijciuntur. adhuc resinam et terebinthinam in ovo exhibere, utile est. Foris uero thoraci et partibus ad arteriam attinentibus lanam sulphure suffitam

suffitam imponito. Et pingue præterea, uel oleum rutaceum, aut irinū, aut anethinum esto. Quin et deligatura ualida in longum exactè porrecta, tusses cohibet: dico aut, per medias extremasq; particulas. Nec præter rationē fuerit, si utrouis herbae pedicularis genere, uel syluestri uel satiuo commanducato cum mastiche, tussis profligandæ gratia utare. Adhæc partes extremas cōfricare, demulcere, atq; ligare expedit: deinde rursum retræctionē soluere. Quod si propter febris asperitatem tussis concitetur, utendū anagargarismate ex aqua tepida: sed et frigida sæpenumerò iuuat. itē ex posca et palmularū decocto, aut rosarum, aut dulcis radicle. Ad hæc uisceribus et cordi ipsi moderata refrigerandi facultate prædita inſiciantur.

De sternutamentis. Cap. 49.

Affligunt subinde quum febribus incidunt sternutamenta. nam caput implēt, et uires arguunt: nōnullis sanguinē eliciunt, et alias id genus molestias inferunt. Occurrendū igitur ipsis est. Cohibet autem irruentem sternutationē, narium, frontis, & oculorū perfricatio, item oscitatio, palati accurata fricatio, eructuatio, contentio iliorum, capitis in altum eleuatio, conuersio in latus, mollis extremitatum cōtrectatio, muscolum maxillæ inunctio, calidi olei in aures infusio, ligaculum calidum mento subiectum. Fugere oportet repētīnam cōsomno excitationem, fumum, puluerem, acutiora odoramenta, piperris, castorei, sinapis, & mentæ. Confert ad sternutationem malorum, et polentæ odor: obtundit enim sternutationū eruptionem. Inanes etiam spongiæ marinæ. Cum autem irritus ad sternutandum impetus oboritur, neq; sternutamentum in uociferationem prorumpit, quies labij idonea est. Continua item acriorum odoramentorum experientia, & animi relaxatio.

De ciborum appetitus auersione. Cap. 50.

Si ob uitiosos succos stomachus quæ offeruntur respuit, exhibenda sunt tum esculenta, tum poculenta, quæ illiusmodi humores uel per uomitionem, uel per alui inferioris deiectionem

H clidere,

elidere, aut temperando emendare, comparata sunt. Quorum rerum sylua in superiore huius operis uolumine comprehensa est. Si propter uirium imbecillitatē cibum horreant, quoniam ex praua intēperie particularum, imbecilla quæuis facultas redditur, oportet distemperaturæ speciei cōtrarijs succurrere. Plurifariam igitur de escarum horrore sermonē libro tertio de stomachicis, faciemus. In febricitantibus autē, protinus inter initia odoramentis conabimur appetentiā restituere. Potissimum uerò polenta aqua madefacta, aut posca, uino copiosiore aqua diluto, aut quorundā fragrantium aut adstringentium fructuum decocto. Illito porrò leni, mediocri item corporis totius frictione. blanda cōtraactione, collationeq; uuluis, et exigua aquæ sorbitione, appetitus reuocatur. Sed lancinatus immisione digitorum stomachus, cibi quodammodo fastidium in oblatæ alimonie desiderium conuertit: præsertim sublata sursum quadā biliosa aut acida materia. A primis affectionis diebus cataplasmatibus quæ foris applicantur, stomachus fastidiosus ad cibū sollicitabitur: ex palmulis, malis cotoneis, cēnāthe, absinthio, & aloë cōformatis. Amplius, alimenta adornentur compluria tum simplicia, tum frumentacea, & alterius materię uarietatem quandā sortita, quæ tamen non multum ab ijs quæ febricitantium usui cōueniunt, discrepēt: inter quos fructus etiā fugaces numerentur, qui non facile acescūt, neq; nimium dulcescunt. Maturi uerò, non usq; ad satietatē tamen admittuntur, sed quantum duntaxat in alia edulia appetitum excitant. Adhibeantur autem ad reficiendū cibis familiares mansuetissimi, qui ægros obiurgare et sollicitare possint. Cæterū febribus solutis, perseuerante in refectionibus inappetentia, conuenientissarum cum oxymelite coctū, & lactuca, & oliuæ sale conditæ, et capparis, & salsamentū, & bulbi, et quicquid stomacho conducere cognoueris, memoria repetitis illis ipsis dapibus, quibus sospites maximè usi sint. Deambulationes porrò & gestationes, uociferationes, & dropacismi, & frictiones, & exercitia

LIBER SECVNDVS.

115

ercitia adhibeantur. Propinationes item succi absinthij, aut as-
loës. Aceti postremò scyllitici mystri mensura absorpta, bona
fide & efficaciter operatur.

De pergrandi fame, quam Græci boulimon, nostri bouinam
& uaccinam nominant. Cap. 51.

Si uerò in uehementem & intolerandā famem ex cibi fasti-
dio incidam (dico autem illam insatiabilē famem, qua affe-
cti cibum non sentiūt) hisce restituemus, tum alijs perodoratis,
tum suillis carnibus assatis, tum etiā hœdinis: et ut summam
expediā, omnibus ingenij odoris suauitatē, nidorisq; fluxum
emittētibus, præterita uidelicet febriū scuitia. Oportet præte-
rea extremas corporis partes constringi, ipsosq; suscitare, ma-
xillas pungendo, capillos item uel aures uellicando: recreatis,
panem ex uino supra modum diluto, aut aliud quiddam, quod
facile digeritur, exhibebimus.

De canina appetentia. Cap. 52.

Quanquam hoc symptoma febribus non aded superueniat,
sed nonnunquam post ipsas, ob eam tamen quam cum cibi
fastidio contraxit cognitionē, operæ precium fuerit, de nimia
quoq; & inexpugnabili eduliorū appetentia sermonē texere.
utrinq; enim naturæ modus exceditur. Quoniā igitur à pitui-
ta frequentius acidā hæc affectio prouenit, erit ipsa incidenti-
bus & abstergentibus oppugnanda: cuius farine cum primis
esse creduntur dulcia, salsa, & quæ alioqui absterget caloris
fica. Vinū itaq; ipsis propinandum largius, impense calidum,
cuiusmodi sunt colore uermiculo, uel rufo sine acerbitate: sed
dulciora potius porrigenda, etiā si nulla siti premantur. Opor-
tet autē talibus ubi ad prandium peruenerint, primò quidem
pinguia, atq; alia etiā omnia oleo copiosiore cōcinnata, omnis
austeritatis astrictioris expertia offerre. Hæc quippe, etiā si
palàm contra causam non pugnent, extremū tamen ad cibos
impetum discutiunt. Horū uerò penuria crassitudinem pituitæ
quæ in stomacho hæret, cōminuit. Iam et alimēta sale macera-

H 2

ta mi-

ta ministranda sunt. Post hæc uina cōmemorata liberaliter pōtent. His lōgiori tēpore perpetratis, canina appetētia sedatur.

De siti. Cap. 53.

Sitim admodum longam ex ariditate uel caliditate particularū, per quas humor ex ore in uentriculum defertur, nasci putabis. Et ariditatis quidem remedium somnus est: caliditatis uerō, uigilantia. Nonnulli autē ē uino sitibundi, esculentorumq; caliditate redduntur, quibus præsidio habetur gelida potio. Vitiosas uerō potiones affectant, perinde atq; etiam cibos, qui præpollenti humoris malitiæ respondeant: unde aliquot tanta siti oppressi sunt, ut inde etiā perierint. Noui qui cum dipsadas serpentes aliquando deuorassent, & qui uino sese ueteri ad temulentiam usq; inuitalent, & nauigātes qui aqua potabili in nauigio deficiente, maris aquā bibere non dubitātes, ad unum omnes mortem oppetierūt. Sed quæ in febris nascitur sitis, placari potest irrigatione capitis ex gelidissimo oleo, aut rosa ceo uniuersim torrētis modo cum strepitu in caput deturbata. Nigræ porrō lactucæ semē manducatū, optimē siti succurrit. Prodest consimiliter & quæ glycyrrhiza appellatur, et cucumeris semē in ore retentū. Exhibe præterea, quod sitim sedat, hoc catapotii: cucumeris satiui drachmæ octo, tragacanthæ drachmæ quatuor, dissolue tragacanthum ouorum crudorum recentium albore: et ubi dissolutū fuerit, tritumq; semini cucumeris prius friato adiūge: quibus subactis, globulos cōformato, deinde in umbra siccato, ē quibus unū sub lingua sitibundus contineat, atq; inibi dissolutum humidum deglutiāt. Postremō dilutum malorū cydoniorū, uel pirorū, uel mespilorū, uel clauicularum uitis, sorbendum præbetur, aut mali punici succus.

De linguæ scabritie. Cap. 54.

Si lingua salebrosa scabrescit, humectetur, lini seminis decocto laborantibus in ore continendum porrecto. Efficacius autem operatur, si myxa cum semine lini decocta, digitoq; in eo iure infecto, lingua confricata, aqua limpida ablatur, aut
Spongia

Spongia abstergatur, deinde rosaceo illiniatur. Verum rosa-
 ccū ipsum melle temperatū id efficacius præstat. Succus item
 portulacæ ore detentus. Et rhus qui in obsonijs usum habet,
 mulsæ tēperatus, probè succurrit. Item Damascena, & mys-
 chlion, hoc est, myxæ ossa ore retenta, et linguæ circūuoluta.
 Facit idem laducæ cauliculus. Archigenes autem docuit et sal
 Indicum, quod colore quidem & substantia nihil à communi
 disidet, sapore uerò mellitum est, lentis instar, uel ad sum-
 mum fabæ quantitate comestum, affatim humectare. In latus
 insuper decumbant, quoniam supina cubatio exiccet. Nec sint
 ore hiantes. Hiatus enim exuccū reddit. Sternutationes deniq;
 accersitæ, linguas quouis alio largius humectant.

De nausea. Cap. 55.

Quando citra assumptionem cibi ægrotantem irritus ad uo-
 mitum conatus torquet, coniectari cuius, puto, licebit,
 prauos humores uentriculū afficere. Quidā lancinantur qui-
 dem, sed euomunt nihil, humore in uētriculi tunicis imbibito.
 Si itaq; humores pituitosi existunt, coquendi sunt, seruando ho-
 minem in quiete, inedia, & somno. Cæterū tenuiores, uomitus
 eijcit, nonnunquā ptisanæ cremore excitatus, aut mulsæ. Gluti-
 nosi uerò & crassi humores tenuibus, attenuandi q; uirtutem ha-
 bentibus, indigent, cuius generis est oxymeli, & similia. Humi-
 ditate uerò praua tunicis imbibita, picra ex aloë, accommodata
 est. Adstringētia uerò impendit nocēt. Quemadmodū rursus,
 humoris ingenti copia citra malitiā occupāte, cōstipantia pri-
 mā utilitatis habēt æstimationē. Atqui medicamentū ex aloë,
 marasmū inducit. Quod si frigiditas humiditate copuletur, mi-
 scēda sunt adstringentibus etiā calorifica. Sed frigida cōstitu-
 tionis indicium est, nihil sitire, neq; calorē ullū sensu percipere.

De uomitione biliosa. Cap. 56.

His qui uomitu bilem eijciunt, cataplasma ex palmulis, ma-
 licorio, galla q; uino decoctis, aut posca, panibus simul le-
 uigatis, applicandū est. Acacia & hypocistis, & balauustum

H ; & rhu

Et rhu cataplasmati admiscendum. Et cucurbitula apposita magnificè iuuat, cum flamma multa. Cibū uerò sæpenuerò paulatim exhibebimus. Sed qui bilem atram uomū. Et stomachi inflationem experiuntur, his spongiæ aceto acerrimo calidoq; irrigatas impone. Vel hedera folia uino elixa, cataplasmatibus instar, adglutinabis.

De singultibus. Cap. 57.

Singultuum alius ex repletione, alius inanitione, alius erosione ab acrioribus humoribus stomacho prouenit, quibus uomitu eiectis sedatur. Plures uerò medicamentum ex tribus pipris generibus assumentes, si protinus uinū superbiberint, singultu infestantur. Quod uerò nonnulli corrupto in stomacho cibo singultiunt, ex his quæ neminē fugiunt, existit. Neq; desunt, qui in algoribus cum tremore singultū experiuntur. Vomitionem igitur ijs qui singultu ex repletione uel erosione stomachi torquentur, sufficiens præsidium cōperimus: calfactionē, ijs qui propter frigiditatē. Quando uerò ex humorum plenitudine singultus oritur, uiolenta opus habet euacuatione, quā sternutatio molitur. Sed ex euacuatione singulibus prognatis, sternutamentum non medetur. Exhibenda autē singultientibus ruta cum uino, aut nitrum in mulsæ, aut fœli, aut daucum, aut cymini, aut zingiber, aut nepeta, aut nardus Gallica. Hæc quippe singulibus corruptione ciborum, uel perfrictione, uel plenitatibus deniq; cōtractis sunt auxilio. Sed qui singultum multitudini frigidorum ac uiscosorum humorum acceptum referunt, his castoreum trium obolorum pondere ex posca propinandum, idem cuti unā cum oleo ueteri sicyonio applicatum, conducit. Ex re quoq; fuerit acetum scylliticum, aut oxymeli haustum. Detentio deniq; spiritus, magnificè opitulatur.

Quæ in febribus circa aluum astrictam & lubricam obseruanda. Cap. 58.

Quæ aluum siccum excitent, libro superiore, quantum res postulare uidebatur, memoratum est. Quoniam autem et humectari

humectari hanc in febribus contingit, de ea quoq; in præsen-
ti differendū arbitror. Bona quippe hominū pars non febris ra-
tione, sed ex hoc duntaxat symptomate mortua est. Principiū
igitur fluxum dimitemus, nullo remedio resistentes, quoniam
à corruptione & praua cōcoctione accidit. Vltra uerò natu-
ræ modum euacuatione facta cohibere aluum expedit. Atq; si
acriora quidē egeruntur, oportet alimenta quæ offeruntur, bo-
ni quodammodo succi, & aliās crassioris esse: è quorū numero
sunt chondri et ptisanæ sorbitiones. Lauacra in hac cōstitu-
tione post morbi concoctionē non sunt aliena. Quum uerò pi-
tuitosiora & ualde fluida deiciuntur, ediuerso cibi aridiores
& calidiores sunt, quatenus febres admittunt. Eius generis
sunt, quæ ex condimentis calidis cōstituuntur. A' balneis uerò
illis abstinendū, nisi quid aliud cogat. Debilitata uerò faculta-
te coctrice, alimentis & remedijs stipticis utendū est. Alimen-
tis sanē, quibus maximē mala punica aut poma cydonea aut
pira, aut mespila admixta sint, uel illis ipsis, & uino tenui fra-
grante, adstringēte. Remedijs uerò, cataplasmatibus puta ex po-
lentis & palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & eiusdem generis
materia. Considerandum autē uenit, quibus nam potissimū lo-
cis adhibenda sint cataplasmata. His inquā, quæ ad stomā-
chum, uel inferiorem uentrem attinent. Nonnunquā et lumbis
imponimus. Cruentis porrò deiectiones compescunt medica-
menta è thure, atq; desiccant. Aut tenuissimus farine flos, aut
pollen, cū thure, uel māna, in uino macerata, aut posca. Acro-
rem uerò humiditatē, etiam cenemate edulcato, quādoq; aqua,
quādoque ptisanæ cremore, aut chondri, aut oryza, aut tragi-
herbæ, non semel quidē, sed identidem. In posterum uerò rosæ
quoq; aridæ, aut myrti attextentur. Nonnunquam & gallæ,
ouum item unā cum rosacco, aut uino tenui adstringēte, aut ro-
sarum decocto infusum, uel sedi modo imposuim, excernendi
promptitudinē retundit. Vbi uerò crebrior desidēdi libido im-
petit, agathiū è spissamētis calentib. sedi conformatū inycito.

Quoniam distillatio uniuersi corporis uel capitis redundans
etiam notat, ex compressu, aut densitudine proueniens: largior
quoque excretio ad laxandam atque diminuendam succorum mul-
titudinem idonea est. Cōsonum uerò est, inde ipsam moliri, un-
de natura proruperit. Hæc accurata mecum perpensione re-
uoluens, in quartanarum distillationibus non dubitavi narium
uisa de more cum typhæ sauciare: neque tamē exiguo sanguinis
effluxu contentos esse oportet, sed habita uirtutis ratione au-
ferre. Spontaneas uerò in febribus narium sanguinis profusio-
nes decretoriè quidē factis, boni consilio, sed immodicè per-
manentem sanguinem cohibere tentato. Extremæ itaque ante
omnia partes uinculis ualidè excipiantur, æger sublato in al-
tum capite figurabitur. Videtur etiam præputij illigatio pecu-
liariter sanguinis ex naribus eruptionem cōpescere. Noli au-
tem uel emungere, uel locum irritare. Sed in grumos sangui-
nem coalescere finito. Nares uerò spongia in posca macerata,
infrigidentur. Cuncolum ex panniculo, medicamēto quodam
sanguinis cōpescendi uim habente illitum, naribus stillantibus
insemito. Sed horum materiam, et aliam curationem de locis
affectis, sequenti uolumine fusius prosequemur.

De animi defectione. Cap. 60.

Qui ex cholera, alui fluoribus, alijsque permultis, ac subitis
euacuationibus, anima deficiunt, gelida aqua aspergendi, et
naribus apprehendendi sunt, os uentriculi perfricandum. Vo-
mitum præcipere, stomachum uellicare uel digitis, uel pannis im-
missis expedit. quin et pluribus uinculis ualenter uinciri de-
bent: facta euacuatione per inferiores particulas, manus per
superiores, crura. Prospicere etiā sanguinem fundentibus for-
mam situs sine dolore sublimē conuenit. Cucurbitula, contra-
rys quæ euacuatur partibus, retrahendi gratia, adglutinetur.
Medetur et uinum aqua dilutū resolutionibus ex immodicis
euacua-

euacuationibus ortis, nisi uiscerum inflammatio, aut dolor capitis uehemens, aut stupida quædam mentis affectio, aut febris adurens, in morbo crudo, prohibeat. Nam in his uinum ingentia adfert nocumenta. Quod si æstus fuerit, & temperatura calida, & potare laborans frigidum potum assuetus, frigidum exhibendum est uinum: sin contraria, calidum. Ex sudoribus uerò nimietate animo deficientibus, cutem, ueluti antea mihi dictum, densare oportet, & aeris perspiratum aliquem frigidum præparare. Cæterum defluxionibus in uentrem nihil horum congruit, præterquam quæ uentri, stomachoq; firmando sunt, adhibere, & affectos lauare: quoniã illiusmodi in uentrem fluoribus lauacra, ut omnium sunt accommodatissima, ita & sanguinis eruptiones atq; sudores ubertim proripiunt. Qui præ multitudine, animi deliquio corripiuntur, uino ciboq; abstineant, & lauacris si febricitent. Mulsæ autem potionis loco propinatur, in qua aut thymus, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum elixum sit. expedit præterea oxymeli. Quod si ex prauis humoribus in stomacho contentis animæ deliquium inciderit, hydrelæo digito uel pinnula ori immisso, uomitionem elicere impera. Si uerò nequeant uomere, oleum quodq; præstantissimum potui exhibendum. Hoc sanè per aluum quoque sæpenuerò euacuat. Absinthii item talib. succurrit. Deinde si propter stomachi imbecillitatem animam perdiderint, ijs stomachum corroborantibus utendum, quemadmodum iam pridem mihi in capite eidem dedicato proditum est. Extremas adhuc partes confricare oportet. Exustos in balneum ducere. Perfrigeratis uerò diatrionpipercon, uel ipsum piper exhibere. Iam uerò ex immodico calore siue æstu, siue diuturniore in balneo mora, animam perdentibus, medetur aqua gelida aspersa: mox si aeris flatibus exponantur, deinde frictione stomachi, ab hoc uini & cibariorum usu. At si quis ob uastitatem inflammationis, aut malignam febris affectionem in accessionibus, animo fathiscit, & perfrigerantur artus, acriter ualida

H 5 frictione

frictione fricato, foueto atq; uincito, uigilias cibiq; abstinentiam indicito: hæc quippe & ante paroxysmum sunt exequenda. Quos propter siccitatem animus deliquerit, his duabus aut tribus horis ante accessionem alimentum exhibendum est, aut chondri cremor, aut panis ex aqua, unà cum mali punici nucleis, aut malis, aut piris. Quòd si ingentis alicuius discriminis periculum sit, unum etiam ministrandum. Iis qui subito anima destituuntur, hoc pacto subueniendum: & ubiq; causam deliqui reputare conuenit, atq; huic unicè reniti. Nonnunquam uerò & symptomatis maior habenda est ratio, quòd quum aliàs periculum, aliàs mortem quoq; minitatur.

Hulceris os sacrum infestantis curatio. Cap. 61.

Febribus, præsertim diutinis, etiam hic affectus, ex diuturno decubitu superuenit. Cum igitur sacri ossis regio incipit rubescere, rotam egregiè magnam ex lana facientes, loco supponemus. Post hæc rosaceum uel myrtinum cerotum, cui spuma argenti, aut cerussa misceatur, superaccommodabimus. Phlegmone autem oborta, panem cum solano, aut sanguinali, aut plantagine, aut brassica tenella, emplastri modo applicabimus. Quòd si exulceratio depascendo serpat, lenticulam cum malicorio cataplasmati more imposito.

LIBRI SECUNDI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI TERTII.

In hoc uolumine uniuersi operis Tertio, de morbis secundum locos affectos sermo instituitur, qui à summo capitis uertice auspicans, ad infimum pedis calcaneum receptui canit.

CAPITA TERTII LIBRI.

De alopecia ophiassi, & caluitio.	unt malis	3
Cap.	1 De cephalalgia, quem capitis do-	
Quomodo capillitium cirratum	lorem uocant	4
reddatur, & tincturæ eiusdem,	De cephalæa & hemicrania	5
ex Cleopatrz de crispitudine	De phrenitide	6
in lucenda commentationib. 2	De phlegmone cerebri	7
De his quæ capitis cutem infici-	De erysipellate ipsius cerebri	8

LIBER TERTIVS.

123

De ueterno lethargo ue	9	e Tinaſmo	41
De caroch & uigilante comate	10	De dysenteria	42
		De colicis	43
De memoria & ratiocinationis	11	De ileo, gracilioris inteſtini mor	44
iactura, & Caro, & Morofi	12	De uertiginofiſ ſcotomaticis ue	45
De uertiginofiſ ſcotomaticis ue	13	De paſſionibus renum & ueſicæ	46
		De hepatis paſſionibus	47
De morbo comitiali	14	De cachexia, id eſt, prauo corpo	48
De melancholia, mania, & numi	15	ris habitu	49
ne afflatiſ	16	De intercute	50
De ephialte, ſiue incubo	17	De lienis affectibus	51
De Lycæone uel lycanthropo.	18	De morbo regio	52
De iis qui amore infaniunt	19	De prominente umbilico	53
De apoplexia, & hemiplexia at	20	que paralyſi	54
que paralyſi	21	De conuulſionib. ſeu ſpasmis	55
De conuulſionib. ſeu ſpasmis	22	De Terano & diſcretus eius.	56
De Terano & diſcretus eius.	23	De tremoribus	57
De tremoribus	24	De bubonocœle, enterocœle, &	58
Remedia quæ oculis ſalubriter	25	hydrocœle	59
adhibentur	26	De teſticularū inflammatione,	60
Quæ ad aures pertinent, & pri-	27	& ſcorti, aliisq; ipſorum paſſio	61
mo de aurium dolore	28	nibus	62
De paſſionibus nariū atq; olfa-	29	De gonorrhœa & oncirogmo.	63
ctus	30	De ſatyriaſi	64
Aduerſus faciei uitia, & contra	31	De priapismo	65
rugæ ipſius remedia	32	De infœcundis genitalibus	66
De paſſionibus oris	33	De h ulceribus pudendorum	67
De angina & differentis eius, i-	34	ani	68
tẽ de iis q angina, aut alia qua-	35	De paſſionibus uulux, & men-	69
uis ratione ſtrangulantur	36	ſtuorū primitus purgatiõe.	70
De grauedine, deſtillatione, rau-	37	De ſuppreſſis menſibus	71
cedine, & ruſſi	38	De nimia purgatione & fluxu	72
De orthopnœa, difficultate ſpi-	39	ſanguinis per uulua	73
randi, & diſpnœa	40	De muliebri profluio	74
De morbo pulmonis	41	De inflammatione & declinatio	75
De ſputo ſanguinis	42	ne locellorum	76
De ſuppuratiõe & phthiſi	43	De uteri abſceſſu	77
De morbo laterali	44	De h ulceratiõe uulux	78
De cordis affectuibus	45	De cancro	79
De mammæ affectibus	46	De ſcirrho & duritia	80
De axillarū foetore ac ſudore.	47	De mola	81
De morbis qui infeſtant ſtoma-	48	De inflatione	82
chum, præcordia, & uentrẽ.	49	De uteri ſuffocatione	83
De uentris inflatione	50	De procidentia uteri	84
De cholera	51	De præcluſione uteri	85
De lienteria & cœliaca affectio-	52	Sterilitatis curatio	86
ne	53	De rhagadibus & condylomatibus	87

De haemorrhoidibus uteri	75	De huiusmodi affectibus in plantis & calcaneis	79
De pariendi difficultate	76	Ad clauos callosos	80
De coxendicis affectibus	77	De unguium vitis, & primum de	81
De podagra & morbo articuli	78	reduitis	81

FINIS.

PAVLI AEGINETAE

LIBER TERTIVS, ALBANO

Torino interprete,

Super eis quæ capillos intentant vitis, de Alopecia Ophiasis, & glabritate. Cap. 1.



Vemadmodum plantarum alia quidē humilitatis penuria inarescentes emoriuntur, nonnullæ uerò asciticijs, sibiq; contrarijs humoribus suffocantur: ita & in hominis cæsarie usu subinde uenire conspiciamus. de fædione enim humoris glabreta: ex succis autem prauatis, Alopecia & Ophiasis, figura inter se duntaxat dissidentes, cōsurgunt. Hæc enim locum capitis affectum ad instar anguis glabrum describit. Alopecia uerò à uulpibus, quod eo frequentissimè id animantis malo confluetur, nomen est inditū. B. cutis igitur colore, redundantem humorem cōiectantes, euacuatione primitus, quæ medicamētis purgantibus fit, deinde quæ parti extrinsecus injiciuntur præsidijs utemur. Proinde ubi ad nigrorem admodum, aut candorē plurimum color uerxerit, cum hieræ antidoto, non tam pituitam quàm melancholicum quoq; humorem uacuare potente, expurgemus. Si uerò pallori propius accesserit, ei quæ ex aloë conficiuntur, globuli exhibendi sunt. Quorum uniuscuiusq; descriptionem in compositorum medicamentorū uolumine comperies. Post uniuersi uerò corporis euacuationem, apoplegmatisimo, nō semel modò, sed crebrius ex aceto, sinapi, melleq; composito, utendum. Conducibilius uerò multo, si in aceto origanum quoq; aut pulegium, aut thymus, hyssopus uel maceretur.

tur. Quin & in cæteris quæ caput infestare solent affectibus, eadem methodo utendum: ante omnia superabundantem succum, uel purgandi facultate præditis medicaminib. uel sanguinis detractiōe, euacuantes, si modò sanguinis plenitas non desit. Sic deinceps ad localem medendi rationem procedendum.

De Alopecia.

Caput prius nitro confricatum, linteoque aspero, lanceo præsertim extersum, adque ruborem usque confricatum, uerbenaca in sole cum aceto contrita perunge: aut halcyonium asperrium crematum & laeuigatum cum oleo ex lucerna obline: aut arundinis radicem, aut corticem amygdalæ amaræ cōbustam, oleo seu adipe ursino exceptam illinito. Mediocria quidem hæc sunt remedia: efficaciora uerò, quæ euphorbio, aut thapsia, aut adarce, oleo detrita laurino, aut liquida pice constituantur. Aliud: Testis erinaceorum marinorum combustis adipe ursina exceptis, locum antea nitro detersum perungito. Aliud: Piperis, stercoris ouilli aridi, irionis, seminis ericæ, singulorum drachmæ quatuor, ueratri candidi drachmæ tres, muscerdæ drachma, bile taurina, aut hircina, uel suina excipiantur.

Aliud aduersus Alopecia, experientia comprobatum:

Mandragoræ radicis, aristolochiæ, radicis ari, ceræ, picis liquidæ, cuiusque congij octo, axungie porci subrumis, rhododendri herbæ meditullij exiguum. axungiam & rhododendron, donec herba liquefiat, coquito, deinde glomeratam herbam abijcito, cæteræ axungie confundito, & elixato: postea ceram ac liquidam picem adijcito, mox audacter in sole utitor: cumque; hucera cicatricem contraxerint, caput uulpis combure, & alcyonium, anchusæque; nigre folia, omnia contusa unitioni inspergito, quo caput pilis uestiatur. Aliud: Murini capitis cremati pars una, testarum marinarum tantundem cum axungia porcina: omnibus in fidelia decoctis, in usum inspergendo adhibebis. etiam ipsæ aridis utitor.

Medi-

Medicamentum e thapsia ad omnes diutinas affectiones.

Buphorby, thapsia, baccarum lauri, uniuscuiusq; uncia, sulphuris uiui uncia media, ueratri tantundē, cerae unciae sex, olei laurini aut rhicinini, aut ueteris, quod satis est. In robustioribus adijcitur Nasturtij uncia, balcyony combusti uncia. Neque hoc medicamentū ad alopecia tantūmodo, uerū ad quācūque etiā in ueteratam perfrictionem confert. In uniuersum uerō in alopecijs prius frictione & abstersione ex nitro utendū, & rasione capitis continua: complures equidem noui, qui sola frictione & assidua rasura capillos plantabant.

Ad glabreta, & capillorum augmenta, ex commentariis Critonis.

Leporum uētriculos quinq; aridos, accuratē in uase testaceo torrefacito, quibus adijce tertiam partē uirgultorū myrti, acaciae fructus, acaciae cremoris, rubi canini, par pōdus: adiāti uncias tres. his omnib. in tenuē farinā contusis, attamina tenui cribro: deinde adijciens adipis ursinae libras quatuor, & phocae tantundē, denuō contunde, et excepta in pyxide plumbea reconde. sed ad usum, quocūq; uidetur hedysmate diluito.

Quibus conferuentur capilli.

Polytrichi partē unā, ladani partes duas, uno oleoq; myrtino excipe, & utere. Aliud: Anemones florē tritū cum oleo illinito. Sed hic quoq; nigrore inducit. Aliud: Verbenacae rectam cum radice exiccata & contusam, exilibus foraminibus incerniculo attamina, admixtaq; tāta olei quantitate, quantā ad sordium crassitudinem inducēdā satis est, in uas æreum reponito: & cum subacta tabuerit, pro oleo similiter utere.

Aqua capillos augens, & nigriores reddens.

Aquae coelestis xestas sex, rhus Alexandrini xestas tres, polytrichi, herbae sabinae singulorum uncias quatuor, ladani unciam, myrti unciam, cucurbitae aridae tantundem, in uase uitreo per dies uiginti macerato, mouēs bis in die rude tedacea. Sequenti uerō tēpore pilis in aquā singulatim demersis, utere quotidie.

quotidie. Semen quoq; altheæ in balneo illitum, capillos non tam conseruat quàm augmentat. Pari modo & oleum illitum in quo ipsum semen altheæ elixum uel impositum sit.

Quæ comas extenuant.

Fici foliorum, uitis syluestris albæ corticis, pumicis, testarum buccinorum, cretæ cimoleæ, singulorum mina, omnibus fidelitæ nouæ ac crudæ impositis, & luto oblitis in fiduli uase, decoquito & cõterito, spumæ nitri adyiciens minâ dimidiam, gallas immaturas triginta: quib. liquefactis, eximito et utere. Aliud: Spumæ nitri minis septē, pumicis tosti minis quatuor, aluminis scissilis, iridis aridæ, myrti syluestris nigræ, gūmi, bryoniæ radicis, uniuscuiusq; drac. quatuor, lupinorū crudo rū in pollinē redactorū cōgy parte quarta utere sine pingui.

Ad profluium capillorum.

Aloē cum uino nigro, austero illinito, aut purpuræ operi menta cum oleo coctæ, & myrrham & ladanum cum uino aut oleo myrteo, aut finium caprillum in testa combustū cum oleo dilue, capitiq; nouacula raso inunge.

Qui capillitium cirratum reddatur, & tincturæ eiusdem, ex Cleopatrz libris de crispitudine inducenda. Cap. 2.

CApite prius absterfo, radice uerticillaris herbæ capillos cum mero oblitito. Aliud: Raso deterfoq; capite, pineam nucem recentem, in cinerem usq; cõbustā, pilæ inditam cõterito, unguentoq; myrteo ad mellis usq; crassitudinē super infuso, sic caput oblitito. Aliud: Pili myrtorum & betæ pari modo cum oleo absterguntur. Aliud: Gallas uiginti, adianti uncias duas, aqua marina usq; ad mellis densitudinem coactas inunge: sed deterfo prius urina capillitio, aut lixiuio & calida aqua abluto, pilos hoc medicamine biduum perungito: ubi tãisper cõtinuerit, tertio die ablue, exiccatosq; oleo myrteo perline. Hoc quippe delicatam, & crispatam, & nigram reddit casariem. Crispior autem euadet, si prius capita nouacula raso, isthoc utare.

Quæ

Quæ canos arcent, & nigrorem inducunt.

Olei ex immaturis oliuis expressi sextarios treis. spica nardi denariū, conchula Indica odorata, iunci odorati floris singulorum denarios quatuor in oleo coquito, atq; seponito, acacia cremoris unciū uino dissolue, & accuratè lauigato: quando uerò olei tertia pars fuerit relicta, hanc percolato, & confundens acacia sitella excipito, atq; inungendo capiti utere quoti die. Aliud: Nucum uiridium corticis, radicis ilicis, cuiusque quadrans, uini nigri sextarij tres, ad tertias decoquuntur, succusq; expressus cum olei myrtei sextario contundiur, utendum eo est quotidie.

Aqua capillos denigrans.

Gallæ sextarium, rhubarb coriaria, myrtorum nigrarum, foliorum cyperi, uniuscuiusq; sextarios duos, cinara quantū manu comprehendi potest, papaueris nigrorum in floribus capitulorum æqualem mensuram, aquæ putealis sextarios duodecim, pluribus antè diebus maceratas ad tertias coquito, deinde illinito. Deterfis prius et exiccatis crinibus, creta cymolie quartam partem cotylæ, & calcis uiuæ æqualem mensuram illinito. Hæc succo betarum elixatarum dissoluta inungito, deinde betæ folia operculi causa superimponito: & ubi satis sic perennauerint, in lauacro expurgentur.

Quomodo rufi capilli tingantur & flauescant.

Myrrhæ partem unam, salis floris tantundem, accuratè friato, & inducto strigmentorum balnearum crasso lentore, absterfoq; prius capite, medicamento capillos inunge, atq; sic inherere cum sua nocte diem finito, deinde ablui præcipito. Aliud: Lupini crudi cum aqua illiniuntur. Aliud: Ex spuma argenti drachma, Creticæ terræ drachmis quatuor, calcis uiuæ drachma, aquam lentam sordium crassitudinis conficiēs, capillos perunge, & betæ folijs per biduum aut triduum iniecis, inde abluito.

Vt nigrum capillitium flauescat.

Eccem uini strigmento balnei excipito, & cerati crassitudine

tudine inducā, somnum inituro illinito, & mane capilli fului apparebunt. Aliud: Cyperi folijs in cremore struthij maceratis, eo diluto utere.

Tinctura auro similis.

Auri instar colorem faciunt, aluminis denarij sex, sandarachæ tātundē, croci denarij duo, thapsi qua tinctorum utuntur (quam Romani herbam rubiam nuncupant) denarij octo, lixiuij pilcariorum denarij quatuor. Coquito autem lixiuium & thapsum contusam, & dimidiata parte cōsumpta, exprime liquorem, in quo alumen, & sandarachā, & crocum dissolue, mox inijce uasi uitreo, & in necessitate, detergo prius capite, oblinito. Cum autem imbibitum fuerit, fœnogræci, & hordei, & cymini aqua tepida sufficiente ablue, inijciens & saponis quantū satis est. Aliud: Fece uini cōbusta, & oleo balanino simul confusis, capilli inungantur. Aliud: Sapone quoque Gallico abstergēda sunt singulis balineis comæ. Aliud impendiū utile: Rhubarbū rubentis sextarium, gallarū sesquilibrium, celidrii uncias duas, herbæ aurescētis (quā rubiam ducunt) uncias duas, polytrichi fasciculos duos, absinthij fasciculū. Lupinorū delibratorū cyathos duos, aquæ sextarios septē, in uase uitreo excipe, finitoq; nouē integris diebus macerari, rudiscula mouēs bis quotidie. Vbi usus uenerit, tolle quod sufficit. In hoc spōgiā intingēs, capillos perfrica, humectosq; finito imbibere. Vbi uerō aruerint, sapone cadida aqua liquato, ablue.

Vt capilli candidi reddantur.

Verbasci albi florem crematum, aceto irriga, & confunde saponi. Aliud: Verbasci seminis, aluminis, raphanorum corticis, cuiuslibet denarium contunde, & taurini glutini quatuor drachmas commisceto.

De porrigne & affectibus capitis cutem deturpantibus. Cap. 3.

Porrigo (quam pytiriasim Græci dicunt) est tenuium furfuracearumq; squamularum ex capitis ac reliqui corporis

ris superficie, nulla relicta exulceratione, decidua resolutio. Prouenit uerò id uitij subeunte caput prauo corporis humore, falsæ pituita, aut bilioso & atribilario sanguine. Euacuato itaq; prius uniuerso, seu prodiū est, corpore, subscriptis remedijs utendum. Cretam cimoliā aqua maceratam betæ cremori cōfundito, atq; furfurationi illinito; & donec aruerit, illitum absterere permittito. deinde loco infecto abluto, thure cū uino & oleo trito denuò perunge. Postera uerò die staphida syluestris, hoc est, herbam pedicularem, cum oleo illinito. Aliud: Nitri, fecis ustræ, gladium unguentariarū, uniuscuiusq; libra, herbæ pedicularis libra una & dimidia, uino dilutis caput absterge. quod si alia corporis pars prurigine infestetur, aridis. Humidiores uerò capitis furfurationes salsugine abluto, aut lupinorū decocto. Huius equidē summū experimentū habeo.

Psudracia & exanthemata capitis.

Psudracia exiles sunt capitis excrescentiæ, pustulis similes, quæ summā cutis superficiem exasperant. Exanthemata uerò summæ cutis pustulæ sunt, & exulcerationes subrubræ atq; salebrose. Vtriq; tamen uitio his quæ deinceps subordiantur, remedijs succurritur. Spumæ argenti, cerussæ, singulorum drachmis quatuor, aluminis duabus, foliorū rutæ uridium totidē, aceto myrteoq; oleo cōtritīs, cuti illinito. Aliud: Rutam & alumen mellæ leuigata, derafo prius capiti illinito. Si uerò abscessibus capitis cuticula infestetur, oliuæ folia cum melle elixa cataplasmatīs modo impone. Aliud: Spumæ argenteæ, cerussæ, singulorum uncias duodecim, sulphuris ignem non experti drachmas octo, cerota myrtea excipito.

Ad hufcuscula capitis densa & rubea.

Sunt hæc perexiguīs admodum papillis similia, è quibus aquosi sanguinis humores eliquantur: derafo antè nouacula capite, & aqua nitroq; deterfo, sulphure uiuo cum lotio humano diluto, utendum. Vel atramētum metallicum cum aceto capiti illinendum.

De

LIBER TERTIVS.

De manantibus capite h ulceribus, quæ Græci
achoras dicunt, & fauīs.

131

Vna quædam in capitis cute affectio consurgit, quæ Græcis achor nuncupatur, Latinis manantia hulcera, tenuissimis foraminibus cuius perforatis, è quibus uiscida sanies excernitur. Haud sanè dispar huic figura et aspectu mali est, quod cerion, hoc est fauū dicitur, quoniam foraminibus amplioribus terebratum, quibus mellis instar humiditas perinde atque in apu fauis continetur. Cæterum originē ad nitrosam, salsamque pituitam referunt. Melioris igitur succi cibo uesci, acri salsoque omnino abstinere conuenit, præsertim si inflammationē redolet affectio. Et post cōuenientiē superuacanei euacuationē, derafo prius capillamēto, caput his aut ter, aut multo sæpius aqua calida in qua elixata sit myrtus, aut rubus, aut lens, aut amari lupini, aut asparagi radix, foueto. Si multa uis saniei erūpat, folia salicis cū aqua aut lēticula inducito. Illinitiones autē cretæ cimolia, aut Cretica, aut rubrica Samia, aut pompholyx, aut spodiū, aut spuma argēti, aut cadmia, aut charta cōbusta, constituant, aut quæ ex charta cōcinnatur cōpositio arida, omnia cū aceto admixto. Smegmatis præterea usus probatur, quod sulphuris, herbe perdicij, saponis, æquali mēsurā cōstat. Composita medicamēta hæc sunt: Spumæ argēti drach. sedecim, foliorū rutæ octo, herbe pedicularis syluestris quatuor, atramēti sutorij duæ, cū aceto & myrteo redigantur in sordiū balnei crassitiem, & illinantur. Aliud: Sandicis drach. quatuor, myrrhæ tantundem, sulphuris uiui drachmas duas, mannæ quatuor, cum oleo ueteri inducito.

Ad achoras.

Qui foetidis id genus hulcusculis infestantur, argenti recreamento, uel plumbagine cōtrita oblinuntur. Aliud ad achoras, & humidæ pforas: Rosarū rhododaphnes triens, sulphuris uiui tantundem, picis liquidæ, picis aridæ, singulorum quædrans, ceræ selibra, olei myrtini quantum satis est. In puerorum achoris, ea in lacte dissoluta illinantur.

L 2

De

Ficus autem nuncupantur germina hulcerosa, rotunda, subdura, subrufa. quæ comitatur etiam dolor. Oriuntur uerò hæc magna quidem ex parte in capite, sed & reliquo itidem corpore. Præstantissimū ad hoc remedium, alumē scissile, & flos aris assatus, & glutinum quod ex taurorum tergoribus confit æquali pondere: cum aris squamulæ duplo trita, cum aceto illinito. Optimum præstant auxilium, balecularū (quas matridas Græci nuncupant) capita cremata, bulbi itidem elixi, & cinis denique cum aceto temperatus.

Contra capitis & menti ficosa exanthemata, Xiraphion.

Misyos drachma una et dimidia, chalcitidis drachmæ duæ & semis, squamulæ aris drachma, aluminis scissilis tantundem, probè loto aridū superaccommodatur, & dimittitur. Postero uerò die cū denud lotum sponsa exterseris, idem imponito. Decidit enim ramentū densissimū: & si rursus diebus sequentibus idē fiat, absq; ullo cicatricis uestigio sanatur. Neq; uerò mediocriter hoc medicamentum adglutinatur, hæretq;.

Ad pediculationem capitis, quam phthirian Græci dicunt.

Qui pediculantur in capite, lupinorum aqua decoctorū diluto abstergantur. Aut uuam taminiā, aut sandaracham siue utrāq; leuigatā cum oleo ueteri acetōue illinito. Aut piperis perexiguum, ne exulcerationem inducat, cū oleo, aut hedere cremore cum melle, aut minium synopicū cum aceto. Aut cedrinum liquorē, aut picē liquidā cum alumine, aut baccarum lauri succum expressum siue oleum deniq; raphaninū applicamus. Cæterū nos syluestrem herbā pedicularē aceto & oleo leuigatam induximus, & semper uoti compotes facti sumus.

De capitis dolore, quam cephalalgian Græci nominant. Cap. 4.

Dolor capitis, quam cephalalgian nuncupant quidam, ex difficillimis casibus existens, aliquando ex sola qualitate distemperata, quandoq; ex humorū nimietate, nōnunquam ex utriusq;

utriusq; culpa consurgit. Est quando ex primitiua causa, puta, qui foris accidit aëstu, frigore, temulentia, idu. Grauißimi igitur capitis cruciatus, ex aëuiis qualitatibus proficißcuntur: maximè uerò præcalida. At qui ariditatē sequuntur, non tãta uiolentia sæuiunt. Humida uerò qualitas omni planè sui ipsius respectu dolore uacat, nisi calori, aut frigori, aut humorū plenitati coniuncta sit. De eo capitis dolore qui febricitantes infestat, in superiore quidē uolumine, cui de Febris est inscriptio, satis differuimus, in præsens de alijs uerba facienda sunt.

De capitis dolore, qui ex calore gignitur.

Qui ex aëstu capitis dolore torquentur, corū cutis tactu calidior, & primò statim manus iniectu aridior percipitur, oculiq; rubicundi sunt: frigidis cōspersionibus, & inunctionibus delectantur, et earū beneficio dolore leuātur. Cæterū illis eadē curatio, quā caput ex febre dolentib. præscripsimus, quadrat. Perseuerante autem capitis dolore, subscriptis utendum cataplasmatis est. Conducit fronti & temporibus applicatus panis ex posca, & rosaceo, aliquando cum amygdalis, aut roseis uel aridis, uel tenellis, aut menta cum pulegio admixto, aut panis cum persici folijs. Valet etiam ocinum cum aceto & rosaceo tritū, aut hederæ corymbi in aceto elixi. Cōducit etiam subactam rosaceo, aut serpilli aqua decocto triticeam farinam miscere. Cardamomū quoque in sartagine frictū, acetoq; & rosaceo tritum expedit. Aut fermentum cum rosaceo, aut iris arida cum aceto. Iugiter uerò unumquoduis horum mutato: nam uetustate efficaciam suam amittunt.

Pastilli aduersus cephalalgiam e calida intemperie.

Croci drachmæ quinque, chalcanti drachmæ decem, aluminis sedecim, myrrhæ septem, omphacij, chalcitidos, gūmi cuiusq; drach. tres, uini austeri quantū opus, utere cum posca. Quod si uigilia quoq; his accedat, tū somnificorū quippiā applicato.

De caput ex gelida intemperie dolentibus.

Qui ex frigore, capitis dolore impetuntur, diuersa his qui

l 2

ex

ex aestu afficiuntur, indicia præferunt. Facies enim uero ipsorum non cōcidit, sed per pallida est. Frigidis neq; delectatur, neq; adiuuantur: uictus uerò ratio, & cætera concurrentia horum stabiliunt agnitionē. Inungatur itaq; oleū rutaceum, laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut balsami succus, maximè si cum crassiora, tum uiscosiora fuerint retrimenta. Hūc frōte tenuis, & hoc liquore, & medicamentis quæ ex pipere & euphorbio cōcinnantur, oblini conuenit. Vinum tenuiū partium exhibendum. Motui quoque corporis indulgere, & lauacris nonnunquam calidis operam dare præcipito. Aliquando, quæ raphanis cietur, uomitione utendum. In quibus uerò qualitas absq; humorum plenitudine perseverat, illo medicamento uictor: Piperis candidi drach. duæ, crocomagmatis drach. totidem, euphorbiæ recentis drach. octo s. stercoris colūbini drac. una s. aceti accerrimi quantum satis est. affectam partē, confricatam prius oblinito.

De dolore capitis ex biliosis humoribus orto.

Signa horum consimilia habentur ijs, quæ eundē affectum ex insolatu natū portendunt. Accedit autē ipsis morsio maior, & pallor faciei, nonnunquā oris etiam amaritudo. Consuevit autem hæc affectio ætates potissimum in uigore consistentes, temperamenta calidiora, & uitā solitudinibus anxiam, & bilem coaceruantes flauā, inuadere. In horum propterea curatione, lauacris tēperatis, inunctionibus, aquosis potionibus, & uniuersa uictus ratione humidiorē, & boni succi utendū. Eucuarē præterea biliosum humorē absinthij diluto oportet, siue cum aloë, & ipsius picræ antidoto per se, aut cum momento scammony, uel confectis ex aloë globulis. Inungēda etiā frons uel croceo pastillo, uel trigono, uel alio quodam compari.

De capitis dolore per consensum.

Si uniuerso corpori caput cōpatiendi ratione condole scat, magna industria contra distemperamentum, contraq; exuperantem materiam certandum est. Si plenitudo urget, & præcipue

eipue in uenis, per incisionem uenæ sanguinem detrahemus. Sin modū qualitas magis transilierit, purgatorio utamur medicamento. Si consortij lege particula laboranti cōpatiatur, uerbi causa, iocinori, aut uētri, aut stomacho, hisce succurrēdū est. Si calida quidē subsit intēperies, panē ē uino aquoso suppe-
ditantes, aut ex chōdro, sorbitiones. Extrinsecus adspergines modicē infrigidantes, roburq; inducētes, ueluti antea demon-
stratū, superfundēda sunt, at si uiscidi ac crassi humores stoma-
cho impacti, dolorē capitis inuexerint, illos etiā, acetosum mul-
sum tū simplex, tū iulianū miscētes, amouebimus: ex hyssopo
in super et origano remedijs, et his adhuc maiore calfaciendi
et incidēdi ui præditis. iam et quæ cū raphanis elicitur uomē-
tio, infusiones itē ex alto calidiores, et cataplasmata proficiunt.

De capitis dolore ex ebrietate.

Si uinum adhuc crudum in uentriculo fluctuat, aqua tepente potui data, uomere præcipito. At si post concoctionem quoq; caput doleat, refrigerantia et reprimētia profunt: cuiusmo-
di est rosaceum per se, uel cū aceto, aut succo hederæ, seu bras-
sicæ. Iam eius herba quoq; folia in aqua calida macerata, ca-
pitiq; imposita, fasciāq; circūligata, naturæ aptitudine ebie-
tati aduersantur. Quin et ipsa brassica elixa est uti uoluit. Lēs
in super sumpta, his opitulabitur, potissimē humido uētre præ-
ditis. Alicæ porrō, malorum puniceorum, malorum cotoneo-
rum, pirorumq; esus, et aquæ potus, salutares sunt.

De capitis dolore ex idu.

Capitis dolore ex idu laborantibus, nisi in summa modō cu-
tis superficie læsi uideantur, continuō uenā secābimus. Vincit,
caput largius subinde superfundere, oleoq; dulci irrigare, et
ipsum lanis cooperire. à uino et solidioribus cibis, præcipuē
si febris comitetur, et agri coercendi sunt: et omnia breuiter tan-
quam ad inflammationem neruorum partium, et in primis
membranarum cerebri, commodē aptemus. Porrō ubi uulnus
illatum fuerit, et huic conuenientes suppetias dispiciemus.

I 4 Malagma

Malagma ad capitis dolorem.

Ceræ drachmæ septē, olei amygdalini quadrans, terebinthina drach. octo, eruginis rasa, cretæ cimolice, chalcitidis, singulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ treis: æris adusti, squamæ stomomatis, uniuscuiusq; drach. dua. Verum ubi durius paulo esse uidebitur, amygdalino emolliendum est.

De cephalæa & hemicrania. Cap. 5.

VTerq; hic affectus ægrè cedens, ac continuus capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, luminis splendore, uini potu, & implentibus caput odoramentis cōcitatur & acuitur. Horum quidam totū caput percuti, alij uerò alteram modò capitis partē autumant, quos hemicraniacos nominant. Et quibus intra caluariam affectus cōsistit, is dolor usq; in oculorum radices penetrat. Quibus uerò extrā existit, hos circa caluā dolor impetit. Cū grauitate itaq; dolores, humorū multitudinem arguunt: cum morfu uerò, uel humorum, uel uaporum acredinem: cū pulsationibus autem infestantes, phlegmonen, sed cum extensione: siquidē sine grauitate percussuq; spiritus tenuis & uētoſi copiā indicat. Sin uerò cum pulsu, inflammationem membranosi corporis insinuat. Si cum grauitate, plenitudinē intra membranas comprehēsam declarat. Cæterū si quādo putris etiam humor feruentior redditur, unā cum febre dolorē capitis patiuntur. Febricitant autē omnino, qui ob phlegmonen dolore afficiuntur. Corpore igitur uniuerso singulis ex æquo humoribus redūdāte, uenā aperire, & stimata languentis uirtute, et clysteribus acrioribus uti expedit. Si adhuc sanguis modū transilire uideatur, nariū uena etiā ad aperta, quantū satis esse uideatur, euacuabis. Mox hieram acutā exhibebis. ab hoc, est apophlegmatismis utendum: deinde & per nares exinanitiones probātur, per ea quidē quæ naribus infunduntur, errhina Græci uocant: cuiusmodi est elaterij succus cum lacte infusus, siue in farinam friatum elaterium, naribus inspiratum: & cyclamini porriq; succus. Composita sunt quæ sequuntur.

Errhinum

Errhinum ad diuturnam cephalæam, & ophthalmiam,
& comitali oppressos.

Nigellæ drachmæ octo, salis ammoniaci quatuor, elaterij
totidem, tritas oleo sicyonio, aut irino, aut cyprino excipe,
ita ut cerati consistentiam induat, & naribus indito.

Medicamentum pituitam extrahens naribus inspiratum.

Rapi, seu umbilici terræ aridi drachmæ octo, nitri rubicun
di drachmæ quatuor: sed si nitri loco elterium inijcias, multo
præstantius erit. pulvis eius naribus per arundinem insuffla-
tur. Vtere præterea epithematis circa caput, & unctionibus,
si uetustas morbum magis occuparit, sequentibus.

Epithema ad cephalæam.

Vngenti irini, peucedani, castorij, singulorum denarius,
baccarum lauri denarij duo, uirgultorū rutæ denarij quatuor,
cum cerato rosaceo excipiuntur, derafoq; capiti, uniuerso im-
ponitur. Mulier quædam in hemicranicis sequenti usa epithe-
mate, omnium ferè per ora claritate nominis uolitaui. Radi-
cem cucumeris syluestris uiridem in tennes portiones dissecas,
pariter et absinthium in hydrelæo, donec tabesceret, decoxit,
& hydrelæo quidem calido mediocriter partem affectam in-
spersit: radicem uerò cum absinthio in pollinè redactam, empla-
stri more imposuit: quo solò medicaminis præsidio, omnem he-
micraniā siue cum febre, siue absq; febre, curauit. Quod si ex-
acerbatio adeò magna superuenerit, ut nequeat tolerare dolo-
rem, utere his quæ lenire, & excrementa infestantia euocare
possunt. Cuius generis est quod proximè dicetur.

Vnguentum pro cephalæa.

Liquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymæ papau-
ris, anisi, alterci, croci, myrrhæ, scāmomiæ singulorum drach-
mas duas aceto excipe, & in pastillos redige. Cum usus uene-
rit, cum aceto aut posca, his qui crassis humoribus aut flatulen-
tis spiritibus dolorē adscribunt, illinito. Et dropace cōsimiliter
unguento, & sinapismo utendum, quiq; è thapsia constituitur
I 5 orbiculo.

orbiculo. Pastillus præterea ex atramento scriptorio peradmirandum in hac causa habetur remedium: quo post hæc omnia, quemadmodum infra in opere de cõpositis dicitur, uicidum est. quin & illud admiratione dignum, in illis qui dimidia capitis parte propter crassum & uiscidum humorem dolitant: Euphorby partē unam, & castorij tantundem aqua excipito, & in aurē affectæ partis indito: ad hæc balneum ingredi præcipito: neq; longa in eo mora facta, ipsum assumant, & solito more lauabunt, eo quippe modo probatū experientia est. Neq; alienum sit, oleo eadem subacta auribus instillare: et quod ad ischiadicos inscribitur medicamentum, etiam diuturna cephalalgia & hemicrania implicitos ex toto liberat.

Ad hemicraniam ueterem.

Ally drach. quatuor, ceræ duæ: axungie ueteris, cantharidum, singulorum drach. duæ. Vesperī emplastri more impositum, per noctem adhaerere finito: mane uerò disrupta pustula, parygro appellato medetor. Aliud: Baccarum lauri cortice exutarū drac. duas. foliorū rutæ tantundem, sinapis drachmam, aqua maceratas cataplasmatīs modo illinito. Hoc uerò his qui ex frigida occasione conflantur, utilissimū est, aded ut semel modò illitū sub balneum, cõfestim medeatur affectui, ita quidem, ut à lauacro integræ sospitati restituat. Olei sabini libra, ceræ uncias tres, euphorby unciam, quo dimidiatam frontis partem, secundum tempora uidelicet ubi musculi sunt, illinito. In quibus uerò non multa frigiditas exuperat, gallæ & crocomagmatis æquales partes uino leuigatas inunge. Sed quibus calidi uapores humores'ue capitis dolorem inferunt, his medicamenta ex euphorbio non offeras.

Apophlegmatismus contra cephalæam.

Succi sinapeos, aceto & melle triti uncias quartuordecim, herbæ pedicularis drach. quatuor, pyrethri tantundē: cõtusa, cribroq; excussa, mixtaq; in sole gargarizato. Quod si ex bilioso humore aut intemperie quadā capitis dolor diutius perrennaue-

rennauerit, ijs quæ mox de cephalalgia præscripsimus, utendum. Si dolor ne his quidem auxilijs elidatur, neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus adplicatis, uisa per arterias facta fluxus distributione, non absurdum fuerit etiam post aures sectione arteriarum uti. Humidioribus uerò, balnea quoque naturalia magna utilitate adhibentur.

De agitatione mentis, siue phrenitide. Cap. 6.

Phrenitis, pāniculorum cerebri inflammatio, nunc quidem ipso cerebro pariter inflāmato, nunc uerò præter naturā caloris excessu in ipso existēte. Causa autem mali, uel sanguis exuperans, uel flauæ bilis humor existit: quādoq; flaua etiam bilis nimium torrefacta, iamq; in nigrorem tendens, unde grauiſſima phrenitis oritur. Nōnunquam cerebrū diaphragmati consortij lege condoleſcens, ex disseminatis in ipsum neruis afflictionem cōtrahit. Si uerò per summos urentiſſimarū febrium uigores, uel stomachi consortio, mentis alienatio accidit, non phrenitis, sed delirium modò hoc est. Comitatur autem peculiariter phreneticos magna quidē ex parte peruigiliū, nōnunquam turbulentus etiā somnus, ita ut exurgāt, exilient, & ceu furore perciti uociferentur. Cum risu quidē hi, qui ob sanguineū humorē præpollentem: cum temeritate uerò, qui propter flauam bilem insanunt. Quemadmodū ij qui atra bile uitium contraxerūt, immaniter et incohibiliter efferuntur, obliuiscunturq; omnium eorum quæ dixerunt & fecerunt, oculos sanguinolentos præferunt, & subinde lancinant, nūc quidem squallescentes, nunc uerò illachrymantes, et lippitudine cæcutientes. Redditur lingua asperior, ex naribus sanguinis profluvia oriuntur, & floccos auellūt, & festucas colligunt, & per omnem morbi curriculum acutè febriunt, febre in profunditate malignius latente: pulsus paruos et obscuros habēt, cum quadam etiā duritie coniunctos: accedit respiratio magna & rara, cerebro primogenia affectione laborante. Si uerò per consensum diaphragmatis rationis error oriatur, respiratio erit

erit inæqualis, conuelluntur sursum præcordia, et calore multo æstuât. Veluti cum phrenitis cerebri uitio cõcitur ardor, ruborq; subcruentus in facie cum uenarum extuberantia elucet. Quodd si bili pituitosus humor contemperetur, ut causam mixtam id malum, sic & appellationem habet compositam: uigilem enim somnum (quod coma Græci dicunt) appellant. In uniuersum quidem, bilioso præpollente humore, uigil phrenitis fit: insaniunt enim eiusmodi uigilantes. Pituitoso contra superante, somno ueluti grauiori sopiuntur: ipsumq; hoc malum antiquiores Galeno medici, Catochon appellauerunt.

Curatio phrenitidis.

Si languentis uires permittunt, uenam in cubito confestim incidere, & copiosius detrabere expedit. Quodd si delirans manum porrigere detrectet, aut licet hæc exerat, periculum sit, ne post euacuationē, iactata hinc inde præ furore manu, immodicam sanguinis effusionem incurrat, uenam in fronte secantes rectam, semel quod satis est, auferemus, clysteribusq; utemur ex oleo uel rosaceo cum cremore ptisanæ. Si uigilie superant, rosaceo aut oxyrhodino caput irrigato. Nonnunquam etiam capite prius aqua calida perfuso, medicamentum ex papauerum calycibus compositum propinabimus, nisi imbecilla uirtus prohibeat. Reliqua uerò uigiliarum remedia, ex superioribus huc transferenda sunt. Decumbat autem læguens in conclauitum luce tum tēperie mediocriter disposito, & diuersis imaginum picturis uacuo, quoniam hæc detertere solent: in quod non nisi acceptissimi quiddā necessarij ingrediatur, qui laborantē non importunē interpellent, & nunc mansuetē consolentur, nunc iusteriusculē corripiāt. Principid aut alimentum mulsu esto: mox deinde cremor ptisanæ, & ex chondro sorbitiones, cū suauī aliquo potu: uerbi causa, apomelite uel hydrorhosato, aut aqua rosacea, aut rhodomelo, uel dulci hydromelo. Nā hydromelum, quod ex Cibra exiguis uasculis importatur uinosum, uitandū est, in huiusmodi plus uocumēti quā uinum excitans,

excitans, et maximè in capitis affectionibus, et ante cōcoctionem. Lotum aqua panem exhibeamus. Intyba item, & lactucas elixas. Si immensus infestavit feruor, hæc cruda sunt exhibēda. Cucumeris item medulla, & peponis & dorycnij, & consimilium. Aqua uerò gelida illis abstinendū, potissimè si septi trāseueri consortiū affectionis causam deprehendamus. Quòd si lotium, ut par est, ob dementiam retineatur, calentis hydrelæi rore pedinē atq; uesticā fouebimus. deinde & digitorū manus innixu loca prementes, proritabimus urinæ profluiū. Calido præterea oleo reliquam corporis molem ipsis decumbentibus perungemus. & ne sursum uersus agitentur, pro uirili cauendum: siquidē opulēti fuerint, ministrorum custodia obseruentur: sin autē inopes, uinculis constringantur. Inordinatus quippe motus uirtutem debilitat. Alia quoq; ratione iam antea fortē pedes uinculis excipiantur, et antispasmi causa contredentur. Si autem lōgior ac pertinax fuerit affectio, ab illis quæ soporem inducunt, coërcendi sunt. Admiscenda sunt autē quæ capiti adhibentur adspersionibus diaphoretica, succus uidelicet mentæ, aut serpylli, aut nepetæ, aut rutæ. Errhinis præterea tunc utendum, sed post septimanam. si uiscera inflammata fuerint, ex semine lini, & hordeacea farina, cum hydrelæo formato cataplasmate, mitigemus. Ad hæc cucurbitulas leues, aut concisa scalpello cute, tum ijs ipsis, tum ceruici ac spinæ imponamus. Si corpus squalidum et torridū uidetur, et adhuc febricitet, balineis quoq; ex aqua potabili et unctione largiori utendum. Vinum tenue nullarū fermè uirū, uires recuperandi gratia propinandum: nullam ex ipso mentis alienationē, ut consentaneū est, oriturā sperantes. aut enim nō fit, quum adsit iam declinatio: aut iam facta facile desistit: aut remittēte morbo, gestationibus, & decenti uirium refecione utendum. Cæterū mente capti ad se reuertentur, si ebrietatem, iram, ciborum corruptelam, atque præ alijs omnibus, æstus solis fugiant.

De

De inflammatione cerebri. Cap. 7.

Cerebrum inflammatione oppressum, in tumorem saepe ad-
 dedo attollitur, ut testæ commissuræ distendantur: dolor
 grauissimus & diuturnus, cibiq; uehemens fastidium siue an-
 gor comitatur, rubor multus in facie cum tumore laxo, oculi
 proterui, exerti, et caput turgidum euadunt. Vena sic affectis
 incidenda, uasa cubiti euacuanda, ex naribus & uasis sub lin-
 gua suis sanguis exhauriendus. Vtere porrò ad capitis inflam-
 mationes, superfusionibus, cataplasmatibus item quæ tum hume-
 tandi, tum maturandi facultatem habent.

De erysipelate cerebri. Cap. 8.

Oritur etiam in cerebro erysipelas, cui obnoxius patitur eo-
 iusmodi: percipit cruciatum uniuerso capite, quasi in eo
 flamma exardescat, facies sub pallida frigescit, os inarescit.
 Ad hunc igitur modum habenti sanguinem detrahe, maxime
 de uenis linguæ subditis, quoniam malum leuius reddit. Frigo-
 rificæ præterea facultatis remedia adhibe, quibus in alijs pa-
 riter ignitis cum inflammatione rubedinibus utimur.

De ueterno, qui lethargus Græcis dicitur. Cap. 9.

Lethargus, cum itidem rationalis uis quædam noxa sit, eun-
 dem quæ phrenitis locum, cerebrum inquã, occupat: sed con-
 trariam habet materiã, pituitam scilicet, humidiorẽ & frigi-
 diorem, cerebrum irrigantẽ. Comitatur autẽ ueternosos lenta
 quædã & ignaua febricula, non admodũ mordax, cum dela-
 uone in somnũ profunda. Pulsus magni, rari, & undosi. Respi-
 ratio nimis rara & imbecillis, somniq; inuidum desiderium:
 inaduosi, & marcore quodam languidi sunt, ægrè uocantibus
 respondent, obliuiosi, desipientes, oscitant crebrò, & ore ali-
 quando distento manent, quasi id claudere obliti. Deijciunt au-
 tem per aluũ pleriq; humidiora, quibusdam uerò cõtrario mo-
 do uenter arefcit, lotiũ iumentorũ urinae similẽ reddunt. Non-
 nulli ex eis intremiscunt, & undiq; sudant. Ceterũ Caros ex
 eadem lethargi materia proueniens, eo tantum ab illo disidet,
 quòd

quoddam Carum febris uehementior præcedit, Lethargum sequitur: quodq; Carus alijs aliquod symptomatis superuenit, febrium puta exacerbationibus plerūq; & comitialibus, & coarctationibus cerebri, nūc quidē fracta caluaria, nūc uerò membrana anteriorem cerebri uentriculū ambitu seruante oblata. Verū lethargus peculiarem quandam cōstitutionem habet.

Curatio lethargi.

Si uires agri permittunt, etiam hic uena incidēda est: si non concedūt, acribus clysterijs utemur. Decumbat æger in ædibus amplis, et mediocrē lucis splendorem obtinentibus: caput olei imbre fouendū, cui adiectum sit castoreū. Neq; desunt, qui olei loco oxyrhodinū cū castorio usurpant, robur inde pariter & calorem capiti indentes. Reliquam uerò corporis molem, & præsertim extrema, oleo ueteri oblinentes, cum nitro tosto, aut pyrethro, aut pipere, aut grano Gnidio detergūt. Potest uerò quis & cerato ex his unā cum castorio cōfecto uti. Odoramenta præterea offeremus, thymum, aut origanum, aut pulegium aceto leuigatum. Os porrò, & palati cælum, sinapi trito cum exiguo mellis, illinito: adhærentē glomeratamq; digitis pituitam eijcito. Quod si admiserint, & apophlegmatismo utitor ex oxymelite cū hyssopo, pulegio, aut origano, aut ipso etiam sinapi. Propinabis aliquid eorū quæ ocysimè transeunt, præsertim diospolitici quantū capit cochleariū unum cum posca. In diuturnis autē tremoribus exhibendū est castoreum scrupulorum duorū aut trium pondere. Vbi uerò humorum extiterit nimietas, neq; quicquā aliud prohibet, scammoniā unius scrupuli pōdere castoreo admiscebimus. Perseuerante uerò etiam ad affeclione, derafum nouacula caput, salibus, milio, et consimilibus, lineo sacco inditis, fouere expedit. Ad hæc sinapis secundum caput, & his quæ sternutamentū proliciunt utendū: deinde cucurbitula occipitio sunt admoūda, partim leues cum multa flāma, partim uerò incisa scalpello cute. Naturalium interim excretionum nunquam obliuisci conuenit,

tuna

tum iniectionibus, tum ijs quæ cient lotium. Irrigabis autē pedinē oleo rutaceo, aut Sicyonio, cū momento castorei. Crebrius uerò ut deglutiant admonendi sunt, calidæ aquæ dulcē aliquā potionē, præcipuè ex melle ori instillātes bombylio, angustii oris calyce. Et sicubi mediā quoq; regionē occupauerit aliqua inflammatio, huic itidē adspersionibus et cataplasmatibus mesdendum. Naribus sinapi aceto leuigatū, aut castoreum combustum, admovento. Ptisana uestiatur cremore, aut auenæ, aut aslicæ, cum aceto mulso, aut sale, aut pulegio, nunc quidē quotiē die, nunc uerò alternis diebus: post cibum uinculis stringātur, partes extremæ quamplurimū percellantur, cruraq; pungentur, pili nonnunquā uiolentius excitentur euellendi. Iam femora & crura rubicunda medicamentis exulcerantibus facta, sepiusculè iuuant. Declinante uerò iam affectione, alterna subleuatione, reclinationeq; gestationem uocant, utendū: atq; in balneū ducendi: refectrix deniq; educatio cōuenienter adhibenda.

De catotocho, aut peruigili comate. Cap. 10.

Iam in sermone de phrenitide habito, huius morbi rationem perstrinximus. Notas in uniuersum habet cum phrenitide ac lethargo aliquo modo cōmunes, sed pro exuperante materia uariantes. Priuatim uerò has obtinet: Opprimitur ac decumbit laborans supinus, protensus, facie interdū subtumescēte & mediocriter pallida, lethargicis persimili: quādoq; uerò & rubor in ipsorū uultu efflorescit, & sursum uersus palpebra superior conuelli uidetur, & ita extare, ut nequeant conuiuere: nulla apparet respiratio, sed æger tanquā extinctus iacet, paruum atq; obscurū retinet arteriarum pulsus, & uehementer crebrum: urinae & alui cohibentur, uel exiguè redduntur. Qui meliusculè habet, liquorē per fauces infusum deglutiunt: qui uerò malo succumbunt, regurgitando per nares reijciunt. Quum igitur pituita bilē superat, à lethargicis eo separatur, quod neq; tumet facies, neq; liuida cernitur, quemadmodum lethargici, nisi quod paulatim leniq; sudore diffluunt.

Grauiore

Grauiore in periculo sunt, qui uigilijs continenter defatigantur, si lotia non procedunt, & suspiriū interruptū intenditur, sudor erumpit, haustuq; ipso potus in nares ebullit & regurgitat. Quod si mulier hoc malo cōflictabitur, ab ea quæ uterina suffocationi obnoxia est, hac nota discernetur, quod secundum naturā uideatur iacere, & ea quæ dicuntur percipere, et nunc exurgere, nunc denud graui somno recumbere. Est ubi diuersum à uigili comate catochon tradunt, non compositā, sed simplicem quandam causam habentem: frigidiorē quippe et aridiorē materiā, quæ posteriore cerebri sinu obturato, affectionem hanc effecerit, qua subitō deprehensus, in eodē habitu in quo correptus est, permanet: uerbi causa. stans, aut sedens, clausis oculis, aut respiciens. quapropter uetustiores Græci catochos, catechomenos (id est, occupatos & deprehensos) in eo malo constitutos nuncupauerunt. Recentiores uerò catochin & catalipsin, quasi detentionē et deprehensionē dicat aliquis, nominauerunt. Curatio persimilis quidem prædictis est, symptomatum uerò discrimina diuersis auxilijs indigent.

Curatio catochi.

In hoc quoq; somni marcore sanguinē detrabere expedit, potissimum in quibus facies rubicundior existit, uirtute corporis permittente: aut clysteribus utendū, nunc quidem pituitanæ modum naturæ excedentē elicientibus, nunc uerò bilem reduciantē placantibus. Pari modo aliorum quoq; præsidiorum ratione utendū, eodemq; modo ægrum nutrire, nunc diebus quidem singulis, nunc uerò alternis, conuenit. Affectus uerò ualde periculosus est, si ex aliquo cibi aut potus errore contingit. qui ut uomant, protinus cogēdi sunt, & cōtractiori uicinus ratione compescendi, alius irritetur, uiscera superfusionibus ex cymino aut ruta irrigentur. Cæterū qui ex temulentia id mali contraxerunt, ijs ebrietate discussa, humidiori alimēto succurrendum, cuius generis ptisanæ cremor cēsetur. caput ad hæc conuenientibus illinitionibus humectandū: ast ue quidē, frigidis:

K

hyeme

byeme uerò tepidis. Si crapula non soluatur, neq; ad sobrietatem reuertantur, deplorata uoletudinis agro manus admo- uenda non est.

De memoriæ iactura, & ratiocinationis labe, Caro
& Morosi. Cap. 11.

N Ascitur quādoq; memoriæ abolitio priuatim, quandoq; fa- cultate rationali simul uiolata: quemadmodū et mentis seu ratiocinatricis animæ offēsa primò per se cōtingit, deinde for- titur memoriæ iacturā comitē. Verūm utraq; mētīs scilicet & memoriæ, parte malè affecta, morosis, id est, fatuitas creatur. Obtinēt uerò cōmunem ex malo tēperamento illic existente, cau'sam. Quod ubi uerū modò fuerit, memoriæ et ratiocinatio- nis noxam, torporesq; & grauiores somni impetus (quis cata- phoras appellat) et altos deniq; prolixosq; somnos inducit. At si humori frigus quoq; accesserit, nō tam caros, id est, sopor- res, quā lethargū inuehit. Non dissimili etiā modo cum sola affuerit ariditas, uigilias tantū: si uerò ariditati accesserit fer- uor, deliria & phrenitides cōciliat. Cæterū mala hæc tēpera- menta nūc quidē in humoribus, nūc uerò in cerebri cauernis, aut ipsius uasis, aut in humiditate inspersa, aut in ipsomet cere- bri corpore, aut temporū musculis huiusmodi quid patientibus oboriūtur. Si quādo uerò humores cū ipsis cōmifcentur, parē quoq; affectū afferūt. sed simplex ne an cōmixtum efficiēs tē- peramentū sit, ex recrementorū specie facile deprehēdes. Cæ- terū memoriæ & ratiocinationis iacturā frigoris esse pro- lem nō ignoramus: an uerò cum humiditate uel ariditate iūcta cōtigerit, id quidē ex egestionib. laborātis habiū, tēperamen- to, uicinis ratione, tempore anni, ac regione datur cognoscere.

Curatio

Si frigida fuerit intēperies, calfacienda est contrarijs: si hu- miditas accesserit, etiā siccanda: si cōtrā ariditas cōiuncta sit, hum- iditate pariter & calfacere conuenit. Eodē etiā modo ubi calida distemperatura, refrigerandū: si ariditas accesserit, hu- midandum: si humiditas, tam refrigerare, quā arefacere
condus

conducit. In quibus uerò sanguinem plus iusto abundare comperies, uenam incidere, uel clysteribus acerbis uti, deinde bieram propinare, tum apophlegmatismos usurpare oportet. Circumlinutiones porrò capitis ex oleo, frigorificis & exiccantibus rebus adiectis, rosas inquam, myrto, lentisco, & huius farinae cæteris conferunt. Vniuerso etiam corpori cōsulendum. Quod si ex feruore et lassitudine scaturit, caput aceto rosaceo perfundatur. Et reliqua curandi ratio, in alijs cum esculentis, tum poculentis, infrigidandi humectandiq; naturā habeat. Si Carus Morosi, aut obliuioni superuenerit, huic quoq; prospiciendum, quemadmodum antè de lethargicis tradidimus, ubi eorum etiam discrimen ob oculos expositum est.

De uertiginosis. Cap. 12.

Accidit affectio uertiginosa, cum cerebrum gelidus glutinosusq; humor occupat: unde ea correpti, etiā leui de causa facile cōcidunt. ut si quando extrinsecus circumagi aliqua, uerbigratia rotas, uortices, turbines uel cōspexerint, uel si ipsi quoq; in gyrū uertantur: interdū uerò cum capite incalescunt, cōmotis in eo humoribus, aut etiā spiritu. Nōnunquā uerò coarctatis in angustū anterioribus cerebri cauernis, perforatu cranij ruptis, ex quibus sanè uehemētissimi cruciatus oriuntur. Præcedit autem primigeniā affectionem, capitis dolor uiolentus, caros, sonores & sibila aurium. Lætuntur nonnulli quidem odoratu, aliqui uerò gustu: quibus uerò per consensum oris uentriculi uertigo accidit, cardiognus hos & nausæ consequuntur.

Curatio.

Vertiginosi in acceſsione quidē concinnis odoramentis, frictionibus, ac alijs cōsimilib. excitandi sunt. In relaxatione uerò discutiendæ affectionis gratia, sanguis ante omnia detrahendus, deinde biera purgandū. Interposito tēporis spacio, clystere acriori utendum, ex cētaurij aut colocynthidos decocto. Post huiusmodi inanitiones caput cucurbitulis occipitio adglutinatīs, incisa cute salpello laniabitur: post hæc apophlegmatismis &

sternutamentis utendum. Quos uerò calor capitis & aurium tinnitus molestat, ueluti cum uapores calidi per arterias ascendant, etiam arteriarum post aures incisio adhibenda est, ut de Chirurgicis exequemur.

De morbo comitiali. Cap. 13.

Comitialis morbus, cum totius corporis conuulsio sit, non sine principum animæ functionū offensa, partim in ipsa quidem cerebri substantia, partim uerò in ipsius uentriculis omnibus cōsistentem habet causam, nunc quidē pituitosum, nunc uerò melancholicum humorem. Quin & ex ostio uentriculi affecto per consensum nascitur, quemadmodū in Colicis, ceu in sermone qui de illis habetur, explicabimus. Vel certē ex aliarum etiā partium cōmunicatione, cum aura quædam frigida ad cerebrū effertur: interim à cruribus, interim à manus digitis oboritur. Visus est nonnunquā & à locellis in quadam muliercula, tēpore quo uterum gerebat, prouenisse: post partum uerò cessauit. Accidit affectus iste potissimū pueris, eisq; recēter in lucem editis: post hos adolescentibus & adultis, minimē uerò senibus & decrepitis. Præcedit igitur epilepticos, corporis et animæ stutus quidā inuolūtarius, mæstitia, familiarium, aut eorum quæ auscultauerunt, obliuio, insomniorū imagines turbulētia, dolor capitis, & continuata eiusdē repletio, ex iracundia maximē, pallor uē faciei, & inordinatus linguæ motus: nec desunt qui eam cōmordent. Qui stamachi uitio comitiali cōfluantur, hos tremor ipsius præcedit, fluctuatioq; et erosio: ieiunijsq; seu tarda cibi assumptione exacerbantur: imminente uerò symptomate, subito concidunt, cōuelluntur, & obscure interdū & indiscretē uociferantur. Præcipuum uerò illorum indicium est, oris spuma, cum cætera cōmuniter quodammodo & alyis morbis eueniant. Quibusdam uerò præter uoluntatem cū lotium, tum oletulū excernitur. Nec desunt, quibus & genitale semen. In quibus itaq; morbus acutissimus est, protinus interficit continuitate exacerbationum, & eorum quæ
super.

superueniunt uehementia. Cæterum magna ex parte longus est: ideoq; si nō in pubertate, aut mulierū expurgationum, aut conceptus tēpore cessauerit, aut si post hoc tempus inuasit, plerunq; ad mortis usq; diem comitatur, nisi per accommoda remedia fuerit natus. Arguit autē comitali correptos, ex bitumine, aut gagate lapide, aut cornu caprino suffitus: comestum item ietur hircinum, aut iocinoris assi nidor.

Curatio morbi comitalis.

Si comitali implicitus infans adhuc fuerit, nihil satagere conuenit: ætate namq; usq; in statum biliosiorē & aridiorem uergente, uictusq; frugalioris usu, sua sponte plerunq; affectio cessat. Oportet autē infantulorum & lactescentiū uictus duntaxat rationē obseruare. Qui post primam pueritiæ ætatem incidunt in epilepsiā, eorum conuulsas & distortas corporis partes pingui irrigare, constringere, & in rectū redigere, deinde ori diducto, digitiū aut pinnā oleo irino imbutā inserere ad detrahendā pituitam, consilium est. Sensus odoramenti ad hęc excitandus est: uerbi causa, peucedano, cyrenēsi succo, bitumine, & pice cedrica. Post acceßiones uerō (nisi quid prohibeat) sanguis è cubito mittendus est. Acceßione uerō nihil remittente, extremas corporis partes sinapismo obline, cucurbitulamq; præcordijs applica. Quod si hęc nulla comitetur intermissio, minima salutis spes est. Confidenter tamen medicus castorium ori uim faciens infundat, & liquorem cyrenaicum, cum melle & aceto: per sedē decoctum centaury uel colocynthidos immittet. Exurgentes uerō à comitali paroxysmo, refeito uirium robore, purgatione hieræ euacuari debent. Hęc utiq; recētis & acuti comitalis medela est: deinceps uerō quæ ad arcendum inueteratum morbū faciunt, trademus. Affligitur igitur potu aquæ quàm diutissimè continendi sunt. Exorsi curationē à seditione uenarū, si nihil debortetur: interpositis quatuor aut quinque diebus, corpusculū reficiemus, ac tum medicamento purgante euacuemus, maximè ueratro nigro, aut colo-

cynthide, uel certè scammonia. Oportet autè ueratrum absq;
 medulla cōtūsum, & per subcerniculū traictū mulsæ cyathis
 quinīs aut senīs inspargere, uel melle discocto cū exiguo pipe
 re excipere. Colocynthida uerò, semine abiecto, interiore far
 fu seruato, passo implere, & solidū noctē macerari: matutino
 uerò diluculo appetēte, passum à colocynthide tollere, & pro
 pinare. Aut ex cādido ueratro medicamentū purgās usurpan
 dum. Est autè id eiusmodi: Baccarū lauri decorticatarū, pipe
 ris albi, alypiadis, euphorbij, ueratri albi, uniuscuiusq; drach.
 octo. hæc quidē exhibebis una dosi cū passo, quod in colocyn
 thide pnotauit, pulchrè quidē euacuat per uomitū. Satis uerò
 purgati, lauādi sunt: teritiō uerò die cucurbitulæ præcordijs
 & scapulis, concisa scalpello cute, sunt imponenda. Post hæc
 plusculis aliquot diebus interiectis, corpusculo rursus recreato
 hiera ex cucurbita syluestri alius sollicitanda est. Quibus per
 actis, cucurbitulæ capiti & occipitio defigētur. Sequēti uerò
 die, laboranti panis mulsæ decoctus & cōtritū cū amygdalis
 amarīs, aut serpillō, aut mēta, aut nepeta, ruthāue, catapla
 smatis instar applicādus: id per tridū cōtinuè agendum. Post
 hæc tōdi caput, et peucedani succo cū aceto diluto, in quo spon
 dylum sit elixū, perungi debet. Rursus spacio interposito, et
 corpore refecto, antidoti è colocynthide obolos nouē in aqua
 mulsæ corrigito: & interpositis iterū diebus, exhibe antidoti
 obolos tres, mox inde pharmacis quæ sternutamenta ciēt, ute
 re. Post quinq; aut decē dies, castoreū in mulso propina. Quie
 te denuō intercalata, alius clystere ex cētaurij & colocynthi
 dis decocto eluēda est: rursus deinde hierā suppedita, & apo
 phlegmatismis deinceps, & purgātibus per nares, ad hæc si
 napismo qui capiti inducatur, cibis item acrioribus tēpestiuè
 utendū. Cōfert his quoq; oxymel scylliticū quotidie epotū: atq;
 mel in quo scylla sit liquefacta, mēsurā cochlearij. Viētus por
 rō ratio illis expedit, quæ incidēdi extenuandiq; facultatē ha
 bet. Proinde & capparis assiduè cōmansus, & salsamentum
 conducunt.

cōducunt. Abstīnēdū uerò à carnib. legumīnib. et uīno immodi-
co, à uenere itē immoderata, balneisq; et sinapi, potuq; cōfestim
à balneo, potiss. mū meri. Vtēdū uerò exercitijs et fricationib.
quæ post omnis corporis partes, capiti quoq; abibendæ sunt.

De iis qui stomachi consensu comitialiter concidunt.

Quòd si primarius stomachi affectus comitalem inuexerit,
ut probè cōcoquat, ægrotātī sollicitius prōspiciendū est. Ad ho-
rā igitur tertiā panis accuratè præparatus, ex uīno assumen-
dus diluto, modicè adstringēte, et albo. Exhibebimus itē medi-
camentū ex aloë, bis aut ter quolibet anno. Noui quādoq; pue-
rum (inquit Galenus) nunquam sanè postea comitali morbo
conflictatū, quādiu radicē glycydis (quā pœoniā nuncupat)
magnā et recentē collo suspēsā gestauerat. Præterea et aga-
ricum eo morbo oppressis subuenit, seseliq; ac spōdylij tū semē,
tum etiā radix. Necnō et aristolochia rotūda cū aqua sumpta.
Opitulatur autē magnificè crurū scarificationū giter adhibita.

De iis qui alicuius membri uitio comitali uexantur.

Ingruēte iam symptomate, cū sentiunt ab aliqua particula
sue pes uel manus sit, excitari, oportet laqueo brachiū aut ti-
biā fortiter ligare. Inclīnāte autē morbo, à lassitudine uindi-
care, adurens aliquod medicamētū affectæ parti inducētes: cu-
ius farinæ lepidiū est, aut quod ex cātharidibus cōsarcinatur,
et id genus. Iulianiū porro oxymel in ea affectione cōstitutis
præsentissimā opem adfert, particulatim emolliēs materiam.
Post omnia autē quæ recensuimus, theriaca quoq; et sponte
emergētia lauacra locū habent. Per uniuersum uerò uitæ spa-
cium à cruditate cauendū est sum nōpere, et ne cibus ante con-
coctionem alius superingeratur, crassi item succi edulia, Viuēt
tardū cibationē, cōmotionem corporis turbulentā, crapulā, et
potu (ut diximis) cōfestim à balneo, præcipuè meracū, unum
ualde uctulū et crassæ substantiæ: acrida, et uehementer odora-
ta, quæ caput infarciunt, fixis oculis ex alio dispicere, diutis-
simam in balneo moram, et capitis ob insolatum exustionem.

Melancholia, alienatio quædam mentis est sine febris, quæ ex melancholico humore intellectus sedē occupante, magna ex parte prouenit, nunc ipsomet cerebro per se afflicto, nunc uniuersi corporis lege cōsortij cōmutato. Et tertia quædam melancholiæ species est, quæ flatuosa hypochondriacâq; à præcordijs nuncupatur, ex inflammatione præcordiorū circa stomachū oboricens, quæ nunc quidem auras quaspiā uitiosas, nūc uerò essentiæ humoris partem ad caput sursum transmittunt. Communes omnium notæ sunt, terror, animi mœror, hominum odiū. Sunt qui sese animalia quædā bruta autumēt, & emulantur uoces eorū: alij uerò uasa testacea, & ne frangantur, expauescunt. Alij mortis desiderio tenentur: quidam mortis formidine torquentur. Aliqui perpetuò ridet: aliqui cum fletu lugent. Nōnulli incitari se maiore quodam numine uidentur, uaticinanturq; futura, haud aliter quā diuinaculi & numine afflati, quos entheasticos Græci priuatim appellant. Peculiares autem notæ sunt, eorum qui per consensum totius corporis melancholia cōfliantur: Gracilitas corporis, nigredo, hirtitudo, & nihil aliud esse quā melancholicū, siue natura, siue ex aduēitio fuerit, puta per quasdā sollicitudines, uel uigilias, uel uitiosi succi eduliorū assumptionē, uel hæmorrhoidum uel muliebrium mēstrum retentionem. Sed qui in eam affectionem præcordiorū uitio incidunt, eos cruditates, acidæ ructationes, feruor, & ipsorum grauitas, arguunt, et quod hypochondrium sursum conuelliur, & nonnunquā phlegmone ætatur: quodq; circa exordium, deinde uerò his aduētis, atræ bilis comitatur symptomata, quæ utiq; cōcoctionibus, aut excretionibus, aut flatibus multis, aut uomitionibus, aut ructibus leuatur. Nullo uerò horum, aut paucissimis ex illis apparentibus, melancholica quæ apparent signa, cerebrum per se atræ bilis humore affici testantur. Si quando uerò flauæ bilis plus æ quo affatæ, in atram facta fuerit permutatio, mania, id est,

id est, furiosam dementiam inferet, in qua ferocius ferarum more scuiunt, ut eos qui incautius circa ipsos accesserint, uiolenta manu uapulent, aut interficiant.

Curatio melancholiæ.

Primigenio igitur cerebri affectu melancholicis, lauacris frequentibus, uidu boni succi & humedante, cum opportuna animi uoluptate, citra alterius præsidiij opem medetur, quando humor infestans temporis diuturnitate nondum euacuationi resistit: tunc enim potentiora, magisque uaria adhibere oportet remedium auxilia. Purgandi itaque sunt principio epithymo, aut aloë. Horum quippe uel momentum unaquaque die sumptum, plurimum opitulatur, clementerque alium subducit. Postquam purgatus fuerit, sicut comprehensum est, absinthium præbeto, nunc herbam in aquæ duorum cyathorum mensura maceratam et elixatam, nunc uero eius succi drachmam mediam cum aqua assidue liquefactam. Aceti quam acerrimi momentum sorbitioni sub somnum porrigitur, ex quo multa obsonia madefacta manducant. Satius uero fuerit, aceto scyllam permiscere, & polium, et tenuem aristolochiam. Quum uero inchoante morbo ad curationem accesseris, qui ex lege consortij totius, ut dictum est, corporis sit, constante uirum robore, omnino à sanguinis detractio ne auspicandum est. A' uenæ incisione, recreatum per inferna medicamento, ex colocynthide aut helleboro nigro purgare conuenit. Oraque hæmorrhoidum aperire, & muliebres purgationes cingere, si propter harum suppressionem affectio cōflata fuerit. Probantur etiam remedia cum quæ urinam proritant, tum quæ per sudores purgant. At si è præcordiorum uitio hæc passio constiterit, etiam horum curam habere conuenit, fouendaque eadem decocto rutæ, anethi, absinthij, pulgij, seminis uiticis, & baccharum lauri superfuso: nam hæc dolores mitigant, & flatu communiunt. Coquantur autem in oleo, & cataplasmatibus modo imponantur: sed horum cataplasmata, etiam ea quæ flatu dissipant, apium, aut anisum, aut cyminum habeant: neque malum, si

cyperus, iris, & libanotis, cataplasmatibus iniiciantur. Hæc autem diutius interdum etiam siue comederit, siue ieiunus sit, permancant: quumque ea detraxeris, uelamentum aliud latum ex lana superapplicato. Cucurbitulis porro oportet, ad discutiedos spiritus, leuibus uti: aduersus uero dolores & inflammationes, cum scarificatione. Si cum medicina diligentiam coniundam uis, noli sinapis obliuisci. Utere ad hæc acris, exterendi facultate praeditis, & dropacibus dorso tenus, & super uentrem. Si uitium in uetustate incidit, praesentissimum est praesidium, quæ cum ueratro per uomitiones fit purgatio. Viduus insuper cunctis boni succi, & modice humectans conuenit. Vitare debent carnes bubulas, atque ceruinæ, lentes, & brassicas, cochleas, uina crassa et nigra, et quæcunque, uno uerbo, atram bilem pariunt.

Curatio maniae, siue furiosæ dementiæ.

Mania laborantibus perinde atque melancholicis succurritur. Priuatim uero horum capiti rosaceum, & acetum rosarum adhibeantur: et picra antidoto, incisa prius uena, purgetur. Admouenda sunt etiam capiti hirudines. Potissimum autem auxiliatur ipsis erratici feniculi radix, semenque ipsius ex aqua epotum, et bryoniae radice drach. cum aqua quotidie sumpta. Si uero ad potionem pharmacorum purgantium induci nequeant mentis inopes, admiscenda sunt ea clanculum, partim sanè ferculis ipsorum, uerbi causa, buccellis, aut caricis, aut palmulis: partim etiam poculis adijcenda. Ante omnia uero uel in culcitra uinciendi sunt maniaci, ne malè uel semetipsos, aut familiares quibus incidunt, afficiant: uel gestandi in lecticulo intra gygartum, hoc est cubile quoddam mente capitis consecratum, ex alto pensili.

De Phaunorum, incuborumque ludibris, Græci ephialten & epibolen nuncupant. Cap. 15.

Ephialten, quem nostri incubonem dicunt, alij à uiro nomen duxisse autumant, aut à phantasia, qua patientes aggredi se se ab aliquo imaginantur (ἐφ' ἄλλοθεν enim insilire alteri est, et inuadere.) Themison uero decimo Epistolarum uolumine, à suffocando nimirum pnigaliona, quod ægrotantes praefocet, appellauit.

pellauit. Id mali potissimè crapulosus, et iugiter stomacho crudis euenit. Comitatur ista affectione possessos, difficilis motus, atq; torpidus per somniū sensus, ac praefocationis in mēte obuersatio, & ueluti ingruētis opprimētisq; alicuius occupatio. ita ut uociferatio supprimatur, aut uox obscura indiscretaq; edatur. Quidā inani phantasia ducti, etiā audire saepe cum qui se oppresserit, ac uenerē exigere credunt: sed eos digitis pecti nam coniundis, siue contractis, in pedes sese conyere. Occurrendū itaq; malo accuratè statim inter primordia. Nā si multo procrastinatur tēpore, iugiter noctu inuadens, grauius aliquod malū denunciat: morbū attonitum, furiosam insanid, & morbū comitalē, quamprimū in caput uitij huius materia irrepserit. Quicunq; enim epileptici interdū, eadem noctu per quietē ephialtici patiuntur. Expedit igitur, secta prius uena, purgationibus uniuersum laborātis corpus euacuare. Gregiè autē praeter cetera hoc malo detentis, ater belleborus drach. unius pōdere subuenit. Scāmonia admixtis obolis tribus, atq; bene fragratiū odoramētōrū aliquod, anisonēpe, dauco, petroselino. Quae ex siccyonia cōficitur hiera, efficacius succurrit. Refertur autē hoc medicamētū ad Ruphū. Vidus tenuis esto, et flatu penitus carēs. Praesidio erit ipsi patiēti paeonia semē. Quindēcim autē grana eius nigra cū aqua idētidē propināda.

De Lycaone, aut Lycano. Lycanthropó ue. Cap. 16.

Qui lycanthropia correpti sunt, per noctē domo exilientes lupos per omnia imitātur, & quoad dilucescat, circa defunctorū monimēta plerūq; diuersantur. Notis uerò sequētib. eo morbo oppressū deprehēdes: perpallidi sunt, cernūt imbecilliter et obtuse, oculis aridis & lingua aridissima, nullā saluā expuūt, siti excruciantur. Tibia, quoniā frequēter impingūt, ita exulcerātur, ut curationē nō recipiāt. Haecenus indicia. Cognoscendū q. lycanthropia melācholiae species est, cui circa tēpus accessionis morbi succurrēdū sanguinis usq; ad animi deliquiū detractione, educatione laborātis cū boni succi alimētis:

Lauacris

Lauacris dulcibus, deinde feri lacris per triduum usu, & purgatione hieræ & colocynthide bis aut ter repetita. A' purgationibus uerò, ea quæ ex uiperis constituitur iberiaca, & cæteris quæ de melancholia memorauimus. Accedente iam morbo, solennibus soporiferis caput irrigandum, opioq; in somnum uersis, nares inungendæ.

De iis qui amore insaniunt. Cap. 17.

Cum amores solitudinibus curisq; consent, neutiquam absurdum fuerit, eos cerebri affectibus adnectere. Cura uerò animæ quædā est affectio, in motu laborioso ratiocinatione occupata. Comites autem uesaniæ huius notæ habentur, oculi concaui, lachrymas nullas effundunt, sed uoluptate quasi perpetua perfusi apparent; palpebræ crebrò mouentur. Cæterisq; corporis partibus non collabantibus, soli illi amatoribus concidunt. Pulsus proprius amantium nullus est, quemadmodū autemauerunt quidā, sed qualis eorum qui solitudinibus multis sunt impliciti. Cæterum cum recordatio rei amata, uisu uel auditu, præcipuè ex improviso subierit, tum protinus perculsa mente pulsus pariter cōmutatur, neq; naturalē & quabilitatem neq; ordinē seruat. Hos igitur mæstos & peruiigiles, cum quidam dispositionem nō satis pernoissent, uinculis, solitudine, tenuiq; uictus ratione cōsumpserunt. Ex quibus cordatiores, deprehenso amante, in lauacra, & comessatū, & gestationes, et spectacula, fabulasq; animū abducunt. Quibusdam terrorem incutere cōuenit. Qui amoris perpetuū uacant, malū indelebile efficiunt. Oportet igitur illis cōtentiones proponere quasdam eius generis, quod persecutus est antea quisque, prorsusq; ad alias solitudines mentem & cogitationem transferre.

De morbo attonito, quam apoplexiam Græci: & diminuta apoplexia, quam hemiplexiam, aut resolutione, quam paralyfin appellant. Cap. 18.

Quando communis neruorū origo afficitur, atq; inde unius Quersæ corporis partes sensu simul & motu spoliantur, morbus

morbus attonitus Romanis, Græcis apoplexia nominatur, principalibus animæ functionibus oblaſis. Si in alterutra capitis parte obſtrudio fiat, hemiplagia atq; paralyſis nuncupatur. Si in alterius partis aliquā particulā incubuerit oblaſio, eius tantūmodo partis affectio dicetur. Crus itaq; inquit Hippocrates, ipſi apopleſion euaserat, pro eo quod erat reſoluitum. Quocirca ſeruatur in attonitis exigua quoddā reſpiratio: quæ ſi plurimū à naturali operatione reſceſſerit, ſummam eſſe affectionem arbitrare: ſi paululū, exiguā. Peſſima uerò eſt, quum intermittitur, uel magna etiā cum uiolētia trahitur. Fit autem affectio, gelida pituita ſemel & cōfertim principaliffimos cerebri ſinus infarciēte. Si quādo uniuerſum ſpinæ principium dicto modo conflēdatur, omnes quæ ſub facie conſtitutæ ſunt partes, ipſa manente incolumi, reſoluūtur: eo quod partes quæ inibi habētur, cū ſenſationis, tum motionis uires cerebro acceptum referant. Si uerò ex medietate affligitur, illarum partium reſolutio conſtituitur. Vbi uerò odorādi facultas interit, uel anteriorum cerebri uentriculorū intemperie afflōrū, uel meatuum qui ei, moides à colando dicuntur, obturatorū, affectio eſt. Attoniti igitur procumbunt ſine uoce, ſine motu, citra ſenſum, & abſq; febre. Præcedit eam affectionē, capitis reſertinus et acutus dolor, puluini uenarū circa guttur (ſphagitides Græci appellant) turgentes, uertigines, tenebricoſa lucis obſcuritate oculis obuſante: oculorū incerti et diſcurrentes lucis ſplendores, frigus extremitatum abſq; cauſa, totius corporis tremor, difficilis motio, dentium in ſomno ſtridores, lotium quaſi rubiginofum, atrum, paucum, cum corpulentiore farine ſimili bypoſtaſi. Bo morbo facilius tentantur circa ſenium, maxime pituitioſioris temperaturæ homines, & eiufdem naturæ uictus ratione utentes. Si quem in iuuentute atq; aſtuo tempore oppreſſerit, ſummam neceſſitatem arguit.

Apoplexiæ, & hemiplexiæ, paralyſis ue curatio:

Morbus apoplexiæ uel nullam, uel difficile admitit curationem,

tionem, mortē quippe minatur subitam. Si quo etiam medio elz
ditur, cum paralyſi plerūq; partis alicuius corporis diſcedit.
In quibus itaq; ulla ſalutis ſpes eſt, iſs uena quāprimū incident
da eſt: et ſi remiſſi: onē quandā adipiſcantur, eodem die. ſiue ſe-
quente ſanguen auferendū eſt. Alius quoq; acri clyſtere mu-
ria & melle mixtis ſubducēda. Deinde oleo copioſiore ſulphu-
rato uniuerſum corpus inungendū. Caput chamæmelino, uel
anethino oleo, in quo ſcilicet ſpōdyliū aut nepeta fuerit elixa,
irrigandū. Muſſam præterea inſtillato, et quæ ingentē odoris
fluxū emittūt, naribus admovento: Opoponaca ſcilicet, aut ſa-
gapenū, galbanū item, uel caſtorium. Oportet autē ori quoq;
uiolēter aperto. digitū aut pennā oleo madidum, ut ea quæ mo-
leſta ſunt, eſcīdatur, intus mittere: ſedē quoq; iſs quæ ſtutus ſub-
ducunt et diſcutiūt, oblinire. Potui aquā muſſam. ſiue oxymel
exhibere cōuenit. Vtemur etiā apophlegmatiſmis, è thymo uel
origano in aceto elixis. Vbi uerō malū remiſerit, mollē & ſae-
cilis digeſtionis, ſucculentūq; cibū aſſumamus. Mutitate uerō
permanente. ſi per uirtutē integrū fuerit, cucurbitulā cum ſca-
rificatione ceruici applicemus. Si liceat, etiā præcordijs: dein-
de geſtentur biga, aut uehiculo, aut penſili culcitra. Vſurpāda
ſunt et ea quæ ſternutamentum proliciunt crebrius, neq; his e-
tiam minus apophlegmatiſmi. Poſt decimū uerō ac quartum
diē, ad reliquas geſtationes perducemus. Sermocinationis præ-
terea curā habere oportet: et peruetuſtum apomeli miniſtrabi-
mus cū micis uel alica: poſt hæc exhibēda eſt hiera quā minī-
mū, à uiceſimo primo die in balneū ducētur: uinū tenerū calēti
aqua diluū potioni datur. Vires inde balineis atq; illinitionib;
reſtituendæ ſunt. Perducātur, ſi fieri poteſt, in loca maritima.

Reſolutionis, quam pareſin nuncupant, curatio:

Quod ſi principalibus animæ functionibus illæſis, omnes
uel quædā corporis partes reſoluātur, etiā hic qui infeſtat hu-
mor, qualiſcūq; fuerit, euacuādus eſt. Mox hierā, quæ caſtorij
partem admixtā habeat, porrigito: à dimidio quidē drachmæ
auſpicans

aſſpicans, cum momento mellis & calida aqua dilutam, uel
 per ſe, et piperis dimidiato ſcrupulo adieſio: poſt hæc quatuor
 diebus interpoſitis, integrâ drach. exhibebimus: ab hoc ſeſqui
 drach. poſtremè duas ac tres, atq; tum rurſum totidem diebus
 intercalatis quatuor drachmæ ſunt offerendæ (ſi modò per lan
 guentē liceat) addito mellis cochleario. Mēbris uerò medica
 menta quæ diſcutiendi facultatē habeant, quæq; exaſperando
 cruentū ruborē cutis excitare poſint, applicāda: quibus cum
 caſtorii, aut piper, aut pyrethriū, aut ſemē roris marini, aut eu
 phorbiū cōmiſceamus. Super hæc uerò embrochæ etiā pro
 ſunt, quæ oleo rutaceo, aut ſicyonio, aut alioqui peruetuſto con
 ſtant. Eſculēta cōueniunt frumētacea, & quæ ſorberi cōmodè
 poſſunt, aut aliàs nō difficilis cōcoſtionis, et ſuperuacancis rea
 trimētis exortia. Cucurbitulæ partibus reſolutis, ſi plures fue
 rint, diuiſim: ſi pauca, uni adglutinētur. Poſt cucurbitulariū
 uſum, cataplaſmata ex pice, aut reſina, aut māna, illinito. Ex
 re aū & uſu fuerit, artemiſia elixa cum nepeta, conyla et ni
 tro, aquæ tūtillo quæ elixādo cōſumetur, admixto. Alius de
 nudò ſubducatur, uel cum aloë, uel polypodio, uel ſcāmonia, uel
 pulve ex colocynthide. Vnguēta itē proſunt ex oleo ueteri illia
 ta, in quo ſcilla macerata dies quadraginta ſub ſole fuerit. Si
 huius copia non ſit, ſcillæ uncias duas in oleo coquito, atq; cir
 cūlinito: aut ſemē roris marini cōſimiliter præparatū. admē
 ſcēda uerò ceræ eſt uncia, ne diffluat. Quòd ſi galbani quoq; et
 caſtorij, euphorbij, adarces, atq; nitri, ſingulorū ſemiunciam
 aſſūperit, multo efficacius in medēdo fuerit. Amuſſatim por
 rò quadrabit et ranūculus herba oleo elixa, et inſolata. Cōdu
 cūt potiones caſtorij drach. unius pōdere, et opopanacis fabæ
 inſtar deuoratum. Mirum quantum opis adferat etiam ſagape
 num erui magnitudine in mulſis: caſtorii pariter cum opopa
 nace, ſuccoq; Cyrenaico, mlij quantitate. Confert etiam quæ de
 tribus piperum generibus conſtat antidotus. Quin & calbria
 ficis acopis apophlegmatismis q; poſt decimum & quartum
 diem,

diem, plenioribus cibis utemur. Pluſculo iam auxiliũ cõcilia-
to, balneo credemus. Poſt triceſimũ diem dropace quoq; uten-
dum, atq; lauandũ, deinde ſinapi emplaftri modo inducẽdum,
in his in quibus motus atq; ſenſus perijt. Aduertentes tamen, ne
(quoniã uſtionẽ non ſentiũt) pluſ ſatis perurantur. Hiſ uerò
qui ſenſu minimẽ deſtituũtur, cuiẽ cruciatare dũtaxat cõuenit:
poſt tumorẽ inducũ, in balneũ deducere, et cerotiſ molli-
bus. A cœna uomitione, uel radícula citata utãtur. Geſtatio-
nibus itẽ ſellæ, uel plaſtri manualis, aut rhedæ. Reliquo uerò
tẽpore in naturalia lauacra deducãtur. Magna poſtremo cum
utilitate uiciuſ ſiccior, potionis frugalitas, atq; fricatio adhi-
betur. Epuliſ itaq; ſiccis uſcãtur ſuiſ pro uirib; tolerantẽs.

De iis qui laxatione aut extensione reſoluti ſunt.

Quoniam autẽ artuſ reſolutionẽ experti uel conuelluntur,
uel relaxantur, idq; interdũ plenitate, interdũ uerò uacuitate,
ruſum attendendũ eſt, partim ſanguinem eſſe detrahendum,
partim uerò minimẽ. Deinde in partib; quidẽ relaxatiſ, reme-
diſ laxantib; ea quæ aſtringunt miſceto. In contrariſ, rela-
xantib; ſolummodo utendũ, cum perfrictione molli. Comple-
tatur autẽ oleum, quod relaxatiſ adhibetur, nitri contriti, ſe-
ciſq; uini crematæ paululũ. Fotuſ erunt ex aqua admodum ca-
lida, præcipuẽ marina: in qua elixentur lauri, uel agni germi-
na, aut ſamproſychum, uel aliud quiddã eiufmodi. Aſtiuo uerò
tẽpore in mari natationeſ, et ſummæ cutiſ exaſperationeſ, uel
in primis conferunt. Vapulent itaq; parteſ afflicte feruliſ,
aut ramuliſ urticæ. ſi reſolutio perſeueret, oportet flacceſcen-
tem ac reſolutã inter articuloſ carneſ attractam comburere,
transfigenteſ candentibuſ ferriſ exilib; et tenuib;: ſed con-
tractiſ partib; dropacem continuò ſuperaccommodare.

De ea quæ in unoquoq; membro conſiſtit reſolutione.

Quæ diſſectiſ neruiſ accidit pareſiſ, nullo medicamine uin-
citur. Sed quam intemperantia, aut humor aliquiſ cõciliauit,
huic in genere quidẽ facultatib; prædictiſ ſuccurritur. Sunt
uerò

uerò peculiares quædam singulis ipsorum, quas subnectemus, medelæ. In his igitur qui canina cōuulsione raptu'ue impetuntur, per phorceā instrumentum quod uocāt, ex æquo in diuersum deduces. Sanguinē q; ex subiectis linguæ uasis detractio competit. Cucurbitulæ item circa priorem dorſi uertebra adæ glutinatis, atq; apophlegmatismi. & per nariū infundibulum factæ purgationes cōferunt. Sciendum igitur est, nō eam quæ diuicasse uidetur mandibulam, resolutionē expertam, sed oppositam. In gluuie uerò uulsa paræsi, cucurbitulæ mēto sunt designandæ. Utendum præterea, quæ castoreo, sagapeno et succo Parthico cōstant, illitionibus. Confert etiam gargariſmus ex rebus acribus. Lingua porrò paræsi infestata, uenæ ipsius secundæ sunt cucurbitulæ mento apponendæ, utendum apophlegmatismis ex sinapi, & exercitationibus linguæ. Vocalibus uerò instrumentis resolutionem expertis, thoraci offerenda sunt præsidia, spirationis suppressione, exclamatione q; utendum. In superciliis uerò paralysi, palpebrarum inunctiones pariter cōducunt: prodest etiam cōsutio. Vesica autem resoluta siue lotium cohibeatur, siue citra uoluntatem excludatur, pedini et tauro medicamento adhibenda sunt. Sedi uerò oleum rutaceum, aut sicyonium, adiecto butyro et castorio, aut galbano, aut opopanace, aut lasere infundendum: quæ quidem per colem uesicæ immissa, plurimum opis contulerunt, aut sola etiam suffecerunt. E' centaurio præterea et colocynthide clysteres cum sicyonio intestinis non inutiles sunt. Profunt item pharmaca quæ lotiū proritandi facultatem obtinent. epota et castorium consimiliter: sed ante omnia, ijs qui nihil lotij emittunt, id per siphonculos uesicarios (quos catheteras Græci uocant) elicendum est. Balneis porrò relaxantibus insidendū et cataplasmatibus inde confectis utendū. Si uerò præter uoluntatem lotium excernitur, cum roborantibus præsijs adstringendū, alimenta arida, et potus gelidos usurpandum. Quum instaurantur, rubores in summa cute cōcitare, & naturalibus balneis frigidis

L utis

uti conuenit. Resolutio uerò spinæ ob uulnus, aut casum, aut luxationem uertebrae, lethalibus symptomatis confluentibus nullo remedio eliditur. Quod si penis resolutus est, hysdē quæ ad uescicam pertinent, utendū. In hysdē partibus atq; libis, etiā is quæ intendendi uim obtinet, utemur. Improbatur lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ cū cæteris oleribus. Recto aut̃ intestino resolutio, quandoq; ab inuitis oletulū excernitur, quandoq; retinetur, hysdē utendū est remedijs, aliās quidē eadē p̃ clysterē immittēdo, aliās uerò astringentia: uerbi causa, decoctū cupressi, lētisci, rubi: aliās remittētia, cuiusmodi sunt adeps suillus, aut anserinus, et oleū maluaceū: nonnunq̃ et mordētia, ueluti salsugo, aut colocynthidos, aut similiū decoctū. perinde enim motiones, atq; ipsa agitatio promouet. Si autē frigus apprehēderit, acopū ex euphorbio cū oleo dilutū immittito. Membra postremo resoluta, cōmuni cura flectito, perfricato, et quēadmodum prædiximus, distendito: summa nanq; spes in frictione sita est.

De paralyti ex colico morbo contracta.

Colica quædam affectio nostra ætate incruduit, quam (et præcipuē eos qui euasuri erāt) motionis exacta quædam membrorum orbitas comitabatur, sensu tactus incolumi, ut uidetur, cōseruato, tanquā iudicatorio aliquo trāsitu ex corporis profunditate in extremas particulas factō. Proinde citra medicamentorum subsidium ultro plerisq; motus postliminio reuersus est: alios uerò qui difficilioris curationis fuere, etiam simpliciora ex prædictis unguenta persanauere. Præcipua uerò his inuenta sunt, tum id quod è populo nigra, tū quod ex abiete cinnatur acopon. Plures uerò medicamenta quæ robur inferrunt, & mediocriter refrigerant, magnificè iuuerunt.

De conuulsionibus. Cap. 19.

Habito de Paralyti sermone, consequens est, ut de Conuulsionibus agatur: quoniā utraq; neruorum est affectio. Cuius rei quoq; gratia de tremoribus deinceps subnectemus. Quando igitur circa morbi statim exordium, uel haud longè ab initio conuulsionēs orsc̃ diutius perennant, à plenitate trahunt originem.

ginem. Cū uerò copiosos sudores, aut uomitiones, aut excrementorum deiectiones, aut sanguinis profluuiū, aut uigilias, aut famem, aut permultas & uehementes cōmotiones sequuntur, à uacuitate oriuntur. Vbi uerò aliquis sospitū subitò cōuellitur, à plenitudine fieri necessum est. Verū si ex febribus adurentibus totius corporis moles et nerui inanuerint, illaq; ariditate conuulsio oriatur, exiti-ssimū, & tantū nō immedicabile malum est. Primum igitur membra quæ cōtrahuntur, ualidè continenda sunt, inordinatisq; motibus occurrendū. Cōfricentur oleo rutaceo, aut sicyonio, aut ueteri, aut huius farine quopiam alio. Propinanda etiā mulsā est. Caterū qui ex inanitione, conuulsione cōstuantur, oleo, aut hydrelæo calēte fouēdī sunt in lauerū quoq; nisi quid prohibeat, ducēdi: tēperatoq; folio cū oleo ac frictione lenissima utendū. Nutriemus autem sic affectos, quæ ex chōdro et alica fiunt sorbitionibus, et uino tenui, facilisq; digestionis, aquoso, nisi infestet febris: tum enim pitiscæ cremore utendū, somnoq; uacandū. Sed quæ ex plenitudine aut phlegmone cōuulsiones cōtrahuntur, plenitatis euacuatione curantur, phlegmonē peculiaribus suis præsidijs medendo. Fiunt præterea cōuulsa nonnunquā, cum uomentes lacinantur uehementius. Succurrit ipsīs et acantiū radix, et spinæ albæ semē in potu sumptū. Aegyptiæ quoq; acāthæ: nonnullē centaurij tenuis succū potui præbent, cū uidelicet ex plenitate cōtrahitur cōuulsio. Neq; ad bibēdū modò porrigito, sed et foris quoq; cuti, castoriū unā cū sicyonio illimito. Quid si his perperatis nō cessauerit cōuulsio, cucurbitulas, cute scalpello circumcisa, imposito; cruribus quidē cōtraheis, coxendicibus et extremæ uertebrae: manibus uerò cōuulsis, dorso et primæ ipsius uertebrae, partiq; humero superiacenti. Vao uerbo, si toto corpore ab affectione libero, labiū, aut palpebra, siue lingua contrahatur, dirū symptoma putandū est, magnos secū terrores adferens, licet exiles corporis partes affectæ uideantur. In his itaq; ab occipitio et primis uertebis fiat sanguinis detractio:

Rigor, qui tetanus dicitur, cum & ipse conuulsio quædam existat, euenit ceu gelu concretis, corporis, præsertim spiritus musculis, frigidus humore foris & intus adstringente: unde in ea affectione constituti, se ipsos flectere non possunt. Vbi igitur corporis membra antè tenduntur, appellauerunt Græci emprosthotonū, nos rigorem in pedibus. Quando retrorsum, Græcis opisthotonus, Romanis rigor in scapulas uocatur. Quando autem ceruix æquabiliter in utraq; partem recta intenditur, tetanus ab illa, rigor simpliciter ab hac gente appellatur. Verum Pelops affectiones has musculorum neruorumq; ceruicis, quorum beneficio in anteriore, posteriorem partem, & quoquo uersum ceruix flectitur, tensionem & contensionem nominat. At qui si in posteriores musculos colli rigeat, opisthotonus ex accedente: si uero in anteriores partes, emprosthotonus: si recta in utraq;, tetanus nuncupatur. Causam huius mali asserit, musculis repletis spiritu et aëre crasso ac nebuloso. Affermat eundem supra modum frigidum & concretum esse, ac ideo difficulter mobile: unde fit, ut sic affectis fomenta sicca magis conueniant quam humida. Et hæc quidem tetani sunt differentiæ: sed omnes communi, non diuersa ratione curantur. Præsentissimum igitur est præsidium febris superueniens, quæ non fuerit à principio. Arguit uero has angustæ respiratio, pulsus rarus et paruus, nonnunquam risus etiam Sardonicus eos inuadit, & rubor faciei, oculi intumescere magis uidentur, & uel nihil omnino mouent, uel instar aquæ lotium, uel cruentum, cum quibusdam ampullis reddunt, alius exiccatur, uigilijs magis infestantur: & sæpenumerò conuulsionibus ita confluantur, ut periculum sit, ne de cubili decidant: quandoq; singultire incipiunt, & è dolore laborant: alij quidem capite, alij uero utrisq; clauiculis, humeris & lumbis, nonnulli uero ipsorum subtremituli quoq; redduntur. Facit autem affectionem hæc etsi rarius, lassitudo, humi dormitio, potius eleuatio, casus, uulnus, æstus, plaga, & alia quæ

quæ eiusmodi nervis noxiam inferre possunt. Medendum autem his quemadmodum illis qui ex inanitione conuellantur.

Tetancrum curatio.

Rigore nervorum ceruice in rectū intenta, sanguis statim inter initia mittendus est, partes eorum lanis oleo sicyonio aut castorio cum ueteri oleo imbutis cooperiendæ, aut uesica quoque latior calente oleo referta, tendinibus est imponenda. Concisa deinde scalpello cute, cucurbitulæ agglutinentur, leues enim etiā lædunt. Applicentur autem interdum ceruici et ab utraque scapularum parte, & lacertosioribus pectoris locis atque præcordijs, nonnunquam uerò regioni uesicæ atque renū. Nihil uerò detractioni parcendum, modò non confertim, sed sensim pluribusque uicibus auferatur. Sudores porrò lanis oleo madefactis detergendi sunt, ne refrigerati euanescent. Quòd si tetanos inuenerit, in oleum bis in die descendere iubeas, & haud diu in ipso morâ trahere: nihil enim uirtutē perinde atque olei in se ipsius deijcit. Bibendū est hydromeli crassum ad dimidias usque decoctum. Ad hæc panacis succi drachmam robusti hauriant, imbecilliores autem hemidrachmiū, uel ad minimum, obolum. Videri autem possit cuiuspiam hoc officere stomacho. Exhibendum etiā ammoniacū: aut succi cyrenensis quantitas orobi, excocto melle oblita deglutiat: laserpitijque radicis cochlearia duo, mulsæ cyathis tribus indita, aut elixatio eius, potui exhibeantur, uel myrrhæ drachmā ex aqua mulsæ, hyssopi que decoctū. Omnium uerò inculpatissimum expeditissimumque erit, castorij exhibere cochlearia duo aut tria, distributa tamen hac quantitate. Nihil enim officiet, etiam si post cibum ex ipso dederis. Præter reliqua uerò ipse quoque potus aliquandiu uacationem habeat, minutatimque sumatur: ægrè enim potantibus in nares potus rebullit, unde uehementer lacinati ad conuulsionem irriantur. Illinienda uerò sedes est oleo rutaceo, cum opopanace, immittaturque ipsis per inferna. frigida porrò superfusionem, cum sit (quemadmodū Hippocrates asserit) maximè temera-

ria, & ob hoc à recentioribus (ut arbitror) reprehensa, etiam nos ipsi deuotamus. Vnguentum probatur, quod accipit nardi sextarium, cera sexantem: folij, amomi, styracis, mastiches, castoreij, adarcae, euphorbij, piperis, spicae nardi, cremoris balsami singulorum unciam.

Opisthotonicis potio.

Panacis radicis, piperis albi, costi, myrrhae, succi papaueris, paria cuiuslibet pōdera, sub somnum instar cicerculae exhibebis. Conducit etiam orthopnoicis. Esto praeterea in hac affectione constitutis uictus extenuans, expeditae digestionis, & minimè recrementosus.

De tremoribus. Cap. 20.

Tremor uniuersim ex imbecillitate neruorum originē trahit, cuius rei testis senectus est. Priuatim uerò plures et diuersae causae tremorē efficiunt, frigidius uidelicet naturae temperamentum, importunus frigidae potus, praesertim in febribus, gelidi & glutinosi humoris abundantia, & immodicus uini usus. Qui igitur ex delictis admissis aperte tremunt, à nocuius abstineant. Perseuerantibus uerò diutiusculè, factis in febri tremoribus, principid quidem uniuersum corpus oleo Sabino, sed in relaxationibus accessionum, peruetusto, aut sicyonio, irrigato: extimas uerò corporis partes illius mollibus lanis cooperito. Deinde cucurbitula à prima spinæ uertebra usq; ad scapulas & lumbos defigendae, membris antea atq; praecordys cataplasmate ex hordeacea polenta illitis. Iam eadē hae membra lanis oleo ueteri aut Sicyonio infectis contegantur. Quod si febres in uetustate inciderint, alternis diebus in oleum uel hydreleum descendendum. Frictionibus ad haec mollibus utendum. Si uerò diutius durauerit affectio (frigiditate iam suspecta) propinanda mulsa & castorium sunt. Calidis pariter locis gestationem fieri conuenit. Cibum promptae digestionis exhibebimus: primo quidem loco sorbilem, deinde uolucrum, atq; piscium mollem carnem habentium. Finitis autem febribus,

bus, lauandum, sed à gelido lauacro & uini potione abstinendum. Quod si multitudo crassorum & glutinosorum humorum fuerit, incidentibus, & extenuantibus utendum. cuius generis est: Accipe ramusculi rutæ, spondyli, quantum tribus digitis capi potest, castorij, nitri, uniuscuiusq; obolos duos, dato quotidie cochlearium cum oxymelite, per uniuersum triduum ieiuno. Aut panacis et piperis grana quinq; propinato in mulsæ cyatho. Simplicia ante potata trementibus succurrunt: uerbi causa, castorium, leporis in cibo cerebrum, alibæ radice elixatio, damasonij foliorum drachmæ quatuor in mulsæ, eupatorium cum aqua. Frigore autem modum excedente, & Zodymi unguento, ac ijs quæ contra paresim scripta sunt, acopis et unguentis, & summæ cutis rubrificationibus utantur, et exercitationibus, perfricationibusq;. Cæterum ob temulentiam tremuli, à uino, donec exadè malo liberentur, coercendi sunt.

Ocularia, & primo de dolore, ex decretis Galeni. Cap. 22.

Quando oculos acerbissimi dolores infestant, considerato quo nunc ex affectu corporis idem in inflammationibus proueniant. Aut enim propter rosionem uehementem ex dira in oculos decumbentium humorum acrimonia, uel ob tensionem faratarum tunicarum, aut propter intensiorem aliquam crassorum humorum, aut spirituum flatulentorum, grauissimi in ipsis cruciatus emergunt. Rosionibus itaq; purgantibus præsidijs quæ mordaces humores educunt, opitulabimur, & oui albore oculis infuso. Vbi uerò maturitatem acquisierit inflammatio, & corpus excrementis uacaret, balneis nullum inuenias commodius auxilium. Sed ijs quæ rudimenta ad plenitatem referunt, inflammationibus, euacuatione sanguinis, subductione uictris, & infernarum partium frictionibus, mederi competit. Intensionibus uerò, euacuato prius toto corpore, & humoribus qui sursum impetuose uergebant, ad ima reuulsis: deinde remedijs topicis, quæ discutiendi uim habent, succurrendum. Fotus igitur ipsis applicandi sunt, & fenogræci decoctum infundendum.

Vbi uerò crassi sanguinis humor oculorum uenulas intendit, sicut reliqui corporis succorum redundantia intendit, potio uini, quod inuiter calfaciendi, euacuandi, atque aperiendi, uim habeat, non inutilis est.

De lucis oculorum perturbatione, & priuatim de Ophthalmia, id est lippitudine.

Perturbatio humiditas oculi est, simulq; cum rubore præter naturam calor, non ex corpore, sed foris aliqua occasione adueniente: uerbi causa, sole, fumo, puluere, oleoq; suscitatus: proinde discreta ipsius causa facillime discutitur. In genere perturbationis huius ophthalmia censetur: non modò forinsecus, uerum citra euentem quoq; causam ingruens, & ad tertium, quartum, aut quintum diem plerunq; permanens. Medetur ei citra negotium, præcautione eorum quæ irritando foris efficiunt, nutritu exiguo, aquæ potu, aut deambulatione, aliuq; cita deiectione.

De inflammatione.

Quum oculi inflammatione tentantur, post totius corporis purgationem, ungentis utendū, quæ humoris pituitosi fluxum reprimere, & irritationem placare possint: uerbi causa, Nilei diarodon, aut Mediacum et Nardinum. Tunica uerò adnata, inflammatione correpta, collyrijs quæ ab affectus celeritate monemera dicuntur, cum oui albore infusis utemur: posttridie uerò, nisi phlegmone intendatur, oleum nardinum illinendū est. Fomentis autē ex decocto meliloti & fænogræci, uti cōsiliū est. Quod si ex crasso humore lippitudo proueniat, medicamenta quæ neq; obstruendi, neq; humoris incrassandi, sed quæ diffundendi, humidandi, & excernendi facultatem habent, utilia sunt: cuius generis est Chiacn. Quod si humores capiti fuerint impadi, cucurbitulā occipitio impone, uel sacrificato, uel hirudines fronti iuxta affectum oculum admoeto, aut cataplasma ex pane syncero aqua macerato, cum exiguo rosaceo: aut polentis in capitū papaueris decocto elixatis, super accom-

modato.

modato. Efficacior etiam utendum est cataplasmate de croco, meliloto, & palmularum carnibus, & tenerioribus coriandri folijs, vitellisq; ouorum assis, & micis panis in defruto maceratis, & exiguo rosaceo, capitumq; papaueris læuigatorum decocto. Semen quoq; papauerum quandoq; mitigandi doloris gratia miscetur. Quod si doloris uehemens fuerit necessitas, momentum opij adijcitur. Sine intenso dolore, deuitanda sunt narcotica. Si mediocris phlegmone urgeat, aloë per se, aut aqua aut oui albore dilutā illinito. Sed quo praesentius fiat auxilium, croci drach. sex, aloës sedecim, gummi nouem simul, aqua cœlesti excipe, collyriaq; concinna: sed & diaroica nuncupata remedia, ab ophthalmiæ principio peraccommodata habentur. Quos uerò prementi digito cedens, turgidiusculus et percandidus circa palpebras, adnatamq; oculi tunicam tumor, absq; tunicarum offensa infestat, his quamplurimum oculis afferent liquida collyria, hygrocolluria Græcè appellata, tum de croco, tum atramento sutorio, melleq; confecta. Illud uerò saluberrimum censetur:

Liquidum collyrium indolorium.

Metallici atramenti sutorij, mellis Attici, cremoris fœnograci, pares singulorum portiones, ad mellis usq; consistentiam elixabis, deinde nucleo specilli utrumq; hircum attingito.

Ad Epiphoram defluxionum.

Auersus defluxionum impetus (quas epiphoras Græci dicunt) in principio statim congruit inedia, aquæ potus, & omnium maximè concubitus abstinentia. Adhæc alius subducatur, posca aquosa madefiat facies, præcipuè si feruens fuerit defluxio: sin minus, atramento sutorio cū melle frontē atq; palpebras oblinito. Nonnulli uerò atramentum sutorium aqua maceratum, ad collutionē exhibent. Sed qui citra inflammationem huiusmodi destillatione afficiuntur: aut etiam cum inflammatione quidē, sed ita, ut supra os caluariæ consistat opifex materia, adglunamentis in fronte utendum: uerbi gratia, ex sim-

L 5 plicibus

plicibus quidem, uirentibus uitis folijs, aut rubi cremore, aut portulacæ, aut cotoneorum cum tenui polenta, aut galla trita cum uino, et tenuissimo farinæ polline, aut cicuta, aut pulicari herba cum aqua, aut solano, aut cochleis cū testis in liuorē contritis, instar cataplasmatidis à tēpore ad alierū tempus illitis: et ut summam persringā, adstringentibus atq; frigidificis. Ex cōpositis uerō pollen frumētaceum, aut myrrha, aut ibus, cum oui albore illinatur: aut Samia terra, cū myrrha et māna, similiter cū candido oui liquore. In frigidioribus porrō fluxionibus, sulphuris uiui, bituminis, picis, colophonie, uniuscuiusq; drach. duæ, pariter etiā musa trochiscus, et Aster, et cōsimilia, optimē fluxū reprimūt. Theriaca item uino adstringente subacta, frontiq; illita, frigidos humorū fluxus cōpescit. Hæc ipsa in potu quidē sumpta, magnificē succurrit, ipsi uerō oculo cū lana, tum panniculū tenuem, albore oui infecta, imponito. Causæ ad hæc recēs pari modo oculo applicatus, acutis maximē fluxiones cohibet. Collyria item cognomēto, quia reprimunt, statlica, cū illita, tum instillata aqueo oui idem præstant. Si uerō in profundo et sub calua, humor cōtensus lōgo tēporis spacio perennauerit, post uniuersales corporis euacuationes medicamētis quæ per nares repurgāt, et apoplegmatis utendum. Capitis tonsura, et quæ cutē eius rubicundā reddūt, probantur. Cæterū in his curationem etiā manū in capite accersunt: uerbi causa, angiologiā, et arteriarū sectionē, tum hypospasmodiū, tum periscyphismum, atq; circa uerticē usq; ad os combustionē. Cucurbitulæ autem occipitio cum scarificatu impositæ, fluxionis impetū reuellere possunt. Signa porrō fluoris extra caluariā, ex uenarum cōceptaculis deprehenduntur: quoniā ea circa frontē atq; tēpora supra modū tument, et caput ueluti reuindum cernitur, et quæ siccandi uim habent adglutinamenta auxilio sunt. Quod si horum nihil adsit, humorum impetu durante, et sternutamentis interim plurimum molestantibus, sub caluaria humorem hæere iudicandum est.

De

Cum ex uehementiore oculi inflammatione utraq; palpebra ita peruertuntur, ut ægerrimè subiacentes oculos uelent, albumq; ipsius sublimius nigro supereminet, ac rubrum etiam magnam nigri partem occupat: subuenit huic sanguinis detractionio, Catharticum, & diarhodum collyrium candidum, et spodiaceum, cum lacte, aut oui albore: quibus illinendæ sunt palpebrae, tempora atq; frons. Fomentis præterea & cataplasmatibus, quæ leniendi facultatem obtinent, utendum. Decreſcēte autem inflammatione, acrioribus subungendum cenſeo: quale habetur diarhodum uiride.

De hypophagmatis & Emphysematis.

Hypophagma, ruptio quædam uenarum agnatæ tunicae perhibetur, ex ictu ut plurimum contingens. Sanguinē igitur ipsis palumbi, aut columbae, aut calidum lac muliebre, in quo momentū thuris diluatur: uel muriā, maximè uerò salis Capadocij instillato. Vtilis item fots ex hyssopi decocto adhibitus. Conducit uerò laxis tumoribus, qui oculis ex plaga proueniunt, fots è posca continuus. Spongia itidem ex posca applicata. Spheclariū speculariumq; combustum, & stercus colubinum, pari pondere, uino aut aceto diluta inungito. Cataplasmatibus instar caseum recentem, aut radiculae corticem, aut uuam passam exacinatam, singulatim in posca aut aqua mulsa applicato. Hæc quoq; contra Emphysemata faciunt.

Ad Emphysemata pruriginosa, & Psorophthalmias.

Emphysema palpebrae ex crescentia est, laxo tumori similis. Psorophthalmia uerò, pruriginosa palpebrarum scabies est, ex salso nitrosoq; humore ducens originem. Expedit ipsis ex posca, lenticulae decocto, et rosariū fomētatio: tū illud hygrocollyrium, æris drach. sex, misyos combusti, myrrhae, uniuscuiusq; drach. tres, croci unā et semissem, pipēris drach. uini Chij, & passi Cretici, singulorū sesquicyathū: coquito ad mellis usq; spissitudinē. Hoc est medicamē Brasistrati, pāchryson appellatum.

appellatum. Valet etiam ad anginam, oris hulcera, uerendorumq; & aurium dolores. Allinantur autem & oleo genæ, sub somnum. Vitentur uerò acida, salsa, & acria,

De Sclerophthalmia & Xerophthalmia.

Sclerophthalmia, durities, & difficilis est cōmotio, cum dolore ac rubedine, absq; humore. Quocirca spongys aqua calida imbutis oculos identidem fouere, & palpebris, somnū iniaturo, ouū cum rosacco, aut adipem anserinū imponere conuenit, fugientes frigida, quæq; duritiem cōciliant. Caput uelari, & pinguedine oblini, aliusq; subduci debet. Xerophthalmia uerò, pruritui similis oculorū est, sine fluxione dispositio. Mendendum huic lauacris, inunctionibus, & boni succi nutritu. Virisq; præsidio cōmuniter fuerint medicamēta tam acria ut lachrymas eliciāt, per quæ durities remittetur, et ariditas humescet. Huiusmodi existit et Brasistrati panchrysos, & quod appellatur dicenthetō, & id cui cognomentum est stratiotico.

De Ectropiis.

Inuersio palpebrarum hæc est affectio, uel ad cicatricem, uel ad carnis superexcrecentiam referens originē. In quibus ergo subexcrecentia in uetustatem incidit, rasilis arugo torrefacta teritur & admouetur: aut plumbo cremato cum sulphure ignem non experto, & loto: aut ambobus aquis partibus, tum æris flore, tum plumbo utitor. nam quod ex cicatrice nascitur Ectropion, ad curationem sui consummatam, manuum operam desiderat.

De Ægilope & Anchilope.

Ægilops abscessus est, qui inter maiorem oculi hircum & nares fit: qui ruptus si negligatur, usq; ad os fistulam aperit. Idem priusquā in hunc erūpat, Anchilops appellatur. Magnificè igitur cōducit glauciū, & crocus, unā cum succo perdicij applicata: identidem uerò permutari debent, & neq; patidum mutantur ipsa. Aliud: Halica in aceto elixa, & sciētē friata: non modò incipientibus, sed et in suppurationem iam conuersis

cōuersis succurrit, aperitq; & ad os usq; descēdit. Hoc si quis utatur, non Aegilopas solum, uerū Anchilopas etiam medebitur. Aliud: Ruta satiuā cum cinere lixiuio quod primò destillauit, trita, decocta, & imposita, aegilopas præclarè instaurat, & usq; ad os penetrat: intra initia mordens, sed postea nō ita. Atq; suspiciendum interim, quòd nullam post se turpē cicatricem relinquat. Aliud: Cochleas cum testis tritas imposito. Aloë quandoq; & myrrha admixta, priusquā aegilops in sanem sit cōuersa, quod remediū etiā post apertionem desiccet.

De Trachomate, id est scabritate.

Trachoma genarum interiorum scabrities est. Harum exarsio rigida, quæ cō peruat, ut ueluti in fissuras exasperetur, Sycofis uocatur: quod si inueterauerit & occaluerit, Tylosis appellabitur. Collyrijs igitur utendum, tum illo quod è uino, tum eo quod è duobus lapidib. constituitur. Et ipso hæmatite lapillo aqua eloto, subiectis palpebris abstergēda est. Atq; Hermation cum exiguo cygnario, aut diacrocu, non tam ad hæc, quā ad psorophthalmiā sine exulceratione cōgruit, inuersæ genæ illitum. At si callus durior, his non uincatur præsidys, genam inuersam pumice, uel testa scpiā, uel folijs ficulneis, aut instrumēto quod à palpebrarum rasura Blepharoxyston uocant, abradimus.

Da Chalaziis.

Chalazium est ociosi humoris in palpebra collectio, cui mendo ammoniacum aceto liquatum cū galbano illinito. Opitulatur etiam unā cum ceroto excepta terebinthina.

De Crithe, seu hordeolo.

Hordeolum, quod critthen Græci nominant, tuberculum est quoddā exiguum in palpebra cilio longiusculum oriens. Quod oportet cera candida fouere: aut muscæ capite amputato, reo liquo corpore perfricare, aut hordeorum diluto perfundere.

De pediculatione palpebrarum.

Expurgatis antea pedunculis, aqua marina tepida ablucere palpebras

palpebras expedit: mox medicamentum quod subscribitur, cilio applicare. Accipe aluminis scissilis portiones duas, staphylidis syluestris portionem unam, quibus tritis utere.

De Madarosi, siue Milphosi.

Hoc pathema casus pilorum palpebrae est. Post uniuersi igitur corporis accurata curatione, smegmatis quae cognomento calliblephara (quonia uenustatis palpebrarum gratia lenociniumque inducunt) nuncupatur, utamur. Terrae Ampelidis, croci Celtici, ladani, & quales singulorum partes, tritas adhibe. Aliud: Stimmeos usti & eloti drachmam, plumbi cremati & abluti drach. quatuor, croci tantundem, nardi Indicae drach. treis, una contere atque utere. Aliud: Palmularum ossium crematorum drach. tribus, nardi Gallicae duabus contritis, utere. Hoc scabiosis quoque oculis subuenit.

Neapolitae ad palpebrarum defluuia, & diuturnos ciliolorum affectus.

Stimmeos, cadmia, chalcitidis, misyos xenici, & quas singulorum partes obiter contunde, melleque subacta torrefacito, laeuigatisque utitor.

De Prillofi.

Ptillosis, palpebrarum est in callum indurata crassities, rubes: quam magna ex parte capillorum defluuium comitatur. Praeter memorata igitur, muscerda etiam deusta, melle laeuigata & illita, summe proficit.

Ad superciliolorum Madarosim, uel glabreta.

Digitis oleo, seu oleo anserino infectis, plumbum contere, coque oblinito. Aliud: Hoc nonnihil nigroris quoque inducit: Noces ponticas crematas, cum adipe caprino, uel ursino contere. Aliud, quod ad menti etiam alopecias confert: Herbae Apollinaris drach. duabus, muscerdarum drachmam, polytrichi tantundem, unguenti irini cochlearijs quatuor, laeuigatis peracurata, unguentum admisceto, fotoque prius loco illinito. Qui si nonacula ante rasus fuerit, efficacius erit.

Ad

Ad Trichiasim palpebrarum.

Pilis qui oculum pungunt prius euulsis, locū confestim sanguine rane priuatim inungito, uel cum cinere chamaeleōtis albi, aut sanguine cimicum, aut fumariæ inter bordenū prognatæ succus cum gummi, aut tellinarū salsarum cinis cum cedrino liquore, aut loti cinis, aut alumen liquidum, phorimon appellatum, aut muscæ caninæ sanguis admodum ad hoc confert.

Trichocollia, id est glutinamentum capillorum:

Conglutinant infractos pilos: Bitumen, mastiche, colophonia, gummi, cochlearum uiscosa portio.

De Encanthidibus & Rhyadibus.

Encanthis est, cum maioris birqui naturalis caruncula excreuit, & protuberat. Rhyas contra, eiusdem est imminutio. Encanthidas igitur iisdem medicaminibus, quæ de Bæropio memorauimus, similibusq; rebus adurentibus, uel erodentibus comminues: non totas, ne Rhyas in uicem eius inducatur: sed ad naturalem uq; magnitudinem. Rhyades, magni quidē anguli carne siue rudis chirurgici manu, siue pharmacorum carnem corrodentium culpa absumpta, nullo medicamento uinci possunt. minuta uerò ipsorū parte, iis quæ modicè adstringūt & carnē inducunt, restituas: cuiusmodi sunt, quæ è croco & glaucio & aloë componuntur, & diacrocu appellata collyria. Altercum item in uino decoctum, & impositum, & momentum aluminis cum uino.

De oculerum h ulceribus.

Hulcerum quæ oculos infestare cōsueuerunt, genus quidem unū est, sed particulares differētiæ plures. Nā quod in cornea tunica cauū angustū, mundūq; bulcus fit, Bothriū nuncupatur. Quod uerò latius quā hoc, et minus profundū, Cæloma appellatur. Argemon autem in circulo iridis natū, ambientia comprehendit, ita ut extra iridem subrufum, intra uerò albuma appareat.

appareat. Epicauma uerò hūlcus est sordidum, impurum, & crustosum: quod cum expurgatur, sæpius humida quæ sunt in oculo effluunt. Et alia innumera ferme hūlcera sunt discrimina, de quibus cōmunius uerba faciemus. Proinde si hūlcus cum phlegmone ortum habuerit, curatio illis quæ phlegmones leniendæ et maturandæ potestatem habent, peragatur adhibita peculiari hūlceris medela: cuiusmodi quidem sunt collyria, Libanium, cygnus, et quæ pelaria appellantur: item aster, et similia: præterea quæcunq; ex amylo, terra astere, cerussaq; cōstant. Scimus autem omnium præstantissimum anodynum esse Ilamonem: ceterum in eius usu perseverandū nō est, quoniam uehementissimè stuporem inducit. Utilissimum autem diazematōn, nihil stuporis inferens. Quod si cum fluxu hūlcus fuerit, ex collyrijs aliquod illi admiscebimus: quale est diaphyras & chiacum, & fuluus cygnus, et breuiter quæ reprimendi sine rosione facultatem obtinent. Aduersus autem sordida oculolorū hūlcera, mulsæ modicè aquosæ ac fœnogræci decoctio utamur per se, et adiciendis etiam quæ ad eam rem facta sunt collyrijs. Acutiora quidem si fuerint hūlcera, albis, Seberiano, & quod ex fœnogræci diluto cōtextitur. Vbi uerò acria non sunt, collyrijs quæ myrrhā habent, et nardinis utendum. Ceterum hūlceribus expurgatis, Cleon medicamentum pulchrè potest cicatricem inducere, & eidem similem colorem induere.

De proptosi hoc est, procidentia oculi.

Proptosis casus est uicæ tunicæ, ab erosione siue disruptione corneæ proueniens, quæ exigua adhuc, ita ut muscæ caput referat, Myocephalon nuncupatur: aucta uerò amplius instar uicæ acini, Staphyloma dicitur. Vbi uerò plurimum succreuerit, adeoq; egreditur, ut palpebras transfiliat, Melon: cum deniq; obcalluerit, Clauus Græcè Elos appellatur. Quocirca si mediocriter tantū oculus, ueluti ad muscæ capitis instar à suo iusto modo procidit, medicamentis quæ reprimendi, astringendiq; potētiam obtinēt, utendum: uerbi causa, Chio, Phæo, Nardino,

dino, & Theodotio. Et eo quod ē summo oleæ coliculo, & ex cornu conficitur. Spongia, posca, aut uino adstringente, aut rosarum decocto imbuta, oculis leniter alligetur, aut splenium. Præcipuum uerò bonitatis honorē aduersus procidentias & omnia hulcera habet Olympiacum, aut Olympus appellatum, cum cremore oleæ, aut polygonij, aut polij. Eadē & hulceri Clauo cōgruentia sunt, & Staphylomatis priusquam albescant. Nam quæ maculis candidas contraxerunt, & calli instar obduruerunt, insanabilia censentur.

De oculi supplantationibus, suppurationibus ue.

Hypopyon in cornea oculi membrana quandoq; nascitur, nunc quidē in imo, nūc uerò in summo, ungui humano forma non dissimilis suppuratio: quæ causa est, ut unguis oculi etiam hoc malū appelletur. Scopus itaq; curationis huius est, ut pus quod in tunica coit, per ea quæ non uolēter discutiunt, dissipetur: cuius farinae sunt aqua mulsa, & fœnogræci cremor, et quæ ex eodē cōtexuntur collyria, atq; libanū, & quicquid ē thure cōcinnatur. Aut cōfringatur uomica, & cum ualētioribus expurgetur: ē quorū albo sunt diasmyrnes, & hygidii. Atqui hypopyis absq; exulceratione medendis, etiā illo utendum est liquido collyrio, cōposito ex atramenti sutorij, croci, singulorum drach. octo, myrrhæ quatuor, mellis libra. Catearum phlyæna cum corneæ membranæ extuberantia sit, ex humore compagem ipsius excoriantē, curationi subijcitur sugillatorū. Medicamē humidū ad hypopya: Bassi, croci, aloes, myrrhæ, uniuscuiusq; uncia, uini quadrans, mellis optimi uncia sex, diluatur crocus cū uino exiguo, deinde aloē cum myrrhæ, & simulatq; crassitudinē prætulerint, inijcitur mel. Vniuersa uasē uitreo reponuntur: bis quolibet die, ter 'ue, si necessitas urgeat, illinito. Vna quippe opera oculum purgat, carnē reficit, & cicatricem inducit.

De cicatricibus & leucomatis.

Cicatrices quæ in superficie oculi innascuntur, à quibusdam
 M generali

generali nomine cicatrices, à nonnullis uerò nebulæ: quæ altius deliteſcunt, leucomata, id eſt albugines dicuntur. Quibus medicamenta abſtergendi purgandiq; facultate prædita ſubueniunt. Leuioreſ uerò maculas, nebulas inquã, anemones ſuccus exterit, atq; minoris cõtaurij ſuccus cum melle. Baſ autem quæ longiore temporis ſpacio perſeuerauerunt, cedriæ liquor extenuat. Acs itẽ per ſe aqua inſtar collyrij tritum: & detergentia collyria, cuius generis eſt, quod e cornu ceruino fit, & rhinarion, hecatombeq; & ſimilia. Sed leucomata, nitrũ oleo peruetuſto accuratẽ maceratũ, ſcitẽ illitum, diſcutit. Idẽ ſepiæ teſta cremata, cum melle trita præſtat. Inter collyria autem, hoc quidem haud inſcitẽ & clemẽter extergit. Mamiæ, gutta ammoniacæ, myrrhæ, troglodytidis, oletuli crocodilorum, æquiſ partibus, in collyrijũ redactis utere: aut cõſectis ex aqua diſſoluto crocodili terreſtris ſtercore collyrijs, maculas obſonito. Haud improbẽ ex Cappadocicis ſalib. aqua dilutis collyria, natura cõtra albugines cõparata, guttatim inſtillaueris.

Cicatricum tinctura.

Gallæ, acaciæ, ſingulorum ſemiuncia, atramenti ſutorij drach. binæ. Collyrium præterea illud proficit: Mali Punici floris, cytinorum, atramenti ſutorij, acaciæ, gummi, uniuſcuſ iuſq; uncia dimidia, ſtimmeos, gallæ, ſingulorum drach. duæ, aqua ſoluuntur. Cum autem mali Puniei flos ad manum non fuerit, tum quæ inſtar mēbranæ acinos intercedũt, admiſceto.

De Pterygiis, hoc eſt unguibus oculorum.

Vnguis ſiue Pterygion, neruoſa quædã adnatæ membræ nula excreſcẽtia eſt, ab angulo quidẽ oriens, ſed ad oculi uſq; pupillam procedẽs: quæ ſupra modũ adaucta, pupillã operit. Magna igitur & inueterata pterygia, ſola manu chirurgica exciduntur. Recẽtiores uerò, & mediocris magnitudinis, abſtergentibus præſidijs expugnantur: cuius generis ſunt, quæ palpebrarum aſperitatem, & albugines propriẽ conſumunt. Ex incompoſitis quidem æs crematum, aut atramentum ſutorij,

ritum, cum felle suillo optimè cōducit. Sed lōgè efficacius hoc, cum atramenti sutorij partem, gummi partem semissem uino macerata inungimus, uel collyria conformamus. Nonnulli uerò fel caprinum melli confusum illiniunt.

Ad Ptergia, Hypopyos & Amblyopias: Oribasii.

Lapidis magnetis, eruginis rasilis sinopidis, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorū drach. quatuor, croci drach. duæ, mellis Attici cochleariū. Hoc etiā medēdis albuginib. cōfert.

De Antrachosi & catcinomatis:

Carcinoma, id est cancer, in cornea oculi mēbranulā abscissus est, magni doloris, tunicarū ruborem & dilatationem præferens, cruciatus pungens usq; ad tēpora protenditur, potissimum si concutiantur: appetitū carent, & acerbis exacerbantur: hoc malū remedijs nō uincitur. Dolor tamē lactis potu leniendus est: frumentacearū item & probi succi epulariū porrectione, absq; ulla acrimonia. Collyria dolorē sedantia infundantur: uerbi causā, Spodiaciū, Seberianū, atq; id genus alia. Consulendum præterea bono totius corporis temperamento. Atqui Carbunculus quoq; ipse hulus est maleficum, difficile, crustosumq; quod nunc quidem bulbo, nunc uerò palpebrā, quemadmodū & alijs quibuscunq; corporis partibus contingit. In eius qui in bulbo oboritur, curatione, statim ab initio fieri debet cum clystere euacuatio: deinde lacte cōctionē probam experto, moderata expurgatio: mox spongia foto, farinam orobinam aut triticeam in mulso elixā, adglutinare expedit. Nonnunquā & iridem tenuem emplastri modo superapplicare, lacteq; oculū eluere. Si ulcera edendo repant, lenticulam cum melle, aut malis cydonijs decoctis accommodare. Si latius depascendo diffunditur hulus, folijs oliuæ elixis, malicorijs in uino concoctis cum melle contritis. Noma autem consistenter, & crusta impositu medicamenti quod dicturus sum, decedite, cum hulcera fuerint pura, luteis ouorū assis tritis cū croco et melle, donec cicatrix inducatur, oblinito. Medicamentū

M A autem

autē est illud: Spody drach. quatuor, myrrhæ non admodum torrefactæ drach. treis, & obolos totidē, in Amineo uino usq; dum exiccetur macerans, passo Cretico ueteri cōmisceto: ubi simul eliquata fuerint, liquidum in pyxide fidili excipito, atq; sublinito. Sed ad carbunculos palpebrarū, malum punicū acidum totum & contusum concisum in aceto coquito. Vbi subadum frustulatim, probeq; leuigatū fuerit, lintecum oppleto, et utitor; interdū quidē bis ter' ue cōmutans, noctu uerò semel.

De Mydriasi.

Mydriasis uitium est, quo colore nihil quidē cōmutato, pupilla multo naturali habitu latior apparet, & nonnunquā uis foriam facultatem ex toto impedit, interdum uerò magna ex parte species hebescit, ut obiecta lumini longē minora esse uideantur quā sint, cuius causa est excrementitius quidā humor. Succurrēdū est itaq; sanguinis incisa uena cubiti detractio ne, uel expurgatione: si uerò non, uenas in hircis diuidito, de inde cucurbitulā occipiti imposito. Faciē itē atq; oculos aqua marina perfundito. Quod si marinæ copia non sit, muria aut posca. Medicamentis deniq; iisdem utendū, quæ & in medendis phlyctænis expediunt.

De Phthisi & Atrophia.

Phthisis affectus est, quo pupilla angustior, obtusior, hebetior, corrugatioq; redditur: quæ cernitur, maiora esse apparerent quā sint. Oritur uerò ex ariditate condensante. Dirimitur autē phthisis ab atrophia hoc discrimine: Phthisis angustiores facit pupillā, atrophia uerò totum oculum exiliorem & humiliorē reddit. Medebimur autē huic exercitationibus, et quā accurata capitis, uultus, & oculorū fricatione: facies ad hæc aqua fouēda, caput ungēto aliquo calorifico circumliniendum. Oculi rarefacienti medicamento aliquo ungendi, quāle est quod sequitur: Gutta ammoniacæ drachmam, crocomagnatis drachmas quatuor, croci duas, floris æris drachmam, aqua excepta in usum adhibeto.

De

LIBER TERTIVS.

181

De Nyctalope, id est acie uespertina.

Nuscitio, quæ Græci nyctalopa appellant, uulgò dici consuevit, quoties acciderit, ut interdiu quidem iusta acie uideat quis: occidete uerò sole, obtusius: noctu planè nihil. Medebitur huic, sanguinis è cubito detractione, hirquorū expurgatione, aut per clysterē inanitione; mox apophlegmatismis pituitam detrabere, aut sternutationes ciere præcipimus. Potui byssopum, aut rutā ante cibum offeremus. Quod si his peractis, non ex animi sententia succedat, rursus medicamentū expurgandī facultate præditum, ex scammonia & castoreo exhibeatur. Oculi melle despumato inungantur, conuiuentibusq; ipsis ac cōpressis humida intus contineantur. Aluminis cōbusti partes duas, salis fossilis unā, cōtere cū melle, atq; sublinito. Aliud: Iecur hircinū assatur, & aquosus inter assandū inde emanās humor collectus inungitur, ipsumq; hepar edendū exhibetur: de coeli quoq; iocinoris uapor oculis apertis accipi præcipitur.

De glaucomate & hypochymate, ex Rufo.

Glaucoma & hypochyma, unū idemq; mali genus esse antiqui putauere. Posteriores uerò glaucomata quidē crystallini humoris uitia, quæ ex humiditate in glaucū colorē transeunt, existimauerunt. Hypochymata uerò, suffusione humorum, inter corneā & crystallinā tunicā concretorum. Sunt autē omnia glaucomata ex ijs quæ nullo prorsus eliduntur remedio. Hypochymata uerò sanantur, sed non omnia. Verū illis qui suffusione tentātur, antequā morbus consistat, sanguinis è cubito detractione, expurgatione, enematisq; acrioribus succurritur: uerbi causa, ex centaurij, aut cucumeris amara decocto, & alui crebriori solutione, cucurbitulisq; in occipite cum scarificatione adglutinati. Per uniuersam uidus rationem, a quam potare, & alimentis extenuatibus uti congruit. Conferent autem temporis progressu, et apophlegmatismi per dies aliquot. Qui uerò perperam intuentur, tanquā si culices appareant, è prauo aliquo humore, aut biliosioribus uaporibus sur

M 3 sum

sum balantibus, his medicamentum ex aloë amarum exhibebimus continuè, aut cum illo quoque purgabimus. In oculis itidem medicamentis utendū, primum quidem simplicibus, ueluti melle & oleo cum fœniculi succo. Mox etiā cōpositis, cuiusmodi fuerit illud: Sagapeni didrachmiū, succi Cyrenēsis, uera tri candidi, singulorū drach. sex. Alij in mellis acetabulis oīdo excipiunt: nos autē, Oribasius inquit, subscripto utimur: Caue calidis liquoris, chamædryos, sanguinariæ, uniuscuiusque, æquales partes conteruntur. Faciunt uerò bene etiam collyria, & quod ex succo fœniculi cōfit. Proteus præterea, & Thalasserys, & è succo balsami confectū, & ex his contexta collyria, opitulari possunt. Ad hæc fœniculi decoctum in principijs superfusum auxiliatur, medicamētumque ex succis opobalsami, pleo ueteri, & id genus confectis.

De Amaurosi & Amblyopya:

Caligatio, quā amaurosim Græcè nominant, est totius plerumque cernendi usus absque manifesto oculorū uitio impedimentum. Obtusio uerò, quā amblyopiam Græci uocant, hebetudo uidendi est, ex clandestina quadā causa proueniēs. Curatio ei in uniuersum eadē quadrat, quam antea in suffusionibus oculorū explicauimus. Speciatim uerò ex oculorū hirsutis sanguinis euacuatio, hirudinū circa tempora adiectio, et infernarum partium frigidio. Progressu uerò tēporis, sternutationem cientibus utendū, & ante cibū uomitionibus, & inunctionibus primò quidē ex mellis & olei æquis partibus, deinde ex his quæ sequuntur cōcinnato: Croci oboli bini, fellis hyenæ drach. piperis cōmunis grana octogintaquinque, cremoris fœniculi drach. sedecim, guttæ ammoniacæ thymiamatis drach. una, dissolutis pulueribus cū succo cōponūtur, mellis cochlearia quatuor adijciuntur, præparata & ærea pyxide excepta utere. Antè inunctionē autē oculi in calidā aquā marinā immersi fouētur.

De Strabismo.

Infantes à generatione strabismū patientes, curantur, per
sona

sona siue larua ita faciei, ut in rectum necessariò intueantur, imposita. Strabismus enim conuulsiva musculorum qui bolbū mouent, est affectio: & lucerna è regione posita, non ex obliquo apparente, emendatur. Sed quādo nares uersum oculi detorquentur, floccos rubro colore suffusos, oculorum hircus, qui circa tempora sunt, adglutinato, ut ad hos fixis luminibus directè intuentes, corrigant oculos.

De Epietismo.

Ita exprimuntur ac eliduntur quādoq; oculi, ut exerti per seuerēt. Quibus ex strangulatu utiū oritur, incisio uenæ cubitus praesidio est. Si ex alia quapiā occasione uisueniat, uera tro nigro, aut scammonio alius ducēda est. Expressiones uero oculorū, quæ ex dolorib. proueniūt, sæpius enim ex nisu laborantium è dolore partus contingunt, purgationibus soluntur: proinde has moliri atq; iuuare competit. Iris autē post sanguinis detractionē, si non quieuerit malum, occipitio cucurbitulā adhibeto, lanamq; melle illitam imposito, aut floccos cum aqua, superq; linteum duplicatū, suspensa manu adalligabis. Expedit præterea, aqua marina gelida uultui superfusa, Cichorij itē, & seminalis herbæ succus cum lachryma papaueris illitus: & alia cōtrahēdi et astringēdi potestate prædita.

De oculi suffusione, quam synchysis uocant.

Confusiones ex idu, sanguinis à cubitu detrahitio, sanguinem item potissimè nuper precepti turturis curat. Sin minus, uersum oculū sanguine columbino oppletū: deinde lanas molles in ouum contusum cum uino, & rosaceo maceratum imponitur & alligatur: sequenti die idē faciendum: tertio fouendum, lac instillandum, & ex rebus idoneis cataplasma adglutinandum. postremò collyrijs, quæ ad ueteres affectiones faciunt, perungantur: uerbi causa, Chiacco.

De Myopia.

Lusciosi, quos myopas Græci uocāt, dicuntur, qui statim ab ertu quidē ipso, oculis propius admota cernūt, sed procul dista spectare nequeūt. Insanabilis sanē istiusmodi affectus est, ob

spiritus uisui, unde nascitur, debilitatē. His contraria patiuntur decrepiti. nam quæ longius distāt, exadius quàm quæ admotā sunt oculis, conspiciunt.

Auricularia, & de aurium dolore. Cap. 23.

Postquam aurium dolorem algore contractū ex anni tempore, antea dicta uisus ratione, uel laborantis interrogatione, utrum ex euidente causa prouenerit, cognouerimus. Et ex eo quod dolor in ima aure sine grauitate, uel distensione, uel ardore fixus sit, calorificis curabitur praesidijs, auditili mealui oleum rutaceum calidū, aut nardinū, aut laurinum calidum, aut amaracinū, aut phulliatum, aut spicatiū, aut cōmune, cum euphorbio, aut pipere, aut castorio, aut commagenū quod uocant ungentū, aut succum balsami instillādo. Et oleum in quo feruefactum sit alliu, uel cepa, auribus instillatum, auxilio est. Ex calida uerò intemperie contracto dolori, in quo feruorem quendam citra grauitatē aut distensionem sentiunt, contrarijs occurrendū, cādido oui liquore colliquato auri infuso, perinde atq; in oculo, Et lacte muliebri, cum aliquo ex anodynīs collyrys, aut succo perdicū, cum exiguo rosaceo, eodemq; ipso, aut oxyrhodino, aut succo solani, aut coriādrī, aut albuci, aut oleo in quo lumbrici, aut multipedes aselli, qui in locis uliginosis, sub situlis uel reperiuntur, decocti sint; aut oleo amygdalino perse: uel uiuentia buccina tria in eo elixa, à natura faciunt. Ceterum ex uiscidis Et crassis conceptū humoribus dolorē, è capitis, ipsarumq; aurium grauitate, Et praecedēte uisus ratione cognoscēs. Sola absq; grauitate aurium distentio, spiritū flatulentiū inclusum colluctari intus testatur. Utēdū itaq; in utrisq; aperientibus Et incidentibus medicamentis: cuius generis est, aphronitriū cum aceto et melle, atq; bilis ouina cum oleo communi, siue amygdalino; necnon Et porri atq; cepae succus tepens cū melle, aut origanum cum melle, lacteq; muliebri contritum, stillatim infusum. Aduersus autē uehementiores frigiditates, fel caprinum cum porri succo instilletur. Quibus uerò dolor

dolor ingens est ac diuturnus, & grauitas auditus, etiam hisce utendum: cuiusmodi sunt, dracunculi succus, ari, bryonia, & huius farine cætera. Priuatim uerò eis qui auris cruciatu propter flatulentū spiritum torquentur, cucurbitula aqua calēte prius calefacta, circa aurē agglutinata, magnificè succurrit. Quòd si grauitas, distētio, pariterq; calor, & dolor pulsatis, aut febris etiā tentet, inflammationē subesse censeo. atq; ante omnia quidē incisione uenarum utendum: deinde cum auriculario specillo lana inuoluta, oleo dulci calido frequēter fouere expedit. Adeps ad hæc anserinus meatui instillandus est, aut uulpinus, aut Basilicū medicamētū cum rosaceo, aut cyprino, aut irino. Foris porrò cataplasmatibus modo illinēda sunt, quæ leniendi dolorem pariter & concoquendi potestatem habent. Sed dolore uiolentiùs saeuiente, ijs quæ mediocriter sensum stupefaciūt, utemur: haud enim leue inde periculū cerebro, quod auditorio neruo inflammato uicinū est, incumbit. Pulchrè igitur dolorē placat, quod habet opij partem unam, castorei partes duas cum lacte muliebri, aut candido oui, aut uino dulci, si tepidū auribus instillatur. Crocodes quoq; pastillus, & Aster, & Philonis antidotus, ita afflictos sæpenuerò adiuuit. Iam uerò aurē assiduè uel oleo communi, uel aliquo calido fotu fouere ex usu est. Lanam eo ipso intinctā in aurē demittere, ita quidem ut minimè, quantum fieri potest, particule ab inflammatione infestatæ attingantur. Vbi autē dolor inueterarit, & iam in suppurationē conuersti cœperit, medicamento è succo seminis lini utitor: instillās id ipsum cum rosaceo, aut chamæmelino solutū. Vbi uerò aqua medicamentosa auditorio meatui inherens offenderit, siquidē plurima fuerit, oris suauis, aut calamo in aurē demisso, ipsam extrahito. Sin pauca, lana auriculari specillo inuoluta, extergens hanc, oleum aliquod tenuium partiū, aut rosaccum, aut oui album, aut muliebre lac, instillato. Cuncta autem moderatè calida esse oportet, quæ auribus adhibentur.

Ad hulcera cum inflammatione infestantia.

Lyciū & meconiū, pari quantitate cū melle trita indātur.

Ad maximos dolores, pus, & grauem auditum.

Amygdalarū delibratarum, spumæ nitri, opij, thuris, singulorum drach. treis, croci quatuor, galbani duas, myrrhæ unā, aceto læuigata, instillato, dolore quidē infestante rosaceo diluta: si purulentia adsit, mulso aut oxymelite: si difficultas auditus, aceto. Hulcera porrò recētia, glaucium aceto subactum, medetur, & quæ ex eo cōficiuntur collyria. Faciūt idem diarhodon, diacrocū, et diasmyrnes. Quemadmodū rursus suppurantia citra dolorē, spurcitia ferri cū aceto diutius læuigata.

Ad sordes aurium induratas.

Nitro aceto soluto cum aqua aurem colluito, & absterfis sordibus, nitrum aceto dilutum cum rosaceo instillabis. Aliud ad sordes: Cardamomi & nitri momentū cum caricis exacinnatis exceptum, in collyria digestum, auribus inijcitur, & per triduum gestata, educūt sordis plurimū, & haud mediocriter leuant. Conducit autē insuper excrescentys carniū, diutinis doloribus et exulcerationibus, quod habet, aloes, thuris, myrrhæ, singulorum drachmā, misyos quatuor, quibus cum aceto in pastillos coactis, ubi utendū fuerit, aceto & rosaceo soluta, infundito: pastillumq; Andronis, Heræ, & Musæ.

Ad inueterata hulcera.

Cedrinum liquorē melli confusum, illinito. Aliud: Misy combustū, & in farinā tritū, inspiratur. Aures cum oriculario clystere, posca, aut oxymelite, aut mulso, aut iure alicuius repellendi uim habētis, ueluti lenticulæ, aut rosarū, eluuntur.

Ad aures cruorem exudantes.

Blue auriculam rotundi odorati iunci decocto, polygonij uerò succum cum momento aceti instillato, aut lycium, aut amurcam, aut acaciam, aut porri liquorem.

Ad carniū excrescentias.

Auris nitro ex aqua calida, unā cum squamæ aris, & sandarachis,

daraches, æquis partibus illuitur: crusta uero obdusa, melle repurgatur.

Ad aures uerminosas.

Absinthij, aut centaurij, aut porri decocto colluatur. In istis labis item capparis foliorum recetium, aut fructus eiusdem succum, aut liquor cedrinum, aut humanum lotium peruetustum, aut ueratrum album cum melle, aut nepeta succum, aut scammoniæ cum aceto, aut succum absinthij. Oleum quoque meatui instillatum usque ad summum, ipsos euocat. Præstat autem oleum aceto temperatum. Et aduersus animalcula quæ auribus incidunt, ipsædem utitur.

De calculis, & consimilibus quæ auribus inciderunt, extrahendis.

Auricularium specillum lana inuolutum, terebinthina, aut gummi, aut alio quopiam glutinoso madefactum in aurem demitte, atque ita ipsum extrahes. Quod si per id parum profeceris, oleum calidum meatui assidue instillato. Si ne tum quidem eijciatur, aut comprehendatur, alia aggrediunda est ratio, ueluti in volumine de Chirurgia prosequemur.

De sonoribus ac sibilis aurium.

Si aurium tinnitus in febribus, aut earundem decretorijs prouenerint, noli quid negotij facessere. propediem namque cum plurimum, sponte hæc murmura cessant. At si post ægrotationem perdurauerint, absinthij decocto auribus fotis, acetum atque rosaceum infunde, aut radiculae succum cum rosaceo, aut helilebori nigri cum aceto. Contra ueteres aurium sonos ex crassis & uiscidis humoribus obortos (deprehendes autem id, quod non uniuersim, sed particulatim obueniunt, consistantque) aceto et nitro et melle aures eluito. Aliud: Veratri candidi drachmas, castorij tantundem, croci tres, nitri sedecim, in aceto dilutas dirige in rotulas, & utitur.

Ad diurnos aurium tinnitus & sibilos.

Euphorbium oleo cyprino dilutum calfactumque inijcitur, quibus

quibus ex nimio sensus acumine caput euaporationibus et flatulentis spiritibus tentatur, his castorium, & semen cicuta in aceto laeuigatum instillato.

De grauitate auditus, & surditate.

Surditates quæ è primo statim ortu, aut post partu quidem, sed diuturnæ, & absolutæ constituuntur, curatione non recipiunt. Quæ autē absolutæ non sunt, sed inueteratæ tamen, & ipsæ insanabiles sunt, aut ægerrimè curantur. Quæ ex bilioso humore sursum uergente conflantur, non admodum difficulter euacuationibus, quæ medicamentis bilem deducentibus fiunt, discutiuntur. Nonnullæ etiā nulla medela adhibita, bile per inferna deiecta abolentur. Surditates uerò, uel audiendi grauitatem, è crudis & crassis humoribus prognatas, sectione uenæ, aut omnino purgatione cum hiera curato: apophlegmatismis item & errhinis utens, naturalibusq; aut ex marina lauacris. In auditorium autē meatum instillare quæ ad aurium tinnitum præscripta sunt, cõuenit. peculiariter autē hæc: lotium & fel caprinum, aut solummodo fel, aut rutæ succus cum melle, aut castoreum cum oleo anethino, aut æsopi medicamentum cum unguine nardino, aut fel caprillum cum galbano. Aut quod habet castorei drach. duas: nitri, ueratri cãdidi singulorum drach.

Ad contusionem aurium, quam thlasin nominant.

Hippocrates quidem nihil ipsis admouendū asserit. Quoniam autē à laborantibus sæpenuerò impellimur, utendum utiq; his: Myrrhæ, aloës, thuris, acaciæ, æquis partes, cū aceto, aut oui cãdido oblitito. Aut panis calidi medullā cū melle in mortario cõtusam, cataplasmatibus modo inducito. Vel quod recipit, Bituminis, thuris, aloës, cochlearii carnis, bulborum Aphricanorum, pares singulorum portiones aceto contritas imponito. Si phlegmone accedat, sesamo soluta illinito, aut chondro cum aceto elixo. Atqui cataplasmata in hac affectione laxiora sunt, absq; deligatura: uel leuiter modò uinciantur, laxamq; oleo infusam sinuoso auris specui imponito,

De

LIBER TERTIVS.

De Parotidibus.

Parotis, glandularū iuxta aures est affectio, quæ eructante inibi materia, nunc ex capite humoribus in eo impactis, nunc ex reliquo corpore in febribus decretoriū facientibus, exoritur. Quocirca si etiamdū in profundo delitescens, parotis non assurgit in tumorē, extrahentia præsidia exhibentes, aut cucurbitulam affigentes, aut fomentationib. crebris utentes, ne si in altū remeet materia, periculum afflicti non effugiant. Si uerò in tumorē fastigiatum cum inflammatione attollatur, contrarijs omnino cataplasmatibus, leniendi & maturandi uiribus præditis, utemur: uerbi causa, ex farina hordeacea, aut triticea, aut seminis lini farina cum mulsā, aut fœnogræci, aut altheæ, aut chamæmeli iure decocto: et quod ex rumice & axungia sine sale constat. Si sanguis modū excedere uideatur, cucurbitulus est ante omnia ipsius incisione uenarū, siquidē per uirtutē laborantis integrū sit. Sed si tumor nō discutiatur, medicamentis quæ suppurationē inducunt, utendum: cuius generis est farina triticea, cum caricarum decocto & oleo: atq; id quod ē polline, itē id quod ē fermento cōponitur medicamentū. Commeante uerò iam ad suppurationē abscessu, uel dissectionē purulētia excernetur, uel acri medicamine cōfringetur. B. quorum albo censetur, nuncupatū smilium, & quod ex allijs constituitur. Parotides autem leuiore fotu ē muria discutiuntur: item diaperanu medicamēto. Hoc quidem non pus modō immaturatum dissipat, sed indoloriū etiā præ omnibus cæteris est efficacissimum. Ad inueteratas parotidas, buccinorum aut purpurarum crematarū cinerem cum melle aut axungia imponamus, aut ficus marinas coctas, aut marrubiū cū sale. Iam obduratas emollit, tum Mnasei, tum Ariobarzanos cōfectio. Præsentissima uerò est, quæ ex lentitia seminis lini textitur. Ante uerò hæc illinito ammoniacum, mixta cum cataplasmatibus pice liquidā, aut adipe taurino, aut bdellio, aut styrace, aut medulla ceruina.

De

I olfaciendi potestate læsa, uox incolumis seruetur, antea
 Sriorum cerebri uentriculorū affectionis suspicio est, qui uel
 simplicis intemperiei culpa noxā conceperunt, uel prauorū
 humorum exuperantia. Si uox autē simul læsa fuerit, ac labo-
 riosior quodāmodo, propter obstructionem meatuum, qui ethi-
 moides à colando uocantur, euaserit, malum rursus ex uitiosis
 humoribus conceptū putato. Proinde cerebri intemperatura
 ex notis sæpius enumeratis cognita, cōtrarijs utitor remedio-
 rum adminiculis, caputq; calida marina perfundito: humores
 apophlegmatismis euacuato, maximè uerò quæ ualidè per na-
 res educunt errhinis. Odoramentaq; subtiliū partium, quem-
 admodū in distillationibus exhibeto. Si humorū copia in uni-
 uerso corpore uersetur, hanc prius uel detractione sanguinis,
 uel purgatione cū hiera euacuato. Sic et in polypo, & oza-
 na agendum cenſeo: deinde loco forinsecus injiciēda sunt auxilia.
 Theriaca quæq; potasæ piſsimè opem præsentissimam attulit.
 Est autem polypus, tuberculū præter naturam in naribus ob-
 ortum, substantia polypodis marini carnem referens. Eiusdem
 uerò naturæ est et sarcoma, hoc est, caruncula in naribus præ-
 ter naturam incrementum. Oza-na uerò hūlcus est cariosum,
 ac putridum, ex acrium humorum illuue prognatum.

Ad Polypodas & Sarcomata.

Squamulæ aris unciam, atramenti sutorij drach. sex, san-
 darachæ quatuor, ueratri nigri duas, naribus flatu impellito:
 & utere perinde atq; præstantissimo: nam in tredecim diebus
 opem præbet notatu dignam. Conducit & atramentum suto-
 rium, cum aceto. Aliud: Corticū mali granati sesquiunciam,
 atramenti sutorij drach. decem, chalciteos odo, bilis taurinæ,
 amomi, myrrhæ, nepetæ, marrubij, singulorū drach. quatuor,
 croci duas, ueratri candidi quatuor: arido utere. Aliud: Di-
 phryge læuigato nares attingito, & peniculo ex linamento
 funiculari prius patentes facito.

Ad

LIBER TERTIVS.

191

Ad Ozænas.

Misſyos, chalcitidis, myrrhæ, uniuſcuiuſq; drach. ſeptem, atramenti ſutorij ſex, aluminis fiſſilis, gallæ, ſquamulæ æris, ſingulorum drach. quatuor, aluminis rotūdi duæ, thuris una, aceti ſextarius, totum in uaſe æreo ad mellis uſq; cōſiſtentiam elixatur, ex carptis q; linamentiſ penicillo adhibetur.

Aliud: Aeruginis & æris ſquamæ paria pōdera in puluerem redacta, conferunt.

Aduerſus fœditatem odoris narium.

Myrrhæ, acaciæ, amomi, ſingulorum drachmā, melle deſpumato exceptā, ſummo nariū interſepto adglutinare mandato. Aliud: Amomi, myrrhæ, roſarum ſiccarum, æquali pondere, unguento nardino exceptum, illinito. Cōducit etiam graueolentiæ narium, malagma Hedychroi cum uino.

Ad hulcera quæ naribus inſident.

Ceruſſæ libram, ſpumæ argenti uncias treſ, ſcoriæ plumbi tantundem, uel plumbi cremati: ſingula probè lota, uino oleoq; myrteo excipe.

Ad ea quæ Glycea dicuntur hulcera.

Spumæ argenti, rutæ recentis, ſingulorum drach. quatuor, aluminis ſciſſilis duæ, oleo myrteo atq; aceto ſubiguntur.

Sternutationes prolicientia.

Sternutamentum citat helleborus albus, aut caſtoreū, aut piper, aut ſtruthion, aut uno faſce omnia: neq; tamē inſpirare, ſed pinna aut digitulo ad intimam naſi partem inſerere conuenit. Sternutamentū autem plus æ quò citatū, medicamine compeſcendum eſt: nardinum igitur, aut roſacēū, aut glycelæum, inſunduntur. Quin & odoramēta ſternutamenta ſiſtunt, aniſum, ocimi ſtipule contuſæ. Sed inter hæc omnia caput ſmegmatis ex nitro & pumice factis exiccandum eſt, aut eo quod Aſclepium cognomentum habet, & Conſtantini ſapone, & Cappadocico ſale, & alijs id genus utendum.

De ſanguinis profluuiio e naribus.

Super ſanguinis ex naribus eruptione, quæ febricitantes infeſtat, libro ſecundo inter febres recensuimus. De quacunq;

uer o

uerò alia, quæ ægrè compesci potest, in præsentia agemus. Chalcitidis pollinem ellychnio siue funiculo lucernario con-
cocto, aut priapisco excipe, & foraminibus nasi indito: aut
oui calycis cinerè admisceto, & gallæ dimidium: lyciõe indi-
co attinge, aut stercoris asinarij cremati cinerè inspirato, aut
succum eius elicitū instillato, aut molaris lapidis extincti ace-
to uaporem naribus hauriendum præbeto. aut obstruente hoc
unguine uitior: Mannæ thuris partē, aloës semissim, oui can-
dido excipe, & utere, per linteolum ex ellychnijs intortum, fo-
rinsecus leporinis pilis unctulo adiectis: aut lucernarij funis-
culus in nares conijcitur. Aut cucurbitulā leuem directē hypo-
chondrio naris, unde sanguinis eruptio fit, bene magnā et con-
stanter applicato: uel aures ualentius obturentur, frontē spon-
gijs gelida aqua imbutis foueto, uel syciā cum sanguinis detra-
ctione occipiti adglutinato. Quandoq; uenam secare, nisi quid
interdicat, & extremas partes deligare expedit: præcipuè
brachia atq; crura, quemadmodum in uenæ sectione solitum
est. Ad hæc agitari cōcuti q; easdem particulas imperato, ma-
nus quidem perfricando, pedes uerò obambulando. nam uenis
indidem sanguine fartis, narium uasa inaniantur. Spongia ge-
lida posca madens, foris q; manantibus sanguine naribus stri-
ctim applicata, quod desideratur, identidē absoluit. Satius au-
tem, si antè naribus cuncoli instar penicillus prælongus ex li-
namentis carptis contortus inseratur.

Aduersus faciei uitia, & antidotum quò facies a rugis
conseruetur. Cap. 25.

Thuris drach. quatuor, fuci tres, spumæ argenti, piperis,
tuniuscuiusq; octo, omnibus ex ichthyocollæ tunfæ diluto
solutis, & in rotulas conformatis, utendum. Aliud: Ramenti
eburnei drach. octo, thuris masculi, ichthyocollæ, paria pon-
dera: utere, quemadmodum dictum est.

Ad faciei nigredines.

Ircos, aut ptisanæ lomenti, singulorum sextarius unus &
semis,

semis, salis ammoniaci, cornu ceruini cremati, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusq; sextans, aqua dissoluta in pastillos diriguntur, rursusq; aqua diluta ante balneum illinuntur. Aliud: Pissanae, erui, thuris, illyridis, spuma nitri, singulorum chœnices quatuor, costi, amygdalarum amararum, uniuscuiusq; drach. viginti, ouorum candido liquore, et lacte asinino excipito, atq; eo quo diximus modo utere. Vincit etiam pastillus Peponatos.

Ad asperam & discolorum ceu a sole cutem, & lentigines.

Cretæ cimoliæ torrefactæ cōgins semis, spuma nitri assati uncia, siliquæ eruacæ uncia media, fellis taurini, scobis eburnei, utrobique uncia, contritis faciem defricato. Aliud: Fecis uini, erui farinæ, lomēti, singulorum drach. decem: ueratri candidi quinque, spuma nitri decem, halcyonij tantundem laeuigata infricatur.

Ad sugillata, quæ Græci hypopya appellant.

Oculis inter initia quidē, decocto scæno-græci, deinde uerō & meliloti fotis, Nili collyrium diarhodon aqua dilutum circumlinito, post hæc diasmyrnes. Quod si nihil profeceris, cōpositum ex sandyce crematū inunge, aut hyssopum cum aqua impone, uel in panniculū uincto hyssopo, & calida aqua mādete, liuores foueto, aut muria acri cōsimiliter. Præterea corticē radiculae cum melle tritū applicato, & hoc inueteratos liuores exterit. Caterū ad expungenda quæ uetustas occupauit faciei sugillata, et uibices ipsius liuidas, tordyli partes duas, rubricæ Samiæ partē, cū melle imposito: cauēs interim, ne exulcerationē inducat. Aliud deterforiū: Hyssopi, thapsiæ, casia, ceræ, singulorum drach. duas, terebinthinæ unam, adglutinato: cura adhibita, ne locus exulceretur, & ob id quidem identidem tollendum.

Ad uaros:

Sunt autē uari, exiles, duriq; in facie tumores, quibus oxymeli infricando circumlinito: aut spumā argenti cum terebinthina, & pusillo olei albi tritā inunge, similiter infricans: aut fissile alumen cū terebinthina, aut amygdala amara aceto eli-

N quata

quata infricantur. Sed in callū duratos uaros. saponis Gallici uncia dimidia, thuris, guttæ ammoniacæ, u. iusculi q; drachma, aqua dilutis illinito, & hora transacta abluito.

Ad uaros, pilos, & aspredines faciei.

Ceræ drach. decem, terebinthinæ unam uisci duar, colliquesfacito, superq; oleū infundito, atq; eo medicamine uultum tergito: tollit enim radicitus. Aliud: Papauer leu gatum, aut pulegiū cum sale atq; aceto, cataplasmatibus modo illinito.

Cerorum Thaidis, ad rubicundum uultum faciendum.

Croci, rubiæ radicis, fuci, thuris, myrrhæ, singulorum drachmas duas adipe uitulino, & oleo mastichino excipe, deinde illinito, interuallōq; temporis imposito, sponsia calida imbuta abstergito. Cæterum faciei medicamēta uniuersō quoque corpori congruunt.

De affectibus oris, & primo de dentium cruciatu. Cap. 26.

Dentium absq; gingiuarum phlegmone cruciatus, interdum quidem in suo corpore, nonnunquā uerō in neruo qui ad dentes pertinet, fieri consuevit. Validissimis igitur opus habet remedijs, quocirca pleraq; ipsorum aceto quā acerrimo componuntur. Cum uerō gingiua propter phlegmonē dolore infestantur, omnium præstantissimū medicamētum est oleum lentiscinum, bene temperatū, ore retētum. Esto id autē recens, quoniā uetus tantū bonitate recenti cedit, quantū uetustate superat. Cōmunis autē etiā in præsentiarū obseruetur medicandi ratio, ut prius qui toto corpore modū excedit humor, euacuetur.

Ad inflammationem dentium.

Colluantur aceto, in quo elixa sūt galla, aut haliacabi radix, aut herba apollinaris semē, aut eius folia, aut pulegium, aut solani succus, aut capparis radix, aut myrti folia, aut populium, aut cucumeris syluestris radix, aut folia rutæ cum oxymelite, aut cornu ceruinū aut acetum scilliticū, aut pyrethrum cum hyssopo. In exesam uerō dentis concauitatē styrax cum opio inditur, aut galbanū, aut sulphur ignē non expertū cum lycio

lycio, uel alterci seminis uapor per infundibulum recipiatur. Philonis præterea antidotus denti illita, indolentiâ conciliat. Vbi uerò ex fluxu dentes dolore conflantur, myrti & len-
tisci, & gallæ decocto, aut rhu Syriaci, aut florû agrestis pu-
nica, aut maliciorum iure colluito. Applicatis salis portio-
nibus duabus, aluminis tosti, et aceto extincti læuigatiq; parte
una, postea uino colluantur. Gingiuis cruentis, tenue alumen
inspergitur, aut aloë et uino colluuntur, aut rubi radice uino eli-
xata, aut rhu Syriaco. Gingiuas uerò cruentas & defluxione
pressas, salsamēti crudi in olla ad carbones usq; deusti, cinere
attingit. Aloë porrò dentes concussos, si inspergatur, firmat.
Rhus itē Syriacus, aut fissile alumen, aut galla, aut rubi radix
per se, uel in uino elixa. Aliud: Nucis uiridis corticē læui-
gato, atq; ius ipsorum si habes, myrrhā ueram, alumenq; scis-
sile in ipsum cōycito. ubi unita fuerint, in usum infundito, atq;
gingiuis qua dens afficitur, imposito, præsentī erit remedio.
Aliud: Allium, & piper, & syluestre staphida, trita, si funicu-
lo lanceo in cuneolos exiles redegeris, atq; identidem ore uer-
saueris, aut permutaueris, humiditatem capitis purgabis, den-
tesq; sanabis.

Ad quassatos dentes, & gingiuas fluxibus tentatas, & unum-
quodq; depascendo serpens in ore hulus.

Chalcitidos ass. & drach. duodecim, cadmiæ octo, utere hoc
pulvere, adiecto aceto: sine dolore dentes tollit. Farina cum li-
quore tithymalli inditur, et super bedera folium accommoda-
tur, & horam permittitur: sponte enim dens conteretur.

Dentium smegma, & ad parulidas.

Aluminis latercularij, salis ammoniaci, singulorum triens:
myrrhæ, costi, pyrethri, uniuscuiusq; drachmæ quatuor, piperis
grana octoginta.

Ad parulidas.

Sulphuris ignē non experti, piperis, aluminis fissilis, æqua-
les partes. Et parulis inflammatio quidem est, in aliqua ginge-
N 2 uarum

uarum parte orta: quæ nisi dissoluatur, suppurat: cum uerò suppurauerit, scalpello disseca, linamētis insertis distēdetur. Epulis uerò, carnis quædam excrecentia est, quæ ab inflammatione exurgens, ad intimum molarem pertinet, cui febris interdum dolorq; iungitur. Opus itaq; cum habeat reprimētib; rasili ferrugine per se, aut cum eiusdem ponderis galla, utendum. Aut fori tosto, aut alumine quocunq; combusto, aut galla priuatim, aut squama æris cum aceto cum plurimis diebus emollita & arefacta.

Dentium smegma.

Aristolochiæ radix cremata, cornu cerui tostum cum paulo xillo mastiches, sal album melle conspersum, folijsq; ficulneis circumuolutum, combustumq;, donec in carbones uertatur.

Aliud: Buccina sale respersa & adusta, cochleæ itē terrestres cum melle exustæ, lana succida cū exiguo sale exusta: singulis aut horū fragrantie causa admisceatur flos rotūdi iūci odorati, aut spicæ nardi, aut foliū malabathri, aut cypirus, aut iris.

Dentes dealbans, gingiuas restringens, & iucundum oris odorem præstans.

Pumicis, salis assi, iridis, singulorū drach. quatuor, cyperi quinq;, spicæ nardi una, piperis sex, leuigatis utere.

Ad dentium stuporem.

Dentiū torpori portulaca manducata succurrit, aut oleum ex nondum maturis oliuis expressum, infricatum. Idem facit amurca, oleo in æneo uase, usq; ad mellis constitutionem decocta, si inueterata illiniatur.

Aduersus dentes attritos.

Dentibus attritis bacca lauri, alumen fissile, aristolochia sarmentaria pari pondere subueniunt.

Contra gingiuas exesas.

Florum rosarum drach. octo, gallarum quatuor, myrrhæ duæ, gingiuas corrosas & humore flaccidas collutas sanant. Item lac asininū, oliuæ foliorum decoctū, acetum scilliticum.

Arida

Arida uerò adhibita ærugo ferri, cytiniq;. Cæterum ad tumores & carnis excrescentias facit portulacæ succus in ore contentus. Muria quoq; conditarū oliuarum, oleum calidū ex oliuis nondū maturis expressum, aut lentiscinum, aut melinum, aut amurca. Ex aridis uerò ærugo ferri, aut æris, radix aristolochiæ, plantaginis semen, diphryges, atramentum sutorum torrefactum, atq; cytini.

Ad labiorum fissuras.

Amurcam elixam, aut adipem anserinum cum melle terebinthinaq; pari pondere, floris rosarum, hyssopi, rosacei, singulorum perexiguum illinito.

Aduersus tumorem linguæ, quem Batrachum appellant:

Ranunculus tumor est cum inflammatione sub lingua erumpens, in pueris maximè. Locum itaq; misyos, æruginis rasilis, & quis portionibus siccis perfricato. Mento autem applicabis antheram, aut sphaerium, aut parygrū ex ouis concinnatum. Venam in perfecta ætate sub lingua secare expedit. Aliud, quod ad aphthas quoq; facit: habet ferruginis rasilis, gallæ, chalcitidis, pares partes: cum passo uerò etiam os eluitur.

Aliud: Bruina farina cum melle ranunculū prius abstersum, galla item læuigata cum melle illinito, aut rosarum floribus similiter, uel iure foliorum oliuæ colluito.

Ad tonsillarum inflammationem.

Si in febricula tonsillæ & columella inflammantur, gargarisationes cum furfurū, aut rosarum, aut palmularū, aut myxarum, aut lentiū decocto competunt. Sed inflammatione remittente, aut in summo eius uigore, mel quoq; dictis cōmiscendum est, quod ab initio facere nequaquā conueniebat, neq; in augmento, ne quem acredine defluxum cieat. At si ad suppurationem iam perducta distrūpatur, mulsagargarissandum est, aut cum lenticulæ aut rosarum decocto: cuiusq; ad exactā solutionē insistendū, aut stomaticā collutionē gargarissandam porriges. Vbi uerò hucera pestilentia tonsillas occuparint,

N 3 utendum

utendum quidem præscriptis : priuatim uerò offerenda est di-
moron confectio, aqua calida, uel aqua mulsa cum flore rosa-
rum traiectarū, aut costū, aut rhus arida, uel elixa, uel glauci
foliorum aridorū decoctum. Est illud peramarum quidem, sed
optimè conducit, si succū, ut in collyrijs solemus, mulsa soluas:
ipsius uerò fruticis aridi flatu impulsī commodissimus est usus,
aut digito accommodati. Danda autē est opera, ne omnino mani-
bus attingatur, aut suspensa saltē manu primoribusq; digitis.
Auxilio etiā fuit Andronius pastillus. Post istas irritationes,
gargarismata cum iure glycyrrhizæ facito, aut eo quod scye-
belite, croco, terra chia, & myrrha constat: postremò uerò ae-
mylo & tragacantha. Quod si hylcus serpens perseueret, me-
dicamento ex lacte, & Samia creta gargarissandū. Aliud
ad tonsillas & antiadas: Succus mali punici dulcis cum cor-
ticibus contusi partes sex, cum mellis una confusæ, ad mellis
usq; crassitudinē decoquantur, & inungantur. Aliud: Con-
stat ex gallæ immaturæ uncijis duabus, aluminis fissilis uncia,
salis ammoniaci torrefacti uncia. hoc puluere leniter attinge.

Aliud: Gallæ drach. octo, misyos duæ, salis assi quinq; ari-
do utere. Est autem Antias, tonsillarum tumor durior.

De oris columella.

Quando gurgulio, quam uiam nuncupāt, inflammatione
tentatur, gargarismatis, quorum usus in tonsillarum inflāma-
tione probatur, mediocriterq; astringentibus utendū: cuiusmo-
di est, succus mali Punici, cochleario aut instrumēto quod Sta-
phylepartū nominant, subditus, tum priuatim, tum cum melle
quantum satis est decocto, aut dulcis radix mali Punici liquori
permixta. Benefacit etiam dulcis radicis succus cum melle in-
ditus. Reprimit uuā hæmatites lapis, & Phrygius crematus,
& ueluti non senescens, ageratus dictus, & confectio ex Phry-
gio lapide, pudēdis dicata, & terra Samia, & eretrias, & ru-
brica sinopis, & Lemnia, & omphaciū per se, et cum horum
aliquo spinae item Aegyptiæ fructus, & alumen scissile. Rosæ
uerò

uerò cum semen, tum folia, mitiorem exerunt efficaciam. Adhuc etiam lenius operantur, gummi, tragacantha, sarcocolla, amy-
lum: quibus utiq; potissimum utendum. si uua magis torqueatur, ab
astringentibus cōstricta. Si æqualiter crassa fuerit ipsa, quod
malum columellā appellat, gargarismatis fidendum quæ ex
myrrha, croco, & cypero constant. Cæterū contusiones solia
citius obseruandæ sunt, & ob id quid? penna potius circumli-
nienda: permixtum uerò medicamentū proficit, rhus Syriaci
drach. octo, croci quatuor, costi octo, seminis rosarū quatuor.
Ad hæc gingiuis cōducit linamentū ē purpura marina, quod
uiperæ collo circumdatū ipsam strāgulauerit: deinde tonsillis
circumapplicatum. Mirum quantum hoc opis cum ad tonsil-
la, tum ad quæcunq; faucium uitia conferat, teste Galeno.

Ad sanguinis eruptiones ex ore.

Porri folia contusa imposito, aut spongiam nouam pici
crudæ immersam concremato, læuigatamq; in usum adhibe.
utilissima est. Oris item collutiones, ex rosis aridis seu uiridi-
bus: decoctum utidem frigidum, aut capreolorum uitis, aut len-
tici foliorum, aut rubi, aut malorum cotoneorum, aut rosas-
rum, aut acinorum uuæ, aut lenticularum.

De angina, eiusq; differentiis, inibiq; de strangulatis, aut aliis
quodammodo suffocatis agitur. Cap. 27.

Inflammati faucium interioribus musculis, angina, quæ
Græcis synanche dicitur, accidit: exterioribus autē, parasy-
nanche. Pari modo & gutturis interiores musculi, si inflam-
mationem experiantur, cynanchen: si exteriores, paracynan-
chen excitant. Omnium eadē euenta sunt. Recta ceruice spira-
tio, & dolor cū difficili spiritu. Nonnullis etiā febris, ruborq;
uultus, colliq; & tumor in quibusdā accidit: os ipsorum hiat,
& deglutire nequeunt. Cynanchen nonnunquā suffocatio co-
mitata est. Hoc affectu pueri rarenter confliantur, cum uerò
tebra ceruicis affectu loco suo excidunt. Cæterū his tanquam
deploratis, manus admoūda non est. Reliquis euestigio uena

N 4 cubiti

subiti aperienda. Sed non semel confertim euacuandū, uerūq;
 in plures euacuationes humorum multitudinē separātes. nam
 cum ex cumulata et semel facta inanitione in animi deliquium
 incidunt, suffocationis periculū superuenit, prorumpēte unia
 uersim in affectū partem materia. Si his malū non cedit, uenit
 quoq; sub lingua secandæ sunt; aut lingua etiam ipsa, si exerta
 tumentiorq; uideatur, scalpello cōcidenda est. Aliuq; acriore
 clystere ducēda, pedes ad hanc aqua calida fouēdi, extremaq;
 corporis partes ualidē deligādæ. Lanis collū succidis, uel oleo
 imbutis uelari, & ex hordeacea polenta cruda, cataplasmate
 adiuuari debet. Ab initio porrō usdē quæ de phlegmone consil
 iarū memorata sunt, gargarizandū: aut simplici diamoron.
 cū elixatione rhois. Nobilius autem fuerit, quod ex syluestrib.
 moris institutū est, diamoron. Post hanc uerō & cōpositio dia
 moro, aut diataryon utendū. Morbo uerō in summo incremen
 to uigēte, nitri quoq; pauxillum admiscendū est, aut sulphuris
 etiam ignē non experti, nisi acredo aliqua prohibeat. Oletum
 præterea caninū aridum contritum, cumq; melle illitū, præ
 sentissimū est remediū, atq; ex hoc colore candidū præcipuē:
 & syluestrium hirundinū cinis similiter prodest. Moram diu
 tius trahente malo, illitione ex semine rutæ, quod besasa appel
 lant, utendum. Interdum quidē eius potentiā aliorum medica
 minum mixtione remittentes, nonnunquā denuō intendentes.
 Probatur etiā cucurbitularum & hirudinum sub mento, cir
 caq; ceruicē applicatio. Ad hanc gargarismatis ex iride, bysso
 po, melanthio, abrotono, glycyrrhiza, ficis in aqua mulsa de
 coctis, aut rutæ succo cum lacte, aut sinapi cū oxymelite uten
 dum. Si qua uerō asperitas inde acrior percipiatur, oleū quā
 præstantissimū calidū, aut rosaceum per se, aut cum cremore
 ptisanæ, aut scænoграci gargarizandum exhibetur. Alimen
 tum aqua mulsa per triduum esto, à quo cremor ptisanæ cum
 potione aliqua suauī propinādus est, deinde & ouorum uitelli
 per liquidi. Bmēdata iam ingluuie (ita ut deglutiant) sorbitio
 nibus

nibus ex chondro, & cibus languentiū uirtuti conuenientibus, utendum. Malo autē remittente, agrum cū ad inambulationes, tum in lauacrum perducemus. Locum affectum cerato ex oleo rutaceo contegamus, & reliqua educatione, ut decet, uirium refocillatrice utamur. Nemini strāgulatorū, quibus spasma circa os extiterit, manus admoliri debet, suadente Hippocrate. Alij uerō uitæ restituantur aceti infusione, & piperis, aut urticæ seminis in aceto acerrimo cōtriti: sed quoniā agrē admodum suscipiunt, cogendi sunt. Dissolutis uerō colli ruboribus, statim suspiciunt, & ad se redeunt. Consimiliter & in naufragis, & uno uerbo, in omnibus qui præfocantur. Excitatur enim his, recreaturq; caliditas.

De Coryza, catarrho, arteriacis, ac tussi. Cap. 28.

Communis est affectibus illis, excrementitij humoris à capite in subiectis partes delatio: qui si in nares defluit, malo coryza græcè, mucus & grauedo latinè nomen est. Si in fauces & palatum, Catharrus simpliciter Græcis, destillatio nobis appellatur. Sin autē in guttur & asperā arteriam deferatur, ita ut interiorē membranā ambientem exulcerarit, et salebrosam reddiderit, uox raucosa comitatur, appellantq; affectionem Branchum, siue arteriacum, latinè raucedinem: in quibus non è capite modò, sed ex uehementiore uociferationis conatu, et è gelidi aeris inspiratu asperitas prouenit cū inflammatione. Si prorogatur diutius malū, fluxusq; in pectus, pulmonesq; decūbit, maleficæ ac pertinaciores generantur tusses. Quin & ex intemperie sæpius tussis excitatur, quandoq; calidiorē ceu in febribus, nonnunquā frigidiorē, quemadmodū in tempestatibus Aquilonijs, quæ aridior est. Iam uerō aliorū sæpenumero morborū symptoma tussis existit: uerbi causa, morbi lateralis, iocinatoriorū, phthisicorum, affectuūq; pulmonis. Proinde Galenus in diuturnis tussibus, grandines quasdam à thorace reijci prodidit. Alexander uerō calculū quendam ponderosum, ueluti in urinarjs meatibus nascitur, in uetere tussē

N S redduntur.

redditum perhibet, indeq; cessasse tussim asserit. Nos autē inter sanguinis rēuētiōē, lapidum excretionem uidimus, quem admodum ubi illuc peruentum erit, pressius commemorabimus. Qui igitur ex aestu, coryza, ut catarrho conflāntur, circa partes affectas caloris sensum percipiūt: fluxio quaedam acrium humorū ac tenuium cū per nares, tum per os defluit, rubor partes faciei nariumq; inficit. Qui uerō ex frigore, his circa caput & frontem oritur distētio, meatusq; obium quae à percolandi adminiculo ethmoide uocātur, obturatio, ita ut resonare uox deorsum per nares nequeat: quibus longiore tempore protenditur, & tusses accidunt, pituitaq; excretio, nunc quidem crudae, nunc uerō liquidae, interdum autem uiridis. Nonnullis uerō febris superuenit, eos qui ex aestu impetuntur, nihil adiuuans: sed ijs qui ex algore infestantur, concoctionis functionem promouens.

Curatio catarrhi atq; coryzae.

Quum igitur calida intemperies modum exuperat, eadem remediorum praesidia quae ex tali causa caput dolētibus competunt, adhibenda sunt. Lauacris utendum, caput permulta calida cōspargendum. Alimenta his cōueniunt, quae sorberi commodissimē queunt, oua sorbilia, amyllum, placēta quae itria uocantur, & sesama, & amygdala, & pini fructus, et quaecunq; ex lacte concinnantur bellaria. Ex uinis uerō, dulcia, non antiqua, eiq; papauerum capitibus linctus, & quae ad haec cōposita sunt praesidia. Si gelida intemperies affligit, et morbus difficulter uincitur, per modico uti oportet nutritu, & capitis ē calidis & subtilium partium rebus, nardino, rutaceoq; cōstituta inunctione. Irinum uerō nō illinendum solum, sed & naribus instillandum. Intus eadē ihure, & myrrha cum oleo, maximē si ex frigida causa grauedo orta sit, perungantur. Nonnullis odoramenta ex rehycula cōbusta, uel ex melanthio aut cymino crematis, detrictoq; panniculo illigatis, fuerunt auxilio: Cyphi Selniacum, id est lunare, naribus admouetur, & frōti salubriter

ter circumlinitur. cui simul unum ex emplastris inflammatio-
nem profligantibus adglutinato: è quorū numero est Icesium,
aut Oxera, aut Barbarus, aut Athena. Ad catarrhum uerò fri-
gidum, Cyphi quoq; potare expedit. Thorace balsami succus
per lanam succidam illinendus est: fouendum idem ab omni
parte cum styrace, irino, & anethino. Cibarijs calidioribus, et
concoctioni nihil renitentibus utendum. Materia uerò conco-
cta, apophlegmatismus qui commanducatu pituitam cit, con-
ueniet, & smegmaia capitis: uerbi causa, sapo Constantini, et
his similia.

Raucedinis curatio:

Arteriacis branchijsq; appellatis, eadem sanè quæ superius
cōmemorata, conueniunt: priuatim uerò, si arteriā laryngaq;
occupauerit inflāmatio, inter initia statim, quæ tectorij modo
illinūtur, remedijs meatus obstruētibus, tantisper dum inflam-
matio moderatior reddatur, utendū est: cuius generis sunt, con-
fectio passi Cretici, tragacanthæ, gummi, & amyli. Pinguium
item palmularum decoctū, et dulcis radicis cum sapa, ad mel-
lis crassitudinem: usq; hypoglottidum, sic quod sub lingua
teneantur, appellatarū. Sed tunc ante omnia uino abstinēdum
est: dulce autē uinum, si inflammatio remissior euaserit, potui
detur. Et bellaria ex melle, & lacte cum amylo, aut pane sili-
gineo, sorbitionesq; ex amygdalis, atq; butyrum assumantur.
Cum uerò humiditas aliqua artus occupat, uehementius abster-
gentia aggrediunda sunt: qualia sunt, fabaceum lomentū, &
ex melle confecta: brassicæ item, & porrum probè decoctum.
Pharmaca porrò magis calorifica, & quæ ad tuſim faciunt,
accommodata sunt. Et quæ sapa ex ficis pinguibus, thure, iri-
de, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, cassia, et
his non dissimilibus confiunt.

De Tuſi.

Tuſibus quoq; eadem methodo medendum. illud duntaxat
absq; perperſione non prætereundum, per consensum ne ca-
terarum

terarum partiū quis tuſſiat, uerbi cauſa, gurgulionis deſtillantis, aut capitis, et an alijs morbis ſuperueniat. Hiſ quoad eius fieri poteſt, ſecundū quē prædiximus, & mox dicemus modi, proſpiciendū eſt. Cōpoſita uerō præſidia deinceps exponam.

Catapotia, medendo catarrho ac tuſſi.

Styracis, myrrhæ, opij, galbani, pares uniuſcuiuſq; portiones, paſſo exceptæ, aut ſingulatim in mortario cōtuſæ, ad erui inſtar digeruntur, noſtūq; lectum petenti trina aut quaterna, quina' ue propinantur, paſſumq; inſuper ſorbetur. Hæc quippe ad acrem & ſubtilem faciunt deſtillationem. Aliud: Herba apollinaris ſeminis drach. duodecim, pinearū nucum ſex, croci duas, deſruto aut paſſo excipe, & utere.

Ecligma, ſeu linctus.

Mellis uncia, butyri ſemuncia, ſimul coquantur, & exhibeantur. Hyſſopi præterea & ficum, & nucleorum pineorum, & iridis decoctum hauriatur.

Catapotia ad diuturniorem tuſſim.

Styracis drach. ſex, myrrhæ duas et ſemiſſem, terebinthina, galbani, opopanacis, ireos, ſingulorum drach. duas, piperis albi, nitri, ſeminis alterci, ſucci papaueris, uniuſcuiuſque drachmam, abſq; ullo liquore in pila contuſa, in catapotia digerito, atq; eo quo docuimus modo utitor.

Arcendis ſalebris gutturis, tuſſi, cruentisq; ſputis.

Amygdalas amaras decorticas uiginti quinque, ſeminis lini torrefacti drach. quatuor, tragacanthæ duas, nuclei pinei grana triginta, oui in adipe toſti croceū: ipſa tragacantha in aqua liquatur, totum uerō paſſo excipitur. Quod ſi fractæ quoq; uocis ſonus edatur, paſſi loco mellis aliquid confundito, præſertim in quibus nonnihil ſuſſum ferri ac eijci expedit.

Arteriace hypogloſſis, hiſ qui uocem amiſerunt, raucis & anaphoricis accommodata.

Tragacanthæ, gummi, ſingulorum drach. ſex, myrrhæ tantam, thuris unam & ſemis, piperis candidi grana uiginti, croci

croci drach. succi glycyrrhizæ sex, trium palmularum carnem, passi Cretici quantū satis est. Et ipse solus tragacanthæ succus in uicē succi glycyrrhizæ linguae suppositus, decoctūq; ipsius ad crassitudinē usq; elixum, quadrupla mēsurā inditur.

Ad amissum uocis sonum, & his qui uocem exercent efficac arteriace.

Porra sex ad tertias usq; decoquito, & ipsa quidem porri cito: liquorē uerò alicæ cum melle iuri ipsorum commisceto, & ouorum antea elixatorum lutea terna unā decoquito, anæthi rudicula subinde commouens.

Bechicum tussientibus utile.

Pulegij uncias duas, nucleorum pineæ, seminis cnici, seminis lini, uniuscuiusq; uncia, piperis costi uncias quatuor, melli elixato miscebis. Aliud: Hyssopi, pulegij, piperis, singulorum uncia, petroselini uncia semis, mellis hemina excipiuntur.

Maturatiuum indeteratæ tussis:

Vbi mellis drach. sedecim, terebinthinæ duæ, galbani quatuordecim unā coxerint, in rotellas digerito, quæ fabæ magnitudinem æquent, & instar nucis ponticæ, & ex his delin-gatur. Aliud: Tussi aridæ arteriaca medentur, & feruentis aquæ interdū sorbillatio. sputū enim propter crassitudinem pituitæ nō reijcientes, liquidis aliquantulū adiuuabuntur. Cōfert præterea ipsis, hyssopi, iridos, & nucis pineæ decoctum.

Trochiscus Capnistos ad tussim continuam.

Styracis, piperis, mastiches, petroselini, singulorū unciam, sandarachæ diobolos sex, baccas lauri duas, melle excepta in pastillos dirige, qui carbonibus inieci, fumo suo nidorē exhibent utilē, si per infundibulum in fauces tussientis admittatur. Prodest etiam quocunq; modo perfrigeratis.

De Orthopnoæa, Asthmate, & Dyspnoæa. Cap. 29.

*Q*ui sine febre crebra respiratione, tanquā à citatiore cursu agitati, conflantur, ab eo quod comitatur accidente, asthmatici, hoc est anhelosi nuncupantur. Eadem quod strangu-lari

lari formidantes, ad respirationē recto pedore toto nituntur, orthopnoici dicuntur. Oritur autē affectio, crassus & glutinosus humoribus, fistulosis pulmonum cartilaginibus, cavitatibus infarctis. Dyspnoea uerò, hoc est spiritus et animae difficultas, commune est accidens, cum haec, tum alia plurima mala comitans. Anhelosorum medendi scopus est, uiscidos crassosque humores, medicamentis attenuantibus & abstergentibus consumere. Proinde acetum scilliticum hoc malo oppressis at commodatissimum est: & inde confectum oxymel in potu sumptum, ipsaque scylla tosta, cum melle trita. Ex antidotis hiera, et alia medicamenta ualidissima, quae alium continenter deiectionibus sollicitant, & cum raphanis citati uomitus, aristolochia rotunda bibita, centaurij maioris radix, spondyli semen & radix, nepeta fructus, hyssopus, iris, melanthium. asellorum qui uligi nosis & aquaticis degunt, sextarium uasi injiciens fideli, super carbonibus torrefacito: ubi uerò candorem induere coeperint, conterito, melleque despumato excipiens, mystrium cum ante, tum post cibum porrigito. Quod si necessitas urgeat, ante haec omnia uenam aperito, & secundum laborantis uires euacuato: alius item clysteribus irritanda. foris thoraci ficus, lolij farina, & hordeaceam cataplasmatibus modo imposito, resina interim ceraque, et melle adiecta. Inspergatur etiam illi iris, mannaque. Non alienum fuerit, farinam hordeaceam cum resina, cera, iride, mannaque, emplastri more adglutinare. Unguentis uerò utendum admodum calorificis, irino, anethino, & rutaceo. Peculiaris multo est, pumicis parte. sphecles (quae est sex uini) crematae partes quatuor, spumae nitri ceratum, confusa & cribrata unguentis excipiuntur, & throaci infricantur. Malagmatum usus est, quae sanies & serosos sanguinis humores extrahendi potestatem obtinent.

Pro suspiriosis potio.

Anhelatoribus polij, abrotoni, castorij, chamaepityos, guttae ammoniaci thymiamatis, singulorum partes aequales melle subactas

fabam exhibeto. Aliter: Sunt nonnulli qui *spumæ nitri* cochlearium, tribus *mulsæ* cyathis mixtum propinant.

Aliud: *Spumæ nitri* dodrās, *piperis* drach. *laserpitij* drach. semis, cochlearium ex aqua propinatur. Aliud: *Castorij*, guttæ *ammoniaci* *thymiamatis*, singulorum drachmæ sex, *piperis* grana quadraginta, passo excipiuntur. *fabæ* magnitudo cum *mulsa* exhibetur. Aliud: *Sinapis* drachmam. *spumæ nitri* ternos obolos, *elaterij* semiobolum, totum hoc in orbiculo o^o octo cōformato, per biduum binos exhibeto: purgant namque per superna, citra molestiam. His qui uelut qui obtorto collo tantum non suffocantur, dato *spumæ nitri* drach. treis, cum *hydromelitis* cyathis ternis, atq; cum *cardamomo* nonnunquam, confestim opitulatur. Plurimum quoq; coxen dice laborantibus confert.

De peripneumonia. Cap. 30.

Peripneumonia, pulmonis inflammatio est, quæ plurimum ex ualentiore in eam partem destillatione, aut angina, aut suspirio, aut dolore laterali, aut alijs ex morbis provenit: nonnunquam affectus à sola inflammatione auspiciatur. Comitatur spiritus angustia, febris acuta & comburens, grauitas, distentioq; pectoris, tumor, & ingēs in facie repletio, materia ad superiora impetum instar ignis faciente. Males rubentes sunt, oculi turgescent, nutant supercilia deorsum, & corneæ oculi tunicæ subpinguiusculæ apparēt. Quū hæc indicia ad æstus feruentiorem declinant, ignita rubedo cum inflammatione pulmonis coniectanda est. In his igitur qui ex morbis alijs in hunc deciderunt, uenæ incisio recusanda est: maximè si diutius perseuerauerit malum, aut ab initio sanguinem detraxerint. Alius durior, in morbi inclinatione clysteribus ducenda est. Aut cucurbitula peringentes complures que, circumcisa scalpello cute, pectori & lateribus, si nihil obstet, adglutinanda sunt. Quod si peripneumoniæ confestim ab initio inuaserit affectio, consentientibus qui ad hoc desiderantur calculis,

uena

vena secunda est: sin minus, cucurbitulae sunt imponendae, sanguis pro agri uiribus demendus. Sorbitiones ad haec cremoris ptisanae, chondri, cum melle assumantur, aut ex amygdalis amarum cum simila, aut chondro, ammixtis pariter potionibus aliquot dulcibus, hydromalo, aut apomelite, aut hydrososato. Salubre etiam recens butyrum, quantum capiunt cochlearia tria. Propinandum autem ipsis ficuum cum hyssopo decoctum, uel iridis mulsam percoctam, uel pulueris eius mensura duum cochleariorum, melicrato inspersorum: hoc etiam per inferna expurgat. Quod uero ad uirium tutelam attinet, crebrius illis melicrati portio seorsim, et cum nucleis pineis repetenda est. Cucurbitulae uniuerso thoraci, lateribusque adglutinandae sunt. Cerotum cyprinum, quod iridem admixtam habeat: aut cerotum ex oleo rutaceo, et iride arida confectum, accommodetur. Vel quod est cera, resina, medulla ceruina, butyro, cespypo, iride sicca, et unguine nardino constat epithema.

De sanguinis sputatione. Cap: 31.

Si cruentum sputum ex ruptis uenarum uasculis originem trahit, largior sanguinis effusio comitatur, et ex euidenti quidem interdum causa, nempe lapsu ex alto, clamore, et id genus: interdum uero ex abdita, puta plenitate, aut frigiditate, nimium naturae modum transgrediunt: frigus namque uenas rumperet, testatur Hippocrates. Si uero cruenta reiectio ad uenarum erosionem referatur, sanguis non confertim, sed per interualla sigillatim excreatur: quum acrimonia quaedam et praua edulia, aut cibi abstinentia, aut acris destillatio a capite in pectus praecesserunt. Si ex uasorum pulmonis adaperitione, nihil quidem ex enumeratis, excepta interdum plenitudine, praecessit, sed uidetur humidior atque calidior, lauacrorumque immoderatoorum usus: et nimium calidis locis domicilium, mali causam excitare uidebitur. Et neque per inflammationes, neque per febres, neque in doloribus euenit, quemadmodum in his qui corroso uenarum corpore, Canabrosim dicunt, in hunc affectum incidunt.

Contra

Contrà uerò tolerabilius habebunt, ut uerissimile est, euacuati. Cum hæmorrhoides, purgationes 'ue muliebres substituerint, etiam periculis erumpente sanguine liberabuntur. Eadē accidet ualitudinis cōmoditas ijs qui uase ob redundantiam rupto sanguinē edunt, nisi propter hunc, aut immodicam inanitionem ledantur. Iam uerò quæ ad uasorū erosionē refertur sanguinis euacuatio, nunquā prosperè succedit. Atqui si per uomitionem egeratur, confessum est, quod ex partibus quæ ad stomachum, aut uentriculū attinēt, effertur. In quibus & per secessum ad inferna proritatus aliquando euacuatur: sin autem cum tussi, à spiritus officinis proficiscitur. At si spumofus fuerit, & elāguescens in cādidum, et ex interuallo absq; ullo dolore angustiaq; extrahatu, hunc è pulmone latum arguit. In quib. tēporis progressu & febris cōtinua sequetur, præcipuè excis quibusdā uasis, & aliquid substantiæ pulmonis, aut asperæ arteriæ circulus, aut uena reddetur. Nouimus uerò quempiam, sanguinē è pulmone sputo eijcientem, procedente tempore maxima cum tussi, & sanguine copioso, lapides expuisse quaternos aut quinos, asperos, tribulorum modo, magnitudine siliquarū trium aut quatuor, et cōtinuò quidē leuatus meliusculè habuit: haud multo uerò pōst tabe cōsumptus, fato finitus est. Si uerò pituitosa excreatur cum leuiore tussicula, aut screatu, spumofusq; ac leue egeratur, ex asperæ arteriæ reijci cognoscito. Quod si sanguis ater fuerit, atq; in exigua frustula, quasiq; minimos globulos cōcretus, dolorēq; loci præferat, à thorace efferri portenditur, per pulmonem siue guttur facta transumptione. Qui uerò cum screatu, ex faucib. per palatum eijcitur. Si quādo autem à capite destillauerit, cum irritatione quadā & tussi redditur, defluente eo in summitatem arteriæ, & iterum sursum regurgitante. Hæc aut acer magna ex parte catarrhus, aut capitis dolor, aut grauedo præcedit. Nonnunquam aut per palatum sanguinis fit euacuatio: idq; deglutita birudine, et indidem alicui partiū adhærescente. Cæterū in cō-

O

mentario

mentario de Letalibus uenenis super hac fusius prosequemur.

Curatio.

Qui catarrho afflicti sanguinē expuunt, ijs uenā mox aperire, nisi uehemēter acris fuerit destillatio, et intra excessum, habita uirium perpensione, detrabere conuenit. Extremas ad hęc partes uinculis excipere, cumq; oleo ueteri calido, aut sicyonio, excepto capite, perfricare. Alantur esculentis frumentaceis, quę succum aliquē austerum commixtum habeant, cuiusmodi est mali punici, pomorum, pirorū, aut eadē ipsa unā decoquantur. Sub somnum orbiculos ex succino concinnatos exhibeto. Tertio die mellis despumati momētum delingēdum prębeto. Si hęc à morbo diutius permanente uincantur, de tonso ad cutim capiti ē stercore syluestrium columbarum medicamentū imposito: & post treis horas medicaminē dēpto, in balneū perducito: ne tamē caput unquā perūgatur. Deinde ubi sorbitionibus enutriueris, noctu dormituro theriacen antidotum dato: rursumq; postridie eadē pręstās, pari modo corpus uniuersum pręter caput perfricabis: cui utiq; ceratum ē thapsia, aut aliud quoddā inducēdum, rursumq; sorbitiones repetendę. Si malū non aboletur, cucurbitula occipiti adglutinandā est. At si acrior humor destillauerit, deuitanda est sanguinis detractio. Alimentis uerō & pręsidijs, quorū usum esse profligādo catarrho suprā, huic rei dedicato sermone docuimus, atq; his quę mox enumerabuntur, utendum. Qui propter frigoris iniuriā sanguinem expuunt, ijs calfacientibus & exiccantibus thorax fouendus est, confectioq; ē duobus piperum generibus suppeditanda, unā cum eo qui ex succino constituitur pastillo. Iam uerō ex instrumentis respirationi dicatis, disruptis oris uasculorū, aut apertis, sanguinem reijcientibus, ueniam, nisi sanguinis copia erumpat, secato. Omnes uerō locis acris expositis decūbant, lecto immobili, figura sublimi, cauentes ne uehemēter uel respirent, uel eloquātur. Fouendę autem afflicte partes spōgijs posca tepida imbutis. Post septimanam uerō

LIBER TERTIVS.

214

uerò lanis succidis cū rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino, nunc
quidem cum aceto, nunc uerò cum uino astringente. Plurima
autem si fuerit eius quod eycitur copia, pollinem & mannā
cum aceto imponamus, aut alumen & acaciā, aut malicoriā,
aut gallā cum aceto, aut palmulas cum polentis, aut malis co
tonijs in uino austero decoctis. Post hæc uerò & ex salicibus
emplastrum superaccommodandū, præcipuè si mediocris fue
rit sanguinis eruptio. Per os autē hæc sumpta cōferunt: Por
tulaca cōmanducata, bene facit: efficacior uerò multo succus
ipsius epotus, balaustrū, rubi fructus et flos, quercus fibrosum,
siue liber, & quæ subiecta est putamini glandis membranula.
potissimū uerò ipsis elixis utatur: phagi ilicisq; tunica maior
efficacia est. Samius aster, ad omnem sanguinis reiectionē fa
cit. Lemniū item sigillū, lapis hæmatites læuigatissimus cum
succo mali Punici, aut herbe sanguinalis. Lapidis uerò quan
titas erit scrupuli unius. Cōposita præsidia sunt: Pastillus ex
succino, & qui ē corallio, & qui ex Aegyptia spina concin
natur. Puluis item cōpositus ē terra Samia, quæ aster dicitur,
Lēnio sigillo, corallio, symphyto, amylo, singulis æquilibrium.
Sed qui hoc malum erosioni acceptū referunt, his maximè, si
catarrhus præcesserit, opū partem semissem admiscemus. Et
quod accipit Samiæ terræ, agerati lapidis, Lemniū sigilli, æ
quale pōdus: utile est, cochlearia duo in binis succi arnoglossæ
cyathis potare. Aliud: Lemniū sigilli drachmas sedecim Sa
miū asteris drach. duodeuiginti, amyli drach. octo, sarcocollæ
quatuor, gūmi duas, pulueris eius cochleariū cum decocti pal
mularum cyathis duob. Sorbeatur insuper posca gelida, aut
palmularum, aut malorū, aut pirorum, aut capreolorū uitis,
uel eiusmodi cuiuspiā decoctum. Si robur exigit, alatur circa
horam secundā aut tertiam: sin minus, circiter quartam. Est
autem panis lotus aqua gelida, aut halica, aut chondrus cum
succo quodā frigerifico: uerbi causa, mali Punici, aut myrto
rum, aut omphacometis: aut ona sorbilia, aut bellariotum
quidam

○

2

quiddam quod è lacte conficitur, cum aliquo astringente. Ex
oleribus aut, intybum, cichoriū, plantago, cum oleo ex imma-
turis oliuis expresso, atq; aceto decocta. Ex pomis aut fugaci-
bus, mala, pira, mespila, mala punica, corni fructus. Potus his
qui non febriunt, uinum erit aquosum, perexiguū. Qui febre
carent, aliquid ex prædictis poculentorū, aut cibyraticum hy-
dromalum. Sed qui sanguinē uomitu reijciunt, ijs dē nutriendi
sunt: cauendum modò, ne crebrius cibi porrigantur. ex facili
nanq; hoc uitio oppressis succurritur. Quoniam remedia que
potantur, ad partes ipsas quæ sanguinem fundunt, illico acce-
dunt, & cōgrediuntur. Vbi aut sanguis in uentriculo grami-
modo globulatum cōcreuerit, coagulū bibendum est, maximè
leporinum, aut ficulneum lixiuū cum aqua, aut thymum, aut
cunila cum aceto. Aut lacte fissili eos euacuare oportet, aut a-
loe. In his qui ex palato per screationē sanguinē expuūt, gar-
garismis inspirandi uim habentib. utendū, fronti q; & capiti
adhibēda sunt, quæ ijs quia sanguinē è narib. reddunt, expedi-
unt. Hæc cruenti sputi est curatio, quam summo exequi studio
cōuenit, eo quòd laborantib. ex immoderata eius euacuatione
discrimen immineat. Multitudo nāq; euacuat sanguinis, quæ
admodū in his qui strangulantur, lethum præsentaneū infert.
Si affectus perseverauerit, in tabē mutationē minatur. Omnia
bus igitur sedulò secundum rationē perpetratis, & subsistente
iam sanguinis eiectione, uires ipsis instaurandæ sunt, robur q;
reficiendum, iuuenum porcellorū petiolos, & cerebella porri-
gentes, corpus perfricari præcipiētes. In primis frequentē u-
sum balnei, potationem uini, iram, & rem uenerēdā cauētes.

De pectoris suppuratione, & tabe quam Græce
phthisin nuncupant. Cap. 32

Empyema, quod purulentam excreationē Romani appel-
lant, in cauo specu thoracis, siue in succingēte costas memo-
brana colligitur, quandoq; ob sanguinis reiectionē, hunc ad
cicatricem non perducto; hinc phthisis cōfestim sequitur, si ex
pulmone

pulmone fiat excreatio. quandoq; ex inflāmate subordina-
ta. Deinde quū abscesserit, & disrupta fuerit, ut in laterali do-
lore aliquādo accidit: aut ex cōfluxu à capite proueniente. Si-
gna itaq; cōsistentis empyematis sunt, grauitas thoracis, tuſſis
uehemens & arida cum doloribus: interdū etiam humiditas
quædam accedit, qua leuari nōnihil uidentur, febriculæq; in-
tra initia statim ignauæ, errantes, et difficilis decretoriæ affli-
gunt. Quū uerò uomica abscessus appetit, acrius cum horrore
aliquo febrili, inq; sermonis proprietate spiritu turbati præ-
cipitantur. Rupto abscessu, pus reijcitur, modò purū, modò fe-
culentum. Quandoq; superius erumpit abscessus, unde grauius
incumbit periculū: interdum uerò deorsum. atq; id quidē quod
descendit, partim in uentrem & intestinū transfunditur, par-
tim uerò in uesicā, facta per uasa quædā trāsumptione, delabi-
tur. Febrili aut febre hectica usq; ad totius materiæ repurga-
tionem: quæ nisi accuratissimè procuretur, breui æger sanio-
sus in tabem rapitur, pulmone exulcerationē sustinente. In
qua iam tabe conclamata, genæ pallescunt, frons atq; ceruix
sudoribus rorescunt, carnes contabescunt, ungues incuruātur,
& crassiores, candidioresq; aut liuidi apparent. Malo autem
magis inualeſcente, uenter conturbatur, hypochondrium sur-
sum conuellitur, dira sitis, & ciborum auersio cruciat: quodq;
excreatur, grauiſſimi odoris fluxum emittit.

Curatio.

Ante igitur omnia, puris collecti maturatio promouenda
est spongiarū fotu, cataplasmati ex farinis hordeaceis cum
caricis discoſis, & resina exigua, & stercore columbarum,
nitroq; et hibisco. Adiuuat aut rupturā, in latus sanum decubi-
tus. Sorbeatur præterea ex temporis interuallo mulsa, & cre-
mor ptisanæ admixto melle: sed quibus plus roboris inest, ius
hyssopi & thymi melle adiecto bibant. Promouet etiā ruptu-
ram uomicae salsamentorū esus, & catapotia hieræ ex colo-
cynthide sub somnū, in cubilis ingressu sumpta. Vbi pus expe-

Rorari cœperit, hyssopi denuò & iridis atque glycyrrhizæ decoctorum in mulsa potionē repete. Vel glycyrrhizam cum sesamo tritā exhibe: aut pollinem in mulsa & oleo percoctum cataplasmatibus modo inducito. Quum autē huius expurgationi per superna renititur, ad compositorū usum deueniendū est: uerbi causa, medicamento quod ex marrubio constat, tum simplicis, tum cōpositi. Et eius quod ex eruis constat, & quod ab ingredientium numero Græcè dodecatheon dicitur, itē quæ ab autore, Philoxeni nomenclaturā sortita est, cōfectionis. Porro qui in tabē decidunt, his porra capitata in chondri ac ptisanæ sorbitionibus liquefacta dato. Iam uerò & hæc per se bis decocta exhibēda sunt. Potus aqua pluuialis esto, & ex eo melis cratum. Circa initia uerò relaxationū, imponantur cataplasmata ex semine lini, & polline, ex decocto fœnogræci, aut maluæ, olei, mellis, & foliorum altheæ. Temporis uerò progressu ad cerata ex butyro, oleo cyprino, laurino, & iride transeundū. Mnasæi item emplastrī usus probatur. Thoraci autem fluxione oppresso, emplastrū ex salicibus imponendum est. Propinanda insuper iampridē in saniosis enumerata simplicia, atq; ex compositis nōnulla. Si anxifera tussis grauitur urgeat, thymum et hyssopū cum succo glycyrrhizæ melle decocto excepta, & in tessellis redacta, sub lingua cōtinenda exhibeto. Conuenit amplius ipsis ex tēporis interuallo præstita Mithridatis antidotus, & quæ ex uiperis conficitur. Utilissimum uerò fuerit auxilium, bolus Armenia pota. Hædræq; antidotus nihilo minus quàm prædicta subuenit.

De dolore laterali pleuritide ue. Cap. 33.

Dolor lateritius, quem Græcè pleuritim dicunt, propriè membranz costar succingentis inflāmatio est. Comitatur hunc anhelitus difficultas, tussis, febris continua, dolor ad clauiculam usq; & præcordia pertingens. Discerni autem pleuritidis ab inflāmatione iocinoris, in qua omnes hæ notæ apparent, hisce indicijs potest: Pleuriticos quidē dolor punctilis infestat,

festat, & tussis quandoq; arida, quod morbum crudum portendit: quandoq; cum sputi reiectione, quod humorem qui morbum creat, innuit. Rubrum etenim & sanguinolentum excreatur, sanguine naturæ modum exuperante. flauum uero & in pallorem languescens, cum flaua bilis superat: quemadmodum rursus albicans & subspumofum, si pituita. In melancholico uero humore, nigrius reijcitur. Pulsus durus ac ferræ modo denticulatus subest. In iecoraria uero inflammatione, nullus dolor compungens, neq; durus adeo pulsus sentitur, sed arida tussis quæ nihil expuitur, usq; molestat: facies pallidior apparet. Quæ uero laterum compunctiones ex musculorum externorum inflammatione oriuntur, hæc quidem nothæ pleuritides appellantur: in quibus absq; tussi, absq; excreationibus, cum molliore pulsu, locus affectus manu attrectatus, dolore afficitur: et nisi suppuratus tumor discutiatur, post sectionem ad exteriora prorumpit: quæ pleuritis ex inflammatione membrulæ costas succingentis creata, eò non feratur. illa namq; nisi uel foras, uel intus à purulenta colluue expurgetur, multo citius in uomicam peripneumoniacam transit.

Curatio pleuritidis.

Si igitur ad claviculam usq; dolor protendatur, uena incidenda est: sin uero ad præcordia usq; perueniat, purgandum. Recentiores autem omnibus sanguinem secta uena detrahunt: formidantes (ni fallor) turbationem, quæ purgationem libenter comitatur. Reclamantibus autem uiribus imbecillis, neutrum faciendum, clysterijs acrioribus utendum. Quod si dolor mediocris affuerit, à clysteribus aqua mulsa, & ptisanæ aut chondri cremor propinentur. In morbi decremento, cremoribus porrum adijciendum, aut nepeta, aut pulegijs & urticæ semen cum melle delingitur. Si dolores uehementer affligunt, post euacuationem demulcendi sunt lanæ calētis, uel sulphuratæ impositu, aut fomentis ex milio, & furfuribus in sacculo adhibitis, aut calida aqua, seu oleo uesicula excepto. Lanæ præterea succidâ cum

O 4 oleo,

oleo, uinoq; marina diluto: siue alia iniicienda, aut ex semini-
bus cataplasma imponendū, cum decocto chamæmelorum, al-
theæ, aut carycarū, ireos, absinthij, mellisq; momento cum o-
leo nardino. Circa quartum uerò diem sorbitionib. nutrito, ad-
iecto melle perexiguo. Septem aut diebus lapsis, lincus ex a-
mygdalis, semineq; urticæ melle contritis, offeretur, aut eclig-
ma ex butyro, melleq; decoctum. Et hypoglottide ex melle de-
spumato utendum. Epithematis porrò, tū uidelicet, quod quia
fœdissimi odoris est, dysodes appellatur, tum eo quod ex sam-
psycho constat: & peganera emplastrum, affectis applicabi-
tur locis. Bulbi præterea cum axūgia appositi, sæpe numero
satis præsidij tulerunt. Iniiciendū insuper eo morbo oppressis
per inferna medicamentū ex butyro & terebinthina. Sed ef-
ficacior lincus est, qui ex fructu piceæ: item ex amygdali ama-
ri, seminis linei, nuclei pinei, & amyli æquilibrio cum melle
conficitur. Quos autem uigiliæ torquent, eos medicamentum
è papauerū capitib. delingere competit. Bx antidotisq; atha-
nasia, & alijs ad hanc prouinciam cōpositis utamur. Post de-
cimum uerò & quartum diem, si malum non cesserit, cucur-
bitulæ ipsis imponendæ, ægri in extenuatoria uicius ratione ser-
uandi. Deinde ubi morbus remittitur, in lauacrum ducendi, fri-
gidum uitandum. Viçus solidior adhibendus. Quod si inflam-
matio costæ succingentis tunicæ non discussa, in pus conuer-
tatur, antea commemoratis utendum.

Ad lateris sine febre dolores.

Lateritijs doloribus sine febre bdellium succurrit, & co-
stus. brassicæ caulium deustarum cineri & adipi mixta, Nam
hoc medicamentum impense discutit.

De affectibus cordis. Cap. 34.

Cor si primario affectu fuerit læsum, procul à medicorum
præsidio abest, uitā cum morte subitò commutans, quum
inflammationes & ignitas rubedines, quæ erysipelata dicun-
tur, uehementesq; intemperaturas in acutissimis febribus, san-
guinis

guinis item fluxum, ex leui potissimū sinus cordis uulnuscūlo, experitur. Si aut per consensum afficiatur, ex cerebri, iocinoris, oris uētriculi affectu, siq; ex mœstitia et metu, alijsq; complurib. causis, syncopē appellatū, quæ repentinus est uirtutis casus, oboritur: quæ resolutionib. & animi deliquijs, exiguo arteriarum percussu, extremarūq; partium perfrictionibus, & circumfluis sudorib. significatur. Quæ si ualidior est, nullæ remediōrū suppetiæ succurrere possunt. Virtute uerò adhuc uel tantillum constante, nonnunquā subuenire datur. Validæ ad hæc cordis palpitaciones subinde ex multitudine, aut feruore sanguinis in eo cōcepti oboriūtur. Cor uerò idem superexcalsactū, magnam et frequentē inducit respirationē: refrigeratum autē, exiguā atq; raram. Omnē autem cardiacarum syncoparū emendationē, secundo libro inter febrium casus recensuimus: tantum hic loci adiiciendum, quāadmodum uincente iam symptomate, extremis partib. perfricatis & illitis, purgamētis item pauimēti iniectis, & alia quacūq; recreatione adhibita, inducēda sint, sudore diffatis partibus, myrtus læuigata, aut creta cimolia, aut succinum, aut malicoriū cum manna, aut terra Samia cum gummi. Membra uerò extrema perfrigerata usq; ad pubem et alas, sinapi, aut pyrethro, aut adarce obducantur. Alimentum esto panis ex aqua, seu uino frigido temperato, pedunculi suilli, articuli, rostra, alæ, omnia frigida. Caput & frontem oleo ex oliuis immaturis, aut aliquo styptico cum gummi, aut decocto rosarum perungito. Præ cordijs autem, stomachoq; cataplasma ex palmulis, rosis, cenanthe, acacia, hypocystide, & alumine imposito.

De palpitatione cordis.

Noni quendā, inquit Galenus, quotannis uerno tēpore palpitacionis cordis accessione diuexatū: qui cum per triennium se à sanguinis detractione adiutum intelligeret, anno quarto, priusquam accidens illud denuò inuaderet, sanguinis missionē repetiuit, nec amplius eidem malo obnoxius fuit: sicq; plurib.

○ 5

deinceps

deinceps annis facitauit, & consentanea post hæc uictus ratione usus est. Sed nihilominus is etiam ante senectam morte præuentus est, quemadmodum & reliquorum plerique omnes, quorum in acutis febribus nonnulli repente animo destituti, pari modo interierunt. Quidam ipsorum citra animi deliquium tamquam syderati, subito uitam in mortem commutarunt. Magna ita affectionum pars ætatem agebat quinquaginta quidem annis inferiorem, sed quæ annos quadraginta excederet.

De mammillarum uitiis. Cap. 35.

Ac à partu casei more sæpenuerò in mammis concretum, inflammationes suscitât. Hisce itaque rebus à principio utendum. Spōgia mollis, posca tepida madidata atq; expressa imponitur, & alligatur appositè. Aut palmulæ cum pane in posca læuigatæ. aut ouo etiam toto utendum, admixto rosaceo, cum cerato perexiguo. aut alumen, & pulicaria herba cum coriandro, aut portulaca superaccommodantur, aut Pyrites lapis tritus cum cerato impositus alligatur. Cæterum distentione oborta, aut lacte in grumos coacto, panem ex hydrelæo, aut œnomelite cataplasmatibus instar applicato: aut panem cum perdicio uiridi atq; cerato, bis in die aut sabaceam farinam cum aqua mulsâ, uel defruto. Quod si pōdus non ferât, irrigatione olei dulcis calidi cum lanis delicatoribus utendum. Fouendæ sunt mammæ cum uapore aquæ feruidæ, aut fœnogræci decocto, aut altheæ, aut seminis apij. Cataplasma præterea imponendū è polline triticeo, & semine lini, aut fœnogræci cum hydromelite, aut sesamo cum melle butyro uel cōtrito. Exultionem porrò mammarū uitare expedit, quoniā lactatio maiorem lactis colluuiē ad ipsas proritabit. Cum autem inflammatio remittit, istiusmodi ceratis utendū: Betam oleo, donec liquefacta sit, elixabis. Ipsa autē proiecta, oleo ceræ mediocrem mensuram ady cito, atq; utere. Aliud: Ouorum crudorū lutea decem cerato cōmisceto, quod cōstet ceræ uncis duabus et semisse, rosaceiq; uncis quatuor, & spathâ ubi permoueris, muricæ

muricæ quātum suscipere potest, inijce: denuoq; cum rudicula agitaueris, utitor. Ad mammarū porro duricies cōfert medicamentum ē melle, & omnia quæ emolliendi uirtutē obtinent medicamina. Vbi tumor in abscessum transit, illis, quorum capite de Parotidibus facta est mentio: item ijs quæ in sermone de Apostematis recensuimus, utendum est.

Archigenis, aduersus erosiones māmillarū cum malignitate.

Vini Hadriani boni sextarij uiginti, rhus coriariorū libra, galbulorum cupressi libra, gallæ immaturæ atræ uncia sex, cassiæ tantundē: quæ simul cōtusa, in uino diebus decem macerato, deinde coquatur, cōmota assiduo rude cupressina, usq; ad dimidias fermet: tum herbas quidē porrice, succus uerò elixetur ad mellis usq; spissitudinē, deinde in uase uitreo reponatur. Vtere in his quæ depascendo erodunt, mero. At si crassius fuerit medicamentū, uino liquidius reddatur: mammarū nomas, aures quæ cum purulentia fluunt, gingiuas ob humiditatē putridas, & dysenterias impositū sanat. Mitigat idem dolores, lacte temperatum. Alijs mammarū exulcerationibus, haud aliter quā cæteris quibuscunq; hūlceribus medendum.

Quæ mammas conseruent.

Cyminum cum aqua contritum mammis emplastri modo accommodato, mox sponsia exterius posca imbuta imposita, pectus fascijs constringito: transactis uerò tribus dieculis, cymino sublato, mammis florē bulborum cum melle superinducito, & cinctura denuo deligatum per triduum finito, idq; ter in mense facito. Aliud: Cicutam in puluisculum læuigatam per dies nouem imponito, & sponsiam foris, ut dictum est: et aliquot diebus interpositis, idem facito. Naxiæ item cotis ramentum, uirginum mammas custodit.

Aduersus alarum graueolentias atq; sudationes. Cap. 36.

AD birquum, sudationesq; axillarum, aluminis liquidi portionibus duabus, myrrhæ una, uino dissolutis utere.

Aliud: Plumbaginē crematā, uinoq; fragrante extinctam cum uino cōterito, myrrhæ momentū usq; ad strigmeti balneorum

crassia

crassitudinem adiciens utitor. Aliud: Spumæ argenti drac, sedecim, myrrhæ duas, amomi unam, uino excipito. Aliud: Aluminis liquidi drach. octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorū drach. quatuor, uino diluatur, & in usum adhibeatur.

De stomachi, præcordiorum, uentrisq; affectibus. Cap. 37.

DE appetitus à cibis auersione, quæ febre correptos infestat, grandi fame, appetentia canina, debilitate stomachi, animi deliquio, de siti præterea, singultu, nausea, & syncope, inter hæc quæ de febribus libro superiore comprehensa sunt, abundè determinatū est. Rursum igitur super iisdem uerba facere cōsentaneum non est. Cæterum inflammationes oris uentriculi, atq; iocinoris, semper opus habent cōstringentium rerum admixtione. Nam si quis sola relaxanti ratione mederi studeat, uit. i in discrimen duxerit. Proinde oportet siue oleum fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, quippiam cui adstringendi facultas sit, adnectere: uerbi causa, absinthium, aut unguentum nardinum, aut melinum, aut malum cydonium elixatum. Ceratū autē quo cōtinuè utimur, est huiusmodi: Cere candidæ uncia, æstatis tēpestate drac. septē, aloes, mastiches, uniuscuiusq; drachma, olei oliuarum nōdum maturarum, aut melini, & nardini, quantum usus ad spissitudinē exigit. Quòd si adhuc maiore adstrictione indiget, ut qui alimentis superior esse non possit, prædictis olei omphacj drachmā, aut absinthij succi parem modum, ad hæc tertiā partem hypocistidis, floris labruscæ, & cremoris rhus adycito. Addere deinde oportet cerati quantitātē, quæ numero aliorum medicaminū proportionē respondeat. Quòd si in uetustatem incidit inflāmatio, ac indurefcit, medicamēta uaria magis sunt adhibēda, & quæ aromaticum aliquid emollientiū & dyscicientiū habeant. Cuius fariuæ est, quod ex meliloto confectum est, & Philagrianum, & quod à fragrantia Buodes nominatur. Viridis iaspidis torques collo appēsus, ita ut os uētris attingat, pro amuleto est. Verūm in calidis stomachi intemperiebus & ardentibus, cum resolu-
tione

tione eius, uel animæ defectu, aut aliqua cibi fuga, nulla omni
 no occasione excepta, quàm feбри, aquam gelidā potui dato,
 cum succo uuæ acerbæ, aut malorum cotoneorū decoctum, aut
 clauiculæ uitis, aut seminis cucūeris ius, uel puluerē ipsius ex
 aqua frigida. Stomacho præterea uesicā gelida aqua fartam,
 aut cucurbitæ ramenta imposito. Catapotia item, quæ extin
 guendi sitim potentiā habēt, ceu iam pridē de siti memoratum
 est, exhibenda sunt. Stomachus porrò qui cum humore languē
 dus flaccescit, refrigeratur et roboratur isto remedio: Foliorū
 rosarū uiridum drach. sex, succi glycyrrhizæ quatuor, uino
 dulci excipito, & tessellatim formulā, quæ linguæ subdi com
 modè possit, digerito. Sed in quibus propter crassitudinē pitui
 tæ calorificis & incidentibus opus est, hoc fuerit præsidium:
 Corticis radicis fœniculi sextans, aceti sesquiseptarius, aloes
 uncia tres, mellis libræ quatuor: radices cum aceto elixæ ex
 primuntur, porriciunturq;: mel uerò iniectū usq; ad crassitudi
 nem decoquitur, et tum deniq; aloë leuigata inditur. exhibe co
 chlearia tria, cum aqua. Nonnulli uerò idem absq; aloë confē
 ciunt. Et diacalaminthes ita habentib. idoneum est. Quibus au
 tem cibus acescit, seminis coriandri drachmā, polentæ instar
 subactam, aqua propinato: siue mastiches cochleariū, siue la
 uacæ albæ seminis cochlearia duo. Cōpositū aut illud proba
 tur, quod habet piperis drach. seminis anethi drach. treis, cya
 mini quatuor, lauigata exhibebis somnū in inituro cochleari uo
 no in uino temperato. In quib. porrò atra bile infectus stoma
 chus est, & inflatione tentatur, in exacerbationibus spongiæ
 acerrimo aceto intinctas imposito. Si his malum non cesserit,
 alumē cum ære leuigato melle exceptum superaccomodato.
 Potui autem dabis intybi succum, aut potioni mentanā infere.
 Quibus stomachus flatulētus atq; distentus est, nepetæ decocto
 symmetrum mellis & piperis mixtum præbeto. Aduersus
 stomachi subuersiones, succi acinorum mali Punici acidi par
 tes treis, succi mentæ partem unam, usq; ad unitatis concre
 tionem

tionem ubi decoxeris, ante cibum mystrium unum pro pinato.

Ad saliuam stomachi.

Saliuosus stomachus aceto scillino, aut oliuarum salfarū muria, aut summitatis nouae germinationis oleæ decocto os abluitur, aut eius quāminimū deglutiatur. Nihil uerò perinde atque aloe aqua irrigata confert. Ad curationē uerò eorum qui cibum continere non possunt, quos ueteres propriē stomachicos nuncupant, fœnogræci farinā melli mixtā, & maluæ semē laeuigatum in puluerē, cataplasmaticis instar imposito. Gerotum uerò ē cera, & olei irini recremento, & castoreo.

De appetitus a cibis auersione, quæ anorexia dicitur.

Anorexia (quod fastidiū dicunt) à cibis est auersio, quæ à stomachi intemperatura, uel ab exuperanti humorū copia prouenit. Deprehenditur autem distemperamentū calidius, siti, nidorosis & fœtulentis ructibus, si quid cibi præter uoluntatem ingestum sit: promptiore item frigidarū rerum, & elaboratis peruiacium coctura. Gelidā intemperiem cōtraria testantur: neque enim hac detenti sitiunt, neque frigida tolerāt, & acida interdum eructant. Qui ad humores ciborū auersionē referunt, partim propter subtiles atque mordaces succos hoc mali patientes, mordentur stomacho, nausea magis afficiuntur, & uehementiore siti premuntur. Quibus uerò humores cōputruerint, ei quandoque etiā febriunt. Qui autē crassis glutinosisque humoribus laborant, morsu quidē siti que uacant, sed communiter omnibus accidit nausea. Si uerò sinum uētriculi humores occupauerint, eosdē etiam ipsos euomunt. Sin autē in tunicis ipsius impecti combibiti que hauserint, nauseant modò, nō euomunt: præterquam cibos, si quos sumpserint. Quocirca qui ob calidā intemperiem cibos fastidiunt, hos frigida uictus ratione curare, & præcipuē iis quæ condiuntur aceto, oportet: panem igitur posca maceratū esui, ipsamque poscam, lac item acetosum, & eam quā uulgò Romani melcā nomināt (quod ex lacte quoddam est obsonium) potui dato. Intybaque & lactucas, & non
nunquam

numquam aquam gelidā, omniaq; mediocriter, secundum eius
quæ iustum naturæ modū excedit temperaturæ contrarietate
tem: quoniā immodicus horum usus non modò non conducit,
sed etiā sæpe remedijs inexpugnabilem reddit affectum. Qui
præ algore escas respuunt, contrarijs omnino medendi sunt.
Vinum igitur uetus, conditū item, & hydrogarum, anisi præ
terea ac rutæ, petroseliniq; decoctū propinandum est. Piper
quoq; è cōmuni aqua calida, atq; ipsum quoq; quod à trib. pi-
perum generibus cognomē habet diatrionpepereon, aut quod
diacalaminthes appellatur. Dabis etiā uiperarum theriacam,
quæ utiq; his qui ad humorū copiam cibi fastidium referunt,
aliena non est. Allia his, cū nutrimenti, tum medicamenti no-
mine idonea sunt. Quum autē ex humorum multitudine deside-
rium edēdi proiectū est, tenues atq; mordaces humores per vo-
mitum uel aluū euacuabis. Vomitus facilis euadit, si æger tem-
peratam aquā, aut mulsam admodum dilutam antea hauriat.
Præstātius uerò, si ante hæc humectantē exhibeas alimoniam,
puta ptisanæ cremorē, aut ouorum lutea. Quomodo autem fa-
cilem quis uomitū cōciliet, uolumine huius operis primo com-
prehensum est. Sin uerò difficulter laborans euomat, præstat
materiam in aluum dirigere, languentes prius copiosiore &
temperato cibo humectandæ. Sed purgans medicamentum
esto, uel ex aloë Amarum, uel ex malis cotoneis confectum,
quod & scammoniam admixtā habeat, uel rhodomelite con-
stet. Quod si absq; scammonia fieri possit, aloes maiore po-
tius copia ipsos euacuare satius est, quoniam scammonia usus
stomacho officit. Qui uerò propter crassos & tenaces humo-
res fastidio torquentur, his attenuando & incidendo succur-
remus, cum oxymelite, & ex hoc, muriaq; compositis, uelut
cappari, oliuū, sinapi, & consimilibus. Neque uerò inidonea
his sunt ea, quorum in illis qui simili malo præ gelida intempe-
rie conflantur, meminimus: præcipuè uerò post euacuatio-
nem, quam oxymelite Iuliano moliri cōuenit. Foris quæ tum
calfas

calfaciendi, tum roborandi stomachum potentiā cōtinent, ad
bibenda sunt: ungenta q̄; & malagmata, cuiusmodi sunt potis-
simè id quod ex uua acerba cōtextitur, et quod marciatum ap-
pellatur, & quæ solēniter applicatur unguina. Epithemata
insuper Baïum & Buodes, eiusq̄; clāssis cætera. Exercitatio-
nes item, atq̄; frictiones cum primis adhibeantur. Ad eorum cus-
rationē qui difficulter cōcoquunt, pariterq̄; appetitus auersio-
ne, propter frigidum simul & humidum succum, aut eiusdem
qualitatis intemperie cōflāntur, ea quæ è malis cotoneis cō-
sistūt, pertinent. Dico aut id, cui Meloplacuntii cognomētum
est, atq̄; id quod è succo malorum constat, & quod ex eorundē
carnib. preparatur, cytrioq̄; malo confectum. Malagmata
uerò proficiunt, Marciatū, & quod ex acerba & nondū ma-
ture uua cremore constitutum, omphacinū uocatur. Baion i-
tem, & Polyarchium, & eiusdē notæ cætera. Quod si hūlcus
uel stomachū uel uentrem occupet, ut ab omnib. quidem acri-
bus tum esculētis, tum poculentis, tum medicamētis abstinen-
dum est, ita mitigantib. utendum: uerbi causa, sorbitionib. ex
oleo, & quæ ex amylo, & terra Samia, & Lemnio sigillo, la-
te itē, mellisq̄; momento quāminimo confiunt, ut citra mor-
sum repurgent. Epithema accōmodum est ex palmulis, coto-
neorum carne, & polenta concinnatum. Cerotum è melino,
aut rosaceo, cū gutta ammoniacā, & thure proficit. Item ep i-
thema Nilei. Emplastra insuper, Diatēū, quia salices conti-
net, appellatum, & Icesion. Dinosces autem hūlcus speciem,
uel ex sanguinis, uel ex puris, uel ex ramentorum uomitu.

Ventriculo soluto & debili, & ob id fundionē suam in co-
quendo minimè obire potenti, aut cibū etiā euomentī subuenit:
Aloes masuchæ, mastiches, styracis, singulorū sextans, absin-
thij triens, ænanthes quadrās, cōfectionis gleucini uncia sex,
ungenti melini quadrans, uini quantū satis est. à quibusdā Cy-
phios, rosarumq̄; singuli sextātes adijciuntur. Hæc omnia pa-
riter læuigata, purpura, aut lana excipiuntur, stomachoq̄; im-
ponuntur.

ponuntur. Nonnulli ceræ selibrā adyiciētes, epithema cōcinnant.

Ad ileosom stomachi affectus, hoc est uehementes
cruciatu, & conuulforios.

Curandis ileosis stomachi affectionibus, ualet optimè pastil-
lus Amazonum. Cuius descriptionem, tum aliorum ad stoma-
chum commixtorum materiam, in uolumine de Compositis
medicaminibus, ad calcem operis comperies.

De uentris inflatione. Cap. 38.

Flatuum in uentriculo prouētiū, ex humoribus uel alimen-
tis in uapores per tepidā caliditatem resolutis generatur.
Frigiditas nāq; eo q; sua natura nequit attenuare, atq; dissolue-
re, nullos producit spiritus. Vehemens autē caliditas cum non
extenuet solum, sed disyiciat etiam, flatus procreationē probi-
bet. Minor uerō caliditas, alimētum in stomacho diffundit quē-
dem & permutat, sed minore quā opus sit efficacia: inde fla-
tus omnis procreatur. Attenuare igitur ipsos medicamētis ca-
lorificis cōpetit, elixātes oleo cymini, apy, herba rutinalis, et
dauci deniq; semē. Frigore autē affectioni accedēte, rutam, bac-
cas lauri, nigellā, fœniculumq; oleo elixato, bitumēq; cum o-
leo laurino admisceto. Si uerō inflammatio dolorib. cōpulata
sit, calfaciētium loco laxātib. utēris: anethū coquens, cui adi-
pem gallinæ & anseris admisceto. Vtilis præterea flatuosus
spiritib. obnoxys, poly fasciculus percoctus, siue decoctū nepe-
tæ, admixto mellis exiguo, et piperis drachma. hæc quidē do-
lore acriore infestante adhibēda sunt: in mediocri sufficit fo-
tus ex milio. Cucurbitula uerō amplissima umbilicū undiq; cō-
plectens, sæpenuerō aētutum toto liberat symptomate. Re-
medio quoq; castoriū est, cum posca epotiū, & foris cum oleo
sicyonio impositū. Esi cum tormine circa umbilicū flatus in-
cidant, medetur. Suillus item talus crematus, & in potu sum-
ptus, tormina flatusq; discutit, & aristolochia rotunda. Dolo-
ribus porro spirituosus, propter uentris obstrukciones, aut ex-
crassitudine, aut ob frigiditatem obortis, uinum meracius post

P cibum

cibum epotum praesidio est. Somnus si superuenerit, malum ex toto profligit.

De Cholera. Cap. 39.

Cholera immoderata uentris perturbatio est, infra & supra per uomitū ex continua ciborū cruditate facta. Quæ interdum propter multā cibariorum prauitatē, nonnunquā ob corruptos humores nimium aggestos accidit. Quocirca si nauaseabundus fuerit, & conturbetur ægrotans, manētibz etiam dum crudis in uētriculo dapibus, uomitus ciendi gratia aquam tepidā haurire iubebimus, ac digitos insuper aut pinnas in fauces inferere. Opitulandum ad hæc alui deiectione. Superuacaneis humoribus eductis, quiete, & præcordiorū fotu, ex dulci oleo, cū uino nō multo, aut mastichino, aut nardino, si hyems sit, uti conuenit. Sōnusq; inducendus. Lauacris, ad unguē facta concoctione, indulgendū, & boni succi alimentis uescendum. Atqui cum excessu facta euacuatione, ab initio quidē ea quæ supra libro secūdo de Turbatione uētris memorauimus, abunde sunt. Perseuerante uerō fluxu, uētreq; collapsō, si pulsus tenuior densiorq; euadit, cataplasma ex palmulis cum cēnāthe, acacia, hypocistidis liquore, & malicorio imposito. Aquæ porrō mediocriter frigida cyathū ad sorbendū exhibeto. Ius uerō rosarū, aut cēnanthes, aut rhois, aut capreolorum uitis, efficacius est, aut succus ex malo Punico acidæ dulcedinis expressus, pusillo mētæ superinictō propināndus. Vbi uerō quæ excernūtur, acriora extiterint, feruore sitiq; immodica superueniente, cucumeris semē cū aquæ cyathis tribus offerendum: intybaq; et lactucas in posca elixas cibi loco māducent. Fluxu autem nondum suppressō, uinū aliquod austerū propinandum est. Si nulla febris infestat, palmatianū, aut amināū, aut spathites, aut omphacomelites exhibeto. Febricitantibz uerō, uinum Punicū, id est, ex malis granatis, aut myrteū, aut cibyraticum, hydromelū per se poculentū, et cum mica panis, aut baliea, aut chondro, Quod si esculenta frumentacea fastidiant, fructuum

fructuum aliquid fugacium, temporariorum uel, mespila nempe, aut pira, aut cotonea, aut mala granata mandentes, carnosum et durum expuent. Si porro cibum ne sic quidem contineant, cucurbitula quam maxima levis stomacho est adglutinanda. Quam adglutinata, aliquo ex praedictis nutriendi sunt. Ceterum ad couulsificas contractiones calida linimenta oleo imbuta musculis circumponito, cerotaque liquida castorei quippiam et sicyonis complectentia. Sed ante haec, membra sunt aqua calida fouenda. Si peruigiles redduntur, somnum accersire, his quae uigilijs aduersari prodidimus, conuenit. Si uirtus non prohibet, et diacodyon confectio miscenda est. Decremento autem morbi facto, in lauacrum ducendi sunt, et pullis gallinarum et columbarum, aut pedunculis suum, aut consimilibus ferculis recreandi. Profusus uero alui fluo, qui cibariorum corruptela existit, magna quidem parte sua sponte cessat, aegris alimentum nihil usque ad consummatam decoctionem, et absolutam corruptorum inanitionem sentientibus. Si remaneat, eiusdem praesidys quae in cholera comprehensa sunt, occurrendum.

De intestinorum leuore, hienteria uel, & affectione coeliaca. Cap. 40.

DVplex leuitatis intestinorum genus est. Vnum quidem ad superficialium intestinorum exulcerationem, nonnullis uero ad cicatricem etiam ab intestinorum torminibus magna parte excitatam, seu ad alias fluxiones refertur. Alterum uero ad imbecillitatem uirium, quae alimenta in stomacho distinent: hanc alteram leuitatis differentiam cum coeliaco, ut uocant, affectu confundi et misceri arbitror: in quo utique imbecilla stomachi uirtute, cibi neque coquuntur, neque in corpus distrahuntur, sed crudi, perliquidi, imperfectique excernuntur, lubrico fluxu tentata in omnibus alio. Sed in leuore intestinorum celerius quam in coeliacis, quae assumpta sunt alimenta, deiciuntur, tamque inuisa cruditate, ut assumpti quoque nutrimenti genus liquidum cognoscatur. et his quidem unice a coeliacis discernuntur. Semper igitur linimentum cum palmulis hac affectione obnoxys, cataplasmatis instar indu-

cendum est. Summè aut̃ prodest lentiscus & rubus cū oxymes-
lite decocti. Si uenter spiritu inflatur, cuminum quoq; & ane-
thum, & ruta cōmiscenda sunt. Cum aut̃ magis increfcit flus-
xio, mala cydonia, alumē liquidum, acaciā, hypocystida, gal-
lam, aut horum nōnulla, aut pariter omnia inferemus. Cerota
insuper ex oleo myrtino, cum uino quopid̃ astringente. Epithe-
mata calidiora quidem, è baccis lauri, & quod ex seminibus
cōstat. Vehementius uerò adstringūt diacenanthes, id est, per-
labruscā: diagigarton, hoc est ex malorum granatorum aci-
nis concinnatum: & cuius pater Antylus est, et Erythry, ad-
miratione dignum. Inueterata uerò iam ægritudine, dropace
uenter illiniatur, & ex sinapi cerato, necnō & ipso per se si-
napi. Potiones cōducunt, simplices quidē, semen plantaginis,
aut semen rumicis, aut mali Punici cortices, uel sorba arida,
aut omphax aridus ex Aminea uua trioboli quantitate, nō fe-
briētibus cum uini adstringentis cyathis sex. Febricitantib. ue-
rò, cum aqua pluuiā. Minus uerò stomachū tentat gallicaceus
uenter siccus potui inspersus, & quæ cient lotia: uerbi causa,
apium, adiantū, et id genus alia in potu sumpta, materiā auer-
tere moliuntur. Ex mixturis uerò probātur Polyida sigillum,
pastillus ex elektro, itē ex Aegyptia spina, & qui clidion ap-
pellatur, & diaspermatū. Cæterum hoc primam habet boni-
tatis æstimationē: Lāpathi syluestris seminis uncia una & ses-
mis, plantaginis seminis unciā, hypocystidos succi drach. sex,
gummi seu acacie denary terni, malorū cotoneorū ad tertias
decoctorum iure diluuntur. Aliud: Cymini, piperis, rhus Sy-
riaci, floris syluestris Punici, singulorū unciam unam & se-
missim, malicorij unciā, laseris, siue succi medici unciam dimi-
diam, aut pulueris ipsius drachmā potioni inserito, aut oxys-
melite macerata, cū mane, tum uespere misceto. Aliud:
Myrtorum nigrorū cochliarium unum & dimidium, anisi,
rosarum siccariū, ænanthes, uniuscuiusq; cochliary semissim,
palmulus uiginti, in pastillos digerito, atq; drachmam cum
aqua

aqua, aut cum uino plus satis diluto propinato. *Palma* hic bonitatis obtinet, ea quæ è uiperis concinnatur *theriaca*. Porro quod ad alimēta attinet, si quæ egeruntur, acria ac biliosa fuerint, è chondro, oryz, alica, & consimilibus erunt, in quibus quædam adstringēdi facultate prædita incocta sint, *pira*, *malu cotonea*, *messila* et id genus alia. *Lac* quoq; excoctū, his salutare est. Potus autē esto uinum aquosum & tenue, aut aliqua dulcis potio. At si pituitosior fuerit excretio, contrarijs omnino edulys enutriendi, semina quædā stomacho grata admiscenda, *anisum*, aut *cymini*, aut *apys* semen. *Lenticula* recocta *sca* penumerò ita oppressis subuenit, cum aceti momento aut oxy melite mansa. *Brasica* etiā ipsæ his coctæ auxilio sunt. Præstat autem alteram eorundem elixationem in posca fieri. Ex uinis uerò uetustius calidiusq; bibatur.

De Tenesmo. Cap. 41.

Tenesmus quandoq; intestinorū tormina præcedit. Sæpe uerò numero ipse per se paulatim creatus cessat. Est autem adfectio hæc, implacabile ad deiciēdum desiderium, quoniam nihil præter exigua, cruenta, uel mucosa egeruntur, quæ tantum non totius mali causam constituunt: factaq; in recto intestino, tumorē non mollem resipiscēs inflammatio, hærentium illic excrementorum opinione, & excernendi ea cupiditatem inducit. *Galenus* uerò scribit, à forti eiusmodi excernendi conatu lapillum quempiā ex sede deieciū. Frequenter uerò obstructionem stercoris in tenui intestino impacti, tenesmus secutus est, qui stypticis quidē & obstruentibus remedijs plusculum adauctus sit. Clysteribus uerò acrioribus, uerbi causa, mulsa adiectis salibus, aut aliquibus quæ per os sumpta emolliūt (cuiusmodi *Damasena*, aut *ficus*, *mercurialis*, *seru* laelis) excreto stercore illico desinit. Quocirca si citra cuiusmodi causam prompta hæc egerendi sine effectu uoluntas eueniat, lenire inflammationem hordeacea poltina calida, & asperginibus ex uino, oleo myrtino, aut rosaceo, aut omphacino lumbis ac pe-

lini applicatis, competit. Caterum mucosa quæ intestinū re-
 ctum obstruunt, mulsi quoq; infusione abstergito, muriaq; non
 raro indiū, id quod res exposulat ipsa, perficit. Satis uerò
 sunt, salis drach. sex, cū aqua calidæ hemina. Mitigātur præ-
 terea dolores et distentiones infessu fœnograci, aut malua, aut
 seminis lini. Quidā uerò sæpius hanc etiā infessionem usurpa-
 runt: Rubi, myrti, cytini, lauri, & cupressi uiridium æquales
 portiones in aqua decoquuntur: est autē Marcellium. At si in
 profundo inflāmmatio et irritationes torqueāt, frumētacei cre-
 mores unā cū quibusdā stypticis percocti, ab infernis infundē-
 di sunt. Oleū uerò dulce immissum, atq; plurimis horis deten-
 tū, dolorē discutit. Si autē crebrius quis ad oletandū exurgat,
 glomus ex spissamētis calidis ano subdetur, uel fursures calidi
 in fascia, aut spōgia, aut aliud quiddā eius generis apponatur.

De Dysenteria, quod est, intestinorum terminibus. Cap. 42.

Dysenteria, quā Romani tormina nuncupant, intestinorum
 exulceratio est, quæ nunc quidē degenerāti teneismo, aut
 uentris præmemoratæ cuipiā perturbationi succedit, nunc ue-
 rò à se originē trahit. In qua excremēta primū biliosa et ua-
 ria profluunt, mox iuxta proportionē cruenta, postremò cor-
 rupta et saniosa, cuiusmodi ex mortuorū cadaueribus proflua-
 re cōsueuerunt. Sed quæ ab atra bile inchoat, exitialis est, cum
 exulceratione cancrū insinuat. Si igitur cum stercore mixta
 exulcerationis signa cum doloribus, & circa umbilicū torsio-
 nibus cernātur, in gracilibus intestinis exulcerationē esse co-
 gnoscito. quæ per os remedia cū primis expetit. Sin uerò ole-
 tum sincerum egeratur, huiusmodi crassorum intestinorū nota
 est, quod clysteribus magis obtemperabit. Vbi autem plurimus
 cruor solitariè deijcitur, affectionē, cruentā uocitant dysente-
 riam. Excernitur quippe aliquādo nigrior, quā secundū na-
 turam, sanguis, lucidusq; seu floridus, quū iecur digestum ali-
 mentum prauē cōficit, imbecillaq; cōtrentrix ipsius uel altera-
 trix facultas debiliior est, sæpenuerò per uenirē loturæ re-
 centis

centis carnis haud abfimile egeritur. Iecorariam autem hanc dysenteriam indigitant, qua de in sermone super iocinore narrabitur. Comuni itaq; curatione, iisdem praesidijs quib. coeliacis, ac alijs praeter naturam excretionibus, succurritur. Propria uero, Lemnia sphaeragis pota, et per aluum infusa, absterfo prius aqua mulsa intestino, depascenti etiam dysenteriae medetur. Deinde muria, et portulacae succus potus dysentericis peraccommodus est, atq; ipsa etiam per se portulaca in posca elixa et comestae. Plantago item, rubiq; cum fructus, tum folia: necnon et altheae radicis decoctum conueniunt. Hippuris ex aqua uel uino pota, eiusq; succus Mori item immaturus fructus ubi aruerit, adhuc etiam magis rubi mora consimiliter arfacta prosunt. Quin et oua ex aceto cocta, mansaq; alui fluores exiccat. Satius fuerit, si ex his alia quae ad tormina spectant commixta, in sartagine torrefacias, atq; esui exhibeas. Praestantissimum uero omnium est omphacium, rhus rubens, et succus eiusdem, malicoria, galla, acini uinacei, messila, myrta, corna, cochlearum integre tostatarum cinis. Compositum uero illud probatur: Cochlearum cineris partes quatuor, gallae partes duas, piperis partem unam in puluerem confusa, obsonijs inspergito: aut ex aqua uino uel cado aquoso potandum exhibe. unice iuuat dysentericos, quibus bulcus nondum contabuit. Et canum ossa uorantium sterces aridum cum lacte, in quo marini calculi igniti sunt inieci, haustum. Composita uero praecipue prosunt, ex Aegyptia spina pastillus, atq; Phisippi: item qui est cornu ceruino, necnon ex seminibus conficiuntur, et Trygonis: catapotiaq; ex macere consarcinata, admirandae uirtutis sunt. Praestantissimus est, qui continet: Opium, croci, lycii Indici, acaciae, rhus, thuris, gallae, hypocystidis, corticum malorum puniceorum, myrrhae, aloes, et quis partibus ex aqua praebetur triobolum.

Aliud: Rhus denarij octo, gallae, malicorij, singulorum denarij quatuor, cochleare unum ex uino propinatur. Aliud: Rhus drach. octo, gallae, acaciae, gummi, uniuscuiusq; drach. duas, opij drach. in uino temperato exhibetur. Hic autem linctus dysentericis

conuenit: Myrtorum nigrorum sextarium, rhus Syriaci tantundem, palmularum Thebaicarū libras duas, carniū malorum cotoneorum librā, mala punica acida cum corticibus decem. uini astringētis sextarios duodecim, ad tertias usq; decoquito: Percolatis, mellis libras sex incito: coctumq; ad crassitudinem, lingēdum exhibe. Constat uerò, quòd cataplasmata quoq; ex astringentibus, quorum syluā ad manum habes, usui sunt. Enemata porrò dysentericis propter affligētes tenesmos competunt, ex cremore oryzæ, aut chondri siue id genus alie cuius, cum adipe caprino, siue hircino, & quacūq; in capite de tenesmo memorata sunt. Quòd si sanguis excernatur, polygoni succus per inferna inŷciendus est, aut plantaginis cum acacia, uel hypocystidis, uel alterius eiusmodi. Sin urgeat fluxio, cohibens sanguen, aliquod remediū incito: uerbi gratia, lanæ succida cinerē, uel spongia inanis pice liquida, seu sanguine bouillo irrigatæ, aut cum alumine liquido crematæ, aut fimi asinini cremore. Andronius etiā pastillus præstans medicamentum est, item Musæ, & his nō absimiles. Necnon & ea quæ subŷciuntur collyria, multo in id efficacissima sunt: præsertim in quibus cum doloribus alui excremēta eŷciuntur. Sed huius ubi depascendo serpens intestina occupauerit, id quod ex graueolentia & putredine retrimentorum, quodq; non ab initio statim, sed interposito tandē tempore ortū sit, deprehendimus: clysterib. crustā inducētibus utamur, cuius clāssis sunt pastilli qui Faustiani cognomentum obtinent, et ex charta, pastillusq; nomine Bulhynus & Thronius: itē ex suberibus confectus cum lēticulæ decocto, aut astringentiū quopiā immiŷsi. Cæterum & hoc sapius à me expertū est enema: Glandium calycis cremati (est autem calyx concauum illud, unde glans querna enata est, quo coriarij utuntur) auripigmenti, solida ginis, rhus Syriaci, & aquas horū concussorū partes, quantum uidelicet duo capiunt cochliaria, oryzæ cremore excipito, et succo anchusæ spinosum grandeq; & nigrū folium habentis, quam

quam chærospetheon nuncupant. Quorum item albuginis si militer ad uncias duas, aut treis immittito. Epithematū porro facta est in uentris mentio. Vētris insuper inunctiones è materia astringēdi arefaciendiq; potestate prædita cōstat, cum aliquo glutinatorio gummi, thure, glutino taurino, polline, in id genus cataplasmatīs locū habeant. Alimentum sic habentibus principio puls ex ovo & lacte parata, mox frumentaceæ sorbitiones per se, & cum lacte elixæ, esto. Lac quoq; modicè decoctum, præstantissimū est. Holerum usus neuiquā necessarius: possunt tamen gustari cichoriū elixum, intybum, plantago, brassica bis cocta, & poma astringentia, carnibus ipsorum porrectis, aut quæ aliàs exasperare possunt intestina. Quod si calor in multā uenerit intemperiem, intybum etiam crudum exhibendū erit, aqua gelida propinanda. potū alioqui præstet aqua pluuialis: stomacho autē affecto, etiā uinū. Volucres deniq; aridiores, & cōcoctu faciles māducētur. Lauacris utantur ex aquis dulcibus. At si fluxū inde experiantur, prægrandē spongiā, uel micæ panis siliginei, uino ascalonite, aut aliquo calido adstringēte irrigatas, uniuerso abdomini superaccommodabis, fasciāq; ubi deligaueris, ita lauari præcipito.

De ægritudine colica. Cap. 43.

Colon crassioris intestini pars, à dextra iliorū parte oriēs, in modū zonæ ad sinisteriorem excurrit. Cruciatūs in eo pluribus de causis suscitātur immensi. aut enim propter crassum pituitosumq; humorē, qui intra ipsius tunicas insidet, aut propter spiritum etiam crassiorem ac turgidum inclusum, aut propter inflammationē intestini, aut propter acres, uiq; mordaci uellicantes succos. Quibus itaq; crassus pituitosusq; humor cruciatū infert, his dolor per uniuersum funditus epigastrium diffunditur. præcipuè uerò, ubi sensu coli situm terebra perforari autumāt. Torsiones hos circa umbilicū excruciat: rursus item, & nausea, uomitionesq; uariæ, sed in primis pituitosa: alius grauius impedita ad eò nihil excernit, ut ne fla

tus quidem præterlabi queat. Excretum autem quandoq; oleatulum, ueluti bubulum cernitur, leue, & spiritu refertum. Præcedunt hæc uerò maximè, gelidorū, crassiꝫ; humoris esculentorum frequens usurpatio, satietas, cruditas, ociū, & id genus alia. Qui uerò dolorē flatulento spiritui acceptū referunt, extensionis potius sensu torquētur. Qui autem ob inflammationem tormenta sentiunt, loci feruore deprehenduntur, quem febris haud ignaua comitatur, unā cum stercore lotiū retinetur, pulsus uentrē perturbat, sitis, æstus, ac nausæ infestant, uomitionesq; biliosæ potissimū, quæ nihil malū subleuāt. Ea quidem ut uno uerbo eloquar, omnium infestissima est colicarū affectio, quæ in gracilioris intestini morbi, quem ileon Græci nuncupant, transitū minuitur. His qui propter acres & mordaces afficiuntur humores, perinde atq; cum subest inflammatio, corpus æstuat, sitis et uigilia molestant. Febriunt autem omnino, aut paulo minus illis. lotiū acre emittūt, & biliosum deiciunt, sæpenumero in alui deiectione plurimū torquētur, & eduliorum potuumq; excalfacientium usu grauius irritantur. Medendum itaq; doloribus, qui ad gelidos, tenaces, et spissos humores referuntur: prouidendo, ne uehementer calida adhibeātur remedia. nam ab admodū calorificis præsidiorū materijs liquefacti funduntur; magisq; in flatulentū spiritum rediguntur humores eiusmodi, quos circa morbi statim exordia medicamentis minimè inflatibus, attenuatoriæ & siccificæ naturæ, absq; immodica calfactione, incidere et cōcoquere expedit. Proinde aluo prius oletulo clysteribus idoneis exonerata, oleum in quo elixum sit cymini aut ruta, cum adipe anserino, uel gallinæ ceo, uel radicū syluestris cucumeris decocto, myrrhaq; denario, melle & sicyonio oleo iniiciendū est. Quin & oleum commune infusum nō rarè pituitā uitreā extraxit, instantemq; protinus dolorē sedauit. Sed si præ nimio cruciatu enema contumaciter retineatur, collyriū supposititiū ex melle, cymino, nitro, rutæ semine arido, brassicæ caule pulchrè polito, et mure

via irrigato, uel brassicæ cinere melle imbuto, aut colocynthi-
de trita cū melle, nitro, ac cymino sedi inferendū est. Caterū
glandes digitorū senum lōgitudine sunt, ut per sedis fibulam
in aluum penetrēt. Anus præterea cyclamini succo, & nitro,
uel centaurio cum melle & nitro illinendus est. Perseuerante
autem cruciatu, clyster præmemoratis adijciendus est. Resinæ
terebinthinæ uncia, siue opoponacis drach. aut galbani drach-
ma quatuor, bituminis aqua portio, cum nitri drach. et aquæ
uncia, & olei rutacei uncys quinq; uel plus. Dolentesq; partes
ex cymino, uel anethino, uel sicyonio oleo fouēdæ sunt. Cata-
plasma insuper Trispermion nomine, cum cymino, baccis lau-
ri, & semine apij imponatur. Epithemata uerò cōmendantur
ex seminibus, è baccis lauri, & ex melilotis concinnata, atque
Polyarchium. Inseſiones item ex fœnogræci, altheæ, chamæ-
meli, artemisiæ, anethi, lauri, & id genus aliorū decocto salu-
bres sunt. In oleum insuper calidū, uel hydrelæum descendere
ex usu est. Potioni absinthiū, & cuminum æquis portionibus,
aut panax cum aqua uel castorij, uel anisi, piperisq; drachma
cum oxymelite præbetur. Quod si cruciatus his remedijs non
cedunt, potionandi sunt confectioe quæ è tribus piperū gene-
ribus constat, uel theriaca. Sinapismo ad hæc, & dropace in
dolorum remissionibus utendū, & sua sponte emergentibus ba-
lineis. Caterū ex aqua potabili lauacra effugiant, nisi ob do-
loris afflictionē cogantur. Cum iam prædictorum aliquo me-
dicamine aluus stercore prius leuata fuerit, lauacris se crede-
re, uaporariq; ignitis filicibus, aut inter candentes parietes iu-
beto, inspersis aliquibus nitrosis smegmatibus. In uehementio-
ribus tormentis, mediocriter mitigantibus præsidys utendum
est; cuiusmodi cēsetur è castorio cōfectus pastillus, cum per su-
perna, tum per inferna immissus, & alia eiusdē generis medi-
camenta. Nam quæ uehementer torporem afferunt, cauenda
sunt. Quoniā ad præsens quidem tormenta paulisper leniunt,
sed diuturniorē affectionem reddunt, materiam incrassando,
mcatuq;

meatusq; intestini cōstipādo. Piliuita uerò iam attenuata, hiers
amarulenta, uel globulis huiusmodi purgare expedit: Aloës,
euphorbii, cocci gnidiij pari, scāmōniæ, æquis cuiusq; partibus
modus est ad scrup. duos. Viçus adhuc ratio calidior et ari
dior conuenit. A primordio quidē morbi perferenda est inea
dia: mox inde acriora manducāda. Porra itaq; tosta eiusmodi
afflictioni detentis esui dentur, cum condito. Apii quoq; et pa
lustris asparagus, allia cruda, præcipuē his qui talibus minime
offenduntur. Verūm conditū ipsum quoq; potent, panēq; cum
ipso sumant. Escas etiā reliquas inculpati succi, et cōcoctioni
nihil renitentes exhibebimus: ita quidē, ut cautius à saturitate
et cruditate tueantur. Vbi uerò flatulentus spiritus dolorem
suscitauerit, post enemata quibus flatus dissipātur. potionesq;,
cucurbitulæ etiā perquā ingentes succensæ, et inanes unis
uerso uētri impadæ, nonnunquā satis adminiculi præstiterūt.
Quod si intestinū inflammatio torquet, è cubito sanguis detra
hendus est. Si uerò mictionis difficultas exercet, uena à malleo
lo secanda est, et iam pridē enumeratis utendum remedijs, ex
ceptis acribus, et uehementer expurgantibus. Lenientes po
tius clysteres infundi, cataplasmata admoueri, imbreg; con
gruo foueri debent. In oleum quoq; descensus cōmendatur. Cu
cubitulis interim utiliter adglutinabimus. Ceretariumq; epi
gastrio applicabimus, quod ceræ quidē habeat quincuncē, cha
ma melini olei sextantem, rosacei tantundem, fabacæ farine
semunciam, lutea ouorū quina. Hæc lentitia seminis lini cogū
tur. Tenuis et febricitantiū peculiaris uicçus, usq; ad inflama
tionis solutionē sic habentibus congruit. Quod si acres et
mordicantes succi cruciatus propererint, oleū per aluum infun
detur, in quo elixatū sit scenogracum, aut alibea, cum molli
adipe recenti anseris siue gallinæ, uel cremore quoq; ptisanæ,
cum rosaceo, aut lini seminis etiā liquore. Potionādi uerò sunt
antidoto ex aloë amara. Lauacris ex aquis dulcibus danda est
operi. Cibis utendū sorbilibus ex chondro, seu ptisana, piscia
busq;

busq; saxatilibus. Vno uerbo, omnis uicinus ratio humidior frigidiorq; esto. Cauendū à cunctis acerbis cum dapibus, tum medicamentis. ex superfusionibus, cataplasmatibus, fotu, uiniq; potu, in primis autē uetuli. Si dolor admodum uiolentus laborantem exerceat, ijs etiam quæ stuporē inducunt, utendum. Multo quippe minus alijs lædunt id genus affectus, quæ tenues mordacesq; humores incrassant, & mediocriter refrigerant. Mea nanq; sentētia, colica ægritudo quæ nostrā ætate incrudescit, ex talibus humoribus nascitur: cum ab Italiæ quidē finibus inceperit, per pleraq; alia Romani imperij loca, instar pestiferæ contagionis grassetur: unde non paucis quidē in morbum committalem, alijs uerò in membrorum resolutionē incolumi sensu, nonnullis autē in utraq; delapsis, magna pars eorum qui in committalem ceciderant, è uiuis excesserunt. Quorū uerò morbus in paralysem transierat, pleriq; euaserunt. perinde atq; in decretorio aliorum transeunte morbi materia. Hoc itaq; modo affectis, medicus quidā per Italiam curam adhibuit. suspectam sanē atq; infidelē quandam, frigorificā scilicet, multumq; temerariam uicinus rationem de industria commentus. Lactucas nanq; crudas et refrigeratas, intybaq; consimiliter, uel ultra saturitatem deuorandū ipsis elargitus est. Præterea uuas, mala, duriorisq; carnis pisces, et quacūq; crustacea, quæ Græci ostracoderma uocant, bubulos pedes, bulbos, et id genus, nō facultate modō, sed tactu etiā frigida. Vinū sanē rarēter admodū admittebat, nec nisi aqua gelida dilutū. aquā uerò frigidā, uel poscam etiam frigidā propinabat. Ab alimento præterea omni calido, mediūq; materia, uehemēter abstinebat. Atq; ita sanē complures aliquot à morbo uindicauit: quospiam ex illis etiam, qui iam in Herculeum morbum, resolutionemq; neruorum prolabi cœperant, præter omnium opinionem seruauit.

De Voluulo, quem ileum dicunt. Cap. 44.

Cutissimum malū, & acerbissimi cruciatus ileos existens,
A casum quendam periculo grauiorē adfert: miserabili si
 quidem

quidem morte tandem eo morbo detenti, alui retrimēta per os reddentes intereunt. Oboritur ex cruditatibus, & obfessa ex crementorū semita, retentis quæ iam corrupta sunt: lethaliū item medicamentorum potu, atq; in scortū descendētib; intestinis, & inflammationē expertis, coli cruciatu præcedēte. Pueris igitur hoc malo oppressis, asperginib; cataplasmatib; clysteribus, collirijs, atq; fotib; quemadmodū in colicis mesmoratum est, succurrendū. Adolescentiæ autē, floridaq; iuuetuti sanguinis detractione absq; mora succurritur: sin minus, cucurbitula uniuerso uētri multæ atq; inanes sunt adglutinandæ, & in regione doloris cū scarificatu. Mēbra porro perfricanda, arctiusq; fascijs coercēda, tum clysteribus & enematis ualentioribus utendū: in seſſu in super olei calidi, antidoti, & purgationibus. In summa, omnibus quorū usus in colica ægritudine probatur, exemptis his qui ad acutos & uellicātes huiusmodi moris coli dolorē referunt. Mirificè uerò conducit ipsis, si euomuerint, anethū elixū & epotū. Obfestim uerò à potu panis incalidā demerso, buccam eius calentē manducandā porrigito. Sed cibū non continentibus, rbun & cymīnū in eadē leuigatum, in oxymelitis cyathis sex potui præbeto. At eos qui ex ueneno ileum patiuntur, aquæ calidæ potu uomere cōpellito. Cæterū omnium lethaliū uenenorū indicia habes uolumine huius operis quinto explicita. Deinde bibendū quoq; oleum calidum, aut ius pingue, quo denuō ciatur uomitio. Post aliquot dies theriaca propinatur. Perseuerāte autem oppilatione, lacte scisso, cum exigua scāmōnia, uel aloë, aut purgante aliqua materia, aluus euacuanda est. Si ex intestini in scrotum prolapsu uoluulosa oriatur affectio, figuratis ipsis quam primū, ut in caput sublimes pendeant, delapsū intestinum intra inguen reprimendum, ligamentoq; coercendum.

De renū ac uesicæ malis, & primitus de calculo. Cap. 45.

Morborum cognatio nos seriē doctrinæ transgredi compellit. Cōmune quippe colica ægritudine, renūq; calculo

culo laborantibus, intra primordia statim uentrem cohiberi, summoq; cruciatu opprimi, cibū fastidire, cruditates pati, & intestinorum torminibus torqueri. Peculiare uerò, colicis hæc omnia magis intesa offenduntur: Nephriticis aut minus. Et colicus quidē cruciatu cum plurimū in dextris ilibus uexās, ad stomachū, usq; iecur itē & lienē pertinet: oleti omnino nihil, imò ne flatus quidē per inferna trāsmittitur. Et cū reddere aluius cōpellitur, quod excernitur flatulentū est, et bouino neuti quā absimile. Nonnunquā etiā pituita uitrea deijcitur, lotium copiosius pituitosumq; editur. Nephriticis autē grauis in renibus dolor quasi fixus hæret, instar paxilli ad adireferēs, & è directo subiectus testiculus dolore afficitur, femur eiusdē partis torpesat, aliud quidē sua spē rariuscule respōdet. Clysteribus uerò iniectis, flatus et biliosus recrementū deijcitur. Lotium exigū, ac sabulosum magis redditur, meatusq; urinary constringuntur. Hæc indicia calculos in renibus esse testatur, quæ hominibus maximè adultis eueniūt. pueris uerò in uesica potius calculi cōcresecere cōsueuerunt. Notæ horū sunt, urinae cruditas, et in albedinē languescēs, cū sabuloso sedimine: pruritus creber, uerēda subinde laborātes contrectāt & arrigūt, identidēq; in lotiū urgēt, et destillat urina. Materiata quidē gignendis calculis occasio, crassus et terrestris humor habetur: effectrix uerò, flagrās renū aut uesicæ ardor. Caterum in renib. quæ calculos cōminuant atterāt, incidātq; utendū medicamentis est, nō tamē excellēter calorificis: cuius farinae utiq; sunt, Basilicorū asparagorū radices, rubi, uitrū itē cōcrematū, graminis radix, adiantū, bdelliū, lauri radicis, cortex, altheæ semē, cicer nigrū arietinū, spongiarū calculi, acetū scillites, pbu, meū, asarū, carpesia, sarxiphages. Siū præterea cū māsū, tum potū scolymi, radix, irion, prionites: lauacrisq; iugiter utantur, & à lauacro confestim eorum aliquid quæ memorata sunt, potent. Adsparginibus insuper, cataplasmatib; et somentis, infusib; relaxantibus placantib; utendum.

dum, hoc ex colicis transumendo. Compositæ autem potiones probantur: Rutæ agrestis, & maluæ sylvestris, apijq; radices cum uino elixatæ. Liquorẽ inde expressum aqua tẽperatum, cochliaribus binis exhibeto. Maceratũ etiam illud in emplastrũ: Balsami fructus, calculorũ spõgia, pulegiij aridi, maluæ sylvestris seminis, & quæ portiones cõtritæ, cochlear inde cũ uini diluti cochliarijs duobus propinatur. Aresadũq; sanguen hircinũ, cicadæ aridæ demptis alis ac pedibus, lapis iudaicus tecolithus appellatus, ex mulso in calido lauacri folio exhibeat: & quæ ex illis componuntur medicamina. Fusca insuper nephretica, & quæ ad eam functionẽ cõparata sunt condita. Troglodites autem præcipui honoris inter remedia cõsetur. Est uerò passerulus auicularũ omnium, præter regulũ, quo uno maior habetur, minima, colore consimili, inter cinericiũ & uiridem medio, acuti rostri, in parietibus sepimentisq; maximè degens: qui totus sale conditus, & concoctionem non expertus, iugiter comestus, cõcretos iam calculos lotio expellit, & in posterũ gigni prohibet. Crematiq; integri cum pennis uiui cinis uniuersus per se, adiectoq; pipere, & phylli modico, ex mero melleq; potio idẽ præstare potest. Aduersus uerò sæuam cruciatus acerbitatẽ uigiliasq; celebratur Sotira, et Philonis medicamentũ. Dolorem plerũq; placauit sanguinis admissa detractio, ocysimè ad excretionẽ propellẽdo calculum. Arcet creationẽ calculi, primũ quidẽ cibaria non improbi succi, & moderata: mox etiã exercitationes, & insolentior leguminum omne genus, frumentaccorumq; usus. Casei item & lactis, quæq; inde præparantur obsoniorũ, uini adhuc atrij, et carniũ abundantia: et ut semel omnia cõplectar, omniũ quæ crassum generant succũ, quæq; admodum calidæ sunt potestatis, & acria, hydrogarorũ inquam, atq; conditorũ, & id genus aliorum abstinentia. Haud enim hæc modò nondum natos calculos cõpescere prohibent, sed iam ortos etiam cõminuere aut excernere possunt. Bibãt uerò oxymeli, adiecto aliquo ex
sum

simplicioribus, quæ lotij proritadi uim obtinēt, puta adianti, apy, graminisq; decocto. A balneo, ieiuni ante uinum, aquam temperatā potēt, et in medio prandij frigidā, nisi quid obstat, super sorbeant. Quod si prauorū humorum copiam sensu per ceperint, sanguinis detractio, seu alui deiectione euacuētur. Verūm ad tutelā negignantur calculi, omnium primum boni tatis honorē meruit. post balneum, ante uinū, nutrimentumq; aliud, aqua temperatæ potus. Sed uesicæ puerorum calculos, efficacioribus adminiculis emollicere, delectu quidē ē præditiis habito. Quod si calculus supra modū increuerit, & ceruici ue sicæ impegerit, quassatu & tubuli, & demissione, uel incisio ne, perinde atq; in uolumine de chirurgia dicitur, utendum.

De inflammatione.

Quod si renes aut uesica inflammationē experiātur, id quod regionis affectæ feruor cū grauitate cruciatus, febricula, alie na animo peregrinante sermocinatio, biliosus uomitus syncca rus, mēdi impotētia, præsertim uesica phlegmone oppressa arguit: sanguinis detractio quamprimum occurrēdum est, mitigatoriaq; facultate præditis asperginib. & cataplasma tis utendū ex ruta, anetho, fœnogræco, althææq; radice. Cly sterijs item mollibus, & enematis quæ ex oleo, & papauere, & adipe anserina cōstituuntur. In uesicæ uerò inflammationi bus, opij quoq; obolus semis cum myrrha crocoq; ac oleo sedē immittendus. Mulsæ propinanda, abstinentum à ualde lotiuma cientibus, multaq; potione: nisi acris ac biliosus humor naturæ modum nimīū excedat, tum quippe copiosiori potui indulgen dum, & confertim semel eorum quippiā, quæ urinā absq; ros sione propellunt, ingurgitandū. Potent præterea seminis lini portiunculas binas, amyli partē unā, ligulæ mēsurā ex aqua. Sumatur itē cucumeris atq; peponis semē. Cum uerò igneum feruorē renes sentiunt, linteola uino & oleo rosaceo, aut aqua & oleo rosaceo melino uel imbuta inijcienda sunt: uel ceratū ē cera, rosaceoq; et chamæmelino oleo, siue melino, et ouorum

Q luteis,

luteis, cum aceto perexiguo, aut polygoni succo contextum.
Postea autē emplastro ex succis Diachylon appellato cū cha-
maemelino utendum. Cauenda sunt nimium calida, quoniam
suppurationem creant. eadem & impediō frigoris: renes
namq; promptissimē ab his in scirrhum obdure/cunt. Abstine-
dum praeerea à balneis est, cum imminet inflammatio. Vidus
ratio quae febricitantibus expedit, & ab arcenda inflamma-
tione nomen aphlegmaton habet.

De urinarum partium abscessu & exulceratione.

Abscessum in renibus portendunt dolores iliorum, turbati
horrores & febres inordinatae. In vesica uerò praeter cōme-
morata, dolor etiā partis fitetur. Renum porro affectum de-
prehendes si homo in sanū decumbens latus, in opposito dolo-
ris ueluti suspensi renis sensum percipiat. In quorū curatione
in sebis, ex hydreleo utendū est, cataplasma in q; ex polline,
oleo, ac resina, aut farina erui cum melle, aut cardamomo, aut
stercore columbino, cum caricis. Pus uerò per lotiū cōfarctim
excretum, ruptū abscessum, atq; in particula hunc esse decla-
rat. Cū uerò etiā absq; abscessu, rupto uase, uel exeso ab acro-
re materia, aut calculo radice urinarum meatus exulceratur,
distinguenda est renū exulceratio, ab ea quae uesicā, aut uri-
naria uas exercet, ad hunc modū. Renibus exulcerationem
sentientibus dolor cum quadā grauitate lumbos affligit, & ci-
tra impedimentū emingunt, lotioq; pus mixtum inuenitur, car-
nosae particulae innatae. Vesica uerò hunc hunc intēta,
uehemens cruciatus pedinē inuicē uentrē impetit: urina ma-
gna cum anxietate redditur, & post mictionē pus in fundo ma-
tulae subsidet. squamulae q; in ipsa tetri odoris, aut laminae cir-
cunferuntur. Furfurea uerò hypostases uesicā scabie laborare
significant. Quando autem meatus qui ē renibus urinā ferunt,
exulceratione confluantur, puris mixtura medio quodā mo-
do, & capillamentis persimilia urinis innatant, tormentumq;
mediū inter renes & uesicā regionē urget. Si uerò pus, aut
sanguis

sanguis solus absq; lotio excernatur, prædictarum partium nullius, sed pudendorum hulus denunciat. Cum itaq; uasa per quæ urina fertur, exbulceratione experiatur, aqua mulsa, uel fœnogræci decoctū, unā cum melle, aut cucumeris semen cum passo propinetur. Purulentiū cum lotio excernētibus, rubrica Armeniaca exhibenda est, uel ferularū crematarū cinis, quantū tribus digitis capitur cū passo. Sed & lac in potu magnificè sic affectū opitulatur. Mixturæ autē hæ, seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ singulorum gemini denarij, in pastillos cōformantur. Aliud: Nucleos pineæ nucis uiginti, seminis cucumeris salui cochliaria quadraginta, amyli drachmā heminis duab. iuris in quo nardi, seminis apij, uniuscuiusq; denarij quini elixi sint, excipito. Verūm Archigenes in epistola ad Atticū, Dysuria, inquit, urgēte, sume papaueris albi torrefacti seminis cōtriti drachmā, iunci odorati rotūdi, uel calami, aut glycyrrhizæ decocto inspersam. Hulus naturā resia piscētes cruciatus illud adimit: semina cucumeris repurgati numero triginta, nuclei pineæ nucis duodecim, amygdalæ amaræ cortice depto trigintaquinq;, croci quantū ad colorē opus est, ieiunus quotidie cum lacte seu protropo ingerat. Mitius sanè fuerit, si loco pinearū tantundē seminis maluæ accipias. Sanare præterea affirmat exbulcerationes uesticæ Cyphi, & ex hoc antidotos. Nos uerò in uetustiorib. hoc usi, nunquam alio magis uario indiguimus: Chamædryos, chamæpityos, singulorū drac. uiginti quatuor, asari, piperis albi, uniuscuiusq; drach. septē, cinnamomi drachmam quā fieri potest læuigatissimi. cochliaria duo exhibemus, cū passo Cretēsi. at si febricitet, cū aquæ cyathis ternis. Si mordax hulceratio, amyli cochliarijs duobus, et seminum cucumeris granis quindecim adiectis, uoti cōpotes euasimus. Hactenus quidē ex decretis Archigenis. Ex uesticaria itē medicamēta, & quæ ex syluestris maluæ semine cōstituuntur antidotus, quæq; ex bellarijs cōfit, uilia sunt. Tauraro imoq; uētri ceretaria accōmodentur cū asipo lota, butyro,

adipē

adipe anserina, atq; styrace. In uesicā uerò clysteridio instruo mento mulsam aquosissimā infundere, seu lac cum momento mellis, aut cucumeris semine, aut alborē oui cum pōpholyge, aut prædidorum medicaminū aliquo, cōuenit. Hulcre autem pascendo serpente, pastillus ē charta immittendus est, aut Bythinus. Cataplasma etiam ē palmulæ dactylis, & uuis passis cum galla, acacia, hypocystide, & alumine superimponitur.

De eruptione sanguinis renum.

Renes haud rarò ex imbecillitate lotia cōtinere nequeunt, sed latiores redditi, ē uena sanguinis aliquid excernunt, aliasq; crassitudines edūt. Sæpe etiā numerò renes sanguinis fluxum per circuitum, perinde atq; hæmorrhoides patiūtur: euacuati uerò subleuantur. In quibus nihil protinus moliri cōuenit, sanguinis fluxu represso. Quòd si cursus eius permaneat, sanguis ex uena cubiti detrahendus est, & iisdē medicamentis, quorum usus ad sanguinis screatū, & alias ipsius eruptiones in renum atq; uesicæ sanguinis effusione probatur, utendum est. Vincit symphyti radix, ac tragacātha uino macerata, ita affectis exhibita: sanguinalis insuper & plantaginis suauis, cum posca, aut amygdala amara cum passo. Siue hoc: Aluminis fissilis drachma, tragacanthæ drach. duæ, gummi oboli quinq; cum passo. Cataplasmatissq; more hordeacea polenta ex posca & rosaceo: aut cataplasma ex palmulis, & siligineo pane cum acacia, aut hypocystide in uino astringēte, aut posca elixis inducitur. Vesica autē sanguinem fundente, cucurbitulæ quoq; ilibus & coxendicibus sunt adglutinandæ. Cæterū quæ nam particula sanguinē fundat, loci dolore deprehendes, & quòd cruor lotio permiscetur: uel ē cōtrario, quemadmodū de pure memoratum est. Sanguinis in uesica in grumos concreti indicium est, quòd reddito sanguine urina raptim supprimitur, quodq; concretus quidā cruor, ut consentaneum est, uel cruenti humores effluunt. Tunc in potu decoctū artemisiæ porrigito, beliochrysiq; aut cunilæ, aut raphani semē, aut succū laserpi

ty,

ay, siue cyrenaicum, siue apij in aceto temperatis singulis, uel leporis coagulū, uel hinnuli, uel hœdi in oxymelite, uel lixiuiū cum oleo exhibeto: aut spōgiæ foris ex muria, statēue calida adhibendæ. Si ne his quidē grumi dissoluantur, disseccare taurum perinde atq; in calculosa uesica, grumisq; sublati cono-
cinniter opitulari conuenit.

De renum duritie.

Quæcunq; durities in renibus suscitantur, dolore quidē uocant, sed ab ilibus quasi suspendi quippiā uidetur, stupēt coxendices, debilitantur crura, lotij momentum eicitur, uniuersusq; corporis habitus aqua inter cutē laborantibus similis est. Hos ceratis malagmatis, frictionib. atq; fomētis emollire: ad hæc quæ urinam cient, offerre, uentremq; subluere conuenit.

De Diabete.

Diabetes pernix poculentorum transitus est, iisdem ut pota sunt per urinā redditis: quapropter siti inexplibili premūtur, unde dipsacon id uitii appellitāt. Ad retentricis potentiæ renum imbecillitatē, ipsius causa refertur, & attractricē robustiorem, uniuersum corpus propter immodicū calorem, consumentem refertur. Huic itaq; affectui repugnātes, alimenta largiora, quæ transmutationi resistūt, neq; admodū humida sunt, exhibeamus: puta halicā cum rosato, aut rhodomalo, aut hydromalo, aut uino nō ueteri, aut quopidā alioqui calido. Ex oleis intyba, serim, lactucas, pisces saxatiles, suū cū pedunculos, tum uuluas, pira, poma, mala punica, et potionē gelidæ. Potionandi præterea succo polygoni, inula campana ex uino nigro, palmularū item myrtorumq; diluto. Cataplasmatū modō præcordijs ac renibus applicāda sunt, polenta hordeacea ex aceto rosaceo, foliaq; uitis, & umbilici Veneris, & parietariæ, et portulacæ. Ad hæc sudores ciere, ac uomitus, à potu frigido, et omnibus quæ urinā proritat abstinere expedit. Intra uerò initia statim sanguinē detrahare, haud inutile cēsetur.

De stillicidio urinæ, difficultateq; meiendi.

Si neq; inflammatione, neq; calculo, neq; quopiam prædi-

ſtorum a'io urgēte, lotij acrimonia uexet, uniuerſusq; habitus,
 uel reliqua etiā indicia bilem præferant, inde uel dysuria, uel
 ſtranguria prouenit. Proinde his quæ hanc immutant, tempe-
 ratiq; uti cōuenit, ptifana cremore, piſcibus, balineis, uiſusq;
 ratione ſimili. Ab acribus abſtinendū. uino, exercitijs, ira, &
 ſero cibatu. Si lotij tenuitas cū albore cōiuncta, cætera q; no-
 te gelidā teſtatur intemperit, merum calidū conuenit, & cō-
 dita, et quæ urinā proritant medicamenta, et eiſdem facultati-
 bus eſculenta, inſeſſusq; calidi. At ſi in lotio præter candorem
 craſſities appareat, phlegmaticū humorē ueſicæ ceruicē ob-
 ſtruxiſſe colligito, & aceto mulſo occurrito. & poculis ex
 hyſſopo, pulegio, aut origano, aut thymo, uel ſilphio, in aqua
 mulſa decoctis, et irrigationib. calidioribus. Si humor craſſus,
 ſiue calculus, ſiue grumus, ſiue id genus quippiā oppilās urinae
 exitū impediat, fiſtula quæ catheter dicitur, educenda eſt,
 niſi inflāmatio particulā occupet. In febris. autē difficultati
 urinæ adſperginib. rutacei, uel anethini, uel ueteris olei medē-
 dum. Cum aluus fuerit aſtriſta, ſcænoſci, aut maluæ deco-
 ctum per inferna inijciatur. Confert dicta affectione oppreſſis
 hydrelæo inſidere, uel alicui prædictarū ſpecierū decocto cum
 oleo. Vincit ceratū hoc: Sylueſtris maluæ radices in ſicyonio
 oleo cum exigua aqua elixātes, donec torrefiāt: ipſæ quidem
 abijciantur, oleo uerò ſuccus rutæ quarta parte, & ceræ &
 caſtorij quantum opus eſt, admiſceatur.

De exoluta ueſica per paralyſim.

Nonnunquam urinæ difficultas, interdum inuoluntaria
 mēdio reſolutionem ueſicæ comitatur, quemadmodum capite
 de paralyſi comprehenſum eſt.

De his qui urinam non continent.

Relaxatio muſculi collum ueſicæ ambientis, huius mali pa-
 rens eſt, quapropter pueris ferè accidere conſueuit. proinde
 communiter ijs quæ robur inferunt, potiſſimè utendum: puta
 ænelæo calido, & conſimilibus. cauentes quæ ualidè refri-
 gerant:

gerant: fouentes potius & ros, quantum fieri potest, calidis. Refrigeratio enim ueluti resolutionis uim obtinet. Naturaliter autem hæc faciunt: Gallinaceū guttur crematum aqua tepida ieiunis potui exhibetur, aut leucā hem flores, modò non absimili, aut leporis testiculus in uino bene fragranti friatus, bibendum porrigitur: nepeta item, myrrhaq; ante cœnā, aut ruta syluestris semen tostū per tridū propinatur. Pudēda uerò eorū, creta cimolia cū succo perdicij circūliniri ex usu est.

De iocinoris effectibus. Cap. 46.

Ecur uarijs tentatur morbis. nam imbecillitate, inflammationibus, erysipelatibus, scirrhis, abscessibus, hunccribus, & oppilationibus corripitur. Super debilitate itaq; ipsius uerba ante omnia sunt facienda: qua laborātes, iocinorosos propriè nuncupare assolēt. Si igitur alius excrementa in chylū quidem cōuersa, sed liquidiora deiciat, transmissione in hepar debilius uel neutiquā omnino peracta, uēire ab ægritudine immuni, at tradicē iocinoris potentiā infirmari lucito. At si lotura recentis carnis cōparia uideantur retrimēta, cū alteratricem, tum sanguinis effectricē. Si autē ad calidā intemperiem referatur imbecillitas, progressu tēporis excrementū feculenius apparet, tetterimiq; odoris: bilis. b. de colorata, crassaq; descendit. iam uerò iecoris substantia, uniuersumq; corpus contabescit, & febriunt afflicti, et cibi appetētia carent, bilēq; euomunt. Sin frigidum distemperamentū fatigat, neq; cōnuat, neq; plures excretiones fiunt: perscuerabit malū diutius, diebusq; aliquot cumulatus uēter deiciet, minus uerò olida, fecis instar, et sanguinis crassi, atræ bili finitimū. Multi præterea ac uarij deiectionū colores, frigidā indicāt intēperie, febrisq; comparēt. & uultus constans non collabiitur, & cibū magis appetūt. Harū aut distēperātiarū, qualiscūq; fuerit, si alteri tri ariditas cōplicetur secissus apparebūt aridiores et pauciores, et languētes maiore siti premūtur. Si humiditas accedat, liquidiora et copiosiora erūt recremēta, ægrīq; minui sument.

Si inflammatione iecur confluetur, omnes quidem ex æquo dolor in dextris præcordijs affligit, qui sursum ad iugulū usque, deorsum uerò ad nothas usque costas pertingit. Febris præterea infestat acuta, tuſſis sicca, sitis, horror cibi, et anhelatio, irruptione suspiriū: lingua principid rubicūda, mox uerò nigra cōspicitur; bilis euomitur, aluus astringitur. Quoniam aut hæc indicia hīs quodāmodo qui costali morbo laborāt, similia existūt: quāto inter se discrimine dirimātur, capite de pleuritide explicauimus. Cū uerò erysipelas iecur affligit, ignei feruores (quas phlogoses dicūt) intēduntur, et æstuant ægri, et tabe consumuntur. Propriè uerò, si caudā iocinoris partem exercet inflāmatio, nausea, uomitiones, à cibis appetitus auersiones, ardoresque flammæ gliscunt, animæ itē deliquia: et refrigerantur enormiter sepiſsimè, ita ut hinc aqua intercutem aspicietur. Sed cum in gibbis huius uisceris partibus inflāmatio oritur, præter ea quæ memorauimus, tumor etiā euidēs in summa cute turget spectatuque tactuque facilis: hæc quidē uiolentā ac ingentē inflammationē produnt. At si obscurior quædā extiterit, iubebimus languentē summo conatu magnum respirare. Et si dextra præcordia dolore affici perhibeat, iecoris mediocrē subesse inflammationē colligendū est: sin qua subiecti muscoli porriguntur, grandis oblongiorque phlegmones tumor appareat, neque quicquā interim memoratorū præstō sit, illos ipsos inflāmari cognoscemus. Quod si grauitas cū distentione et dolore in dextro hypochondrio absque tumore ac febre sentiatur, uenarū obstructionē præfert, qua parte quæ portas et simas iocinoris partes perreptant uenæ, his quæ in gibbis existunt, cōmittuntur. Cum autē in abscessum uertitur inflammatio, dolor ipsis cum distentione increſcit, et præter rationem rigores superueniunt, in læuūque latus decumbere magis iocinore laborantes nequeunt. Disrupto autē abscessu, uel per lotium, uel per uentrē, cumulata puris colluies excernitur. Quod si in durā iecoris dispositionē scirrhus similis tumor deciderit,

derit, dolores quidem comminuuntur, tumor uerò euidēs cum duritia existit, circumiacentesq; loci attenuantur. Progressu autem tēporis id cognitu fuerit difficile, quodd aqua intercutē properē comitetur, uniuersumq; hypochondrium humiditate contegatur. Quod calidæ itaq; iocinoris intemperici succurratur, frigdrificis, et uiscus mediocriter roborantibus utendum: è quorum albo habētur, seris, & cichorium mansum, interim crudum, interim uerò cum coriandro elixū: eius tē decoctum, succsq; epotus: quinetiā puluis ipsius aquæ mulse inspersus, cum calidæ, tum frigidæ iecoris intēperiei præsidio est. Intybam quoq; esculentū, & sonchus, paria præstāt. Prodest præterea succi mali citrj cyathus in mulsa sumptus, & filicis succus pari modo. Si autē cum obstructione modica fatigāt intemperies, ea ex uino quopiā tenui, & lotiū proritanti exhibeantur. Catapotium uerò quod sumit cichorj drach. quatuor, chamæpityos radicis drach. totidē in melle decocto, nucis pōticæ quantitatē exhibe: & aqua superbibatur calida: iam ex opij, seminisq; Apollinaris herbe confectura propinandū, & ipsa Philonis antidotus. In quibus calor intenditur, his rosaceum perquā præsentaneū existit, aut melinum potui ministratur. Cibus autē erit succus ptisanæ, uel chondri, cum hydrorosato, & panis consimiliter ex aqua, cum aliqua id genus dulci portione. In summa, edulia quæ mediocriter citra oppilationē infrigidant, assumātur. A uino prorsus abstinendū, nisi alia desideret causa, puta stomachi imbecillitas, tum quidē tenue, & nullarum fermē uiriū, aquosum aliquod conceditur. Brysipelati iocinoris pari propemodum ratione medendū. Sed gelido distemperamento infestante, contrarijs occurrendū est. Panis igitur cum uino exhibēdus, & bis terūe cocta brassica: castaneas itē, uuasq; & ex gallinis quantū satis uidebitur, gustare expedit. Vinum bibatur. propinandū tamen, est eupatorium, seu asariū: aut medicamentū ex piperibus, & ex his quæ antea cæliacis & dysentericis congruere tradidimus, aptiora seli-

genda sunt. Sed cyphoides appellatae confectiōnes, ut ad calidas distemperantias nihil conferunt, nisi modicus quiddam calor cum humiditate copiosiore coniunctus fuerit, ita gelidis iniuriis praesentissima sunt praesidia: praesertim si cum iecoris humiditate et oppilatione copulatur. Caterum si obstructio fuerit ex crasso et glutinoso humoribus. contraria, ruscum corrubantur, ut, atque eius fructum in primis exhibere, laurique radicis corticem, eupatorium uel ex oxymelite, amarorum uel lupinorum iure, curata ac pipere, confert etiam farina lupinorum pota, et caparis radices partes duas, costi pars una cum uino: et compositio diabacani aduersus crassorum uiscidorumque humorum obstructiones confert: praeterea iris, pistaciorum cum fructus, tum cortex, marrubium, amygdala amara, et ex his passillus, dracunculi, ariique radix, agaricum, et scilliticum non tam acetum, quam oxymel. Iecur uero lupinum aridum friatum, ligulae melleura sumptum, omnibus iecoris morbis cum mero dulci subuenit. Theodoretus insuper antidotus omnium utilissima in iecoris oppilationibus, scirrhis, et inueteratis inflammationibus, remedium censetur. succurrit idem morbo colico, atque etiam regio similiter picra ex oxymelite. Cibaria sic affectis exhibenda sunt, calefaciendi et aperiendi potestate praedita: uerbi causa, porra ex oxymelite, et qui in frutetis prouenit asparagus, caparisque: consimiliter, ceteraque obsonia cum aliquot calidis et reserantibus. condimentis elixa: unum item tenue ac uetus. Cauenda sunt quae crassum humorem comesta relinquunt, et balnea frequentia, a cibo potissimum. Affectui autem diuturno, non sanguinis detractione modo, uerum purgatio quoque, si nihil obsit, adhibenda est. Quod si inflammatum fuerit hepar, uena in dextro cubito costae in animo secunda est, sanguis auferendus, et copiosus, si uires sufficient. Foris huic uisceri cataplasmae instar adglutinanda est farina hordeacea, et saenograeci, aut seminis lini, cum palmulis, aut malis cotoneis, meliloti floribus, absinthio, chamaemelino: atque in uniuersum, cum emollientibus semper confundenda sunt astringentia. Epibemata autem hunc faciunt,

Nilei,

Nilei, & euodes, hoc est odoriferū, iū Philagrianū, et Apolophanis, et ex sertula cāpana cōfectū, et cognomēto Coptū. Sed ad prægrādes inflāmationes, multa admodū experientia comprobatum est illud: comæ absinthij, nardi Gallicæ, asari, croci, singulorū uncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellij, guttæ ammoniacæ, thymiamatis, uniuscuiusq; uncie duæ, medullæ uitulinæ uncie quatuor, cerati lētiscini libræ quatuor. Oxy-mel eis dē exhibendū est, simpliciaq; præsidia, puta asarū, nardus Gallica, uel Indica, iūcus odoratus rotūdus, petroselinum. Aliū ad hæc ciere expedit cū urtica, herbaūe mercuriali, elixis et māducatis. Declinationis tēpore, epithymus et polypodiū in malsa propinātur. Clystere etiā aluus euacuāda, ab initio quidē ex malsa, cū sale seu nitro. Facta autē remissione uigoris, admiscetur hyssopū, uel origanū, uel cnicum, uel centauriū, uel colocynthis. Et in summa, caua hepatis per aluū, gibba uerò per lotia purgātur. Post hæc cibi loco dandus est cremor ptisanæ, in quo elixū sit apiū. Si erysipelatis naturā resipiscit inflāmatio, curatio superius cōprehensa est. Si abortus fuerit abscessus, rupturæ succurrendū cataplasmate trispermo cū refinā, māna, pice, alihæe radicib. stercore colūbino, caprilloq; potādo prius poly decoctū, fumaricāq; herbæ, et ius ad tertias decocti thlapsis, aut cichorij, et chamædryos radicis. rupturæ que facta, et pure erūpente, aquā mulsam, & quæ de renib. ex hūlceratis memorata sunt, adhibe. Extrinsecus aut cōpositio Mnasi imponitur, et reliqua emolliēdi uim habentia. ad hæc medicamētū icesion, aut quod ex salicib. est cōfectū. Quod si iecur in duritiē occaluerit, exigua curationis spes est, affectu in aquā intercutē decidēte: æquē tamē emolliētib. admiscēda gutta ammoniaca, bdelliū, medullæ, adipēs, quæq; eandē uim obtinent. Potāda iū sunt, quæ oppilationē uisceris discutiūt et abstergunt. Quod genus sunt quæ lotium proritant, & calculos atterunt, cum his quæ antē ad huius uisceris obturationē conferre diximus, & alimento nimirum concinniter temperato.

De

De Cachexia, quod est, prauo corporis habitu. Cap. 47.

Cum corporis habitus primum in aquositate diffundi coepit, Cachexiam appellare consueuerunt. succurrendum est huic, sanguinis, si nihil prohibeat, detractione, qui pedetentim & partitis uicibus per triduum aut quatrimum exhauriendus est. Euacuandi autem maxime sunt, qui per hæmorrhoidarum aut mēstrualis expurgationis retentionē in hanc affectionem inciderunt. Quemadmodū is qui ob humorum plenitudinem hoc malo conflictatur, ab euacuatione sanguinis per uenam abstinendū: omnino uerò hiera ex colocynthide parata purgandū. Viētus ratio hoc malo implicitis tenuis & sicca ex usu est. Naturalium aquarū usus conceditur maxime, quæ aluminis & nitri mixtura cōstant: deinde quæ sulphuris naturam habent, aliud uerò lauacrū ex diuturniore temporis interuallo admittatur. Varijs exercitationū generib. credentur languentes, sed primum is quæ per medicos reuolutores uocatos fiunt. Postea autem ueratro perpurgetur. Mirifice autem ipsos iuuat delibatio iuris absinthij, et cottabismi, & dropaces. Quod si affectus in aquam intercutē deciderit, tum hydropico rē curatione, eo quæ mox perscribemus modo, subueniendū est.

De intercute, seu Hydrope. Cap. 48.

Cum iecur nunc quidem per se impensius, uel phlegmone, uel scirrho, uel alio quodā affectu oppressum perfrixerit: nunc uerò ex aliarum etiā partium consortio, defectus generationis sanguinis accidit, et Aqua intercutē appellatur. In qua interdum multitudo spiritus cum exiguo humore, inter pelliculam peritonæum & intestina congregatur, ut uenter inferior percussus, sonū instar tympani edat: cuius ergo & tympanias hydrops appellatur, qui ex stomachi, alui, & coli inflationibus, diuturnisq; febribus conflat. Interdū ex peritonæi, aut in mulieribus uulvæ duritia, siue scirrho: nonnunquam rursus ingens humoris colluies cum momento spiritus in eisdē locis coaceruatur, perinde atq; in utre quopiā cōseruata: hinc ægritudo

Eudo hyderus ascites, hoc est, uentricularia nomē obtinet, ipſus quoq; ē cauſis iam pridē enumeratis cōciliatus. A duritia uerō ac ſcirrho lienis atq; iocinoris, fluxibusq; inteſtinorum diuturnis, maxima ex parte prouenit, in quibus uenter turgere, reliquū corpus alimentū non ſentiens, eliquari cōſueuit. Quando que etiā in uniuerſa corporis mole frigidius ac pituitoſius ſanguen cōtinetur, cuiuſmodi quidem partim à iocinore deſluit; partim uerō ab uniuerſa corporis carne, tanquā in liquore reſoluta manat, uſq; adeò ut corpus albidū atq; pituitoſum, cadueri cōpar appareat, Leucophlegmatiasq;, hypofarcidios hydrops, aut anasarca nuncupatur, qui ex longis febris, et prauo ſtomachi habitu, retentis diutiuſculè hæmorrhoidibus, fluxu muliebri ſuppreſſo, reſpirationis anguſtia, uigilijsq; immoderatis citra rationem obortis, atq; id genus alijs de cauſis contrahitur. Quibus dum curationis manū admouemus, communiter ab euacuatione auſpicamur. Sed in Aſcite atq; Tympanite medicamentis, quæ aqueū humorē proliciunt, opus eſt. In Anasarca uincit ſanguinis detractio, maximè ſi mali occaſionē præbuerit hæmorrhoidū retentio, uel menſū ſuppreſſio, niſi in praua habitudine præceſſerit ſanguinis diminutio. Hic itaq; ueluti in ijs qui malo habitu præditi ſunt, oportet per uices euacuationē moliri. poſtea excrementum bouis armēt arū arefactū, accuratè contritū, in poſca aut oxymelite elixatum, et ſulphuris quarta parte adiecta, emplaſtri modo toti uētris capacitati applicare. Aut ſimum caprillum in pueri lotio adſtrigmentū balnei craſſitudinē maceratum, cataplaſmatis more uentri imponere; per aluum id acriter ipſos expurgat. Cæterū ex fermento quoq;, ficubusq; aridis, calce, nitro, iride, cardamomo, ſulphure ignē non experto, gutta ammoniaca, baccis lauri, ſylueſtri ſtaphide, et agreſtiū columbarum ſtercore, uel omnibus, uel ex his quibuſdā cū aceto mulſo utendum cataplaſmatis. Deinde ex ſimo caprino, ſpōgium appellatum epithema, miro quodam modo humorem per abditos meatus, uentremq;

uentremq; educit. Siccifica post hæc imponenda sunt emplastra, ex jalicibus, icesiis, uel Cureo adscriptis, uel ex baccis lauri contextis, uel polyarchium, uel diaspermatis epithema. Sed et illud mirifice humores funditus exhaurit, quod habet lapidis pyritis, sulphuris uiui, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; denarios duodecim, cymini sedecim, nitri duodecim: quæ omnia ceræ mometo, et terebinthina resina excipiuntur, et corio inducta uniuerso uetri superaccommodantur. Propinadum ius radcis ebuli, sambucine in uino decoctæ, aut cucumeris syluestris in uino adstringente per triduum macerati. dato cyathi unum singulis diebus, adiecto cyatho usq; ad ternos. Ex uariis constat quæ subijcitur mixtura: Balsami, nardi, cassiæ, cymini, glycyrrhizæ, hyperici, rotundi iunci odorati, asari, dauci, amomi, myrrhæ, petroselinii, calami odorati, piperis, seselis, spodylij, et quæ portiones sumantur. Cōducunt hæc singula seorsim, et quæcūq; lotium proritāt. Sed absq; grauitate mictionē scilla tosta cum melle eliquata linctus modo exhibita promouet. Verum potaturis in aqua etiā decoquetur. Quin et illud impedio cōducibile: Visceris interni scillæ libras duas, in uini austeri sextariis tribus usq; ad tertias elixatas propinato ex uino quotidie, auxpicatus a mystro ad unciam usq; unā. Diureticū etiā illud præstantissimū est: Aluminis liquidi quantitatē fabæ aqua dilutam et linteo colatā potui per triduum, alternisue diebus porrigito. Expediit etiā his picra ex oxymelite. et Theodoretus, atq; ex amaris amygdalis pastillis. Habetur uerò aquacia propemodum innumera, sed hæc experimēto magis cōprobata: Cocci cnidij quadraginta aut quinquaginta, uel lathyrides uiginti aut triginta, uel euphorbij siliquæ quinq; aut septē, uel squamæ æris denarij duo, seu tres cum micis panum exceptæ, et in globulos redactæ. Aut sambuci radicis corticis succus cum cōdito potus: uel oleaginis foliorum, et æris cremati siliquas quinq;, anisi tantundē in aqua administrato, intra primordia quidem drach. unā; interposito uerò tēporis spacio duas, et plures. Et quæ

quæ subiunguntur admiratione digna sunt catapotia: Aloes,
 euphorby, grani gnidy singulorum uncia, rhei dimidia, bras-
 sica succo excipito, et in pillulis redigito, ceratia sepius siue no-
 uem exhibeto. Ipsa quoque ex caryophyllo antidotus miro quo-
 dā modo aqua proritat. Vinū etiā aquā eliciēs præbere stude-
 bimus. Optimū uerò tale erit: Scilla uncia tres, seminis apy,
 capparis radicis corticis piperis, uniuscuiusque drach. quatuor,
 cocci cnidy repurgati drach. folij drach. malabathri pilulae
 duæ, uini quā optimi heminae duodecim, mellis coctionem
 non experti librae sex. trita, et per incerniculū traicta, uino
 perfunduntur scilla uerò liquatur: modus est, cyathi tres. Post
 humoris euacuationē, theriaca quoque utendū: fimi uerò bubuli
 torrefacti lingulae mēsurā ex uino quotidie pota magnificē o-
 pitulatur. Acrorib. porrò clysterib. uiri cōuenit, nisi fuerit al-
 uis sua sponte humecta: tum enim exiccare ipsam satius est.
 Atqui in mulieribus hydrope oppressis, pesti huius etiā usus sa-
 lutaris habetur: anisi, cardamomi, cymini, nitri, aristolochia,
 fœnogræci, pulegy, ficuū interanei aqua portiones susino ex-
 ceptæ subiciuntur. Post hæc naturalibus aquis cōstanter im-
 mergi, in harena sepeliri ac desudare, cæteris uerò lauacris
 abstinere cōuenit. Quod si quādo lauare etiā placuerit, in bala-
 neo inpersiōib. ex nitro, sale, sinapi, calce, atque id genus utan-
 tur. Hæc utique etiam sine lauacro utilia sunt si arida cum oleo
 uentri adfricentur. In anasarca autē, reliquæ etiā partes exer-
 ceantur, proque uiribus, in sole aridae perfricentur. Reliqua ui-
 dus ratio aridior esto, salsamenta itaque edenda sunt. Sinapi,
 et allia, ex uolueribus syluestres et arida: ex holeribus aspa-
 ragus, et gingidium, porra, sinapi, caucalis, et cætera sylue-
 stria. Sal theriacum uel ammoniacū obsonijs admisceatur, ui-
 naque tenui utantur uetusto, lotiū proritante. si ad manū sit, ma-
 rina quoque aqua admiscenda est. Potus in uniuersum quidē cir-
 cumscribendus: aqua uerò ne gustanda quidē. Si cum febre hy-
 drops infestarit, a calidioribus, multaque acridinis esculentis,
 medica

medicaminumq; adminiculis abstinendum, mixtimq; eis ad id quod urget instantes, utendū. In tympanite, ea quæ purgandi uim obtinent, & quæ totam corporis miscellā colliquant, casuenda sunt item cienda urinæ efficacia. Sed quæ flatus attenuare atq; dyscere possunt, his tam intus quàm foris uti expedit. Cucurbitulæ iugiter inanes uniuerso uentri imponantur. Qui postremò ascite impliciti sunt, his nisi superioribus auxilijs manū dederint, pertusio, siue punctio, quam paracentesis uocant, nulli aliæ hydropis speciei congruam, adhibenda est.

De affectibus lienis. Cap. 49.

SI lienis, ab iocinore humorem atrebilium (qui sanguinis ueluti fex atq; cœnū est) trahere comparati, attrahrix facultas laborauerit, aut meatus per quem illum prius attrahēbat, obstruatur, ater morbus regius sanguine impuro per uniuersam corporis molē dilabante suscitatur. At si grauitas, & distensio, siue dolor etiā splenem exagitet, obturatio significatur. Si nihil horū acciderit, attrahendi potētiae infirmitas: si atræ bilis uomitus citra febrim, uel alium prauum affectū ingruat, retentricem lienis uirtutē agrotare portendit. Expultricis huius uisceris imbecillitas, à cibis appetitus auersionem inducet, dum non de more melancholici humoris retrinētum à liene ad os uentriculi defertur, & appetitū suscitatur: sed constipato in liene atræ bilis humore, primum quidē inflammatio oboritur, quam feruor, dolor, & distensio innuunt. Posterius autem in scirrhum transit, feruore cum dolore cessante, tumore autem duritiāq; persistente. Sic affectis os graue olet, gingiuae exeduntur, in cruribus hulcera non persanantur: ob quæ iocinore pariter affecto, subtercus (ueluti prædictū est) nascitur. Huius igitur uisceris intemperiei, perinde atq; iocinoris medemur. Phlegmone autē infestante, sanguinē è uena læui cubiti, siue ab extrema manu detrahe, quod ex prolixiore intercapedine fiat reuulsio, uel propter naturalē quandam cognitionem. Deinde cataplasmatibus modo applicanda sunt, quæ extenuandi

uim

uim absq; euidenti ardore possident, adiectis quibusdam etiam
nunc astringentibus. Huiusmodi est suapte natura, qui salis flos
nuncupatur. Id etiā cataplasma admirandæ uirtutis est: Fœ-
nogræci triens, farinæ hordeaceæ, nasturtij, uniuscuiusq; un-
cia, ficuū pinguiū libra, uerbenacæ herbæ aridæ uncia: ficus
macerari aceto quàm acerrimo, cumq; cæteris iam pridem
contritis elixari, inde rursum decoqui debent. Vel stercus ca-
prinum cum polēta hordeacea coquitur in posca, factūq; inde
cataplasmate imponitur. Adycies autē, si uidetur, salis quoq;
florem, fomentis prius adhibitis, cyprino cū exiguo aceto ma-
lagmatis utitor. Primitus quidē simplicioribus, cuiusmodi est
hoc: Cereæ libra una et semis, centaurij libra, nitri quadrans,
resinæ terebinthinæ, seminisq; uiticis, et capparis radicis cor-
ticis, singulorū quincuns. decoctis quæ liquefieri debent, ari-
da inspergātur. Sed Nilei malagma bonitatis principatū te-
net. Cæterum si inflammatio in duritiē aridā, sensuq; non per-
ceptibilē incidat, uehementioribus opitulamentis utendū, quo-
ad cutis superficies exulceretur: è quorū albo, quod ex capra-
rum oleo constituitur, & citrinū habetur. Inter hæc sunt, em-
plastrum Machærionis, Curei, tum quod è baccis lauri, tum
quod è salicibus constat. Hoc etiā à me experientia comproba-
tum est: Auripigmenti, sandaraches, singulorū sextans, cerie
terebinthinæ, picis aridæ, singulorum libra, galbani, liquoris
panacis, cuiuslibet uncia, corticis radicis capparis, myrobala-
ni, singulorū triens, ammoniaci thymiamatis drach. duæ, nar-
dini aut cyprini scrupulos quatuor. Et gutta ammoniaca cum
aceto illita, lieni sæpenuerò præsentaneū fuit auxilium. Pos-
tum etiam trium aut quatuor diobolorū pondere, cum uno ca-
storij, si sub ingressum balnei ficum siccā mādiderint, & man-
sam expuerint: aut guttæ ammoniacæ & castorij aquis por-
tionibus mixtis, dato denariū: hæc etiā scirrho oppressis sub-
ueniūt. ueluti & capparis cortex aceto laeuigatus, & catapla-
smatis modo inducens: qui sanè etiam ex aceto haustus, seu ox-

R. mēte

melite crassos ac uiscidos humores exhaurit, quandoq; uerò etiam sanguinem euacuat. Salicis itē cortex similiter illinitur, cinisq; cochlearū cū cruda farina hordeacea ex oxymelite illitus. Itē centaurij succus extrinsecus impositus atq; epus, et lupinorū amarorum ius cum ruta ac pipere sumptum, farinaq; ipsoꝝ cataplasmatib; modo impasta. Aqua præterea in qua subinde candens ferrum extinguitur sit, febricitantibus quidem cyathis tribus sola exhibita, non febricitantibus. uerò cum uini et aceti cyatho uno: aut rumicis erratici radicis cum scilla triobolus, aut trixaginis siue serpilli oxybaphū integrum ex oxymelite, anagallidis cærulei coloris florē habentis succi diobolū potui præbeto cū posca: uel acetū scillites, aut oxymel. Cōposita uerò hæc: Panacis radicis, guttæ ammoniacæ thymiamatis, corticis radicis capparis, struthij, scillæ tostæ interanci, æquis portionibus drach. unam propinato. Cōfert etiā suspiriosis et hydropicis. Aliud: Myricæ fructus denarij quatuor, piperis tantundē, spicæ nardi drachmæ duæ, ammoniaci thymiamatis totidem, aceto scillitico eliquantur: drachma una in oxymelite administratur.

Ad lienis durities.

Cyclamini drach. uiginti, bryoniæ tres, dictamni duæ, scillæ tostæ octo, herbae lanariæ sex, capparis radicis tantundē, dabis pastillum triobolarem in oxymelite. Et qui ex eruca conficitur, peraccommodus est. Vincunt epulæ extenuantes, acris potentia, et arefacientes, cum potu paucissimo, exercitationes item, frictionesq; et sinapismi. Est etiam quando et cucurbitulæ cum scarificatione probantur.

De morbo Regio, quem isteron Græce appellant. Cap. 50.

ARquatus, bilis est per uniuersum corpus suffusio, interdum quidē atræ, qua de in lienosis uerba seruimus, nōnunquam uerò flauæ. Harū utiq; cōpluria habētur discrimina, quarum causæ notæq; sunt istæ. Nā si in febrili lāguore subito supersueniens aurugo, febrim pacauerit, decretoriū innuit, materia ex alto

ex alto ad extrema prorūpente, conflatur: neq; ullo alio medicamento indiget, sed lauacris dūtaxat, mediocriq; frictione repētē discutitur. Quòd si cū febre et biliosis deiectionibus oriatur, et in præcordys dextris grauitas sentiat, inflammatio feruens iocinoris ostēditur, cuius uolētia sanguis in bilē cōuersus per uniuersum corpus diffunditur. Si uerò absq; grauitate feruor in ipso substituerit, et sola calida iocinoris intēperie nascitur affectio. Sin citra febrim deiectiones albescāt, folliculi felici uitio malū adscribitur, siue meatuū ipsius, si grauitas in lateris dextri præcordys sentiat, oppilatorū: citra uerò hanc, uiribus inbecillium, uel attractrice ex iocinore humorē proliiciente, uel expellendi facultate ad intestina bilē protrudente. Sanguis nāq; biliosus nō purgatur, per uniuersum corpus spargitur, quēadmodū in atra aurigine fieri prædiximus: mox uerò his lotia etiam perquā lutea affatim demittuntur. Nasceatur etiā morbus regius ē feruido solidorū corporū distēperamento, quo in bilē quicquid eius alimēti ratione offertur, degenerat, ueluti in phlegmaticū humorē in hydrope anasarca nutrimentum trāsmutatur. Deprehēditur autē huiusmodi arquatus, quòd nō cōfertim illico, sed pedetētim gignitur, nullo commemoratorum prasente. iam ex letalis etiā medicamēti potu, iūq; uirulento, foris ab aliquo pestifero animali illato, idem morbus euenit. De calidæ itaq; temperaturæ hepatis, et ipsius inflammationis, uiriūq; imbecillitatis curatione, haud multo prius in sermone huic uisceri consecrato, peregrimus: quæ huc nullo discrimine euariāte transferātur, ne nobis eadē subinde sint repetenda. Quòd si meatus uesiculæ, in qua fel excipitur, uterq; aut alter ex his obstruatur, sanguis de cubito dextro detrahendus est. Nōnulli autē ex his et illis qui ob inflammationem hepatis regio morbo cōfliātur, iuxta paruū dextræ manus digitū uenā diuidūt. Cataplasmatibus inflammationē arcen tibus utendum. Cum hicra clysteres quoq; idonei sunt. Potiōnandi sunt apij, seu adianti, seu rumicis, seu serpilli, ad tertias

usq; iñre decocto, uel absinthium potui inseritur. Summopere autem conducunt radiculæ cremoris gemini cyathi, cum uno uini cyatho poti. Succus itē cichori cyathi bini aut terni priuatim, aut cum uino sumpti. Ob iocinoris porrò inflātionem iāericos ænomclite, uel decocto tenuis aristolochiæ, aut hyperici, aut adianti, aut struthij, aut rubiæ satiuæ similiter, aut ramēti cornus ceruini drach. cum uino, aut iure pastinacæ erraticæ in uino ad tertias usque elixæ potionabis. Vel sulphuris ignem non experti drach. in ouis sorbeatur. Hæc et in obturatione iocinoris magnificè opitulatur. Seminis adhæc atriplicis dioboli octo cum chrysattico, aut alio passo in balnei ingressu poti, felleum humorem abundè euacuant. Magna item cum utilitate picra porrigitur cum arida, tum ex oxymelite, & Theodoretus, quiq; ex amygdalis amaris cōstat pastillus. Cinnamomi insuper quantū tribus digitis cōprehendi potest, in mulsi cyatho uno, aut aqua tēperata exhibeto. Vel myrrhā fabæ magnitudine cum piperis granis quinq;, & cinnamomi tantundē. Qui ad calidā solidarū partiū distemperaturam Arquatū referunt, molli frictioni, exercitationibus moderatis, inunctionibus, & lauacris credēdi sunt. Cibo humedate & modicè frigoris, succo ptisanæ, intybo, seri, cichorio, piscibusq;, & uino tenui aquoso alēdi. Cæterū de his qui letali potione, aut morsu eorum quæ ictu uenenū relinquunt, in Arquatū incidunt, libro quinto mentionem faciemus. Bis le uerò oculos, uultūq; inficiēte, naribus in balneo elateriū erui quantitate cum lacte muliebri instillato: quamprimū in solium collocabis, præcipiēdo ne caput immergatur. A balneo, uictus ratione restituendis uiribus adhibita: rursus in sole errhinum infunde. Cōfert item cyclamini succus, marrubij, & nigellæ. Acetum quoq; acerrimum æger in lauacri folio dens, naribus attrahat, atq; sic aliquandiu pressis naribus contineat, & euacuabitur prodigiose.

De

De procidentia umbilici. Cap. 51.

Prominentis umbilici causam, et chirurgicamque eius mali curationem, libro de ijs quæ manus opera administrantur, differemus. Sed quoniam nonnulli medicamento beneficio in integrum restitui possunt, de hoc in præsentia referendum est: Aluminis scissilis drach. quinque, fecis uini octo, rosacei decem, gallarum immaturarum duæ, uino diluta, ad mellis crassitudinem redacta, umbilico insperguntur, superiniecta prius foris spongia posca imbuta, mox fascia circumligetur. Aliud: Fabæ fræ corticum, et gallarum, et balaustij pares modi in aqua decoquantur: ubi dissoluta fuerint, et accuratè contrita, spongia, quemadmodum prædictum est, imponantur. Aliud: Scobis plumbi drach. sedecim, cicuta, manna, cerussa, hy pocystidis succi, singulorum drachmam uino dissoluito, atque eo quo dictum est modo utere.

Quæ diu impuberes & imberbes, particulasque naturales ac testes conseruent, inibi que etiam psilothra. Cap. 52.

Cretam cimoliam, et cerussam æquis portionibus, alterci succo excipe, ita ut strigmenti balneorum crassitudinem induant: deinde olei lentiscini quantum satis est iniiciens, contunde et utere. Aliud: Cicuta succum, solanique, herba apolaris, lupini tenerrimorum foliorum et psilly æquas partes cum læuigaueris, utere, loco prius absterso, lotoque. Sed oportet pridie aquam bibere.

Psilothrum demoliens pilos.

Multipedum asellorum, qui tacti per domos rotundi oberant didrachmum, sandaraches uncia media, calcis uiuæ uncia, aceti ueteris cyathus, lixiuij ficulnei cyathus, in olla decoqui, et in balneo usurpari debent. Aliud: Cineris calcis uiuæ partes duæ, auripigmenti tantundem, cretæ cimoliæ pars una, in aqua ferueat, et ceu proditum est utere. Aliud, simplex et minimè graueolens: Lixiuij calcis uiuæ sextarius, sandaraches uncia elixetur, quemadmodum explicatum est, in usum

R 3 accomo

accommodato. Cæterum quæ abolendis pilis dicata sint, inter
ocularia memorata sunt.

De bubonocèle, enterocèle, & hydrocèle. Cap. 53.

Cum præciso peritonæo intestina delabuntur, longè opero
sior est curatio, quàm si ex eius raritate contigerit. Pueris
frequētius, utpote humidioris naturæ, utiū hoc accidit: et ple
riq; abq; manus opera, impositu saltē medicamentorū, et liga
turis cōpetentibus curātur. Medelis uerò subscriptis utēdum.
Hoc dñtaxat à nobis adiecto, quòd hæc uitia sola locorū diffe
rentia diuersam sortiuntur appellationē. nam si intestinum su
prà tantū in inguibus subsederit, bubonocèle, hoc est inguinæ
lis ramex: si autē in scrotum iam descenderit, enterocèle, id est
intestinalis ramex appellabitur. Mali igitur Punici corticis
drach. decem, gallæ immaturæ quinq; in uini austeri cyathis
ternis coctis læuigatisq; imposito, perfricato prius intestino,
& frigida cōspargenda, decimo die soluuntur, quiescendumq;
in lectulo laborāti est diebus triginta, bibatq; cupressi decoctū
cum uino, aut galbulorum eius triobolū ex uino plus satis dilu
to. Hoc medicamentū pueris efficax est. Aliud adglutinans:
Symphyti radicis, marrubij succi, amygdalarū amararū, gū
mi, aquæ partes. Aliud: Terebinthinæ fescuncia, ceræ, thue
ris, myrrhæ, glutini pisciū, cochlearū cum testis, singulorum
uncia: gluten pisciū in aceto per triduum macerato. Aliud:
Pilularum cupressi unciā, gallarū tantundē, malicorij semun
ciam, glutini taurini quadrantem, mannæ, thuris semunciam
Symphyti tātundē, cochlearum, cum testis unciā. Galbulos et
mali Granati cortices uino adstringēte plurimū cōcoquito, et
reliquis melius in pollinē tritis, exceptisq; utere. Aliud: A
loes, malicorij, thuris, hypocystidis succi, glutini fabrilis, pi
cis, bituminis, singulorū fescuncia, uini dulcis quantū satis est.
Alterū, quod etiā in hernia perfecta proficit, modò nō sit inue
terata, habet chrysocollæ, taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocol
læ, lapidis gagatis, lapidis hæmatitis, rhus Syriaci quo coria

utuntur, acaciæ, singulorum unciam & dimidiam, lepidis pyritis ignem nō experti, magnetis cœrulei coloris, aluminis scissi, mannæ, thuris, uniuscuiusq; unciam, picis Brytiæ quincuncem, cochlearum cum testis unciam, scorice argenti trientem, gallarum unciam, squamulæ stomomatis unciam, æris tantundem, bituminis selibram, myrsinati quantum satis est, uino adstringente aridis exceptis, si decoctum ut digitos non inquinet, utere. Quod si iacere non sustineant, triangulari eos fascia crassiore & potente cōstringere, & ad interiora intestina cohercere, tutò deligabis. Arceantur à cibis infantibus, uini copia, crebro balneorum usu, & motu intenso: puta, cursu, saltu, clamore, atq; id genus alijs.

De Ramice aquoso, & quomodo euacuandus sit humor:

Piperis grana centū, baccarū lauri octoginta, nitri drach. uiginti, ceræ quadraginta, olei hemina dimidio excepta in usum accommodantur. Aliud præstantissimum: Floris Asij lapidis drach. sex, uuarum passarum ab acinis mundatarum libras duas, cymini Aethiopici drach. octo, nitri rubei tantundem, trita & læuigata impone, fouens serò ac manè. Non desunt, qui sulphuris quoq; drach. octo adijciant. Aliud: Calcem aqua non restinctam strigmento balneorum excipito, atq; cum cerato imposito, & nitri momentum calci uiuæ misceto.

Aliud: Radicum brassicæ deustarum cinerem adipe suillo uetere eliquato exceptū inducito, tertio quoq; die soluito. Quod uerò non magna fiat humoris collectio, utere malagmate isto: Ceræ libræ duæ cum semisse, picis uncie quatuor, guttæ ammoniacæ thymiamatis uncie totidem, aluminis liquidi fescūcia. Conducit etiā medicamentum ex populo nigra, & cætera quæ ex alto in superiore partē extrahendi potestate obtinēt.

De testium & scroti inflammatione, deq; cæteris eorundem uitiis. Cap. 54.

Scroti inflammationem deprehendes, si imposita manu diu statim dolor percipitur, cum partis feruore, inensaq; diurne.

R 4

duritie. Teste uerò inflāmato, ad suspensæ manus palpitatiōē
 minimē doliāt, sed impaētis immanius digitis, rubor ac duris-
 tia ipsius per cutē minor uidetur: ualidiore aut compressu du-
 rities quādam ex alto obuiat, & febris nonnunquam oritur.
 Proinde peculiariter quidem testium inflāmationib. cōuenit
 sanguinis secundū malleolos detraētio. Cōmuniter uerò omni-
 bus cataplasmata & cerota expediūt. Cataplasmatibus itaque
 modo inducitur lomentū cum uuis passis, pinguib. acinis exem-
 ptis, in uino plus satis diluto decoctū: cymini aut asphodeli ra-
 dices coctæ et eliquatæ miscētur cum farinæ pollinis pari mo-
 do, et emplastri instar adglutinātur: aut semen lini ex uino ni-
 mium diluto, aut scenogræcū ex aqua mulsa, aut lilij radicem
 in mulsa, aut recentis uini fecibus cum tenuissimo polentæ flo-
 sculo, aut senecion, & coriandrum uiride cum uuis passis, sine
 acinis. Si ingens cruciat ardor, folia alterci cum farina triti-
 ci, aut cicerum imponuntur, siue calami odorati folia, aut cuc-
 curbita cruda. Quod si malum in uetustatē inciderit cum duri-
 tie, cucumeris syluestris radicē in mulsa elixato, contritāq; cū
 loliacea farina, more cataplasmatibus adplicato. Verūm in
 hoc nihil minus est subsidij, quod accipit uuarum demptis acie-
 nis quincuncem, cicerum sufferuefactorum sesequiunciam, cy-
 mini unciam, sulphuris dodrantē, nitri unciam, resinæ uncias
 treis cum semisse, quibus singulis cōtritīs cum melle cataplas-
 matibus more utitor. Cerota uerò huc faciunt: Olei cyathus, co-
 lophonis uncia sex, plumbaginis, cumini, uuarum passarū, lo-
 menti, singulorū uncia quatuor, cera uncia duæ: plumbagi-
 nem cum oleo usque ad aliquantulam, crassitudinem decoqui-
 to, deinde ceram ac resinā adijce, sublatum ab igne tepidum,
 uuis passis læuigatis, farināq; infundito. Aliud: Olei anethi
 ni & rosacei, cera, resinæ piceæ singulorū quincuncem, cy-
 mini uncias duas cum semisse, stercore asinini unciam et dimi-
 diam, contere cum stercore asinino cuminum, & cerotum re-
 frigeratum misce, unaq; diluito, deinde inditum linteolo appli-
 cabis,

abis, de superq; lanā imposito oleo omphacino imbutam, uel butyro, & resinæ æquis portionibus utitor. At si ex sudoribus hulnera in scroto nascantur, gallam tritam, aut alumen axungie uel hircino felle inferre, et illinito. Cæterum ad testiculos aphiba oppressos, cretā cimoliā cū aqua prius illitā, sinito arefieri, calidāq; aqua abluito, myrtū aridā, smirnūq; momentū tritū emplastri ritu imposito. Iam uerò superexcresecetes testiuū carnes cinis uitis ceturionalis, nitro et aqua conspersus, et applicatus tollit. Scroti pruritū nitrū curat, & staphisagria, alumenq; liquidū aceto eliquatū, & rosaceo in balneo illinitū. Vbi laueris, partē oui albore cū melle perungito.

De incontinentia prolifici feminis, & libidinosis
insomniis. Cap. 55.

Gonorrhœa inuoluntarium genituræ profluuiū est, quod continuò citra penis tentiginē, ex imbecillitate retentricis potentiæ provenit. In qua conquiescant, lumbiq; & pubes uelaminibus cum uino, & melino, uel œnanthino cōtegantur: deinde opus est cataplasmate ex palmulis, malis, œnāthe, acacia, hypocystide, rhu, atq; id genus. Collocandi sunt insuper in lentisci, rubi, atq; consimilium in uino elixationibus, uel etiam aquis. Alimentis præterea utendum est siccificis. Post primam morbi tempora exercitationibus, quibus toti corpori, languentibusq; particulis robur inducitur, credendi. Porro de feminis abundantia et fecunditate, libro de Tutela sanitatis primo perpensum est: ubi & super his etiā qui in uenerem congrēdi nequeunt, scriptum est. Itē quæ ad ueneris insomnia contulerint. Valet etiam his, grabatum frigidius, decubitusq; corporis in latus dextrum, siue læuum: cunctaq; medicamenta frigori fica lumbis subillita, cuius farine sunt coriandrum, cicuta, cerussa, portulaca, omnia uerò cum aceto.

De Satyriasi. Cap. 56.

Satyriasis est genitalium palpitatio, quæ aliquam seminalem uisum uisum inflammationē cum intēsiōe comitatur: &

R 5 nisi

nisi conquiescat hæc palpitatio, eadem genitura cōceptacula in resolutionē, aut conuulsionē præcipitat, subitoq; intereunt hac cōuulsionē lāgidi, nō sine alui tumore, frigidoq; sudore. Fæminis etiā, sed rarius, hoc uitii exagitat. Venā igitur pro tinus secare, uictū tenuē, et abstemiū quotidie epulari, ligurire nunquā, sed paulatim ingerere cōgruit. Antecedit utilitate be ta, malua, mercurialis pusillum, et ius cochlearum. Probantur etiā ex simplicibus clysteres. Ea uerò quæ lotij ciendi potesta tem habent, uitanda sunt. Prodest itē lumbis refrigerantia ap plicare: uerbi causa, solam succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Penē insuper, taurumq; mitigatorijs refrigerantiis oblimire necesse est: puta spuma argenti, creta cimolia, ce russa, aceto uel aqua, aut uino dulci, aut sapa diluīs. Supinum quiescere perniciosum est: nymphae radix pota, iris item, et adiantū, rutaq; succus, cum ei qui genitali profluuiō, tum qui ueretri arrecti palpitatione laborat, proficit. Triticus cibus parca manu datur, et sitis imperatur. At si uitii non cedit, cu curbitule incisa cute scalpello adglutinādæ sunt. Quod si ree dundās materia adfuerit, hirudinib. etiā impactis inanire, et uentri hordeaceā polentam crudam inducere consilium est.

De Priapismo. Cap. 57.

Priapismus constans incrementū penis est, qui in longitudi nem latitudinemq; nullo in uenerē impetu intumescit. Fla tuosus nimirū hic est spiritus, qui turgidā reddit particulam: humorum glutinosorū crassorumq; soboles, moderati caloris officio. Perspicuū sanē est omnibus, quod in ea uitio particu lar calfaciēdæ nō sunt, sed clementer refrigerādæ, rosaceo ce rato cum aqua cōtuso, et chamæliño colli et lumbis superac commodato. Victus et medicamenta extenuatoriæ uirtutis, absq; calore manifesto porriguntur: magna itē utilitate adhi bentur, quæ naturaliter operantur, experientia usuq; cōpro bata. Potare igitur nymphaeam expedit. Semē uiticis, rutaq; uiridis obsonijs admiscendū. Hoc tamen neuiquam intra mali statim

statim primordia exhibendum est, quoniam calfacit nimium, sed post usum aliorum attenuandi potestatem habentium. Eua-
cuaturus uomitum ciecto: alui enim purgationes sæpe uicinas
partes fluxionibus afficiunt. Exercitationes frictionesque ad uē-
tositatis discussionem utiliter adhibentur. Venus nemini me-
moratorum congruit, nisi quibus propter coitus abstinentiam
genituram redundare conijcimus.

De impotentibus particulis. Cap. 58.

Qui hoc morbo oppressi tenentur, nequaquam in uenerem
proruunt, animumque ob id deuouent. Horum autem ratio est
partium resolutio, aut seminis genitalis inopia. Cum igitur de
his quæ genituram procreant, tum quæ simplici uirtute ad con-
cubitus excitant, primo uolumine, ubi de tunc da sanitate agitur,
perpensum sit, fortiora in presentiarum adijcienda sunt. Comu-
ni itaque curatione ipsæ hic remedijs quæ acopa dicuntur, aduer-
sus resolutionem factis, utendum est. Priuata uero curatione stel-
lionem crematum laeuigato, deinde oleo adiecto, magnū dextri
pedis digitum oblinto, atque in uenerem cōgreditor: si cessare ani-
mus est pollicem lotionem purgato. Iam medicamentum est stellioni-
bus ex pluribus contextum efficax habetur. Propinquitur autem
quæ uenerem excitant, quorum hoc primum fuerit: Piperis, gra-
norum pini, petroselini, rameti pudedi ceruini, terebinthinæ,
et quæ portiones melle excipiuntur. Aliud: Cicerum crudo-
rum, nucum pinearum utrobique sextans, seminis erucæ, piperis,
uniuscuiusque uncia, melle excipiuntur, bini denarii cum mero
exhibentur. Satyriaca item appellata multiphariam compo-
sita huic malo subuenit, et id genus alia. Considerandæ præ-
terea sunt aliæ affectus causæ, et singulis peculiare curandi
rationes accommodandæ.

Genitalium sedisque præsidia. Cap. 59.

Genitalium, sedisque hucera citra inflammationem oborta,
aresfacientibus impense medicamentis indigent: cuius gene-
ris sunt, ex charta combusta, anethum crematum aridum, et cu-
curbita

curbita deusta. At si hulcera sicca, recentiaq; extiterint, aloes arida in polline trita & impacta, præsentis est remedio. Omnium uero præcipuum indolorium, nulloq; inefficacius pompholyx est. Si humidiora contigerint hulcera, piceæ cortex per se, & lapis hæmatites. Si autem ipsis etiã profunditas quædam affuerit, manna admiscenda præfatis est. Si deuorãdo sanas partes aggreditur, quod hulceris genus nomã dicunt, lentacula cum malicorijs illinetur. Coraco præterea ex oxymelite cognominato utendũ, & bihyno, atq; eo quod è charta conficitur. Rimis uerendorum, sedisq; quas rhagades uocant, medebitur resina fricta cum rosaceo in modum glutinis contrita, admixto oui uitello, & opio: uel hederæ foliorũ aridorum cinis cum rosaceo, in plũbeo mortario subactis adhibeatur. Ad hæc ex ænelæo cõstitutus pastillus, & lapis phrygius, modis omnibus peraccommoda sunt remedia ad rimas et sordida putridaq; circa ani coronã hulcera, præsertim quũ elidi nequeunt.

Aliud simpex, et acrimoniam retundens.

Cadmie, & piperis, singulorum sextans: florum rosarum abiectis unguibus selibra. puluerẽ loco dolenti apio prius absterso inferre. Cæterum ad condylomata conducit, chalcitidis, æsopi ceroti, medullæ ceruinæ, rubi foliorum par modus cum cerato, et ex ænelæo orbiculus cõsimiliter. Quod si in cole intra naturalium foramẽ hulus delituerit, pus aut sanguen sine urina destillans testatur. Primum mulsa dilutiore colluitur, mox lacte, deinde collyrium asteris lacti cõmiscetur, seu albus pastillus, uel dialotarion in plumbea pila tritus pyxide reconditus demittitur, uel pẽna iam intincta inungitur: deinde tenue linamentum tortile illitum imponitur. Optimum est, quod cõstat ex gallæ, & pompholygis, amyliq; ac aloes æquis portionibus, rosaceo & plantaginis succo dilutis.

Ad pudendorum dolores.

Genitalium cruciatus placatur, butyri ac resinæ æquis portionibus scitè subactis, emplastri more illitis, aut seminis lini
marco

marcore, myrrha & resinæ frictæ æqui ponderis læuigati
impositu.

Ad tumorem pudendorum:

Mollium foliorum uitis triginta, cerussæ drachmæ quinque
contritæ, cataplasmatibus modo impositæ. Vtere præterea solu
ex marina gelida, requie ite et religatione penis. Carnes uero
genitalium superexcrecentes, quas Thymos Græci nominant,
sanat, nec recrescere sinit, cinis sarmentitius cum aceto impo
situs, corticis item salicis deusti cinis. In uniuersum autem thy
mus, formica, & uerruca pensilis pariter medicamentis ualide
exulcerantibus euellentur, erodentibus uero enecabuntur. Pri
uatim autem elaterium cum salibus impositum, id mali com
pescit: grossi, cum aceto, nitro, et farina, succusque fici illitus.
Smaridis item caput salsum & combustum: rubigo cum sulphu
re ignem nondum experto cremata, tithymalli succus illitus,
ocimi folia cum atramento sutorio, aut heliotropij maioris fru
ctus cum uino cataplasmatibus more adglutinati.

Ad inflammationem ani.

Cerussæ triens, pompholygis uncia, aut cadmiæ tenera,
thuris utriusque uncia, succi sereos hemina soluuntur, succus pau
latim affunditur, donec consummatur, deinde factum ex cera
uncijs duabus et rosacei libra cerotum, ubi raseris commisceto,
& ualenter subigito. Immite autem per pylculum instrumentum,
& superdeligato. Confert autem insuper rimis in orbe ani
cum inflammatione enatis: necnon h ulceribus quæ cum ignis
to feruore, aut morfu in sede exurgunt.

Ad ignitos ani rubores, quæ erysipelata dicuntur.

Sumito medicaminis diachylon, id est ex herbarum succis
libram, rosacei quantum satis est, panis puri libram, croci un
ciam, opij tantundem. cæterum crocus et opium passo maceren
tur, panis uero aqua: deinde ipsis probe dilutis, id quod ex suc
cis herbarum constat medicamentum & rosaceum immittitur,
subigiturque dum euadit liquidius. Facit autem ad calidissimas
etiam

etiam podagras. Aliud, quod conducit etiam ad inflammationem ani: Cerussa uino & rosaceo in pila plumbea, & cochleari eiusdem materiae contrita & illinita. Aut cerussa, & oui albore cum rosaceo in eadē pila, quoad glutinis lentorem induant concussis, sedem perungito.

Hedricum ad ingentes ani dolores.

Tenerorum foliorū alterci, foliorum tenerorū portulacae, micarum panis in uino maceratarū, lutorū ouorū assatorum & aquas portiones, rosacei quantū satis est: postquam locū affectū rosarū & meliloti decocto foueris, cataplasmate inducito.

Hedricō utilissimum ad ani inflammationes
& excrecentias.

Cerussa, spuma argenti, ammoniaci thymiamatis, bdellij, singulorum dioboli sex, terebinthina uncia, cera uncia dimidia: arida succo solani, herbae apollinaris, aut portulacae contundito, quae liquefacta, illis permixta excipito, et liquefactis rosaceo utitor. Phicotyche porro medicamentū, & ex metallica plumbagine comparatū, ani inflammationibus prodest: item quod Graeci quoque diatonlotarion nuncupant, ad haec ex balicaccabo, rosisque, pastilli, admirandā laudem inter illa quae tum sedi, tum naturalibus adhibentur, meruerunt.

Medendis excrecentiis ani.

Si carnes superexcrecentes inflammatione confluerentur, erit generatim praedictis priuatim uero isto pastillo utendum: Cerussa quadrantē, pompholygis uncia, spuma argenti sextantē, mastiches scrupulos sex, alterci succo excipito. Si uero absque inflammatione infestent, cupressi pilularum crematarum cinerem affectae parti uino antea absterso superaspergito: aut aridae cucurbitae corticis deusti, aut ossiū palmarū cinerem similiter, aut testarum ouorum, scaenicali; cinerem, aut foliorum mali Punici succū aequali modo, uino albo locus deterfus diebus septem eluitur. Ad excrecentias autem quae in callum obduruerunt, calcem & auripigmentum cum acriore aceto dissolue. Nec alienum, si in sole perungas.

De

De hæmorrhoidibus.

Si uenulæ quæ in ani corona extant, plus quàm par sit euacuentur, habitus in aquâ intercutē resoluitur, affecliq; prauè cibi beneficiū sentientes contabescunt. Periculum uerò est superabundantis sanguinis profluij, quemadmodū & eiusdem suppressionis in totū, unde perdifficilis redditur curatio. Proinde cum plures in orbe sedis uenulæ patent, unā purgationis gratia relinquere expedit. Nonnullæ uerò in exteriori parte existentes non apparēt, eoq; ægerrimè curantur. Cæcæ autē & latentes nihil excernunt, sed grauiore cruciatu fatigant. His igitur cyclamini succum inunge, & aperiētur. Aduersus uerò eas quæ largius iusto sanguinē fundunt, in aquæ heminis octo spinæ Aegyptiæ, foliorū sambuci, artemisiæ, singulorum quincunx, herba sideritidis triens, usq; ad medias elixentur, postea herbæ porriciuntur, aquæ uerò hic puluis cōmifecturæ metallici atramenti aluminis rotundi drachmæ octo, spumæ argēti quatuor, gallæ quadrās, misyos drach. duæ, sereos tantundem. In elixatione cū puluerē solueris, septies in die aspergito. Postera uerò die pari modo alteram confectiōnē æquali pondere irrorato. Tertio cōsimiliter. Quod si reliquæ quædā permāserint, quarto die acu cōpungito: si sentiat æger, aut sanguis profluat, decoctū similiter facit: pulueris uerò semissem admisceto. Vbi foueris, puluis, quod exactè deurat, adprimatur: ob inflāmationē uerò panē cataplasmatīs more imposito. Aliud: Panē purū garo primi honoris tindū in ficiili nondum alio liquore imbuto crematum, lauiatumq; iniecit, uino sede prius abluta. Facit etiā ad excrefcētias. Aliud: Sereos drach. duæ, chalcitidis drach. una, misyos tantundē, atramēti sulorij drach. tres, aluminis fissi nouē, aris deusti una, melātericæ tantundē. uere arido. Epulæ nimium quidē inanitis pauca, et ab excremētis aliena cōueniunt, et quæ arefaciēdi cōstringēdiq; potestātē continēt, è quorū numero est chōdrus ex posca lotus, oryza, & halicæ, ex holeribus intyba, cichoria, et portulaca:

ex

ex uinis quæ adstringunt. In hæmorrhoidibus autē cæcis contrariæ congruunt: cum primis uerò loliginum, sepiarum, ac polyporum, torpedinis, et selachiorum qui squamis destituuntur, esus, pulchrè cōpetit: hæc etenim sanguinem conturbant. Et quæ mensium ducendi uim obtinent, ex usu sunt.

Ad procidentem anum.

Erices fructus, gallarum, cerussæ, acaciæ, hypocystidis succi, piceæ corticis, rhuris, myrrhæ Aminææ, æquas portiones aridas superaccommodato, sede prius uino austero deterfa.

Aliud: Recrementi plumbi, rhis Syriaci, singulorum denarij octo, floris rosarū drach. quatuor, myrrhæ Aminææ duæ, utere quemadmodum superiore. Aliud: Piceæ corticis, manna, spumæ argenti, uniuscuiusq; drach. octo aridorum galbulorum, cupressi, plumbaginis, singulorum drach. duæ, utitor ratione prædicta. Lotium item languentis calidum adhuc superfusum opitulatur.

De locellorum affectibus, & primitus de menstruorum purgatione. Cap. 60.

Plerisq; sanè puellis anno decimoquarto mensium expurgatio primū incipit: paucis ante tertium & decimum, aut duodecimum: plurimis uerò, post annum decimumquartum prorumpunt. Tempus autem cuiq; purgationi statum non est. Multis per biduum, aut triduum: maximæ uerò parti ad quintum usq; diem fluunt, alijs usq; ad septimum, ad duodecimum usq; diem rarius expurgantur. Sistuntur autem muliebres huiusmodi purgationes quibusdam anno ætatis suæ quinquagesimo, paucis uerò ad annum usq; sexagesimum protrahuntur: nonnullis à septimo statim lustro, et potissimum obesis desinere menses cœperunt. Non respondente igitur menstrualis purgatione, circiter statum menstruorum tēpus, lauari, si famoq; prius, aut porro capitato, cum pipere & ruta unā decoctis ex passo cretico potionari debent, à cuius heminae haustu deambulationibus commouebuntur menstrua. Manducet interea loligines,

gines, sepias, polypodes, & quæcunq; id genus: nam propriè mouendi sanguinem uim obtinent.

De suppressis mensibus. Cap. 61.

Supprimitur quandoq; menstrualis purgatio, uniuerso corpore incommoda ualeitudine affecto, interdum uerò locellis modò priuata ægritudine cōflictantibus ex frigore uernaculo, aut idu, aut natua distemperantia, uel acquisititia offensione, ut plurimum uerò ex aborsu, & primario alicuius principis mēori affectu: uerbi causa, iecoris, aut uentriculi, aut pectoris, aut alicuius id genus diuturno morbo oblati. Mensium autem suppressio, multarum & diuturnarū ægritudinum causam solet inuehere. Cum igitur ob aliquā interancorum primariam affectionem abscinditur, aut remoratur muliebris purgatio, nihil utilius quàm ei quod primario afficitur, occurrere: mox uulua rationē habere. Sed eorū notio in superioribus comprehensa est. At ubi nihil horū adfuerit, perspicuum est, locellos per se uitio teneri. Si itaq; neq; ætas, neq; habitudo corporis, neq; aliud id genus prohibuerit, sanguis per uenā detrahendus est, non ante tamē præscriptū mēsiū tempus. Vbi uerò iam præterierint, dies decē adiciantur. Auferatur uerò nō plus duabus libris cum dimidia, neq; etiā minus una, siquidē uenam secabimus: sin minus, hiera ex cucurbitula syluestri, duobus denarijs in mulsæ cyathis senis purgabimus. Quòd si febris pariter infestet, hiera quidem utēdi locus non est. Opportunū uerò fuerit, in primis statim febriū dieb. sanguinē mittere. Post purgationem corpus muliebre paucis diebus reficiendum est: procedente autē deinceps tempore, exerceatur deambulationibus, partium inferiorū frictionibus, & balneis. Ex cibis conferunt qui facile distribuuntur, & humida holera, ac dulcissima, pisces saxatiles, aues teneriores, & lactis potatio, confectioes ex melle, quæ melittomata dicuntur, uinum tenue, colore candido, non admodū uetus. Non probantur carnes, neq; legumina, excepta ptisana. Vbi autē statū purgationis tēpus

S

pro

pro foribus constiterit, ex maritimis piscibus, dentur chartilae ginei, & ex osses, ut dictum est, Graece selachia & malachia uocantur, & qui pro cute integuntur testa: porra item capitata, cum ruta ac pipere elixa sumant, ius quoque eorum bibant. Infernae partes uinculis tribus quatuorue diebus ualenter constringantur. Aduentante autem statim mensium tempore, laxentur compedes, bibatur myrrhae obolus, aut fabae quantitas, aut castoreum ex passo, uel aqua mulsa, aut artemisia decoctum, aut salia uae, post balneum ex passo & absinthite. Vinum autem absinthite per omne curationis curriculum propinetur. Si uero solenni purgationis tempore, ne tantillum quidem, uel nihil commentatione dignum, excretum fuerit, sub malleolo sanguis detrahatur, & auferatur denuo. Post septimum uero aut octauum diem purgatione ex biera utendum. Et post quartum rursus diem, dropax summini, lumbis ac femoribus illiniatur. Aqua exinde in potu tri duo sumpta, sinapi cum aequa portione panis macerati ad aequinoctium usque imponitur: deinde lauet, sequenti mense ficus arida pro pane admisceatur in decocto fenograeci, maluae, pulegij, ruta, ac artemisia. In finem uero pudoris, susinum, aut amaracinum infundatur: & pessus ex medicamento est noue rebus constante, & ob id ennapha-macum nomen obtinente, aut libanius insinuantur. Est etiam pessus lana peccata, & quodcumque aliud teres digiti speciem praeferes, quo medicamenta sustinentur. Haec igitur curatio plerisque ad ceteros menses abinde fuit. Si autem ualidiora res postulauerit remedia, haec fuerit eorum materia: Iris illyrica pota cum uino, cyperi, ariq; radix, & casia, rotundi odorati iunci floris, nardus, inulae radice decoctum, et myrrhae fabuli Graeci instar, cum passo in dimidiato mulsa cyatho, et dictamni iuris cyathi duo, & gutta ammoniaci, & sagapenum. Sed quae stomachi uitio minus obnoxiae sunt, opoponacis momentum in pilulas redactum, & incocto melle irrigatum assument. Iam & consueta nobis semina, muliebria ciere nata sunt, sed minore efficaciam: quale feniculum, cyminum, apium, daucus Creticus, fesceli

seseli, ammi. sion, ciceres, cedri fructus, & omnia quæ urinam proritant. Prostreta porro ex myrrha, absinthij, aut lupinorum decocto, seu ruta succo contrita subijciuntur, bdelliumq; similiter. Styrax item, & sylvestris olea gummi, succus uerutæ compari modo, uel aristolochia longa in collyrij formam concinnata. Consimili præterea modo cætaurij grandioris radix, aut ueratri, aut liquor scammonia, & colocynthidos interior caro priuatim, & artemisia cataplasmatibus more cum ruta illita, galbanumq; , facto inde suffitu. Quæ factum etiam utero elidere naturæ suæ apitudine possunt.

De exuberante purgatione, & hæmorrhagia locellorū. Cap. 62.

Immodica mensium purgationes fœminis contingunt, cum interdum sanguinis menstrui copia cōfertim & cū impetu, interdum in fine partus erumpit. Quæ magna quidē ex parte sua etiā sponte cessant. Subinde etiam post abortum uehementia sanguinis profluvia euellunt, ita ut sæpe comitetur periculi. Primū igitur artus extremi ab axillis et inguinibus fascijs constringantur. Posca nō frigida propinatur, eadēq; locus fouetur, plurimaq; lana, uino, oleo, siue rosaceo, siue melino, siue myrtino imbuta locis imponitur. Estur chōdrus lotus ē posca, aut oryza, aut balica. Vino abstinetur, hydromalū uerō austerrum, aut omphacomeli, aut id genus quippiā ipsis conceditur. Propinandū insuper, in posca balaustrū, siue hypocythidis, uel acaciæ cremor, aut lycium, aut Samius aster, aut uix acerbæ succus aridus, aut rheum, aut lēticulæ in Italico uase fictili crematæ cinis, aut sesamū in posca, donec molliusculū & delicatū reddatur, maceratū, edendū præbetur. Pesti naturalibus fœminarū insinuatī, sanguinis eruptiones cōpescunt: hypocythidis succus, aut acaciæ cum manna aceto eliquatæ. Mirificè prodest spōgia, uino aut liquida pice tincta, & pesti modo supposita, uel deusta ipsius cinis cū aceto, poscaue applicatus: pari etiam modo suberis Italico uase testaceo cōbusti cinis. Foris autem egregiè subueniūt epithemata quæ astringēdi naturam

8 2

habent,

habent, & ex dactylis palmae, cotoneisq; & quae malicoriae continent cataplasmata, aut ilicis glandem, aut rubi uirgulta, aut lentisci folia, balaustrum, acaciam, hypocystidem, gallae momentum, & alumen. sed omnium maxime illud: Taurinum glutinum, tantisper dum dissoluatur, posca maceratum, deinde linteolo robusto impactum, lumbis imponitur. Efficaciter ad hoc faciunt emplastra, quae glutinatoria uim retinet: uerbi causa, Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, atq; id genus cetera. Pessariorum etiam talium ad sanguinis profluvia usus est Gallae interancum tritum, & thus aqua dilutum insinuatur: aut cytini, aut dulcia mala Punica consimiliter, aut seminalis lauiogata. Componuntur autem, aluminis fissilis, medullae gallarum, succi acaciae, mannae, singulorum drach. quatuor, ouorum assatorum lutea quatuor, arida in succo plantaginis teruntur, & commiscuntur. Cum usus exigit, pessulo laneo excipiuntur, rosaceoq; intincta naturalibus conduntur. Quin & cucurbitulae inanes spaciosae saepius sub mammis adglutinatae, tantum ut nihil desideres reuellat. Inseffus insuper his quae sanguinis eruptiones patiuntur, huiusmodi conuenit. Oxychoeni, quod est iunci marini, capitis myrti, foliorum rhamni, rosarum, surculorum rubi aequalis modus in aqua decoquitur, qua insidentibus loci utiliter fouetur. Aliud: Mali Punici dulcis radicis corticis, myrti, corticis cupressi, singulorum partes tres, gallae pars una, aquae quantum satis est. Id uero et per uterinum clysterem, Graeci Metrenchitē uocant, succum plantaginis, aut sercos, aut seminalis, aut strychni, aut perdicij, aut psyllij, aut hypocystidis, aut acaciae infundito. Atq; haec quidem lana, aut digito, aut mela, pinnae ue in longitudinem format, usq; ad os uteri inseratur. Et Andronis pastillus per uterinum clysterem cum praedictorum succorum aliquo, aut uino adstringente infusus, efficax est remedium.

De muliebri profluvio. Cap. 63.

Muliebrium locellorum fluxus, est uniuersi corporis quod expurgatur, destillatio. Huiusmodi uero specie id quod

anach

euacuatur, præfert, cuiusmodi humor, qui in corpore redun-
 dat: aliud rubrū quidē, instar saniei sanguinis: aliud uerò cano-
 didum, à pituita proueniens: aliud autē luteum, amaræ bilis so-
 boles: nonnunquam aqueū. Si autē sanguis syncerus, quemado-
 modum in illius per uendā detractione, effertur, animaduerten-
 dū erit accuratē, ne qua in locellis enata sit erosio. Deprehen-
 ditur autē fluor, quod loci perpetuò dissidentibus colore humo-
 ribus madescent. Laborans pallet, alimenta non sentit, cibum
 odit, in deambulationibus spiritus difficultatē experitur, oculo-
 los habet intumescētes, interdum quidē cum dolore, interdum
 uerò citra dolorē, uel cum exulceratione, uel absq; illa, uel in-
 flammata, uel sordida, uel munda. Toti itaq; corpori arefa-
 cientibus succurritur si morbus fuerit humidior, absq; euidēti
 calore: frictionibus itē corporis uniuersi, & illinitionibus ex
 melle assatim decocto. Pharmaca etiam quæ urinā cient, por-
 rignantur, è quorū numero habetur aqua in qua elixa sint asae-
 rum & apium. Per aluum præterea totum corpus euacuatur.
 Ad hæc portulaca commanducata, succusq; eim epotus subue-
 nit. Balaustrū item, rubiq; cū fructus, tum flos, et qui cortici
 querceo subest liber, et mēbrana quæ sub putamine latet glan-
 dis. Hippuris, potissimè rubens, profluuium, pota ex aqua aut
 uino, sistit: aut hypocystis, baccæq; lentisci frictæ cum uino po-
 tæ: Samius asler, Lemnium sigillū, coaguū leporinum, aut
 bædinum, aut agninum, aut uitulinū, aut ceruinū, acini uina-
 cei triti, myrti, omphax aridus, piceæ cortex, & quæcunq; ad
 locellos sanguinis profluuiū uexatos memorata sunt, modò ne
 sint quàm par sit efficaciora. Quādo autē cum cruciatu effertur,
 per uteri siphonē, aut clysterē succus halicæ, aut ptisanæ,
 aut tragi, aut oryzae, unā cum anodynīs aliquot remedijs im-
 mittendus est. In accessionibus morbi dolor mitigandus est. In
 remissionibus uerò (habet enim circuitū nonnunquā) utendum
 fuerit gestationibus uarijs, deambulationibus, uociferatu, uen-
 tationibus, cucurbitulis, dropacibus, particulis superioribus im-
 S i positis,

positis, aut apricationibus, frictionibus, unguentis depilatorijs, quæ psilothra dicuntur, sinegmatibus, sinapis, uomitibus cum radícula prouocatis, ridu reparante, lauacris, mero, uarijsq; dapibus.

De locellorum inflammatione, & declinatione. Cap. 64.

Inflammatio uteri è pluribus causis originē trahit. Ex iclu nempe, ac mensibus suppressis, frigore utē, & inflatione, neq; minus etiā ex abortu, et partu parum dextrē eliso. Comitatur locellorum inflammationem febris acuta, capitis dolor, tendinum, radicis oculorū, brachialis digitorū, colli deorsum conuulsio, & in contraria conuersio, stomachi per consensum dolor, osculi locellorū præclusio, pulsus parui & frequētes. Etsi exigua fuerit inflammatio, haud crudeli uulua dolore afficitur: sin ualidior fuerit, eadem uniuersa pulsatorio cruciatu torquetur, membro undiquaq; inflammatione obfesso. Parte uerò inflammatione modò depressa, eandē dolor magis exercet. Nam si posteriora ipsius solū inflammatione cōstiterint, dolor lumbos excruciat: retrinēta alui specie oleti canini, compressore recto intestino, retinentur. Si uerò anteriora inflāmantur, dolor pectini insedit, urinaq; stillicidium, aut difficultas oritur, stridula in arētā uesica. Si autē latera inflammatione tententur, inguina intendentur, & crura ægrè mouentur. Si extrema ad fundū uteri pars inflammetur, partes umbilico circumiacentes dolore potissimū cum tumore infestantur. Vbi autē uulua osculum inflammatio occuparit, dolor in abdomine affligit: digitoq; immisso, durum ac rigidū occurrit orificium. In curatione itaq; fœtus inprimis ex uino & oleo tēperato, uel uino et oleo rosaceo per uelamina, ex lana mundiore inferiori uētris regioni ac lumbis, citra deligaturā adhibendus est. Cibi commendatur abstinentia per triduum, à quo seclā uena cubiti, sanguis, nisi quid impediāt, detrahendus est. Cōsummatur meditatio ipsa chondro ex aqua mulsa, aut pane, aut ouis sorbilibus tertio quoq; die. Secundū quintū uerò diem cataplasma imponatur

natur ex polline farinaceo, semine lini, fœnogræco, mulsâ maceratis, in qua capita papauerû decocta, & à mulsâ iam abiecta sint, & oleo. Si autē inflammatio erysipelatis naturâ respiciens excalfacientibus magis irritetur, sertulâ campanâ in passo elixâ, tritamq; ouorû tostorum luteis adiectis cū rosaceo, aut melino, aut crocino cataplasmatibus modo applicato: aut palmarû daſylos uino temperato subferuefactos, cū tenuissimo farinae polline, aut aliquo ex relatis unguinibus læuigato ac illinito. Malo autē remittēte, cerotû nardinû aut cyprinû iniiciendū est. Inter cūcta remedia, infusus ex decocto fœnogræci aut seminis lini, maluæ, artemisii, & oleo ex usu sunt. Sed in his quæ calorem nō tolerāt, ex calida aqua rosaceo infuso. Pessimæ uerò et infusiones adhibeantur ex æsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, unguento Susino, & cera Tyrrhenica. In his quæ caliditate ferre possunt, pessus ab auri colore Chrysus appellatus cōuenit, et enneapharmacus. Sed quæ hâc nō sustinēt, his ex ouo, et rosaceo, adipeq; anserino seu gallinaceo cōficiantur. Cæterū aduersus ardētiores inflammationes emplastro ex herbarû succis in duplo fictili uase cū rosacei liquefacto miscetur succus plantaginis, aut fereos, aut cichorii, aut intybi. Vel sequenti utitor: Adipis anserini suillæ sue recētis axiugiæ drach. quatuor, cerati rosacei aut Susini uncia duæ, ouorum affatorû luteorû uncia, croci drach. myrrhæ trioboli, opij oboli duo, uel opij loco capitû papaueris decoctû. Si uehementissimus uuluum infestat dolor, succi papaueris lentis quantitate, cum lacte muliebri, & succo fœnogræci, subiiciendum porridge. Ad inflammationes porrò cum durtia, tetrapharmacum rosaceo liquatum subiicitur, uel infunditur. Declinationibus uerò uuluae secundum paroxysmos quidem, perinde atq; inflammationibus succurritur. In remissionibus & declinationibus, blandioribus utendum. Si uetustas malum occupauerit, remedijs metasyncriticis appellatis, pugnandum. Foris autem durtie oborta, malagmatis, puta è sertula campana,

item Mnasi, & Icesy, Melina Sarapionis, aut pyrina. Vi-
 dus principid quidē tenuis esto: facta autē modica relaxatio-
 ne, laborantes in balnea ducantur, ciboq; magis uario ac ple-
 niore utantur.

De abscessu uteri. Cap. 65.

Cum inflāmatio uteri in abscessum conuertitur, signa quæ
 memorauimus, intenduntur. In accessionibus febres inor-
 dinatæ cum horrore inuadunt. Per initia quidē intensæ cum
 doloribus. Postremò uerò ad suppurationem perducto aposte-
 mate, aliquantulū remittunt. Vbi uerò uomica eruperit, cru-
 ciatus sæpenumero acriores, ceu punctorij incidere uisi sunt,
 febresq; feruentiores accenduntur, urina nonnunquā suppri-
 mitur, interdum aluus, factio iuxta affectū uteri partem impe-
 dimento, aliquando uerò tumor circa pubē attollitur, & tan-
 quam inundationis sensus, si abscessus grandior fuerit. Quod
 uerò in expositis locis consistit, etiā specillo instrumento locis
 inspiciundis idoneo, aut digitorū attactu deprehenditur, præ-
 ter quod dolores ob neruosam oris ipsius uteri paritē acerbio-
 res infestant. Quemadmodū in fundo, circaq; sinū dolore mi-
 nus afficiuntur, & digitorū tactui tumor non occurrit, orifi-
 cium autē gracilius uidetur. Suppurationi igitur maturrimè,
 cataplasmatibus ex fœnograeco, semine lini, bordeacea aut tri-
 ticea farina, admixtis interim ipsis ficibus elixis, aliquando
 etiam columbino stercore opitulandum. Infectiones, quibus ad
 uteri inflammationem utebatur, crebrius adhibita profunt.
 Pessuli item ex terebinthina, myrrha, & sipo, atq; butyro con-
 cinnati. Rupto autē abscessu, si quidē pus in uesicā deferatur,
 lac, cucumerisq; semen potandū: sin uerò in intestinū rectum
 putris euaserit materia, lentium, malicorij decoctū aluo infun-
 ditur. At si aperto abscessu pus merū in sinū pudoris cōfluat,
 rosaceum infundito, aut ex amygdalo dealbato oleum, aut te-
 trapharmacum Basilicū, aut recens butyrū. Si sanies tenuior
 tetri odoris eruperit, quemadmodum ex hulcere depascendo
 repente,

repente, maiore astringendi vi, præditum erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si post humorum excretionem urgeat inflammatio, cataplasmatibus in seſſionibusq; perſeuerandum. Cum autē in uteri oſtiolo abſceſſus conſtiterit, neq; rumpatur, extenuatis circumiacentibus puri corporibus, ad pus expellendum chirurgica manu utamur: ceu in libro de his qui manu medicam exercent artem, memorabitur.

De exulceratione locellorum. Cap. 66.

Exulceratur ſubinde uulua ob difficultatem pariendi, uel propter foetus extractionē, uel eius interitum, uel acria medicamenta, uel fluorem, uel ruptos abſceſſus. Quapropter ſi prompta & oculis expoſita fuerit exulceratio, ſpeculi artiſicio deprehēditur: ſi in alto recōdita, ab excrementis egeſtis. Humor nāq; diuerſus excernitur, inflammato quidē hūlcere, exiguus, ſanguinolentus, aut feculentus, cum ingenti dolore. Si ſordidū fuerit hūlcus, copioſior, et ſanies ſeroſa cū minore cruciatu profluit: ſi depaſcēdo ſerpat, teterrimi odoris, aterq; cū doloribus uehementioribus, alijsq; inflammationum indicijs. Irritantur ex medicamentis relaxantibus, & leuātur ex contrarijs. Ex mundo autē hūlcere, humor exiguus, æqualis, ſine odore, craſſus, albicans, cum facilitate excernitur. Inflammato autē hūlcere, ijs quæ ad inflammationē conducere docuimus, utendum eſt. Sordidum hūlcus, ptiſana cremore cum melle illuendū eſt, aut tetrapharmaco, cum Suſino, ſiue mulſa in qua elixum ſit ſcœnogræcū, aut malua, aut furfures, aut lenticula cortice detracto. Ceterū quo exactius purgetur, etiam marrubium, aut eruum, ſiue mel, admixta erui farina, aut iris, alumen uel rotundū, uel ſimile quiddā inijciatur. Eadem & foris ex mulſa macerata, more cataplaſmatis inducuntur. Peculiaris opitulatur hoc medicamentū: Crocus optimus laeuigatur lacte muliebri, deinde ceroto roſaceo exceptus cum adipe anaserino, flocco illinitur. Exquiſitius, et ad ingētes dolores diſcuſiendum efficacius eſt illud: Calyces papaueris in paſſo tempe

S 3 rati

rato irrigatur per triduum: mox decoquantur donec liquefi-
ant, deinde teruntur cum foliorum rosaceorum drach. quinque,
eroci tribus, admixto capitū papaueris decocto: postea super
fundito his ceræ rosaceo liquatæ denarios duos, et in pessa cū
rosaceo imbuto subijce. Vincit etiā medicamentū quod ex ouis
crocoq̃, ac rosaceo, adipe anserino, medullaq̃; ceruina cōtexis-
tur. Aegyptia uē sine rubigine ad exulcerationes mirificè fa-
cit. Depassio ubi fuerit cū inflammatione, panis tepida macera-
tus, ex hydromelite, oleo, alibæa, scenograeco, palmulis pingui-
bus cataplasmatibus modo illinitur: immittendus uerò succus plā-
taginis solani, seminalis, sereos, primitus quidē per se, deinde
uerò cū uino austero, siue aceto. Si citra inflammationē depas-
sio serpat, inijcienda sunt efficaciora: exēpli gratia, decoctū
malicorū, rosarū, olea colliculi, cupressi: malorū cotoneorū,
rubi, myrti, lentisci, rhamni, rhus quo utuntur coriarij ē uino
astringēte: postremo aut aluminis, acaciæ, lycij, hypocyssidis.
Ex iisdē etiā decoctis infusus cōstituitur: si nihil proficitur, pri-
mo quidē medicamentū ē charta immitte, deinde uerò acetum,
aut Anthera, aut chalcitem, aut atramētū sutorium. Huic ex
isdem liquoribus, et quæ dysentericis congruunt. Alimenti
perexiguū boni succi ministrato. Expurgato iam hulcere,
lauare pluriphariam, et nutrire crebrius, et uinū præbere,
quod incarnatio uelociter fiat, expedit. Pessi autē uice indetur,
medicamē ex moris, dilutū cadmia, aut ladano, aut plūbagi-
ne. Foris autē abdomini atq; coxēdicib. empastrū cicatricē in-
ducēs imponendū. Quēadmodū enim cataplasmatū, ita et em-
plastrorū potētia per cæcos meatus ad interiora trāsferetur.

De uteri cancro. Cap. 67.

EX canceris uteri alij quidem hulcerati, alij uerò non hula-
cerati existunt. In cancro igitur non hulcerato, tumor in
uulue ostiolo reperitur durus, inæqualis, crepidinosus, colore
feculentus, rubicūdulusq̃; interdū etiam subliuidus: cum uehe-
menti, circa inguina, in uentrē, abdomen, et lumbos dolore,
mannūq̃;

manuumq; attrectatione, et medicinarū uarietate excādescūt
 Si cum hūlcere cancer est, prāter dolores & duritiās, tumo-
 resq; hūlcera exesa ac inaequalia cernuntur, magna ex parte
 quidem sordida, prætumida, albicātia, humore cōcreto defor-
 mia. Sed quæ munda uidentur, feculenta, lurida, rubentia, &
 cruenta apparent: sanies inde tenuis, aquosa, nigra, aut ignea,
 tetri odoris iugiter excernitur: nōnunquam uerō etiā sanguis
 erumpit, cæteraq; indicia quæ de utero inflāmato enumerata
 sunt. Hæc dispositio curationē non recipit, ceu ipse etiā asse-
 rit Hippocrates. Placari tamen potest infestationibus ex fœno
 græco, maluaq; paratis, atq; id genus cataplasmatīs. Effica-
 cissimæ leniendi uires habent in exacerbationib. malua, aut
 alibæa in mulsā subacta, colliquataq; cum pauco rosaceo, &
 instar cataplasmatīs adglutinata: ad hæc cōpositio ex ficubus
 aridis, fertula cāpana, ruta, thure, napoq; herba accuratē cū
 oleo cōtusa. Item cataplasma ex palmulis in passo decoctis,
 adiectis ouorum uitellis, atq; farina hordeacea, aut papauere,
 cum coriandro, aut seminali, aut seri: hæc quidē in ipso crucia-
 tus tēpore prosunt. Post hæc uerō cerotū ex rosaceo, aut myr-
 tino, aut cenanthino, aut melino cum palmulis in passo elixis
 admisceatur. Priuatim uerō cōpetit ceratū ex amurca in cor-
 tinis abenis inuenta, quæ testa læuigatur, ceratoq; rosaceo ex-
 cipitur, tantisper dum consistentiā emplastro idoneā induat.
 Hæc quidē extrinsecus adhibētur. Interius uerō mitigat locos
 oleum. Si exhulcerati fuerint, lac quoq; muliebre infusum, te-
 pidusq; plantaginis succus. Si cruentū ab hūlcere manat, suc-
 cus seminalis herbæ cum pauco thure cōmulcet. Mitigāt præ-
 terea pessi è croco, lacte muliebri, liquore papaueris, et æsipo.
 Omnium uerō efficacissimū est, & aduersus sedis etiam affe-
 ctiones, quod accipit spumæ argenti Italicæ lotæ uncias sex,
 thuris masculi, æsypi, adipis porcini recentis, butyri noui, ceo-
 ræ Tyrrhenicæ, singulorum uncias duas, rosacei quatuor.
 Spumam argenti in succo sereos contritam, liquatis injcito.

Cibus

Cibus qui facile in uentriculo uincitur, & in membra distri-
buitur, inculpati succi exhibendus est, uini aquosi paucissimū,
acriores cibi, satietasq; cauenda est: promptissimè nanq; ipsis
cibaria corrumpuntur.

De scirrho, & duritia. Cap. 68.

Obdurefcit uterus, quandoq; sanè dērepēte, nulla perspicua
occasione, plerunq; tamen præcedente inflammatione, quæ
neq; discussa, neq; in abscessum permutata fuerit. In eodē ge-
nere habetur durities, quæ scleroma appellatur, in uteri cerui-
cæ magna ex parte obueniens, tumore quidem habēs similem;
sed minus renitentē, cum dolore mediocri. Accidit autem his
uteri declinatio in contrariū, tumor uehementer durus, & ta-
lūi repugnans cum grauitate, & difficili motu: non crurum
modò, sed uniuersi corporis, obeūdisq; uitæ functionibus segni-
tia. Superuenit nō rectè curatis deprauatus corporis habitus,
naturam aquæ subtercutē resipiscēs. Principiò igitur sanguis
secta uena auferendus est, alius Archigenis hiera sollicitanda:
deinde cataplasmata ex ficibus aridis, æsipo, nitro, absinthio,
& cucurbitulæ cum scarificatu adplicanda & malagmata,
polyarchiū, diaspermaton, & diadaphnidon, hoc est, ex bace-
cis lauri confectū. Insestibus utemur ex caricarum, artemisiæ,
pulegi, althææ decocto. Pessuli ex resina terebinthina, galba-
no, myrrha, iride, æsipo, dropace. Aquarum naturalium usus,
quæ nitri naturā aut bituminis præferunt, commendatur. Si
corporis robur non desit, etiam helleborismus probatur.

Pessulus mollitorius.

Ceræ Ponticæ, unguēti nardini, uniuscuiusq; quadrantem,
irini, gleucini, cyprini, singulorū sextantem; adipis ursini, &
anserini, butyri, æsipi, medullæ ceruinæ, resinæ terebinthinæ,
singulorum unciam. Aliud: Polydrach. duas, myrrhæ qua-
tuor, cum uino Mēdesio tritas, irinoq; dilutas ad subiiciendum
exhibe. Aliud: Ceræ Tyrrhenicæ, adipis uitulini, resinæ te-
rebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis attici, olei ueteris, æquis
portio

portionibus. Pessus metasyncriticus, hoc est, noxia ex alto euocans, & restauratitius, & ad inflationes faciendus. Vuae passæ candidæ, demptis acinis, quadrans, foliorum uiridis rutæ sextans, aquæ marinæ unciam & dimidiam, cymini drach. quatuor, mellis quantum satis est. Illitum autem pessum oleo cypri-
no immergito, atq; supponito. Cæterum Chrysus pessulus uocatus, atq; Libanius, necnon enneapharmacus, huic affectioni accommodati, uerum peculiarius adhuc Titianus.

De Mola. Cap. 69.

Mola quoq; scirrhi naturam præsentans tumor est, nunc uteri orificium, nunc ipsum uniuersum occupans, & topheam duritiam tactu referens, cum eorum quæ superiacent, hoc est, præcordiorum retractione, gracilentia, decoloratione, cibi fastidio, mensium retentione, mammis turgentibus, ita ut per inuitia in quibusdā ueræ conceptionis opinio suboriat. Tem-
poris uerò progressu discernuntur: nonnullæ uerò aquæ inter-
cutem præferunt suspicionem. Cæterum discrimen ex tumoris duritia, & ex surdo digitorum percussu: dignoscitur, quod inde nullus, quemadmodum in hydrope, sonitus edatur. Quum inten-
ditur, re uera in hydrope conuertitur: nonnunquam uerò incurabilis magna ex parte morbus nascitur, quibusdam sanguis quoq; effertur. Omnibus itaq; ex æquo conclauis angustiore, obscuro, modicè refrigerato, lecto immobili recubere confert, ita ut crura sint aliora & quieta. Efficax quippe ad concie-
tandum quemlibet fluxum, est motio. At tumores, duritiasq; iisdem medelis quæ in scirrhis uteri, scleromatibusq; scriptæ sunt, medebimur. Suffusiones autem aquæ intercutem similes, remedijs in capite de Hydropico morbo commemoratis. Brutiones au-
tem sanguinis, perinde atq; profluum sanguinis, & fluorē mu-
liebrē curabimus. Sunt qui molam asserant carnem informem, in locellorum tunicis consistentem, conceptus modo in lucem edi. Hoc morbi genus uicū relaxante, quò maturius excutia-
tur, tractandum est.

De

Inflatur uterus ex frigore, uel corruptione fœtus, uel ex in-
 felici partu ostiolo cōnuente, uel sanguine intus in grumi-
 concreto, interim spiritibus in concavitate loculamenti ipsius
 collectis, interim uerò ex raritatibus corporis ipsius uulua.
 Quæ comitatur tumor pedinis, & imi uentris, cum duritia et
 dolore pulsatili, qui ad septū usq; transuersum, stomachumq;
 & inguina pertingit, percussuq; digitorum sonitus tympani
 instar editur. Curatur itaq; primū detractione sanguinis si
 nihil impedimēto sit: mox in affectus accessionib. inedia, fotuq;
 ex oleo rutaceo. In seſibus item ex rutæ, pulegiæ, artemisiæ, ca-
 siæ decocto, et similibus. Cataplasmatibus ex seminibus apij, cy-
 mini, fœniculi, anisi, ameos, lolleacea; farina. Cucurbitulis
 insuper leuibus, & incisa cute scalpello. Si uitium uetustaten
 senſerit, corpus hiera picra euacuabimus, dropacib; q;, et si
 napismis, & naturalibus aquis utemur. Cæterū obstetrix in-
 fert digito oleo prius imbuto, incumbentem sanguinē in gru-
 mum conglobatum si assequatur, auferat clemēter ipsum resol-
 uēs: deinde rursus cataplasmatibus modo imponēda, ficus, nitrum
 & absinthium. Epithemata emolliēdi facultate prædita erūt:
 Polyarchium, diaspermation, & diadaphnidon. Pessuli deniq;
 ex ruta, melle, nitroq; formentur. Cum primis autem ille ac-
 commodatus est, qui ē ficuum pinguium contusarum drach-
 ma, cymini duabus, spuma nitri drachma cōcinnatur: sed pro-
 pter acrimoniam in lacte prius macerentur. Pessi postremo
 mollitorij, omnes huc sunt idonei.

Strangulatus uterinus est, uulua ad superiora retractio, &
 Consortium afflictionis nobilissimæ corporis partes percipi-
 unt: uerbi causa, arteriæ, quas carotidas uocant, cor, & ce-
 rebri membranæ. Accidit autem languentibus appetente ac-
 cessione, torpor mētis, segnities, crurū debilitas, pallor faciei,
 species oleosa & hebes, ac tristis aspectus. Obruente uerò iam
 strangu

strangulatione, profundissimo sopore, desipientiaq; corripitur, instrumenta sensuum detinentur, uox obmutescit, crura contrahuntur, malæ demum rubescere incipiunt, & facies turgida repletur. Cum malo remittente ad se reditura est mulier, promanās quædam è muliebrib. locellis humiditas iactu percipitur, immurmurat uenter, & progreditur aliquid ex intestinis, ipseq; uterus paulatim laxatur, tum deniq; ad se redeunt, sensumq; recipiunt. Mouetur porro id morbi genus quodā circuitu, quæadmodum et morbus comitialis, facta uidelicet uulua, uel seminali, uel alia quauis materia, aut hac in eadem corrupta. Plures quidē rursus relatæ sunt: nonnullæ uerò in ipso paroxysmo uitâ in mortem subito cōmutarunt, citato primū arteriarum pulsu, mox inordinatim trepidante, postremò eodem in totum abolito. Tū exiguo per partes humore rorescit cutis. respiratio primū quidē obscuratur: postea uerò exactè intercidit. Hic aff. dñs hyeme atq; autumnō frequēter ingruit puellis salacibus, stilibus, & potissimè si ui medicamentorum infæcundæ euaserint, et aliter refrigeratis. In exacerbationibus igitur, extremas partes arctius uincire oportet, & tota crura corpusq; uniuersum confricare, ut animo destitute ad se redeant: graueolētiaq; odoramenta narib. admoueātur: uerbi causa, scirpus lucernæ extinctus, castorium, pix liquida, cedria, uellera & linamenta combusta. Quidam uerò matulatis quoq; lotio ueteri siue olctulo fœtentem naribus obtulerūt. Et cucurbitulas inguinibus, & imo uentri cum plurima flamma inanes, atq; cum scarificatione adglutinare proficit. Accessione autem longius protracta, etiam ea quæ discussis flatibus peditus agunt, utilia sunt: cuiusmodi sunt colica aluo indita, putta, cyminiū, nitrū cum melle, et stercus cum clystere subducere, ne torqueāt iniecta, congruit. Porro naturalib. fragrantissima unguēta infusa, detrahēre uulua naturæ aptitudine possūt: ueluti amaracinū, malabathrinū. Sinapi uerò partim quidē naribus obijciatur, partim uerò pedib. cataplasmatibus instar imponatur.

*In hoc
stom*

procidere affirmant, quòd sanè uidetur absurdum. Quo enim pacto reducta in suam sedem queat restaurari? Oportet itaq; in huiusmodi curatione, stercore prius per clysterè euacuato, et lotio excreto, quo undiq; ab anxietate libera sit uulua, laborantem supino corpore collocare, coxis accliubus, & popliti bus reflexis, cū diuaticis cruribus. Deinde hastulā laneam, forma & crassitudine pudendo muliebri conformē, tenui lino teolo circumuoluto, & in succū acaciæ, aut hypocystidis uino dilutū demergito, subycitoq; uulue, & absq; uolūtia omnem uteri partem delapsam sursum retorqueto, quoad uniuersus tumor intra sinū recipiatur. Pedem præterea extrinsecus spongia in posca expressa operiendus est. Decumbat autem mulier extensis et coaptatis insertim cruribus, ita quidem ut alterum alteri inequillet. Post hæc cucurbitulæ sunt adglutinandæ, cum flamma plurima, umbilico & utrisq; ilys. Odoramenta naribus offerenda sunt perodora. Tertio die lana sinui imposita, mulier uini nigri & austeri in seßu quadantenus tepesactō utatur, siue in decocto myrti, lentisci, & malicorijs insideat. Post hæc, priore lana è pudendo sublata, altera eodē madefacta medicamento imponatur. Foris cataplasmata abdomini inyciantur, diaphœnicon scilicet ex farina hordei, aut lente, & malicorijs cū oxymelite, atq; hæc alternis diebus usq; ad exactam curationē rursus permutentur. Quòd si pars prolapsa diuturnitate temporis putruerit, amputetur, nullū prorsus discriminē ueriti. Totam etenim uuluam purefactā quandoq; amputatam fuisse, & mulierem superuixisse tradunt.

De Muliebrium locorum præclusionē. Cap. 73.

Accidit angusta circa muliebrium locorum os præclusio, quam phimon appellāt, aut propter exulcerationem quæ præcessit, aut obduratam illic inflammationem. Succurrendum est igitur in seßibus qui mollificant ex oleo & aqua, & scenos græci decocto, cataplasmatib; eiusdem facultatis: pisis item emolliendo efficacib; adhibitis. Quòd si inueterauerit malum,

T suffia

suffinentis uaporibusq; aromatib. confectis utendum. Discu-
 ut etiam eiusmodi nexum pessulus ex ælypo, nitro, resina &
 terebinthina contextus, si nihil aliud quam uulue or. ficy con-
 uientia subsit.

Sterilitatis præsidia. Cap. 74.

Sine itaq; discrimine utriusq; sexus, tam maris quam fœmis-
 nae, corpus uniuersum in media ei inculcata temperie con-
 seruare congruit, & absq; laborū, ciborū, balnei & reliquo-
 rum omnium excessu. Præcipuum enim est à sagina, ne obesiorē
 cōparet habitudinē, arcere: neq; enim habitiores progignen-
 dis liberis sunt idonei, eo quod pudendis inter se optimē conue-
 nire nequeant, tum quod paucissimū seminis emittant: neq; ue-
 hementer extenuati procreare liberos sufficiunt. Cōferunt in
 hac cōstitutione, cuncta quæ calfaciendi, paululumq; inflandi-
 uim obtinent. Vinum calidæ naturæ cum modo sumptum. Et
 ex boleribus cruca, nasturtium syluestre quod, hominumre,
 erysimon, & id genus. Ruta uerò & nepita prorsus sunt fu-
 gienda. Si autem prauorum humorum copia conceptus impe-
 diatur, eosdem expurgare, aut utili uitæ ratione temperare
 expedit. Priuatim uerò mulieribus utile est, summū uulue cu-
 ram habere, ac mēsiū purgationē mediocriter & sine impe-
 dimento fieri. Cum igitur pro foribus est purgatio, cura me-
 diocritatis non tā esculentorū quā poculentorū, quā fieri
 potest, maxima habenda est: & quippiā eorū quæ ad purga-
 tionem stimulant, sumendū: cuius farinae sunt cum holera odo-
 rata, tum quæ acrimoniā præferūt, puta scandix, crithmon,
 fœniculum, apium, smyrnū. Pravam uulue temperiem emen-
 dare cōuenit. Frigidiores igitur arguit mēsiū retentio, uidus
 gelidioris potentia, & crassi succi, et stupor circa pectinem,
 lumbos, & crura. Quæ uerò ad summum sunt p̄sfrigerata,
 ne uenerem quidē appetūt: expedit igitur cum alijs remedijs,
 tum fotibus quibilibet, tum ys quæ suffutibus constant, reuo-
 care calorem. Neq; abominandum fuerit, castoreum potare.

& si 4

Et fragrantia semina, cuminum, anisum, pulegij comam Et
 iuniperi baccas, unicuique pipere commixto. Vteri uero fetus,
 partim uapores erunt, qui inferne per sedem in sinum pudenda
 excipiuntur: partim calida aqua abluendo fiunt, in qua elixa
 sit salvia, artemisia, ruta, cyperum, pulegium, acorū, Et quae
 bonum emittunt odoris fluxum semina. Cataplasmate ex sin-
 gulis pedinem illinemus. Conducit non minus Polyarchium
 epithema. Frictio porro pedinis atque coxendicum nulli alij
 praesidiorum cedit. Vtitor etiam pessis ē myrrha, ruta, galba-
 no, Et castorio, fomento genitalium locorum prius facto ex
 aqua mulsa, siue marina. Probatur ad haec pessus qui appella-
 tionem Gona obtinuit. Calidiores locellos testantur corpus to-
 tum calidius, mensium paucitas, qui cum labore erumpunt, et
 exulcerationes muliebrium naturalium. Succurritur itaque
 mediocriter humectantibus, Et perfrigerantibus: cuius generis
 sunt olera, lactuca, malua, blitū, cucurbita, cucumis, pepon,
 atriplex, portulaca, atque id genus esculenta alia. Vesicae, imo
 uentri, lumbisque refrigerantia adhibentur cataplasmata, suc-
 ciisque illinuntur. Quod si humiditate muliebrium locellorum in-
 fecundae non concipiant, in media re uenerea madore profun-
 duntur, tenuioresque Et copiosiores defluunt menses. Vidus
 ratio sic habentibus proficit aridior, pariter Et labores, fri-
 ctionesque superiorum partium, simul et uomitus, cibariaque sic-
 ca et mediocria. Ex re praeterea usuque fuerit, ipsam quoque uul-
 uam medicaminibus acerbis continere, ē quorum numero ha-
 betur lentisci elixatio, Et myrtorum, Et rosarum, Et rhus,
 praeterea mali Punici floris, Et foliorum rubi, atque gallae.
 Vtero contra aridiori, contrariis occurritur auxilijs: lauacris
 inquam, Et unguentis, cibisque humectantibus, Et holeraceo
 nutritiuo uino mediocri, haud admodum ueteri. Si propter
 crassiores humores fecunditas frustratur, siquidem mordax
 humor insisset, mulierem probe purgare a quolibet humo-
 re, familiari medicamento, maxime tamen picra ex aloe:

T 2 deinde

deinde sero lacris eluere, uicibusq; rationem exquisitiorem dissi-
cere cōuenit. Pituitosos aut humores exercitijs, sudationibus,
uomitionibusq; , siue per inferna euacuare expedit . Oportet
insuper ex pharmacis epithymum, euphorbium, piper, semen
dauci, semen petroselini, singula contusa pondo duūm drach.
potui dare. Hoc per uentrem etiam pulcherrimè deducit, uul-
uāq; calfacit, quēadmodū saepe iam mēses quoq; rupit his, quæ
purgationē non sunt expertæ. Quando aut remedia profecisse
cōstat, mēstruis purgationibus rectè expeditis, cessante purga-
tione, in uenere[m] congregari consultū est. Quandoquidem autē
spiritus similiter in utero conclusi, facultatem concipiendi pro-
hibēt, notas ex his, quæ de uulua inflationibus prodita sunt, de-
prehēdes. Medendū uerò talibus primūm cibi abstinentia, mox
cyminiū, anethum, apij semen, rutæ, anisi, & aromata pleraq;
offeruntur, partim quidem potanda, partim uerò apponenda.
Conniuentes porro mulierū uuluas aperire conuenit, fragan-
tibus, iniectis lauaminibus ex malua, & semine lini fœnogra-
ci, & oleo, interdum etiam melle. Vehementioribus item arte-
misia, cunilagine, nepita, pulegio, & anthemide; ad hæc resi-
na quoq; terebinthina, nitro, cucumere syluestri, elaterio, cassa-
sia, & liquida pice. Quibus ostium hiat, his uicibus, sotos, medio-
camenta aridiora, & constringentia, cytini malorū Punico-
rum, lentiscus, rubi radices, myrta, & quæcunq; in humidiorē
uulua expediunt, accommodantur. Peruersiones deniq; uulua-
rum, fomentationes corrigunt, & mollitoria si inferuntur.
Coitus postremò qui à tergo exercetur, plurimū momenti ad
partus conceptionem conferre uidetur.

De uulua rhagadibus, condylomatis, & hæmor-
rhoidibus. Cap. 75.

In uteri ostiolo, rimæ (quas Græci rhagades uocant) quan-
doq; ex uiolento partu proueniūt: quæ primum quidē recē-
tibus etiamdum ex puerperio doloribus delitescētes fallunt,
postea uerò paulatim sensu percipiuntur, nūc attrectatu, nūc in
congressu

congressu uenereo, dum ex attritu polluantur cruore. Agnos-
cuntur uerò sinu pudoris adaperto: scissionses enim, rimæq; in
ostij corona speculantur. In quibus sanè chirurgi operam, &
erodendi uirtute prædita medicamina respuentes, simplici-
bus infessionibus atq; pessis utemur. Cōfert etiā tetrapharma-
cum dissolutū. Quòd si labris callofis fuerint rimæ, cōpositio
ne ex charta, cum rosaceo utendū. Si autem uehementiam eius
laborans non sustineat, iridem illyricam resina terebinthina
exceptā imposito. Hulcusculis uerò cicatrice obductis, magno
cum emolumento adhibetur medicamentū ex cadmia, aut eos-
rum aliquid, quæ sedis affectibus dedicata sunt: cuiusmodi est,
quæ ex spuma argenti contextitur confectio. At ubi eiusmodi
fissuræ uetustate in condylomata degenerarint, consimilibus
discutiendæ, & ad cicatricem quamprimum reducendæ sunt.
Hæmorrhoides præterea in muliebrium locorū ostio siue cer-
uice nascuntur, quæ in partibus speculi artificio deprehendun-
tur, quia in exacerbationibus sanguinolentium, subrubrūq; tu-
berculum excrucians, euidenter apparet. In uitij uerò relaxa-
tionibus fluor dolore uacans, subliuidus, feculentus excernitur.
In quibus igitur loci commoditate fieri potest, per morbi indu-
cias, amputari mydio instrumento debent. Sin minus, medica-
mentis restringendæ sunt, nunc quidem aridis malicorijs, adie-
cta galla, aut quopiā eiusmodi adplicatis: nunc uerò his quæ in
sanguinis uteri profluvio cōprehensa sunt, adhibitis: quæ etiam
diarrbis, & sanguinis fluxū patientibus congruunt. Hoc po-
tissimum discrimine discernuntur, quòd uterus per interualla
continenter cruorem emittit, non eo solum, quo menstruas ex-
pedit purgationes, tempore.

De difficultate pariendi. Cap. 76.

Pariendi difficultas, uel parturientis, uel foetus, uel loculi, uel
à foris euenientiū uitio accidit: parientis quidē, si nimium
crassa & præpinguis, aut uulua tota iusto arctior sit, aut do-
lorum imperita, aut pauida, aut inflammationē circa uterum,

T 3 aut

aut alijs partibus experta, aut quocunq; alio morbo affecta, aut suapte natura imbecillior, minus ad fœtū propellendum firma, aut quia parturitionē int̄pestiuē accelerauerit. Fœtus aut cūctio, si inusitata magnitudinis, aut paruitatis, et modicæ grauitatis, aut amplissimi sit capitis, aut mōstrū (uerbi causa, biceps: aut mortuus) aut uiuens quidē, sed imbecillis, neq; potens in lucem progredi: aut si numerosi fœtus, quinos nanq; simul editos asserit Herophylus: aut si naturæ contrariam habuerit in utero figurā. Naturalis etenim nascentis figura est: Prima quidē, in caput uergi, manibusq; in femora protensis, procliui directē ad orificiū capite. Proxima uerō, si fœtus rectā in pedes conuersus est. His exceptis, reliquæ omnes parturienti formæ præter naturā sunt. Vitiō autem loculi, partus redditur difficilis: si propter crassitiem non auellatur: uel si antequam conueniat, præ nimia tenuitate abrūpatur. euacuato nanq; humore, fœtus propter ariditatem ægerimē delabitur. Ex his quæ foris occurrant, ægra sit parturitio, uel frigore, quod uterū cōdensauit: uel calore immodico, qui uires deiecit: aut alio quopiā euētū fortuito incurstante. Si igitur astrictio, quasiq; obturatio difficultatis paricidi author sit, laxatione primitus succurrito, infundendo largiter oleū dulce, et calidū, et decoctū scēnogræci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiam oua, doloris mitigandi gratia. Deinde pubem cum imo uētre et lumbis, cataplasmate illinito ex semine lini, aut aqua mulsa, aut hydreleo, in se sibusq; similib. A balneis remedia quæ relaxent, cōmendantur, nisi febris, aut alia quæpiā prohibeat occasio. Mouetoq; parientē lectica, in acre temperatē calido. Nonnulli uerō cōquassationes ualidas, sternutamētāq; adhibuerunt. Meticulosam adhortamur, in expertā doloris, doccimus, ut ualidissimē spiritum contineat, et ualidiore nisu conceptum ad os uteri protrudat. Quæ animi deliquiūm pati cœperit, ijs quæ stuporem arcent odoramentis recreanda est. Reuocatū mediocriter, modico cibo reficimus. Præpinguem
ad

ad l. ſtulum ſupinam collocabimus, contraſtis ad femora genubus, quod uulua pub̄ uerſus tendens, ſtulo directè opponatur, quod cerotarys & inunctionibus delinire digitis cōuenit, ac leniter aperire. Si quis præterea morbus has partes infeſtauerit, etiam huic proſpiciendum. Alui excrementum detentum, molli clyſtere extrahendam. Secundas autem clauſas, digitis aut ferramento quod polycopon uocatur, in ipsis digitis occultato, diuidere oportet, laua manu prætentante, & pinguem aliquem humorem in uulua loculamentum per clyſterem immittimus. At ſi præter naturam iufans figuratus ſit, ad naturalem figuram redigendus eſt nunc quidem impellendo, nunc uerò adducendo, nunc ſtendendo, nunc uerò dirigendo. et ſi quidem manum prætendit, aut pedem, membro apprehenſus extrahendus non eſt, magis namq; affirmatur, aut luxatur, aut membrum etiã dilanatur: ſed digitis humero aut coxen dici conceptus affixis prominens eius particula denuò in locum conuenientem reuocanda eſt. Si toio fœtu in ſeſe conglobato perperam figuretur, ſurſum prius ipſum ab uteri oriſicio ſublimem euomere: deinde prehensum denuò, ad os ipſum dirigere conſilium eſt. Quod ſi plures uno fœtus deferantur, iterum à ſuperna infernaq; parte reducito: uerùm ut omnia leniter, & abq; membrorum offeſa traſtentur, locis oleo perſuſis. Tempus in ſellam collocandi parturientem eſt, cum uulua oſtium apertum digito ſubcidit, & quod præruptum eſt, prolabitur. At ſi quodd mortuus ſit infans, aut aliã ob cauſam progredi moratur, extrahi neceſſe eſt.

De coxendicis affectibus. Cap. 77.

Iſchias, hoc eſt, coxendicum afflictiõ, de genere omnino morbi articularis exiſtit, niſi quod cauſa ipſius coxæ inheret: Quæ eſt craſſus & pituiſoſus humor, qui in coxëdicis cõpagoet articulo cõcretus innititur. Dolor uerò à natium gibbo pube q; ad genna uſq; pleriq; autem ad extremum uſq; pedis calcaneum peruenit. Quum igitur circa prima morbi rudimenta

menta in languentem incidimus, facta alui scyballorum per
 clysterem euacuatione, ex uena cubiti sanguis detrābendus est:
 si dolor inueterauerit, à malleolo affecti cruris detractio mo-
 liatur. Per morbi quidē insultus, istac irrigatione utemur: Cy-
 prini cyathi octo, aceti quatuor, nitri duo, seminis roris mari-
 ni iouis, laniis succidis calida imponuntur. Post id cataplasma
 ta applicentur ex amarorū lupinorū farina, cum oxymelite,
 farina' ue lolleacea, cum resina, et cucumeris erratici radice,
 & nitro, & nepeta, & semine roris marini, & baccis lauri.
 Cæterum nepita per se magna cum utilitate cataplasmatibus
 modo cum oxymelite, aut mulsis imponitur. Emplastro præ-
 terea mitigatorio utendū, in quo cere drach. centum, terebin-
 thina uiginti quinque, eruginis sex, myrrhæ galbani, ireos, sin-
 gulorum drach. sex, cedriæ quinque. Cæterū potionandi prius
 sunt ipsi succo Cyrenaico erui quantitate, aut castorei drach-
 ma, cum opopanax triobolo. Porro capparis radice cortex
 potius, & cataplasmatibus immixtus confert. Quod si dolor in-
 tensus urgeat, tum anodyna medicamenta locū habent: uerbi
 causa, confectio Philonis, & quæ è duobus piperū generibus
 contextitur. Clystere uerò utimur illo: Mellis cyathus unus &
 dimidius, olei sesquicyathus, aquæ cyathis bini, nitri denarij o-
 cto, terebinthina drach. quatuor. His calidis aluo immixtis, cir-
 culum ani fouere expedit: ut per morulā longiorē continean-
 tur. mucosum humorē euacuat, nonnunquā etiam sanguinē,
 cum plurimum præsidij cōfert. Si his actis malū non cesserit,
 quod rarenter usuuenit, tum denud frequētius id ipsum usur-
 pandum, aquæ loco cētaurij decocto admixto. Sanguinē uerò
 cit capselle herba semen infernè inditū: liquor item cucume-
 ris erratici, et medicamentū quod ex ipso cōficitur, uel oleum
 quod è radicibus eius contextum est sycionium: & salforum
 piscium muria, & oliuarum colymbadum per anum utiliter
 infunditur. Cucurbitula insuper sunt cum plurima flamma
 & scarificatu coxendici adglutinanda: interdum etiam hiru-
 dines,

dines. Morante autem diutius hac ægritudine, aggrediunda est purgatio ex hiera, aut colocynthide, exhibendo medullam propè læuigatā & maceratā pondo drachmæ unius, in mulsi cyathis duobus, siue non multo plus minus'ue, pro uiribus languētis, aluiq; facilitate. In aqua uerò mulsa ruta elixetur. Puls item colocynthidos sic affectos probè expurgat. Vomitus in super cū radiculis elicitus, intra initia quibusdā auxilio fuit. Morbo remittente, dropaces inungendi sunt. Utendum quoq; acopo ex euphorbio, præcipuè eo quod pæcilum, hoc est, uariū appellatur. Lauacra quoq; naturalia accommodata sunt: si hæc ad manum non sint, in alys lauare balneis, & memoratis indoloris uti debent. Mixturisq; nitrīs, Asclepio, compositione ex euphorbio, adarce, nigro ueratro, castorio, pyrethro, pipere, et staphide syluestri, æquis portionibus. Post balneum picis aridæ uncie tres, sulphuris uiui duæ, calidæ adhuc cuti inspergantur, & cooperiantur charta. Si hæc nihil profuerint, reliquis morbi restantibus præstat sinapi cum caricis, aut per se cataplasmatīs more imponere. Persanat autē ipsos ex ædissimè iberidis herbæ usus, quam & lepidiū, nonnulli uerò agriocardamum appellant. Nostras uerò fruticosa est, folia lauri cōparia, & longè maiora possidens: quæ multa experimenta scapius nō modò in coxēdicis ægritudinibus, sed in alys etiā diuturnis affectibus dedit. Cæterū efficaciora multò sunt æstatis tempore. Quòd si tum nulla detur foliorū copia, radicis corticē cum adipe suillo cōtusum, emplastri modo linteolo denso impaētū, locis maximè dolētib. imposito, puta gibbæ, natiū regioni, & femoribus, atq; tantisper dum nigrorē induat, aut omnino luescat cutis, finito: deinde ipsum demito, lotoq; laborāū cerotarium illud impingito: Opopanacis uncie quatuor, aceti cyathis duobus diluuntur, & ceroto cyprino excipiuntur. Verū si tam ardentium usum respuunt, instaurantibus emplastris utendum: cuius notæ fuerit, Cera, resinæ picæ, singulorum drach. duodecim, terebinthinæ, syluestrium

columbarum fimi fecula uini recentis cremata, uniuscuiusq;
drachmæ sex, galbani unam et dimidiam. Sed et ea quæ Lece-
na appellationem habet, est numero reficientium iudicatur. Con-
ferunt item quæ ex lixiuio quod destillauerit, et nitro conte-
xuntur. Potionibus nonnulli continuatis per annum usi sunt, et
quibus est medicamentum diatesaron, trixaginis libra, gen-
tiana uncia novem aristolochia octida tantundem seminis
rutæ aridi sextarius. hæc trita et cribrata singulis diebus co-
chliary quantitate exhibenda sunt ieiuno, et ei qui probè confe-
cerit cum aqua gelida cyathis duobus, per annum, quod mor-
bus discutatur: necnon diabepta, quod est et sepiè compositum,
et quod Procli cognomen habet, eadè pollicentur. Nam ex-
ercitationes quæ in ambulando, cōtinuis flexionibus, saltibus,
et cursu perficiuntur. Alimentum sit mediocriter attenuans,
et quod concoctioni minimè resistat. Quod si nulli prædicto-
rum cesserit morbus, in suppurationem transit, quandoq; laxa-
tis nervis ligantibus uertebra luxatur. Proxenie se igitur
longius a gritudine, iunctura tribus aut quatuor locis exuren-
da est, quemadmodum in opere chirurgico memorabitur: ad
compluresq; dies hulcera aperta, ne cicatricem obducant, ser-
uanda sunt.

De Podagra & Arthritide. Cap. 78.

Podagricus et articularis cruciatus, non solum ex imbecil-
litate particulari corporis proficiscitur, quoniam accessio-
nes indefinenter adfluerent, quatenus et infirmitas continuè
imbecillibus articulis adfluit. Neq; etiā ex humore scilicet, quo-
niam non in articulis modò insidet affectio, sed utraq; et humor
præter naturā, et particulari debilitas, morbum articulare
suscitant. Cum enim membrorum nutritrix facultas debilior ob ci-
borum affluentiam defatigatur, cruditates continuè obueniunt.
Sanius igitur humor superabundans quacumq; articuli iunctu-
ram prius debilitatā occupat, colligantesq; nervos distendens
dolorem excitat. Neq; enim principales nervi, quibus arbitra-
rius

rius cietur motus, primaria affectione inflāmantur, quoniam in medijs articularū internodijs inflammationem oriri oportet: uerbi causa, cruribus, aut femoribus, aut genu, aut cubito, aut humero. Sed per consensum tamen, quem cum articulis ineunt, idē nerui afficiuntur. Quā diu igitur pedū articula-
 menta humor infestari; duntaxat, podagra morbus nuncupa-
 tur. Cum autē in reliquos corporis articulos causa penetraue-
 rit, iam tum articularis morbus appellari cōsuevit: quo nomi-
 ne uertebra, humeri, maxilla, atq; uniuersi deinceps articuli
 languore impliciti cōprehendūtur. Nonnullis aures quoq; &
 dentes, & guttur, & interdū etiam iecur, & lien, articularijs
 doloribus oblanguent. Quibus nisi protinus malū in articulos
 crudet, laborantibus periculum imminet. Exuperans uerò hu-
 mor, nunc quidā biliosus, nunc uerò sanguineus, quandoq; me-
 lancholicus, magna uerò ex parte pituitosus ac crudus est, ex
 alimentorū redundāte copia, et cruditatibus et ocio cōflatus.
 In articulis nāq; si lōgiore tēpore inueterauerit, inspissatur, et
 glutinescit, ita ut lapidosas articularum durities, quas tophos
 Romani, poros Græci nuncupāt, efficiat. Nonnunquā uerò di-
 uersi commiscētur humores. Proinde cognitu curatuq; diffici-
 lius est uitii, & tantū nō immedicabile malū. Auctores huius
 mali plerunq; sunt, labor immēsus, inambulatio uehementior,
 iugis equitatio, et intēpestius rei ueneræ usus, insolita gelidæ
 potatio, et frigidorū, aut pluriū, aut prauorū esculentorū esus,
 & uini largioris usus. Quin et ex prolapsu quidā, aut propul-
 sationibus, aut luxationibus, aut id genus, primā morbi tenta-
 tionem auspicati sunt: antecedēte interim in corpore materia,
 quæ antea quiescebat, sed quam euidēs causa mouet. Mœstitia
 autē, solitudines, uigiliæ, & reliquæ animæ affectiones, non
 solum prauum humorem concitant, sed etiam siue primariè,
 siue per accidens pariunt. Variæ itaq; sunt afflictionis huius,
 ceu didū est, causæ: humorū tamē negociū facientū differen-
 tiæ, haud difficulter locis quibus impacli sunt, perspicuè red-
 duntur

duntur, tum coloribus, tum cæteris accidētibus prodita. Biliosus namq; fluxus colore sublurido et rufo deprehēditur. Idem caloris insuper sensum ingerit, cruciatumq; acerbiorē efficit, & protinus ad supremā cutem, citra amplum tumorem erumpit, calidū rerum impositu magis exacerbatur, quemadmodum ediuerso frigoris placatur: quod quidem cæteris ferē omnibus magna ex parte, peculiariter uerō alijs biliosis cœrit. Febris item sæpenumero in accessionū summis uigoribus accedit, ualdeq; sitibundi redduntur. Consimili modo et in melancholicis, atrioris coloris corpus deprehendas: sicuti in pituitosis, album & aquosum corpus cernitur, unde minus cruciantur, & serius tumēt particula. Perinde atq; si sanguineus humor in corpore abundat, cruentum colorem membra præferunt. Sed ad exactiorem indicationem iuuabit te superior uicinis ratio, & cætera.

Curatio eorum qui ad biliosum humorem fluxum referunt.

Caput curationis eorum qui flaua bile confluantur, magisq; ipsius qualitate, euacuatione infestantis humoris, per medicamenta purgandi uim habentia tentabitur: cuius est modi potissimum quod ex rhodomelite contextitur, & quod ē malis cotoneis constat, & quæ ex hiera picra conficitur antidotus, & ex aloe præparata catapotia. In accessionibus uerō foris rosaceo cum oui luteo, modicoq; uino utemur, leniter particulam infricando, demulcentes herbas quoq; frigoris admo uebimus: uerbi causa, solanū, portulacā, herbā apollinarem, semperuiuum, lenticulā lacustrē, serin, papauer, seminale, rosarum folia, atq; consimilia. Quæ nunc quidē seorsim, nunc uerō cum micis posca irrigatis illinūtur, farinæ hordeacea cum rosaceo cataplasmatibus modo imponuntur. Cum autē erysipelatis naturā sortita fuerit artuum inflamatio, solatur eximie impositus cucurbitæ recentis cortex, peponis & cucumeris caro, cum per se, tum adiecto pane: perdicij item folia, & hederæ cum pane, aut hordeacæ farinæ polline; psyllium quoq;

quoq; cum polenta elixum, feruores flagrantium inflammationum mirificè lenit. Rosaceum itidem cerotum cum aliquo liquore frigorifico illitū, & ex lomento medicamentum. Constat autem ex his: Cerae uncys quinq;, chamæmelini duabus et dimidia, rosacei utriusq; uncys duabus & dimidia, lomenti fabacei semuncia, ouorum luteis quinq;. Aliud cataplasma: Maluas uirides coctas contere, & psylliū separatim in lentorem reda&it admisce: deinde ouorum luteis adiectis, oleoq; chamæmelino, cataplasmatibus instar impone. In multo ac intolerabili cruciatu medicamine è croco et glaucio, et opio utendum, posca dilutis & circumlitis, aut cum mica panis cataplasmatibus more impa&is. Sed hæc Galenus cōmendat: Succis papaueris drach. quatuor, croci unā, cum lacte bubulo siue caprino, uel panis medullam iniice, & subactam rosaceo assume, cataplasmateq; utitor, uel opium, & crocū cum lacte trita, ceroto rosaceo excipe. Cerotū uerò ex turpene eandem uim in paroxyzmis obtinet, atq; oleum ex eadē expressum. Eiusdem generis est: Panis mica aqua uel posca macerata, semperuiua, uel strichni, uel portulacæ, & palmularū carnibus, et papaueris semine, æquis portionibus, cum ouorū assatorum luteis, & rosaceo quantū satis est, cataplasmate imponitur. Cæterum quæ membris torporē inducunt, minimè probantur: præterquam ad cruciatum uehementiā leniendam: plurimus quippe narcoticorum usus, meatus obstruit, tophaceas durities, & diuturnas motionis difficultates procreat. Post anodynorū itaq; usum, uel cōfectione ex succis herbarū facta cum chamæmelino temperata utendum, aut ea quæ constituitur ex althæa, aut aliquo eiusmodi medicamento. Vbi uerò pars affecta refrigerata, calfacientibus instaurata fuerit, robur membro, palmulato, dicitur quod uinulus nomināt, aceto rosaceo, aut uino rosaceo soluto inducemus. Quæ si detrectent emplastra, acaciæ succū è posca, aut lyciū cum croco, & glaucio, et succo perdicij cū posca illinito. Videtur insuper frigorificus et humectans expedit: cuius causa,

causa, ptisana, è chondroq; sorbitiones: & ex holeribus, mala-
ua, lactuca, intybus: ex auibus uerò domesticis, maximè pulli:
& ex piscibus saxatiles, echinus, pedines, atq; id genus. Deui-
tanda sunt omnia quæ calfaciunt, bilemq; pallidâ atq; flauam
pariunt: uina itē uetera, uermicola, nigra, satietasq;. Lavacris
uerò ex potabilib. aquis utendū, et circa ipsos noxij humoris
fluxus, quatenus causam exhibent: & cū absunt, si nihil prohi-
beat. Arceri etiam debet excandescencia, inedia, acrium esus,
ebrietas, labores immensi, & ueneris usus.

Curatio, sanguineo humore artus tentante.

In quibus uerò sanguineus humor abundat, in his sanguinis
detractione confidenter utendū est: enim uero id etiam in pitui-
tosioribus, aut ualde melancholicis: quoniā in eorum uenis hu-
mor plurima ex parte quantitate magis quàm qualitate infe-
stans cōtinetur. Tentanda est itaq; in prima statim ægri tudinis
aggressionē, sanguinis detraçtio: quoniā qui sæpius huiusmodi
defluxionibus cōfliçati sunt, sanguinis euacuatione læduntur
magis, quàm adiuuētur, præcipuè quibus natura frigidius im-
becilliusq; corpus est. Post sanguinis uerò missionē, alys etiam
humoribus redundantibus, pauculo temporis spacio, etiam ex-
hiera purgatione utemur. Verū oxymel Iuliani hos etiam
appositè purgat. Qui autē eiusmodi purgatoria medicamenta
abhorrent, catapotys utantur quæ recipiunt aloes, colocynthi-
dos, ueratri nigri, scammonia, singulorū unciam, euphorbij,
nitri, utrobique semunciam, succo brassicæ excipito, & pro ui-
rium ratione porrigito. Præstabit autē, si cū malorū cotoneo-
rum succo in globulos digerantur. Aliæ pilulæ in acceßionib.
& in remissionibus, cuiuscunq; humoris causa podagricis ex-
hibendæ: aloes uncia sex, agarici dimidia, croci tantundem,
costi, spicæ nardi, rotundi uinci odorati floris, carpobalsami,
singulorum uncia, cassia duæ, scammonia tantundem, epithy-
mi uncia treis & semis. Dosis mediocris, dioboli duo: consum-
mata, dioboli quatuor. Catapotia similiter ex lapide Arme-
niaco

niaco mirifi. è purgant, & priuatim articularijs cruciatibus expediunt, tum in fluxionum initio tum in incremēto, tum in inclināte morbo exhibita. Sed cum non desint, qui scammoniam ceu stomacho offic. eniē damnent, ministranda illis, præcipue pituitosa materia redundāte, hæc sunt: Colocynthis interioris, hellebori nigri, bdelli, gummi, aloes, singulorum uncia, nistri Alexādrini, euphorby, uniu. cuiusq; uncia dimidia. Modus est instar diobolorum quatuor. Ego gummi loco epithymi posuerim. Quidā inter ipsas accessiones cuiusuis cruciatus articularis, hermodactylo ad alui subductionē utuntur. Ceterum attēctio opus est, stomacho nanq; hermodactylus offic. ut: nam anxietatem inappetentiamq; inuehit. In solis igitur his qui negotijs inuitabilibus obstricti sunt, eo utendum: breui quippe, & cum plurimum post biduum omnis inde fluxio cohibetur, ita ut consueta obire possint munia. Noui ipse quempiam, qui substantiam hermodactyli nunquam præbuit, neq; quippiam ex eadem compositorum medicaminum: sed herba ipsius decoctum, cum aliquo solenni medicamine, cuiusmodi est anisi, aut apy decoctum, potui dabat, & suspiciendo quodammodo uentre concitato, humoris impetū compecebat. Sed quoniam stomachum, ceu didicisti, ledit, his postea quæ stomacho conducunt, & robur inducunt, cum mediocri calfactione os uentris corrigere conuenit. Sed ex coronopodio medicamentum præstare Alexander asseruit, eo quod ex hermodactylo conficitur: quod nō secus alium subducit, dolores omnes discutit, minimeq; stomachum offendat. Localia pituitosis imponantur: medico quidem dolore infestante, brassica uiridis cataplasmatibus modo adglutinata, apium, conyzæ, uerbenacæ cretior conferunt. In uehementi autem dolore, farina sænogræci partes tres, lolliacæ pollinis, farinæ cicerum, uiridumq; parietem unam ex mulsæ, aut uino tenui, cum exiguo cyprino, aut nardino, præsertim hyeme imposito. Et brassicæ radicis & caulium combustorum cinis, cum axungia cataplasmate imposita,

impasta, multis opem præstitit. Verùm ad dolorem mitigandum, recentem esse oportet axungia: ad disciendum uerò, ueterem & salsam. Et sterces bubulũ cum farina hordeacea in mulsã decoctũ, aut per se recens humidum, cum folijs brassicæ cataplasmatibus more illitum iuuat. Itidem præstant pilulæ caprinæ priuatim, uel cum farina hordeacea in posca elixæ. Quoniam uerò quidã etiam per ea quæ contraria esse uidentur, adiuti sunt, (nam diuersorũ humorum miscella dignotio nem præcedat requiritur) iam harũ materia promiscuè exponenda est. Cõducit itaq; atriplex, tam syluestris, quàm satiuã, cũ pane cataplasmate factõ imposita. Aut uerbasci folia, cum bulbis & pane læuigata: uel cũ polenta, uel è pulte hordeacea cataplasma. In uniuersum, ubi abdita morbi causa est, uarijs quoq; remedijs pugnandũ est, nunc quidem cõsimilibus, nunc uerò planè contrarijs, neq; ysdem tamen diutius insistentium. si nullo sunt præsidio. Hæc quippe in arte medica obeunda, quotidie cõtinerere cernimus idem remediũ, articuluũ unum quidem iuuare, alteri uerò in eodẽ & grotante inflammato, non modò non auxilium eodẽ die præstare, uerũ quandoq; etiã non sine magna demiratione offendere. Vnus enim et idẽ sæpenumero articulus ab eodẽ remedio nũc quidẽ iuuatur, paulo uerò post ab eodẽ inflammationẽ cõcipit. Nunquam igitur cum uiscida & crassa materia præcellit, calidiora adferũt præsidia: acriter autem ac feruentiore humoris qualitate superante, refrigerantibus placantur dolores. Nihil uerò mirum, si frigidior materies inflammationis tẽpore acceditur, æstuq; ferueat, ut bilis, si ita contingat, admixtionẽ præteream. Tophos porrò in articulis coalescere, lupinorũ farina cum oxymelite, aut posca, uel laserpitio, aut bryoniæ radix cum pane prohibent. Et hoc sine offensione dolorẽ mitigat, et modicè dissipat. Lycij unciã, guttæ ammoniacæ thymiamatis tantundẽ, trita cum uetustissimo uino, & oleo omphacino elixato, lomento quod satis est, adiecto, cocta mediocriter cataplasmatibus instar adglutinato.

Post

Post summum uerò uigorem, tumore relicto, bulbos per se, uel cum farine tenuissimo flosculo, usq; ad laniationē illinito, sic enim efficaciam exerunt. Quod si dolores cataplasmatibus nihil leniuntur, irrigationibus membrorum, calidisq; affusionibus ex alto opus est, præsertim si partes tumētes fuerint extremæ. Ex chamæmelorum, & fertulæ campanæ, aut centaurij decocto: nonnullis uerò solum capparis decoctū satis auxilij tulit. Id uerò omnium efficacius fuerit: Thymum in aceto acerrimo, & origanum, & saturciam, & nepitā decoquito, eodemq; aceto locos affectos foueto: non semel modò, uerum sæpius in die fidenter: cō pluribus, namq; hoc profuit, non pituitoso solum humore languēibus, sed quibus flaua etiā bilis fuit infesta. Sunt qui quod infra scribitur, obseruauere: Illicis glandes læuigatæ contunduntur, & quàm plurimū decoquuntur, quo decocto ab initio statim articularis fluxus, extimi quidē artus ad bene longum tempus asperguntur: sed interiores particule spongys liquore tinctis fouentur: hoc enim modo impetū materiæ reprimunt. Idem his qui è bile hoc malo laborant, accommodatum est: quemadmodum & aquæ calidæ sine elixatione perfusio. Aduersus porrò eos qui ex intensissimo frigore oriuntur dolores, & constrictiones articularū, ualidissimum est remedium, quod habet olei ueteris sesquilibrā, nitri Alexandrini libram, resinæ terebinthinæ librā, euphorbiæ unciam, iridis sextantem, fænogræci farine sextarium unum & dimidiū. His etiam ea quæ in coxarū morbis recensuimus, pulchrè conferunt: plurimi namq; in sic perfrigeratis, in remissionibus morbi etiam sinapi, cum caricis, & alijs phœnigmis usi sunt, aliqui etiā composito ex cantharidibus medicamēto: sed hæc in posterum noxam inferūt, nisi aliquo etiā ex mollificatibus utantur: qualis est compositio ex lanaria, diastrutheon uocant, atq; pyxide, et basilio, & medicamine ex abiete, item ex populo nigra, & bromio, & lysiponio, atq; acopis adhuc uehementioribus. Quorum autē articuli nerueo potissimè consortio affliguntur, suc-

V

ciq;

ciq; impati ipsis constringuntur, hys ex muli lotio fotus, in sum-
 mis præcipue morbi incrementis, gelidioribusq; defluxib. con-
 fert. Pari etiam modo is qui è duobus ueratri generibus consti-
 tuitur pastillus, turgidis laxisq; tumoribus congruit. fomenta-
 tio ite ex frigidis salibus, aut aquæ aliàs marinæ calf. &c cum
 spongys conspersio, & ex salibus emplastra; & quæ ex stilla-
 titio lixiuio, nitroq; & his non dissimilia cataplasma post
 morbi uigorem opitulantur. Videlus ratio aridior ita habentia-
 bus conuenit, et ab excrementis superfluis aliena, atq; inedia,
 aut cibi frugalitas: quotidianus balneorū usus uitadus est. Post
 lauacrum uerò ex nitro, alysq; abstersionibus utantur. In dolo-
 rum relaxationibus exercitia, ac frictiones præsertim artuum
 magna cum utilitate adhibentur. Balineis naturalibus, necnon
 fabulosis etiam fomentis uti alienū non est. Probantur & uo-
 mitiones ex raphanis, cibarijsq; elicita. Qui suapte natu-
 ra huc sunt procliuiiores, etiam cum ueratro, coq; candido e-
 uacuabuntur, si per uomitum, uel per aluum etiam inferiorem
 expurgentur.

De his quorum sanguinei humoris fluxus
 artus infestat.

Qui sanguinei humoris influxui articulariū dolorem acce-
 ptum referūt, postquam sanguis in principio morbi detractus
 est, prædicta subsidia foris inieciuntur. Biliosior quidē si fuerit,
 et acrior, naturæ modum excedens sanguis, ea quorum in bile
 propriè meminimus, adhibeantur. Si frigidior, pituitosiorq;
 aut melancholicus redundat, his quorum postea mentionem fe-
 cimus, exceptis nimium acribus, occurrendū. Si malum inue-
 terauit, ysdē etiā ipsis locus erit. Verū illud etiā cataplasma
 intra principia statim expedit: malicoriū, rhus coriariū, atq;
 farina in uino eliquata, cataplasmatibus modo inducuntur.

Aliud: Folia brassicæ cocta, & exquisitissimè læuigata, fece
 aceti iniecta, & ouorum crudorum bina lutea: & rosacci pa-
 rum, cōtritaq; simul identidem cum assidua permutatione im-
 ponuntur.

ponuntur. Alimenta quæ extenuant, parumq; nutriunt, assu-
menda sunt. A carnibus itaq; et leguminibus, luinoq; multo ac
nigro abstinetur. At si fieri queat, uini potus ex toto deuitan-
dus. Non paucos equidem noui, qui ab hoc solo in totum ab-
stinentes, omnes morbo leuati sunt. alij nanq; in morbi confe-
ctum exordio prorsus conualuerunt: alij uerò in posterum ra-
rius, et minus grauib; accessionū doloribus uexati sunt. Quo-
circa si non cōtrariū hinc eueniat, nihilq; mali inde speretur,
per uniuersum deinceps uitæ curriculum, uinum nunquam ad-
mittant. Quicunq; uerò propter imbecillitatem aut frigidita-
tem succumbere uidentur, per biennium saltem uitam degant
abstemiam: mox ad consuetudinē paulatim reuersi, modicum
atq; aquosum perpetuò bibāt. Oportet abstemios in locū uinē
decoctum anisi, uel alicuius id genus seminis potare: à fugacia-
bus pomis, & reliquis refrigerantibus, uenerisq; usu pro uiri-
li abstinentes. Atqui sumptis anni spacio pharmacis, languen-
tes prorsus à morbo uindicare conati sunt, plures quidem pia-
tuitosioris & excrementitiæ naturæ iuuerunt: calidioribus
uerò & aridioribus repentinæ mortis autores extitere, ad ali-
quod interaneum, puta renes, costas, aut pulmonem, aut prin-
cipem aliquam partem, translata materia. Satiùs igitur fue-
rit biliosioribus, plurimoq; sanguine præditis, uini usum ex to-
to uitare, quum nemo ex hoc memoratis inciderit periculis. In
frigidioribus autem, & excrementis redundantibus, theriaca
è uiperis utere: crebrius quidem, si concocta fuerit materia, &
præsertim hyeme: rarius uerò æstiuo tempore. aut enim inde
ægritudo discedit, aut saltem lenior redditur absq; prædicto-
rum membrorum oblesione. Verum quoniā nos cōmemoratis
aliqui uti cogūt antidotis, genere nō dissimilibus: scito id quod
Damasoniū, et Agapetium nūcupatur, et atacton, et octaidon,
& quod ad Proclū autorem refertur, quod ex scordio, itē ex co-
rallio preparatur, atq; cōplura deniq; alia proficere. Omnium
tamen tutissimū est, et si p̄p̄m experientia comprobatur, quod ex

corallio constituitur, & lapidosus etiam articulorum durities in tophum confirmatas dissoluit. Horum uero omnium facultates, & utendi rationes, mali item huius euitandi consilium, in uolumine de Medicamentis inscripto reperies: pari etiam modo medicaminum quæ psilothra uocant, aduersus articulares cruciatus, compositiones, & usus modum in eodem habitu. pituitosiore inquam. Alij uero, qui à toto morbo liberari contendunt, uulpes totas in oleo discoquunt, quo articuli morbo medentur: alij quidem uiuas, alij mortuas capacissimo libeti coquendas iniiciunt. Simili modo & benas elixant, oleum distrahentis potentie conficientes, deinde solia eodem implent, in quæ articuli morbo confligati postquam descendunt, immorari ibidem diutius, artusque perfricare præcipiunt: sequitur inde, ut non articulorum tumores modo, uerum uniuersum etiam corpus euacuetur.

De tophis.

Quoniam inter articulos sæpenuerò topi, interdum quidem ex crasso & terrestri inharere humore, interdum uero ex medicaminum usu, quæ distrahendi & arefaciendi impensius, nulla autem molliendi facultate prædita, conflantur. Sciendum idoneora esse medicamenta, quæ emolliendi prorsus et dissoluenti uirtute obtinent. Molliunt itaque adipēs uetustī, medullæ, gutta ammoniacæ, bdelliū, oleum perquam uetustum, & styrax. Discutiunt autem et arefaciunt nitrū, sal, lixiuium stillatitium, adarce, euphorbiū, & id genus. Cæterum ad tophos in articulis priuatim facit caseus antiquissimus, & acerrimus, cum carnis suillæ pinguis et ueteris decocto tritus et impositus. sua namque sponte, topho debiscēte, quotidie fit euacuatio. Probatur uero ex compositis medicamentum ex perna, experimento comprobatum, quod bifariam concinnatur. Et quæ ex stillatitio lixiui diximus, & id peculiariter, quod habet spumæ nitrī, terebinthinæ, lixiui quod primum destillauerit, propolis singulorum trientem, ceræ dodrantem, colophonice libram, olei uncias sedecim, quibus mixtis tum in tophis, tum in abscessibus uitior.

Atqui.

Atqui illud è cinnabari admirandum quidem aduersus tophaceos tumores, aliaq; plurima remediū præstat, sed inuētū admodum difficile medicamentum est. Quippe quod è leptocaryis constructitur, præter quòd efficax habetur, etiam parabile est: neq; robusti ribus tantum, sed subtilibus etiā corporibus accommodatum si sumat quis confectiois ex melle, aut ex oraci tunica partes duas, ad illius medicaminis unam. Vbi uerò hæc in pròptu non fuerint, dapsimythiū quoq; nō rarò & qualipondere ipsi confunditur. Aliud ad tophos: Sandaracham resinsam leuigatam in oleo quercino excipito, atq; poris discutiendis illinit. Aliud quod ad fistulas & agilopas confert: Olei sextarium, spuma argenti uncias octo cum dimidia, auripigmenti unciam: Spumā argenti atq; oleum, donec manus non inquinat deoquito, deinde auripigmenti farinam inspergito: et priusquam uestionem senserit, ab igne tollito, ac utitor. Epibemata porò ex flore Asy lapidis in morbi remissionibus imposita, ad omnes quæ singulis articulis incubūt, collectiones ac nodos conueniunt, uniuersaq; ægritudine ueterum quorundam testimonio liberant. Creditur item medicamentum ex flore salis contextum, in morbi relaxationibus, compari modo applicatum, reliquias tumoris dissipare.

De euitanda podagra.

Vbi iam podagra, uel morbus etiā articularis constiterit, difficillimè cura commemoratam methodum eliditur. A non dum oborta uerò seipsum tueri et asserere, facilius, si quis cibos circuncidat & ys quæ in corpus facile distribuuntur, superfluitatibusq; uicant, mediocriq; uino utatur, & exercitationibus quantum satis est, indulgeat. Sal in oleo coniritum, et articulis cum frictione impactum, cunctos qui podagricum morbum euitare student, magnificè adiuuat, nisi aridam nimium corporis intemperaturam sortiti sint. Vti autem eo manè, & uespere toto uite spacio, et post inflammationum relaxationes oportet.

V 3

Ad

Ad perniones qui in planta pedis, imisq; calcaneis
eueniunt. Cap. 79.

Perniones bulcerosa sunt affectiones, quæ in digitis manuum pedumq; brumali frigore emergunt. Quas oportet tepida marina, aut betæ, aut lenticulæ, aut erui, uel albuci radicis decocto fovere. Post fotum, lenticulas coctas in uino læuigatas, cataplasmatibus instar imponere: aut ficus tritas cum oleo, aut alumen cum farina hordei æquis portionibus in uino distemperata adplicare: aut fecem subaridam, aut bulbum recentem uino tritum adglutinare: Vel allia in oleo fricta, tritaq; ceram cum mediocri oleo liquefactam injicere. Aut malis coria cocto in uino, & læuigata, cera rosacea excipere, atque uti, irrigatis antea membris rore lupinorum decocti. Vel mannam, aut sulphur uiuū cum melle elixo impingito. Sed alterci etiam succus cōtinuè illitus, inflammationes & dolores sopit.

Marcellium ad perniones.

Rapi radicem excauato, inq; capacitatem eius ceræ uncias duas injcito, oleiq; lentiscini unciam, & in uase duplici cum aqua marina, seu muria aut decocto lupinorum elixato. Partim superfundito, partim ceratum in rapo liquefactum frigidum imposito. Sed in pernionibus exulceratis, thuris, scissi aluminis, minij, resinæ, æquales portiones adipe suillo exceptas illinito. Cæterum ad bulcera cum inflammatione medicamento hexapharmaco utendū, quod habet olei dodrantem, aurini adipis, & fellis, uniuscuiusq; librā, lithargyri uncias sex, colophoniam trientem, mellis scilibrā.

Ad manus digitorum, totorumq; pedum rimas.

Picem liquidam inunge, aut cancerum fluuiatē marinum uel super carbones crematum, testæ ramentum, cum oleo ad mellis crassitudinem contritum, abstersis prius scissuris instillato. Conducit uerò & scillæ interaneum oleo feruefactum, & resina terebinthina eliquata, & cornu caprinum deuſum, caprilloq; adipe exceptum. Sed callos undiquaq; purgare, deinceps medicamentis uti expedit.

Ad

Ad calcaneorum, plantarūq; pedis rimas, antheras.

Calcis uiuæ drach. decē, cerussæ uiginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recētis septuncem, colophonia dodrantem, cremoris seminis lini cyathum, olei dulcis uncias quadraginta. Tam planam mollemq; plantam, quàm ul lum aliud reddit. Aliud: Adipis caprillæ, ceræ, olei, æquis portionibus uiere. Aliud: Malicoria in aceto elixa, cataplasma modo diebus quinque impone: deinde scissuris circumpurgatis, calcem uiuā cum oleo & balneorum strigmento applicato. Aliud: Scillā oleo elixato, ipsam quidē frixam porricito, in oleo autem terebinthinam liquefacito, ac utitor.

Ad edendis attritionibus calcaneis longo decubitu.

Ceræ, olei, spumæ argenti, mellis singulorū partes æquales, ad omnem plantarum et calcaneorū palmæ, atq; internæ digitorum partis exulcerationem conducunt, præsertim si bulcus ungui uicinum sit.

Ad sordida plantæ hulcera, emmoton. Prodest etiam ad ea quæ pudendis adnascuntur.

Amurcæ cyathum, aceti tantundem in arco uase ad meleam usq; crassitudinem decoquito: separatimq; trita, squamæ aris drach. duas, manna tantundē, mollis lanæ succidæ quantum manu capi potest tæda contectæ, & crematæ cinerem totum excipito, ac utitor. In uulneribus quidē uino resoluuntur: in pudendis uerò plantaq; pedū passo. Aliud: Amurcæ, mellis destunati par modus, hoc ipsum gingiuas etiā expurgat.

Ad porrigines ex calce amentorum attritu.

Pulmo agninus, & porcinus, atq; caprillus conducunt: sed corium ueterum sandaliorum combustum, inflammationem quidem sanat minimè: sed inflammatione sublata, opis plurimum suggerit, uel cepa cum adipe gallinaceo copiosior inicitur, aut galla concremata inspergitur, uel acacia aceto diluta illinitur.

Claui prius undiq; repurgatis, aliquid ex erodentibus sue perinducito: uel rubiginē rasilem, uel sandarachā, uel puluerem Syringiacum, aut collyrium Syringiacū gummi loco, gutta ammoniacā exceptū. Est autem clauus, circinatus in orbem callus, colore cādido, clauorū capiti similis: omnibus corporis partibus, sed pedū planta digitis q; potissimē oriēs. Longiori autem tempore euellitur etiam, si scalpello ferreo apex clauī continuē abscindatur, aut pumice atteratur: pari etiam modo & callos. Prosunt uerō lupinorū crudorum deustorum cineres cum melle, aut misy liquida pice exceptū: nigella cum urina pueri uenerē non experti, uel oui croceum, uel putamen fabaceum cum aceto decoctū. Ad hoc in frequēti experimēto est, Cantharidum, atramēti sutorij, castorijq; æquales portiones, terebinthina, emplastri modo exceptæ, et clauo prius undiq; repurgato impositæ. Aliud: Fecis, calcis uiuæ, uisci par modus cū stillatitiæ lixiuia, uel lotio pueri uenerē nō experti.

De unguium uitiis, & primum de paronychiiis. Cap. 51.

Reduuiā, quam Græci paronychiam dicunt, abscessus est, qui iuxta unguis radicem suppurat, quem utiq; etiamdum pusillum inchoantemq; galla cum melle reprimat, & radices agere nō patitur, uel Musæ pastillus, uel iris ex aqua. Sed ubi iam præter naturā caro excreuerit, scopus medicationis est, eam non mordicantibus consumere et rūpere. Faciunt autem ad reduuias, aurii sordes, & lycium. Cum in suppurationem maturuerit huius, acu, ut humor effluat, compungito, spongiamq; aqua imbutā imposito, aut lenticulā aqua eliquatam adglutinato, aut palmulatū cum uino, aut rosis uiridibus, aut aridis aqua irrigatis, leuigatisq;, aut farinā hordei cū aqua. Prodest itidē ad paronychias lupinorū farina, melle uel mulo so macerata. Ad exulceratas uerō reduuias expedit: Aerugi nis, spumæ argenti, sarcocollæ, uniuscuiusq; drach. quatuor. Super linamētū cōcerptū ex uino, itē sponsia imponitur. Sed
necesse

neceſſe eſt carnem undiquaq; ab ungue diuellere ac diducere.

De pterygiis.

Pterygium, carnis incrementū eſt, partem aliquā unguis operiens, ex reduuia neglecta, uel alia eiufmodi occaſione obortū. Cui auripigmentū, uel manna æquis portionibus inſpergitur, deſuperq; motū ex uino atq; ſpōgia imponitur. Aliud: Chalcitidis, ſquamæ, malicorij, æquas partes ficubus affatis, & melle excipito, aſperſo prius decocto ſtibij. Cæterum arefactam pterygij partem circumuellito.

Ad putrefcentia digitorum pterygia, naturaliumq; hulcera.

Thuris, ſquamæ, ſingulorum drachmam, æruginis rafilis ſemunciam, mellis cyathum, cōtere in ſole, tantisper dum ſubflauum induat colorem; deinde utere cum ſplenio, loco prius uino irrigato.

Quæ breui pterygia exiccant & perſanant.

Soreos toſti drach. duæ, thuris tantundem, æruginis rafe drachma cum melle ſubacta, pterygio imponūtur. Facit uerd idem ad reliquas etiam, quæ in iſdem locis oriuntur, hulcera malefica, nigredines, & hulcera putrida. Aliud: Squama æris palmularum carnibus, aut ficuum ſubacta adhibetur.

Aliud: Fimum palumbinū cum tenuiſſimo farinae floſculo in paſſo elixato, atq; conterito: calidumq; applicato. Squamula item per ſe inſperſa arefacit pterygia. Sed frequenter oportet angulum unguis pterygion pungentem, auctum, copario inſerto amputare.

Ad ungues contuſos.

Myrtum, & mali Punici tenerrima folia unguibus adglutinabis.

Ad ungues cruentos.

Vtiliter hordeacea farina cum pice mixta imponitur.

Vt ungues qui doluerunt, abſcedant.

Sulphur læuigatum adipe ſuillo exceptum applicatur.

Vt ſcabri ungues abſcedant.

Viſci quercini, ſandaraches, ſanograci, ſingulorū uncia

V 5 duæ,

duæ, cantharidum, thapsia, uniuscuiusq; uncia, aceti quantu-
 tum satis uidetur. Aliud: Propoleos Atticæ, ceræ, bituminis,
 uniuscuiusq; drach. duæ, sulphuris ignem non experti drach-
 ma. oleo non inquinentur. Vbi usus poscet, calfa&u unguibus
 circumlinitur. Aliud: Picis liquidæ, ceræ, colophonis, tere-
 binthinæ, guttæ ammoniacæ thymiamatis, sulphuris uiui,
 spuma nitri, æquis portionibus, cauendū ne polluantur, ma-
 nusq; inquinent. Aliud ad tollēdos scabredine affectos ungues
 ab'q; exulceratione: Sumantur bituminis, auripigmenti, san-
 darachæ, sulphuris ignē non experti, singulorum drach. qua-
 tuor: quibus contritis, resina excipiantur, atq; utere, septenis
 diebus dissoluens. Aliud: Erui farina, bile ouilla, aut lotio o-
 uino temperata utere, aut calce aqua non extincta cū oleo, aut
 etia cum opobalsamo. Vel atramentum sutoriū, & sulfur ignē
 nō expertum, uisco quantū satis esse queat exceptum, corio im-
 pactum imposito. Vel herba pediculari aceto diluta utere. Vel
 resina terebinthinæ drachmam, sandarachæ binas, simul un-
 guis radici adglutina, fascia accuratē circumligans. Cum ue-
 rō exciderit unguis, ceratum myrtinū, in quo medicamento ex
 resina compositi mōmentum contineatur, superinducito.

LIBRI TERTII FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI QVARTI.

In hoc uolumine operis uniuersū quarto, de affectionibus quæ
 foris in corpore potissimum nullo certo limite, sparsimq; inur-
 gunt, tractatio est.

CAPITA LIBRI QVARTI.

De Elephantiasi.	Cap. 1	De papulis, quæ Græci exanthe-	
De lepra atq; psoa.	2	mata uocant.	8
De impetigine.	3	De epinyctidibus.	9
De prurigine.	4	De pustulis, quæ phlyctænæ di-	
De leuce scabiei specie.	5	cuntur.	10
De alphis candidis & atris.	6	Ad ambusta.	11
Aduersus stigmata ex decretis		Ad uerberibus percussos.	12
Archigenis.	7	Quinam pili ambustis renascan-	
		tur.	

LIBER QVARTVS. 315

tur.	13	Ad dolentia & inflammata hul	315
Ad apofymata.	14	cera.	36
De formicis et uerrucis.	15	Ad immatura necdum purulenta	
De ganglio.	16	hulcera.	39
De inflammatione.	17	De hulceribus cauis.	40
De abfcessibus qui foris corpus		Quæ hulcera sordida expur-	
infestant.	18	gant.	41
De gangræna & fyderatione.	19	Aduersus hulcerum uermes.	42
De herpete.	20	De carnis excrescentia.	43
De erysipellate.	21	De nomis, semipedonib. et pha	
De pano, bubone, et furunculo.	22	gedænis.	44
De dothienibus, tumidis abfces		De hulceribus cicatrice carenti-	
fibus.	23	bus.	45
De termintho, tumore nigro &		De maleficis, quæ chironia & te	
tereti.	24	lephia dicuntur.	46
De carbūculis anthracib. uc:	25	Ad cicatrices nigras.	47
De canceribus.	26	De sinibus.	48
De ordemate laxo tumore.	27	De fistulis.	49
De inflatione.	28	De ruptis hulceribus.	50
De luxatis & contusis.	29	De hulceribus articularum.	51
De carnibus contusis, & sangui-		De palis, lignisq; fixis, telis, spi-	
ne in contusis concreto.	30	niscq; & id genus aliis corpore	
De fractura & conuulsione.	31	extrahendis.	52
De scirrhis.	32	De sanguinis eruptione e uena	
De strumis.	33	et arteria.	53
De steatomatis, & atheromatis,		De percussione neruorum.	54
& meliceribus.	34	De articularum tensione.	55
De fauis.	35	De luxatis artubus.	56
De simplici hulcere.	36	De lumbricis.	57
Quæ conglutinare hulcera pos-		De ascaridibus.	58
sint.	37	De dracunculis.	59

F I N I S.


PAVLI

PAVLI AEGINETAE

LIBER QVARTVS, ALBANO

Torino interprete.

De Elephantiasi. Cap. 1.



AIOREM oportere semper remedijs, quam aegritudinis uim esse, bellè Cappadox, arbitror, Aretæus docuit: indeq; fieri, ut curari Elephas minime possit quod scilicet medicina nulla superior inueniatur. Nā si Cancer, qui singulorū modò corporis mēbrorū Elephas quidē est, inter morbos immedicabiles ab ipso etiā Hippocrate cēsetur: quā non sit Elephantiasis, qui cancer quidā corporis uniuersi existit, multò potius, lōgē curabilis minus? Atra siquidē bile, cuius soboles hic morbus habetur, bifariā prouenit (aut enim ē melāchlico seculōtoq; sanguine, ac ueluti sanguinis limo, aut ē flaua bile, utrisq; supra naturæ modum assatis, originē habet.) Elephātes quippe perrubros mitio res ferē, aut, ut uerius loquar, malitiosos minus prima bilis atræ differētia gignit: Reliquos uerò qui infestiores sunt, & corpus totū ulcere sū reddūt summaq; decidere faciūt, altera flauæ bilis nimīū cōbustit proles parit. Morbo igitur iā uetis, manus admoēda non est. Auspicāte uerò prius in morbo, ita ut nihil ab extremis deciderit, nulla etiā fœdarit cutem exulceratio, neq; extuberationes admodū exurgūt, uultus tantūm liuido rubore magis quodāmodo suffunditur, sed neutiquā admodū indecorus apparet, mederi tentabimus. Quidā etenim, atq; hi sanē non pauci, morbū inchoantē plerisq; sola capitis adustione, ne suppuraret, prohibuerunt. Ocypus itaq; nos, ubi morbus primū suppullulare cœperit, sanguinem seclā uena detrahimus, & uerno potius tempore, quādo frequens iste affectus ingruit, et acceſsionibus suis exacerbescit. Sed paucis inde diebus nouem aut decem interpositis,
pulis

pulte colocynthidos hac lue oppressis purgabimus: non semel,
 sed identidem ex proportionē uirtutis medicamentū quantitatem
 adaudiuri. Proficiti etiam talibus per hierā purgatio. Rursum
 uerò diebus circiter decē intercalatis, serū lactis scissū offeren-
 dum est, neq; sanè minus tribus heminis, neq; ultra quinq;. Se-
 quentibus uerò diebus, non scisso, sed recens emulso alantur.
 Inter hæc, morbus si remittat, alimento eodē utantur si autem
 permanet lacte abstinendū. Vomitus acrium ciborum esu, ra-
 phanis, et cibarijs prouocet. Probatum est hæc uerū ca-
 dido facta expurgatio bis quidē si queat fieri in uere, si uel ue-
 rō autumnali tēpore. Conclamatis neq; uenam secare, neq; ue-
 ratrum propinare cōuenit: quum inde materiei neq; in altum
 ex cute deriuatio, neq; ulla etiā diminutio fiat. Ceterum in al-
 uum atq; intestina materies deriuanda est, rem dijsq; noxia euo-
 cantibus utendū, arefaciendo atq; astringendo summā corpore
 ris cutem. Cucurbitula itaq; inanes ori ueniris et præcordijs
 affigantur: easdemq; partes dropace illinito: pusillo inde tem-
 poris progressu denuò ad principia reflectendū, à purgatione
 quæ per hierā fit auspicandos: sanguinis missionem plūs detra-
 menti quàm emolumenti allaturā, iitantis. Eodem die aut ter
 aut quater in anno repetito, tempore aut uerno potissimum,
 atq; autumno. Iam uerò his etiā potiones expediunt: Aceti cy-
 athus unus, cum cedrini liquoris cyatho, et succi brassicæ cru-
 dæ cyathis duobus cōmixtus potui cū manè, tum uespere ex-
 hibeatur: Aut uertemni herbar folia arida pondo drachmæ
 unius in uini cyatho. Vel cornu ceruini drachmā, et aceti scyl-
 litici cyathi mensurā, post diluculariam inambulationē quoti-
 dianam potui datur. Cætera uerò pro loco ac tempore ysdem
 porrigantur: Vel scyllæ seminis drach. quinq; in aqua mulsa,
 aut in melle instar linctus exhibetur: Vel succi Cyrenæici crui
 quantitas mellis atq; butyro subacta: Vel, bovis rasuræ drach-
 mæ semissis, cum uini cyathis duobus: Vel cymini Aethiopicæ
 drachmæ tres, cum melle eligmatis modo. Atqui multo præ-
 stantius

stantius auxilium quàm hæc præstiterit, theriacorum pastillorum drachma, in uino generoso cyathi unius mensura læuigata & epota. Pari etiam modo scylliticorum pastillorum drachma bibatur. Nepetæ insuper liquorem, tanquam efficacissimū in potu præsidium summis encomijs euehūt, absorptū. A cyathis tribus auspicandū, et ad senos usq; transcundū perhibent. Verūm omnibus facile efficaciam palmam surripuerit ē uiperis contexta theriace, cū in potu sumpta, tum foris illita. Quod si ad manum fuerit uiperarum copia, non est aliud efficacius, quàm harū carnes comestæ, albo iure ex aqua largiore, salibus, porro, atq; anetho, usq; ad spinarum discretionem probè elixæ: capitibus ipsarum primò, caudisq; ad digitos quatuor amputatis, & intestinis omnibus exemptis, pelleq; detracta. Theriaci uerò sales eadem pollicentur, cum obsonijs assumpti. Nam qui ijs hoc pacto utuntur, illis squama quandoq; aut ueluti uulpis pellicula quædam à cute decedit.

Victus ratio eiusmodi conuenit.

Post somnum manibus leniter permulceatur, recrementisq; alui depositis, gestationibus, uocis exercitio, frictionibus, uariisq; gymnasio, partim saltu, partim altioribus & folle utatur. Postea deterso sudore, ursino, uel uulpino, uel hircino, aut uolucris alicuius adipe, uel butyro recente perungatur. Modico autem interuallo temporis interposito, lauacris operam dantes, fœnogræci, aut ptisanæ cremore, aut gutta ammoniacæ perexiguo in aceto liquefacto delinetur. A balneo deterfus, oleo lētiscino, aut cenanthino, aut myrteo perfundatur, & uino modico cum alumine, gutta ue ammoniacæ strigmenti balneorum crassitudine. Abstersus denuò tenerrimis linteolis, horæ dimidium quiescat: à quo aqua hausta euomat, digitis in fauces, pinnis ue demissis. ubi euomuerit, uinum absinthites, uel origanites bibatur. Alimenta erunt, panis hordeaceus, mazæ ex polentis. Ex oleribus beta, lactuca, rapha-

nus, porrum, & brassica, bis aqua ad dulcorem usq; elota, & capparis. B' maritimis autem admittuntur ostrea, pelorides, herinacci, peſtines, tellinæ, cum beta decoctæ: salſamentum uetus ceu medicaminis uicem obtinet. Mero omni morbi tempore abſtineatur, & coitu ſimiliter. Pauciſſimum modò uinum, ac tenue & aquoſum, quando uires reſtaurare poſt purgationes uolumus, aſſumitur. Tunc acris quoque præter condimenta circumcidenda ſunt. Ad hæc utiliter offeruntur ptiſana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum pane, malua, rumex, ſiſarum, & piſcis teneræ carnis: Ex auibus, quæ inculpati ſucci ſunt: Ex fructibus, ficus, uua, & uua arefacta: Ex dulciarijs mellitis conueniunt, ex nucleis pineis, uel ex amygdalis friſtis placenta, & cnico, his qui bis in die nutriuntur: moleſtum quippe ipſis, ſemel duntaxat cibum capere. Vbi corporis interni habita fuerit ratio, ſmegmatis quoque uſus commendatur in balneo, ex decocto betæ, aut ſcenograeci, cum ſpuma nitri, aut ſapone, aut myrobolano: & nonnunquam pſilothris utendum. Exterit & portulaca cum aceto contrita, tenuèque ſemperuiuum: rumicis radices aceto concoctæ, alumen cum ſalibus, & ſandaracha æquis portionibus in uino & lentifcino. Facit huc medicamentum alphis dicatum, ex alcyonio, nitro, myrrba, ſulphure, ficusq; ſylueſtris folijs aridis, cum aceto læuigatum ac illitum. Præſtat idem quod conſtat ex ſepiæ teſta combuſtæ, pumicis, nitri, cretæ cimo- liæ crematæ, commeosq; & gallæ immaturæ, æquis ponderibus, aridum inſperſum, aut cum aceto affricatū. Illud etiam admirandū: rumicis radicū fasciculus qui manū impleat, nitri drach. quadraginta, thuris uiginti quinque, ſulphuris totidē ex aceto Aegyptio circumliniuntur. Vincit itidē, ſi inducatur cui inſunt auripigmētū drach. decē, ſulphuris igne intadū octo, coſti duodecim, calcis aquæ non reſtinctæ quatuor, ceræ tantundē, baccarū lauri aridarū duodecim: hæc ſimul cōterūtur, et macerātur foliorū populi albæ ſucco, uel craſſo decocto: et

cums

cum iam mellis crassitudinē prætulerint, illinuntur. Aliud: Radicum rumicis fasciculi duo in aceto decoquuntur, & in pi-
la contunduntur, & læuigantur: deinde alcyonij libra, aphro-
nitri uncia octo, sulphuris uiui libra, cochlearij testarum cre-
matarum uncia quatuor, chamaeleontis cum radice totidem,
conterantur pariter omnia usque ad balneorum strigmentitiam
crassitudinem, deinde corpori circumlinantur: æstatis quidē
tempore in sole sæpius, hyeme uerò in balneo, tantisper dum ex-
sudent. Cæterum Asclepij aridū smegma his bellè cōueniet: et
omnia cōmuniter absterfua, quæ dicturi sumus, ad Alphos fa-
da, quemadmodum etiam quæ in præsens aduersus illa relata
sunt. Turgida uerò corporis eminentia inflāmata, uel exbul-
cerata, delinentur lycio Indico, aut glaucio, aut aloë, aut An-
dronis pastillo, aut polyidæ sigillo. Cataplasma insuper ac-
comodabitur ex chōdro cum succo herbæ seminalis, aut plan-
taginis, aut parietaria læuigata. & milesiæ herbæ uiridis fo-
lia, cum axungia cōtusa. & cataplasmatibus more imposita, mi-
rifice prosunt: rubescunt quippe inde partes quibus imponun-
tur, subsidunt autē facile pane superinducto, aut cerato ex oleo
amygdalino, rursumque naturali suo colori restituiuntur. Exbul-
ceratis uerò emplastra congruunt ex diphryge consarcinata:
& ex uino, melinū, & coracion, et quod ex aceto mulso con-
stat, necnon Andronius pastillus, & bulla quā pompholygem
dicunt, & cadmia. Cæterum morbum totum leniri indicat, si ci-
catrrix primis hulceribus inducatur. Cōtra uerò difficultatem
anhelitus laborantium elephantiasis, millepedas sub aqualibus
degentes quinque aut sex, ex mulsæ cyathis tribus potui dato.
Communiter uerò & eorū nonnulla huic affectioni cōpetunt,
quæ suspiriosis conducere prodidimus. Aquarū porrò sponte
emergentium usus ueluti necessarius seligendus est, atque in pri-
mis aluminosarū, & quæ ferri naturam obtinent, et si fieri po-
test, frigidarū. Vtiles etiam ipsis plurimum fuerint potæ. Ma-
ritimi etiam sabuli usurpatio eiusdem semper est potentia, om-
niaque

niaq; sudorifica. Quoniam autem hic morbus nō minus quā pestis cōtagiosus est, quā procul ab urbibus, in loca mediterranea & refrigerata, & quibus est hominum infrequentia, tabe illa affecti habitandum ablegandi sunt. Si possibile est, hinc etiam ad proxima loca migrabunt, tum propter se, tum propter eos qui (ut uerisimile est) ipsis incident. Ipsi nanq; ita salubriore aere fruuntur, & alios hac lue non inficient.

De lepra & pfora. Cap. 2.

Lepra pariter et pfora summæ cutis scabredo est, cum pruritu & corporis colliquatione, ex atrabilario humore originem trahens. Sed lepra profundius circularibusq; erosionibus corporis cutē depascit, et piscium instar squamulas ex se remittit. Pfora uerò summā corporis cutem uaria erosione figurat, furfureaq; ex se corpuscula edit. In quibus sanè sanguis detrahendus est, si humorib. redundare corpus appareat: sin minus, idem omnino purgante pharmaco airabile exonerandum est. Extrinsecus uerò utroq; ueratro cōmuniter utendum. Calcemq; ablutā seruato aridā, cumq; usus poscet, aqua diluens ad strigmentitiā crassitudinē illinito. Aliud: Saluicæ, oliuæ, Aethiopiciæ lachrymæ, singulorū drach. octo, radicis corticis capparis gummi, uniuscuiusq; drach. tredecim, illinito ex aceto in sole. Sed lepras peculiariter exterunt ac dimouent anemonæ appositæ, uitisq; cādidæ radix. Composita uerò. Lolleacæ farinæ chænicæ, cardamomi albi drachmas quatuor, spumæ nitri unā, atramenti sutorij octo, asphodeli radicis mediæ quatuor, tritas in aceto, et in cerati spissitudinem subactas circumlinito, nuro prius loco deterfo. Vbi solueris, solues autē die tertio, & ablueris aqua gelida, denuò illinito.

Aliud: Radicum hastulæ regiæ succi uncias sex, sulphuris ignem non experti, mannae, uniuscuiusq; drach. decem, nitri octo: aceto subacta inungito. Caterum ad pforā propriè conducunt. Ex simplicib. quidē, uua syluestris, lupini amari, carmomū cum aceto, lily radix cū melle, resina terebinthina,

X sulphur

sulphur, ciceres, fimus caprillus, Cōposita uerò, misy unā cum chalcitide & quis partibus ex uino, psoris humidioribus illinito. Aliud: Rhododaphnes teneriora folia in olei sextario decoquito, tātis per dum arefiant, ramulīs q̄; porrectis adijce oleo ceræ candidæ quadrantē: ubi eliquaueris refrigerato, sulphuris q̄; uiui unciam insperge atq; illinito, idēq; uel sub sole, uel in balneo. Sunt qui unā cum rhododaphne scyllā etiam in hunc usum decoquant. Aliud: Accipe confesionis diachylon, hoc est, succis herbarū sextantē, ceræ tantundē, rosacei unciam, spumæ argēti, cerussæ singulorū quadrantē, picis liquidæ se librā, stercoris argenti, sirici, cuiusq; sextantē, aceti quantum ad læuigationē aridorum satis est. Aliud: Cerussæ unciam dimidiam, amyli tantundē, plumbi unciam, lotariorū rubrorum uel anchusæ sextantē, ceræ se librā, rosacei dodrantē. anchusam egregiē unā cum rosaceo elixato, deinde reliqua inijcito.

Aliud: Oua decem, uel quot opus fuerint in aceto acerrimo macerato, donec cortex ipsorū emollescat, inde eodē aceto lutea ipsorum decoquito, rosaceo eliquato, & reliquo aceto, & spumæ argenti symmetrū strigmentitia crassitudine illinito.

Aliud: Ouorum maceratorū in aceto uitellos treis, rosacei se librā, sulphuris uiui quadrantē. Prius eliquatis & contritis cum aceto uitellis, & sulphure, inijce ceratum. Spuma quoq; argenti aceto rosaceo læuigata, ut emplastri formam induat, aciores psoris expurgat. Porro ex rumice etiā, atq; pleraq; quæ elephantiasi medendo sunt facta smegmata, communiter lepræ & psoræ accommodata sunt.

De impetiginibus. Cap. 3.

Mixtis saniebus serosis, tenuibus, & acribus, cum alijs humoribus crassis, impetigines oriuntur, quæ procliuiter in psoram & lepram cutis aspredines transeunt. Quocirca uehementer arefaciētibus egent pharmacis. Proinde post uniuersū corporis, si opus sit, euacuationē simplicia quidem ipsis conueniunt: Cicer, ueratrū, echinū saxatilis, pix cerato et resinæ mixta,

mixta, crocodili terrestris sterminus, et sturnorum, cum oryzana
folium epulati sint. Non pauci unico hoc impetigines, quæ in
mento aut aliàs proueniunt, medicati sunt: Plurimū tritici su-
mens, incudi cuiusdam ignitæ imposito, humidūq; ex eo defluēs,
etiamdum calidū impetiginibus inungito. Puerorū uerò liche-
nas salua humana continenter perfricato. Hos etiam gummi
pruni illinitū adiuuat. Quibus uitium inueterauit, uiticis folia
aceto trita, cataplasmatibus modo adglutinātur, aut pari modo
folia capparis. Cōposita uerò hæc: Sulphur cū thure, uel cum
gutta ammoniacæ, eliquatum aceto illinitur.

Pastillus aduersus impetigines.

Glutini fabrilis drachmæ quatuor, thuris tres, aceti cyathi
dimidium. aceto diluta illiniūtur. Aliud: Chalcitidis, gummi,
uniuscuiusq; drachmæ octo: sulphuris uiui, misyos, singulorū
drachmæ sex: squamulæ æris, acaciæ, uniuscuiusq; drachmæ
duæ aceto inunguntur. Aliud: Sulphuris igne non experti,
nitri spumæ singulorum drach. quatuor, seminis roris marinæ
grana sexaginta, contere cum aceto: uerū locum tantummo-
do affectū illinito, sanam partem nihil inquinās, arefactū frigē-
da aqua eluito. Aliud: Veratri albi drach. octo, farina lupino-
rum tostorum, buccinorū cinis, nitri, uniuscuiusq; chcenix, in
puluerē redactis fricētur. Iam uerò feras lichenas appellant,
qui à mediocriter arefacientibus nihil iuuātur, sed acrioribus
exacerbantur. Exhibenda sunt igitur medicamenta, abundē
quidem efficacia, sed quæ non plurimū erodāt: cuius est modū
quod habet glaucy, thuris, alcyonū, bituminis, sulphuris, gum-
mi, uniuscuiusq; unciam, si cum aceto illiniatur. Aphricam pē-
cem cum aceto elixam, liquefactamq; illinito. Aliud ad im-
petigines et pruritū: Atramenti sutorū, sulphuris ignem non
expertum, nitri, thuris, æquis portionibus, ad impetigines cum
aceto, ad pruriginem autem cum uino utitor. Aliud liche-
nium: Gutte ammoniacæ thymiamatis, erui farina, farina
lupini, æquis partes, cum aceto illinito.

X 2

De

PRuritus qui senibus accidit, ex toto nunquam curatur, placatur autē subordinatis remediōrū auxilijs in cæteris ætatibus. Si malus humor author fuerit, hunc quāmprius eua cuare expedit siue biliosus, siue pituitosus, siue putris, siue salus extiterit. Deprehenditur autē id quidem ex ætate, temperatura, uicū, anni tēpore, regione, atq; reliquis hisce cognatis. Quocirca si uenit pariter cū sanguine fartæ, redū dare uidentur, à detractione sanguinis auspicandum est: Sin qualitate potius molestat, congruis eo medicaminibus exinanito, ad externam uertamus nos curationē. Lauacro itaq; utendum omnino etiam dum ieiuno est. Verū nonnunquā etiam post exiguum cibum sumptū, denuō lauandum. Aegrē nanq; humectatur affectio. Decocto autē fenogræci detergitur, uel betarū, uel furfurum, uel maluæ syluestris & satiuæ, uel ptisanæ. Lomētum ad hæc, farinæ uel lupini, uel myrobalanorum, uel peponatum præparatū ualent. At si uitium uetustatem senserit, lauacris consimiliter indulgēdū. Fotus ex decocto saluæ, myricæ, mercurialis, origani, pulegi, baccarū lauri, cucumeris syluestris radicis, capparis, lixiuia stillatitia, & muria acida cōmendantur. Deinde nitro arido consperguntur, uel cum fece aceti, uel eo quod accipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulphuris ignē non experti, uniuscuiusq; librā, cretæ cimoliæ libram dimidiam. Vel illud: Spumæ nitri, sulphuris uiui, alcyonij cremati, æquæ portiones, quib. uel cum prædicto decocto aliquo utere. Quod si uidetur, ueratro etiā arido cōsperge, sine pingui. Allinitur autem cum oxelæo pedicularia herba trita, uel sulphur, uel sandaracha, uel simul omnia: uel sinapi cū myrobalani succo expresso, et oxelæo. Vel cochleis combustis laugatisq; in melle, uel rumicis radicibus, uel ex iisdem rebus confectis smegmatis, uel uti paulo antè in capite de Elephante proditum est, uel quibusdā psoræ consecratis. Quod si partes bulcerib. cōflicentur, parygro, uel ea quæ diapompholygos

nomen

nomen obtinuit, compositione utendum: uel ceræ uncia liquefacta, in cyprini cyatho, cui sulphuris uiui uncia admixta sit.

Aliud contra pruritus: Nucum iuglandium rancidarum unciam, sulphuris tantundē, apij succo contritis, utere in balneo, abundē membra perfricās. Hoc unū auxiliū satis plerisq; scabiosis, & alijs pruriginosis præstitit. Apiū item per se, uiride, contusum, & affricatū in balneo, magnificā opem contulit. Pari quoq; modo perdicū, & acerna resina cum rosaceo dissoluta, ac illita iuuat. Aliud: oryze purgatæ atq; admodum albæ quadrantē tusum, incerniculoq; traieciū, aceto acerrimo, donec strigmentorū spissitudinem induat, dissolue: adieciatq; læuigati sulphuris uiui uncia, pulchrè cōfusa, in balneo utere, diu perfricans. Verū in his qui excrementorū nimia multitudine obruti sunt, & quis illorū portionibus commixtis, longē præstantius reddetur subsidium.

De Leuca. Cap. 5.

Leuce, uutiligo à quibusdā appellata, coloris quædam cutis ad candidius immutatio est, ex uiscida glutinosaq; pituita proueniēs. Quoniā uerò non quælibet leuce remedijs illinitur, notis ipsius istiusmodi censeo: Acu in superficie leucen compungito, ita tamen ne ultra cutē penetret: si sanguis promana uerit, curabilis est: si nã lacteus humor, conclamata existit. Vel laneo panniculo asperiore ipsam perfricabis: si rubicundior euaserit, curationē recipit: si uerò in eodē cutis colore permanferit, remedijs nullus est locus. Et quæ plura corporis loca occupauit leuce, magis desperata est, quàm quæ pauca fixerit: & inueteratæ potius quàm recentes, curā respuere putandum est. Nonnulli quidē ferro candenti leucen exurēdam autuma uerunt, & hoc solum ceu compendiū sanationis probauerunt. Alij adustionē dolorosam, atq; ex hac cicatricem nō minus ac leuce indecorā fore arbitrati, medicamentis crustam induentibus usi sunt: cuiusmodi perhibent, quæ cicatricē concolorem efficiunt. Alij uerò repudiātes horū uim perdifficilē, tincturis

uti maluerūt, impostura magis, quæ circa hæc accidit, quàm utilitatis rationē habētes: qui sanè reliquis omnib. magis sunt auersandi, propterea quod statim reuertitur affectio. Utendū igitur subiectis est remedijs: Adarca, seminis roris marini, sulphuris uiui, æquis portionib. singulatim tufis, et priuatim cretis: deinde simul cū aceto sat multis diebus laeuigatis, in sole illinito, nō cōfertim, ne cutis exbulceretur: procedete uerò tēpore exiguū quippiā hellebori, galleq; tantundē admisceto. Aliud: Fici atræ uirgultis in aceto maceratis et cōtritīs, nitri spumā, sulphur uiuū, myricæ fructus, æquali cuiusq; pōdere adijcito: ubi locū prius nitro defricaueris, illinito et insolato, obseruās ne exulceratio inde cōsequatur. Cæterū Archigenes folijs fici, calcis quantū satis est cōmiscendo, similiter usus est: Vel helleboro, inquit, cādido fricatas leucas quoad sudādo reliquo corpori cōcolorē speciē induant, sinopide aut mediade illinito: uel acubus trāfixis pūctas, donec cruore inficiātur. sinopide cū aceto perūgito: uel absterfis prius locis recte fici succo, ut dictū est, in sole illinito, et folijs eiusdē aliquandiu obnixē cōfricato.

De alphis candidis & atris. Cap. 6.

Alphorum generatio eiusdem speciei cum leucis est: uerū hæc altius penetrando cutē mutant, ita ut pili etiam cōsimiles sibi enascantur. Alphi uerò summā cutem deturpant, licet ipsi quoq; si in uetustatē incident, profundius recedant, ut pili in eis albi, ob subiectū humorem procreentur. Ex pituita namq; cādidi, nigri uerò ex atræ bilis humore nascuntur. Communiter igitur utrisq; cōgruit calx abluta, aqua dissoluta, uel dracunculi radix cū aceto cataplasmatīs modō imposita. Pari item modo ueratrū utrunq;: Lupinorum amarorū elixatio adpersa, ipsorūq; farina ex aceto melleūe acetoso impaeta: radices itidē capparis cortex cum aceto, lilij radix cum melle, cepa cum aceto in sole illita, crocodili terrestris oletū, itidem et finus sturnorū, cum oryzā modō comederint, tostāq; sepiæ testæ. Compositum uerò hoc efficax est: Alcyonij, nitri, uniusq; eiusq;

cuiusq; uncia binæ: ueratri candidi, sulphuris ignem non experti, singulorū uncia: nonnulli uerò uini fecem concrematam adhibuerūt. Aliter: Sulphuris uiui, nitri spuma, singulorum drach. quatuor, seminis roris marini grana septem, laeuigato cum aceto. sed non nisi alphon perunge, nihil inquinans membrum incolume, arefactum uerò aqua gelida dilue. Aliter: Farinae lupini, buccinorum, & nitri, uniuscuiusq; chœnix, ueratri albi drac. octo, arido locum deterge. Aliter: Erui farinae libras duas, seminis crucæ, amygdalorū amarorum, cucumeris agrestis radicis, singulorū librā, ænomelite pariter eliquata, alphis illinito, & tempore interposito cum spongia abstergito. Proficit idem aduersus lentigines, asperam & discolorē ceu à sole cutem, uaros, summāq; cutis maculas.

Ad alphos candidos experientia comprobata.

Sulphuris uiui sextarij duo, calcis uiuæ albæ triens, albores ouorū quinq; olei nardini et aceti aliquantulū: sulphur ante omnia laeuigatur, deinde ipsi nardini oleum superinycitur, ac deinde cōteritur, ab hoc acetū instillatur, rursusq; diluitur. Calcē uerò priuatim loiā semel, bis, et ter sulphuri immittimus, undē cū ouorū albugine, et rursus lauiamus, coadūq; i quorē effundimus. Modicū autē relinquētes, quo illini unguentiū queat, atq; ita cum opus est utimur. Aliud, quod ad Archigenē refertur: Sulphure ignē nō experto, folijs fici aridis, aphronitro, alcyonio, creta cimolia, myrto cum aceto utere. Aliud Archigenis: Fici foliorū exiccatorū in umbra, sulphuris, aluminis, & quas partes cum aceto illinito. Vel foliorū fici drach. quatuor, nitri duæ, alcyony tosti totidē, aceto in balneis illiniuntur. propriē uerò alphos nigros efficaciter discutit sandarachā, cum parte sulphuris dimidiata: præfricata uerò cute nitro, sub sole perūge. Ceterū cādidos alphos atramēti sutorij, æruginis, & quaportio, nitri duplicata absq; pinguedine exterit. Vel seminis roris marini, sulphuris ignem nō experti, adarces, par modus cōtritū, cum aceto infricatur et illinitur. Vbi uerò aruerit, la-

uato cutem perfricans, quod medēdis etiam leucis efficax est.

De stigmatibus, ex decretis Archigenis. Cap. 7.

Stigmata curabis si lotij feces quæ matulae adharēt, aceto primo cum aceto superinducas. Vel calcis uiuæ partē unam, nitri assati flauī dimidiū cum aqua sub sole inungito. Vbi uerò locum exbulcerauerit, perinde atq; bulcus ad cicatricē perducito. Verum enim uero Crito medicus iussit, confricatæ nitro prius cuti resinam terebinthinā illini: deinde linamentis colligatam sex diebus relinqui, septima die solui, acūq; stigmata compungi: breuiq; tēporis spacio interiecto, sanguinem fluentem spongia detergi, tenui sale locum confricari: tum ad dies quinq; medicamentū inponi, quod habet thuris, nitri, calcis uiuæ, ceræ, singulorū drach. quatuor, mellis octo. Quod ubi solueris, nigrū in medicamento deprehendes. Aliud unguentum: Piperis drach. duas, rutæ quatuor, sandarachæ tantundē, auripigmenti drachmam, mellis quantum satis est illinito, loco prius nitro confricato: atq; alijs perinde atq; in superiore peractis, per tridū soluito, nigrore q; deterso rursus oblinito. Tollit etenim, inquit, uiginti diebus aded exactē, ut neq; exbulcationem, neq; cicatricem relinquat. Aliud, quod Criticum appellatur: Thuris drach. quatuor, nitri duæ, atramenti sutorij quatuor, ceræ sex, piperis, calcis, thapsiæ, singulorum drach. tres, auripigmenti sesquidrachma, sandarachæ drach. tres, mellis quantū satis est, haud aliter atq; superiore utitor. Orbasius affirmat, batrachium illiū, uel capparis folia stigmata expungere. At si altius radicibus aëlis non tollātur, sed obiter cuti insederint, crusta gelido cauterē inducā exterminabis.

De papulis, quæ exanthemata uocant. Cap. 8.

Papulæ eruptiones, quæ Græcè exanthemata dicuntur, ex densatis in cute crassis humoribus, magisq; ubi densior pellicula superficies extiterit, propullulant. In quibus itaq; si profundius humorū subsedit copia, ante omnia purgare expedit. Nam si quis id facere superfederit, tentaueritq; prius disy-

cere,

circumfusam, quamvis impleatur finito. Conniuciente uulnere
 pustula denuo cōpungatur, consimiliq; modo exprimatur. ser-
 uandaq; ut prius cutis ambiēs, donec id quod sub ipsa exbulce-
 ratum est, in cicatricem cōtrahatur. Quocirca priusquam pus-
 tula aperiātur, lentem elixam, cum aqua eliquatam illinito.
 Aut mali Punici frōdes cinere calido tepesfactis applicato, lo-
 cosq; attingito. Quōd si fiat eruptio, et bulcus oriatur, adipem
 suillum liquefacito, spumamq; argenti eliquatam admisceto,
 et in lintecolum impastam superimponito. Vel lily radicem
 coctam in aqua, tritamq; cum cerota superinducito.

Ad epinyctidas & phlyctēnas.

Spuma argenti, sulphurq; uiuum, a quibus portionibus cum
 aceto, et myrtus laeuigata, strigmenti illinitione, adiecto oleo
 et uino applicatur. Cōducit ad hanc, et ad calidas eruptiones,
 et papulis quae ab ebulliente feruore perizemata dicuntur et
 manditia capitis ulcera, incipientesq; furunculos, et exustio-
 nes, et plumbagine et ex ouis confectum medicamentum.

Ad ambusta. Cap. ii.

Ambusta igni modicē abstergeantur medicamēta efflagitant,
 ita quidem, ut eadem ipsa neq; excellenter calfaciant, neq;
 admodum refrigerent. Terra proinde Chia, Cimolia, et Cre-
 tica, omnisq; terra non pōderosa circūlita aceto haud ita acri,
 aut aqua admixta egregiē proficit, pustulasq; exoriri prohi-
 bet. Idē sanē praestat ouum candidū crudū integrū quamprī-
 mum impositū, uellere molliore exceptum: mediocriter namq;
 perfrigerat, et absq; morfu exiccat. Scriptorio adhuc atrame-
 nto igne uisita perunge, uel ibus aqua maceratū, uel lentē eli-
 xam et laeuigatā, uel cruum cataplasmatīs modo impingito.
 Ceterū ad exustiones feruētis aquae, priusquam pustula exo-
 riatur, oliuarū salsarū aqua cōtinuē cōspargito: ipsaq; oliuas
 sale cōditas, cū polēta eliquatas inducito: uel alumē scissile cū
 aceto tritū illinito: uel taurinū fel cum aqua permulta liquefa-
 ctam circūlinito: uel lixiuū stillatitū garo uel muria super-
 fundito; aut bulbos liliorū, uel hyacinthorū, uel narcissorum

cu.

cum rosaceo tritos, strigmenti balneorum crassitudine induca, illinito. Cæterum Marcellus hoc modo compositum tradit: Lin teolum melle irrigatum, hordei; succo imbutum comburito, et cineris drach. octo immittito, cerussæ quatuor, butyri octo, ceræ, adipis caprilli, rosacei, cuiusq; sedecim. Sed medendis pustulis excitatis iam, Rhun et farinā hordeaceā cum melle laugata impingito. Vel calcē uiuā cerotæ confundito, & panniculo illitam superimponito. Medicamentum cognomēto Sphæarion ad hæc est utile. loca exulcerata porris laugatis obducuntur: uel portulaca trita cum polenta, uel sterco columbinū linteum inuolutum exurito, oleoq; dissoluens, cinere ipsius utere. Mirum sanē quā præsentiā perhibeatur: Pini aut picæ cortex, seu adiantū aridum friatū, myrti' uel folia cōcremata, et in leuorem contrita insperguntur. Conducunt autē hæc etiam singula si cū cera concinnentur. Necnon quod accipit rubæ anchusæ radicis arida, confusa, & friata uncias quatuor, ceræ candidæ nouē, rosacei octodecim. postremū cōpositio ex cerussa cum momēto medulla ceruinæ, exquisitū præstat remedium.

Ad eos qui uapulauerunt. Cap. 12.

Medendis flagris, cerussæ, et spumæ argenti æquas partes, ceræ quadruplū, cum susino aut rosaceo, in emplastri modum imponito. Primo die lilino tantum seorsim utitor, uel croci, tragacanthæ, singulorū drachma, ouoq; integro absq; eruis unita percussis inducito. Pellis præterea ouis recens excoriata calida circumposita, reliquis omnibus efficacius naturalis dici spacio casis medetur.

Quomodo pili ambustis renascantur. Cap. 13.

Capilli ambustis renascuntur, si folia ficus in olla cremata cum cerato emplastri modo imposueris: uel caricæ drach. octo, amaraci drachmam, leuigatis cum oleo ad cerati consistentiam utere. Aut ramentorū lapidis drachmas centū, squamule aris decem cum aqua in pastillos subactas reconde; & cum usus poscet, partē unam cum cerotæ partibus octo dilue.

Ad

Ad abraſa. Cap. 14.

SI cutis aliqua corporis parte auellitur, & ſuperficies ipſius
hulceribus cōſtātatur, primis diebus uel uino, uel aceto, aci-
dāue muria conſtringito: ſequentibus autē ad inducendā cica-
tricem, liparis & ex albis emplaſtris triphēris utitor. Maxi-
mē uerō iuuat, quod ceruſſae recipit partē unam, guttae ammo-
niacae dimidiā, myrtei quantum ſatis: gutta ammoniacae aqua
laeuigata, ceruſſam admiſce, myrtinū ſuperinfundēs, et utere
lipara, aut ſcobe lapidū, quod marmorarij deradiūt, ſquamam
aris admiſcens, & myrteo conterens utitor: uel cretam cimo-
liam, & argenti ſpumam cum uino & ricinino, & myrteq;
laeuigata uſurpato.

Ad paraſyrmata, intertrigines, hulcera ſinueterata,
& ſeniles mollesq; cuticulas.

Spuma argenti chryſitidis drachmae quinquaginta, cerae
uiginti, reſinae aridae ex picea duodecim, olei cyathus unus &
dimidiatus. Argēti ſpumā & oleū ubi coxeris, reliqua inſyce,
rudiculaq; cōmotis, & in pila emollitis utere. Abraſam uerō
cutem hulceribus amputare non conuenit, ſed inducere reme-
dium. coit nanq; & conglutinetur hoc pacto, etiā ſi nigreſcat.
Denudata uerō carne, aegrē cicatrix cōtrahitur, uellicatione
et ſordibus infeſtato hulcere. Cāterū ab inflāmatione apo-
ſyrmata conſeruat rhu rubrum cum melle illitum, uel iunci
rotundi odorati coma cremata, & cum melle impoſita.

Ad Abraſa, & flagellata, & conuulſiones articulorum,
dolorem ſedans medicamentum.

Spumae argenti, ceruſſae, uniuſcuuſq; ſextans, cerae ſeli-
bra, olei puri uel roſacei ſeſquilibra, amyli ſextās. Prodeſt ad
haec eadem: Pelarium ex recremento argenti, & medicamen-
to ex ouis confectio.

De formicis & uerrucis. Cap. 15.

VTrūq; uitium exigua quā dā in cute excreſcētia, calloſa,
et magna ex parte rotūda eſt. Hoc uerō dirimūtur diſcri-
mines

mine: Formica quidem latiore basi seßiliq; est, in scalpendo & attritu simile morfiunculis formicæ sensum adferēs. Verruca uerò, quam acrochordona nuncupant, basim habet angustam ac pensile, ita ut chordæ nexu suspensa pendere uideatur. Hos sanè tumores è medio tollunt elateriū cum sale impactum: thuris item lachrymæ cum aceto, grossi cum aceto & farina, nitroq;: succus fici illitus, itidē thymalli, smaridisk; caput salsum, crematū. Aerugo itē cum sulphure igne intacto cōbusta, ocymi folia cum atramēto sutorio, quod ex palmitibus etiam dum uiridibus cōbustis destillat, retrimētū ouium cum aceto, birci fel illitū: herbæ solaris maioris fructus, cū uino cataplasmate inductus: ruta cū nitro et pipere, nitrū cum lotio puerulū uenerē nō experti, stercus bouis armētarij in aceto adhibitū.

De Ganglio. Cap. 16.

G Anglion, neruorum est concretio ex percussu, uel labore proueniēs, in plerisq; corporis quidē partibus, præsertim uerò motui consecratis, puta manūū extremis, et pedum plantis. In quo utiq; malo Archigenes iubet calcē uiuā cum adipe anserino & terebinthina imponi, crebrò tamen ex achate lapide medicamento utitur. Oribasius uerò usus est illo, quod habet cerussæ, resinæ pineæ, olei ueteris, uniuscuiusq; unciam, guttæ ammoniacæ thymiamatis, galbani, singulorū unciam, ceræ trientem. Aut plumbeum orbiculū crassiore, uertebæ instar, magnitudine ganglion excedentē, imponi & alligari præcipit: porderē nanq; suo ipsum longo tempore dissoluit. Et nos illo quoq; utimur.

De inflammatione. Cap. 17.

Q Voslibet calidos cū dolore & ardore tumores, phlegmonas Græci, Latini inflammationes appellare consueuerunt. Cæterū pro diuersitate materiæ ipsos efficientis, horum quoq; differentiā euariari perhibent. Sanguine nanq; bono, et moderata crassitudine in partē aliquā confertim subito confluente, & ob nimiam copiā inibi impacta, peculiaris cognomen

menti inflammationem excitari asserunt. Bile uerò flaua in ali qua corporis parte hærete, herpeta uocāt. At ubi sanguis una cum bile flaua simul influxerit, erysipelata cōstituit. Cū uerò influens sanguis calidus admodū fuerit, atq; crassus, carbuncu los parere solet. Ab ea igitur inflammatione quæ propriè pble gmone appellatur, quæq; in permulis usque accidit, inchoan dū. Ba tumor quidā est rubēs cū dolore multo, renitens tactui, cal: s q; ex sanguine, ceu relatum est, non prauo oriū habēs, quī aliquādo ex uniuerſa corporis mole fertur: nōnunquā in aliā quam modò particulā nimiū incūbit, ita ut in uasis nō cōineatur, sed roris instar in media partiū spacia uacua excidat. Vul nerationib. adhæc, ruptionib. itē, bulcerib; q;, et alijs complu ribus, quæ foris ingruunt causis hæc accidit affectio. Cum igitur pars corporis aliqua subitō absq; præcedēte causa euidentē inflāmatur, toto uerò corpore in partē contagiū mittēte, uni uersum tū corpus sanguinis detractione leuandū est: mēbrum aut inflāmatum irrigandū, et illinitione consolandū, non calo rificis & humedatib; sed humorū illuuiē repellentib. auxi lijs, quodq; in loco hæret affecto, euacuantib; . Cataplasmatib; igitur modo semperuiuū, & mali Punici corticē in uino deco ctum, ceramq; cum polenta subactā impingito. Cum dolor ue hemēs nullus excruciat, hoc fuerit et similibus utendū. Maiori uerò cum dolore parte fluxu infestata, ne tum quidem calidā aquam aut oleū adhibeto, uel quæ ex farina cōtexuntur cata plasmata: hostilia nanq; hæc rheumaticis affectionibus sunt. Mitiganda uerò doloris uehementia medicamēto ex passo, ex rosaceo, ceraq; exigua, uelleribus sordidis œsypi quāmpluri mum cōtinētibus, æstate quidē frigida, hyeme uerò tepida exa cipiuntur et applicantur: ita sanē, ut superiores affectarū par tium loci spōgia uino adstringēte et austero, siue posca gelida imbuta cōprehendātur. Admiscēda porrò sunt cataplasmatib; ad eā provinciā utiles herbæ. Parietaria idcirco omni inflam mationi accommodata est, cū intra exordia, tum etiā in incre mento:

mento: Glaucium non dissimiliter, atriplex, et malua, laetuca item, et cucurbita, calidis illitæ. Valēt etiam tribuli utriq; ad eas quæ ex destillationibus oriūtur inflammationes. Brassica uerò ad tumores facit indurescētes. Ceterū cum immutatio oboritur, purisq; nihil subsidet, ex chalcitide emplastro curabis, uel aliquibus eiusdē generis defluxionib. cōsecratis. Purā porò lanā uino imbutā austro, extrinsecus medicamēto superacōmodabis. Medebere itaq; hoc modo his qui ad fluxū referuntur inflammationibus. At quæ occasione cuidā adscribuntur, huc meditando eas, calfaciendoq; non lædes: eisi quādo res ususq; feret, scarificare easdē haud erit absurdū. Verū si eas quæ ex fluxu originē trahūt inflammationes scalpello incideris, praesertim ab initio, auctor ingētis cuiuspiā incōmodi languētis fueris.

De exterioribus corporis abscessibus. Cap. 18.

Qvòd si tibi suppurationem prohiberi non posse uideatur, panē in hydrelæo coctū cataplasmate impingito: uel hordeaceam farinā cōpari modo præparatā. Fouetur mēbrum aqua alibæ radicis incoctæ. At si tumor ægrè in suppurationem perducatur, aut cute imperspirabili difficulter distrabatur, cataplasmate ex ficis siccatis utere. Oportet autem dulces et præpingues ficus elixas eliquari in aqua, et aquā mellis instar tenuis efficere, farināq; hordei inycere: et si dissipetur quidē tumor, sed minus quā opus sit, cum ficis hyssopum aut origanum coquito. Si quando uehementius exiccare uolueris, salē decoctioni immittito. Exquisita autē diligētia attendendū, ne propter uehementiorem ariditatem membrū obdurescat. Si quando eiusmodi quippiā conspexeris, aqua cucumeris syluestris radicē, aut alibæ, aut bryoniæ decoquito. Efficacior autem, et in discutiēdo uehemētior dracūculi radix est. Ipsum ad hæc ex dracūculo medicamētū ualidius eiusmodi uitia disycit. Interdum igitur hunc solum decoquas, aliquando uerò etiam ficus aridas inycias. Farinam quoq; cū adipe. Et oleū anethinē discutiendi uim habet, humoresq; crudos ac tumores incoctos dissipat,

disipat, & maturat. Pix quoq; duriores & crudos tumores
 uniuersos indita cataplasmatibus concoquit, & præcipuè liqui-
 da. Medicamentum comp-situm, quò iam concocti abscessus
 extirpantur, ita ut in splenio pus subinde deprehendatur, in-
 cocti uerò exactè discutiantur: Lapidis pyritis drachmæ duos
 decim, guttæ ammoniacæ læuigatæ tantundem, fabacæ fari-
 næ denarij sex: pice liquida excipiantur, & alutæ illita impo-
 nantur. Sed spleniū ne tollas, quoad ultro decidat. Remedium
 tamen illud baud ita diu antè est præparandum: arefit enim
 ocyssimè. Si uerò ob hæc tumor nihil distrahatur, pus autem
 subiaceat, parte scalpello diuisa, id ipsum euacuandum. Vitari
 deinceps conuenit, ne oleū quis aut aquam applicet: uerū si
 abluendū interim bulcus fuerit, aqua mulsa poscāq; ac uino,
 necnon mulso utendū. Et si inflammationem experitur, è lēte
 cataplasma inijcimus: sin nulla adsit inflāmatio, aliorū quip-
 pe medicamentorū in istiusmodi sectionibus forma emplastri
 usurpemus. Neq; etiam minus quod conflatur ex chalcitide.
 Spongiam insuper, aut lanā uino imbutam acerbo superim-
 pone. Vulneri autem nullum pinguetudinem præferens medi-
 dicamentum admoue: cuius notæ tetrapharmacum est. exas-
 dius nanq; gliscit arefacere.

Quæ rumpant abscessus.

Quoniam autē nonnulli ferro abscessus diffecari non tole-
 rant, usu etiā medicamentorum extrahentiū & disrumpentiū
 dissectionem moliemur: narcissi radicem in læuorem tritam, et
 in mulsa cum irino coctā illinito. Vel mollem arundinis radi-
 culā cum melle minutim contere. Quòd si dura fuerit, in aqua
 mulsa prius decoquito: uel aristolochiā cum melle cataplas-
 matibus modo superinducito. Disrumpūt præterea picis aridæ,
 propolis Creticæ æquales portiuncule, et cicatricē inducunt.

Dionysia medendis abscessibus admirandæ uirtutis, & ad
 maminillas & bubones, extrahendi potentia regnans,
 per abditos meatus distrahens.

Olei ueteris, aquæ, uniuscuiusq; libra. Hydrelæum illud de
 coq^u t)

còquito, mox spumæ nitri uncias sex immittito, misyos unciam unam, seu duas. Decoquantur quousq; recrementiis per cocturam separatis inquinandi finem fecerint: deinde adyiciatur mannæ, thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum selibra.

Ad neruorum abscessus.

Ceræ, colophonix, butyri, uniuscuiusq; libra: picis aridæ mellis, singulorū libræ duæ & semis, æruginis quadrās, uiscē quantum satis est: Aliud epispasticum: Guttx ammoniacæ thymiamatis uncias sex, ceræ, terebinthinæ, uniuscuiusq; uncias quatuor, sulphuris igne intacti uncias treis, nitri tantundem: et Smelion quod uocant medicamentū, & diascordon, niolenter ea quæ iam mutata sunt, disrumpūt. Id etiam quod è cremore seminis lini fit, discutit, et transmutat, rumpitq; commodissimè. Sed ad mansuetiora apostemata etiam quæ contra abscessus, secundum atq; post aures dicta sunt, expediunt phar maca. Hæc igitur super demanante ex inflammatione abscessu. Galenus autē asserit abscessum nonnunquā, etiam si nulla inflammatio præcesserit, posse cōsistere, quæ ex sanguine inculpato originē trahit. Cōfestim nanq; ab initio, inquit, per aliū quempiam humorē excoiātur tēporis spacio subiectæ partes adhærētes, & abscedunt, & ob id sectæ quoq; omnigenam humidorum & solidorū corporum intra sese speciem habere inueniuntur. Olet enim et lotio, grumoq; atq; humori mellis speciem præferenti, & mucoso, & ossibus, unguibusq; & capillis, in abscessibus similia reperiuntur corpora: certè & animalcula non rarò deprehensa sunt, cunctis ferè quæ ex carie nascūtur quàm similima. Porro lapidibus et harenis, testis, lignis, carbonibus, argillæ, sordiū strigmēto, amurcæ, & feci deniq; (infit) cōparia, in abscessibus præsertim inueteratis ex humorū decubitu conflātur. Proinde absolutior apostematum extra corpus significatio quàm compendiosissimè dicenda: & eorū quæ adhibitis remedijs dissipari nequeunt. Est igitur abscessus carniū, carnosarūque partiū, uerbi causa, musculo

X

rum

rum, uenarum, & arteriarum corruptio, mutatioque. Horum aliquid quidem tunica continetur, ueluti atheromata, steomata, melicerides. Alij uero tunica destituuntur, generis uocabulo nomenclaturam sortiti, de quibus in præsens uerba facimus. Abscessus suum generationem magna ex parte inflammatio præcedit, de qua disputauimus. Cæterum quandoque confestim etiam à principio, ceu iam pridem diximus, oritur abscessus. Abscessus comitantur ardor uehemens loci, spaciosus tumor, rubicundior solito, & durus, cum dolore punitiuo, pulsu, & grauitate, ita ut uideatur partem aliquid suspēdi. Quod si locus princeps fuerit, febris quoque inuadit, & horror inordinatus, & per noctem impensius dolent, ac febriunt. Bubo ad hæc nonnunquam proximis in glandulis exurgit. Cum autem consummatur abscessus, magna ex parte minuitur: stimuli uero pruriginosi obueniunt, & torpere nonnihil incipiunt, tumorque magis in apicem mucronatam fastigiatur, tangenti lenis cedensque, & superficies in acumine detrahitur. Dico autem hæc de ijs qui foras rumpuntur. Siquidem igitur uel medicamentis, aut sua sponte rumpantur, emmoto curentur, particula iam euacuata pure. Sin contra, abscessus, eo quem in chirurgicis præscribemus modo, aperendus est.

De gangræna & syderatione. Cap. 19.

Quando inflammatio neque distrahitur, neque in pus conuertitur, frequenter in gangrænā & syderationem, quam sphacelon nuncupant, commutatur: de quibus in præsentiarum agemus. Gangrænas quidem esse dixerunt, cum ob inflammationis amplitudinem pars aliqua mortificatur: neque iam consummatur, sed etiam dum confiunt, ita cognominant. Huius affectionis tanta uis est, ut nisi quispiam rupta omni mora, præsentissimas tulerit suppetias, pars afflicta promptissime mortis habitum contrahat, & hominem interimat. Cum uero exacte sensu carere locus coeperit, non amplius morbum gangrænā, sed iam syderationem nominant. Accidit autem hæc labes ipsis etiam ossibus, cum eisdem circumfusa caro, deprauata gignens saniem, eadem madefecerit,

& cor.

Et corruerit. Cum igitur membrum ex toto interierit, quam-
 bcyssimè ad sanam usq; partem attiguam est amputandū. Cateo-
 rum in gangræne curatione, sanguis ex male affecta parte,
 quam fieri potest, euacuandus est. aut enim uenam incisa uitatus
 sanguis, cum in eadē parte uena turgens conspiciatur, exbau-
 riendus; aut tota corporis cute pluribus et altis plagis dissecta.
 remedium putridis dicatū accommodari debet, cuius ceræ est,
 farina cruina, aut loleacea, aut fabacea ex mulso acetoso. Si
 quis harū uires intendere desideret, salem immittat, uel pastil-
 lum Androniū, aut id genus aliquē. Conferunt et gangrænis
 nuces peruetustæ. Perpurgat uerò ipse cortex seu urtica, cre-
 morq; thymalli, in loco ac tēpore modoq; exhibitus. Cōducit
 ipsis irrigatio ex lupinorū amarorum decocto. Nonnulli post
 putridæ partis præcisionē, tutioris excisionis gratia, cauterijs
 adhibitis mali radicē exurunt, in quibus sale cum porro uten-
 dum. Postremò ad crustas et squamulas dimouēdas cataplas-
 ma adglutinandū ex pane, uel hordeacea, uel triticea farina in
 hydrelæo decocta. Et cephalico puluere cum melle, tetraphar-
 maco item, et Macedonico quod uocāt, utendū. Probè itidem
 crustas detrahit panis cū apio læuigatus, eliquatq; aut ocy-
 mo, uel iris, aut panax, aut aristolochia, acorūmue cum melle,
 uel etiam rhus. Belle etiā crustas abducit Machæionis medi-
 camentū. Et Isis, linamentaq; concepta ex melle. Sed in cor-
 poribus delicatis sufficit farina erui cum melle.

Ad gangrænas, ex Oribasso:

Rubiginis rasilis, rubricæ, aluminis scissi, æquas singulo-
 rum portiones aqua liquefactas, gangrænis inungito circum-
 qua; scarificatis. Loleacea itē farina raphano et sale cata-
 plasmatis modo impacta gangrænas remouet, quādoq; etiam
 cum aceto: Vua passa acinis demptis cum cortice adiecto sale
 et oxymelite, idem præstat. Iuglandium item medulla, myr-
 tiq; folia in uino elixa, et detrita cum melle. Raphanus cum
 aceto crustas ad os usq; effringit.

Y 2 D8

Flaura bilis nullo confusa humore excreta, in quampiã corporis partiẽ decumbens, herpetem procreat. Qui si essenti sua crassior & maioris accrementi fuerit, altius totã, usq; ad subiectam carnẽ, exulcerat cutem: & appellatur herpes exedens. Sin tenuior, minoreq; acrimonia, & calida fuerit materies, exiguas bullas, paruusq; pustulas in summa cutis superficie milij seminibus persimiles excitat. Miliaris herpes à similitudine nuncupatur: quanquam Oribasij opinione, mixta flaura bili pituita, miliarem herpetem constituit. Vniuerso igitur corpore felagio prius medicamine exinanito, locis deinceps languore possessis, frigorigica, siccificaq; applicantur medicamenta: intra principia quidẽ capreoli uitis, rubi & plantaginis folia, deinde lenticula his admiscetur interim, mel item atq; polenta, & quod traditũ est ad inflammationes ex destillatione, cataplasma, absq; semper uiuo. Exulceratis uerò locis pastillos passo, uinõue tenui et adstringente, nõ uetere, uel posca aquosa subactos illinito, & glaucium, eiq; similia ex aqua. Si nihil proficit, aceto temperatũ adhibebis: succo autẽ plantaginis, aut solani, uinoq; diluta magnificẽ opitulatur: uel semen lini arcfactũ, inq; uino & oleo elixum, in pollinẽ tritum superaducito: uel cretam cinoliam solani succo dilutã inungito: uel spumæ argenti trientẽ, & porri cremoris cyathos septem, betaq; succi tantundẽ, leuigata illinito. Vetusis iam hulceribus pastillus Musæ & Andronis accõmodus est. Aliud ad ampullosum herpeta: Recrementum plumbi in uino adstringẽte tritum inducitur, superinducantur cataplasmatibus modo folia betæ in uino decocta, uel ceræ uncia quatuor, myrtei sedecim, recrementi plumbi quatuor, uino diluta illiniãtur. Hulcere uerò serpente represso, ex recremẽto cerato utere, uel lenticulam elixam cum melle adglutinato. Ceterũ ad herpeta sub cute, recrementũ plumbi, rutæ contritæ succo excipitur, uel ceratum myrteum rutæ loco. Aliud: Lana ueteris succida, thedacco ligno

ligno crematæ drach. duodecim cum dimidia, ceræ uiginti
quinque, stercoris plumbi oxybaphi semissem, adipis caprilli
depurati, & aqua abluti drach. uigintiquinq; myrtini uncias
quinq;. Aliud ad herpetas acriter depascentes: Corticum
dulcis mali Punici, spumæ argenti, uniuscuiusq; drach. sex, la
næ succidæ thedaceo ligno circumplicatæ & crematæ treis,
ceræ duodecim, cerussæ octo, thuris, aluminis scissilis, cuiusq;
drachmam, uino & oleo myrtino excipe.

De igne sacro, erysipelate' ue. Cap. 21.

GAleno autore, tumor ex feruente tenuiq; sanguine excita
tus, priuatim & propriè erysipelas uocitatur: ex utrisq;
sanguine pariter & bile creatus, ex dominatè in mixtura hu
more nomen obtinuit. Sanguine nanq; iustum naturæ modum
excedente inflammationē erysipelaccam: flaua autē bile præ
pollētē, erysipelas inflammata nuncupant. Cōmanius autem,
tumor è sanguine biliq; feruētioribus factis cōflatus, plurima
ex parte erysipelas nūcupatur. Verū utro modo dicas, nihil
adeò ad opis ferēdæ usum interest. Id uerò ignorandū non est,
difficiliora esse erysipelata, quæ caput inuadunt: proinde nisi
efficacior subueniatur adminiculo, languentes interdū suffo
cant. Quamobrem ab initio confestim simul atq; apparuerit,
uenam in cubito præsertim humeralē aperiri: si ea non compa
reat, obuiam. Sin uerò sanguinis detractiōē quippiam uetet,
medicamento flauā bilem ducēte corpus euacuabimus, quo in
caterarum etiam partiū erysipelatibus utere, uel maioris effi
caciæ clysteribus. Erysipelataq; perūgito, his quæ influētē
materiam frigorifica uirtute retundūt: acruatā uerò modicè
calfacientium & humidantiū beneficio dissipent, priusquam
particula liuorē aut nigrorē contrahat. Cura perpetuò adhi
bita, ut liquidis perungantur, sic ut crebrius cōmutentur, prio
ribus per spongiās probè tinctas, ablutis: multa nanq; & fer
uida membri incensio ocysimè in uaporem erumpens, eadem
exiccat. Initio itaq; erysipelata, ut dixi, refrigerantia cum hu

Y ;

miditate

miditate absq; adstrictione indigent. Cuius classis censentur, semperuiuum, portulaca, herba pulicaris, lenticula palustris, seris, cucurbita, solani, herba apollinaris, lactuca, glaucium, aliquando etiam apium, ramniq; folia cum per se, tum addito pane cataplasmatibus modo impacta: necnon cerotum ex aqua gelida. Admiscetur uero his opij nonnihil, succiq; papaueris, cicuta, et mandragora. Coccinenturq; composita medicamenta, fiatq; cerotum ex cera de albata, rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino absq; sale facto. His in pila emollitis, aqua frigida quantum suscipere potest, superfunditur. Quod si aceti tenuis et caddidi nonnihil admiscueris, praestantius medicamentum conficies. Iam polenta quoq; cum herbis aliquot praedictis refrigerantibus, frigoris quantum res postulat, inducit. Et palmarum dactyli pingues cum horum aliqua mixti. Illiniatur praeterea membrum cum cerussa, aut creta cimolia, aut terra figulari cum solano, aut spuma argenti cum rosaceo, uel chalcitide adiecto oleo et passo, uel cerussa cum aceto et lycio, uel acacia cum aceto. Remittente porro seruore, probatur usus simplicium, sulphuris igne intus, menta q; cum oxyrhodino, aut ruta cum absinthio, aceto, et oleo: uel spuma argenti, adiecto porri beta q; succo. Compositorum uero priuatim quidem in capite, commendatur usurpatio pastilli: spuma argenti, cerussa, croci, sulphuris igne non experti, opij cum uino passo. Communiter uero uniuersis, rubrica sinopis, chalcitidis, misyos cremati, rubiginis, atramenti sutorij, aluminis scissi, a quibus portionibus, cum aceto utere. Aliud: Sulphuris uiui, cerussa, opij, acacia, pares singulorum partes cum aceto. Cataplasma ad ignem sacrum, hucera serpentina, abscessus, parotidas, et ambusta: Alibet recentis foliorum mollium libram elixam in hydrelao probe conterito, etingere rosacei uncias quatuor, spuma argenti, cerussa, uniuscuiusq; uncias duas cum dimidia: de quo cum coriandri succo laeuigato, uel cremore semperuiui, aut solani; inde panis micas inyce, donec formam induat emplastrum.

Ari, & superinducito. Atqui emplastro etiam illo utitor: Rescinini libra, myrtei tantundem, ungenti uncia quinq; , spumæ argenti quatuor, eruginis rasæ duæ: aceto dissoluantur rubigo & spuma argenti. Ceratum ad erysipelata & igne usta: Cera dealbatæ triēs, rosacei quadrās, oua sex, perdicidis triēs. Cessante autē inflammatione, aut in uetustatē incidēte, priusquam liuescat membrū, cataplasma ex farina hordeacea illinito. Quod si luridum iam fieri cœperit, cuti scarificatæ, cataplasma inducendū. Irrigandum autē est ex unda dulci calida, interdum uerò & marina, aut muria: nonnunquā etiam cataplasmati talis liquor cōmiscetur. Postremò prædictis medicaminibus cōpositis utendum, animum cum medela applicando. Nam si diutius perseueret inflammatio, in suppurationem uel in putredinem commutatur.

De pano, bubonibus, et furunculis. Cap. 22.

Secundum Galeni sententiam, bubo, panus, & furunculus glandularū affectus sunt. Bubon quidē inflammatio: Panus uerò glandulæ inflammatio, suppurare incipiens. Aliorū autem quorundam opinione, tubercula communiter omnia, è quouis membro præter naturā erumpentia, ita quidē ut abscessus naturam referant, phymata, hoc est, Pani uocātur. Tradit enim Hippocrates, quibuscunq; phymata in urinario meatu erumpunt, in suppuratione facta in uomicā prorūpente, liberantur. Quicunq; autē bubones ex colliu, uel alijs huleribus, doloribus excitantur, periculo uacant. At qui febribus superueniunt, sicut præcipuè in lue pestilentiali incidere cōsueuerunt, pessimi sunt, siue in femoribus, siue sub alis collōue proueniāt. Verū priores, intra initia, quemadmodū quæuis inflammatio, præsidys refrigerantibus & constipantibus repelluntur: uel spongiæ impositu è posca, uel lane ex uino, & oleo ex oliuis acerbis & immaturis expresso, uel rosacco, uel melino, aut lentiscino, uel myrteo: inde eis quæ discutiendi uim habēt, utendum. Si corpus omne humoribus æquabiliter redundat, prius

euacuandum est: Sin excrementis uacauerit, hūlceris, in qua-
 cunq; corporis parte prouenerit, habenda est ratio, perinde
 q; in sermone de hūlceribus pressius agetur. Caterum glan-
 dula inflammatione oppressa, lanis oleo quodā relaxante im-
 butis mitigatur, membrumq; uniuersum ipsis circūuoluitur.
 Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non promptē inci-
 dere, uerū medicaminibus ceroti formā imitātibus dissipare
 tēto: qua in re primas facillē tenet medicamentū ex perano,
 et botanicum, id est herbaceum. Si per haec non dissipatur, ad
 sectionem, perinde atq; in reliquis abscessibus, deueniendū est,
 consimiliterq; illis medendū. In his autem quae in febribus, uel
 omnino humorū copia proueniunt, arceri debent repellentia,
 ne retrusa profundū repetat materies, sed à discutiendi facul-
 tate praeditis cōfestim auspicandū. Et si nullū impedimentum
 obstet, puta aetatis, aut uiriū, ex uena cubiti prius sanguis de-
 trahendus. In loco autē affecto, fotus ex decocto chamæmelo-
 rum, aut anethi, aut id genus aliorū adhibeātur. Reliqua uerō
 medicamentorum materia, huc ex his quae proximi uoluminis
 capite de parotidibus inscripto memorata sunt transferatur:
 neq; ex his etiā minus, quae nuper admodū mihi ad inflamma-
 tiones conferre dicta sunt. Quemadmodum et furunculorum
 quoq; curationē tum hinc, tum ex his quae ad erysipelata con-
 ducere recensuimus sumito, Atticus insuper aster herba, quae
 bubonium, hoc est, inguinalis etiam ob hoc ipsum appellatur:
 nō solum cataplasmatīs instar impacta, sed alligata quoq; bu-
 bonibus, opitulari creditur. Panos peculiariter discutit, si in-
 ducatur adiantū, atriplex, helxine, altheae radix uino elixa,
 gutta ammoniacā cum melle eliquata et imposita, uiscus cum
 resina atq; cerato. Rumpit item propolis: lupini amari cum
 aceto illiti, cucumeris syluestris radix terebinthina
 excepta, radix capparis consimiliter,
 nitrum itidem cum fermento
 uel ficibus.

De

De Dothienibus. Cap. 23.

Dothien, quem furunculū appellant, tumor est abscessionis faciem præferens, ex crassis humoribus in carnosis plerunq; partibus proueniens: clemens quidem, cum in sola cute coierit: maleficus autem, curatuq; difficilis, cum altius radicibus adis in cutem erumpit. Dissipat autem dothienas, & maturat, triticum dentibus friatum & impositum: mastiche Aegyptia: uua passæ exemptis acinis sale contrita, & cataplasmatismore impaeta, hunc uel distrahunt, uel diffindunt. Fici aridae ex hydromelite adglutinentur, aut resina ficis comixta imponatur. Aut ipsæ ficus aridae dum fuerint pingues diuise, aut fermentum cū nitro, aut semen lini cum melle, aut alierci folia læugata cū butyro. Mixta uerò prosunt ex fermento, ex polline farinaceo, & medicamentum suo nomine Dothienicum appellatum conuenit. Fetus uerò ex spongijs mollibus continuè in calidam aquam immersis competunt, deinde sic medicamenta inducuntur.

De Termintho tumore atro ac tereti. Cap. 24.

ORibasius terminthum phymatis speciem esse asserit, supra quā pustula nigri coloris adiacet: qua rupta, subtus simile quiddam desquamato apparet: quo quidem dissecto, pus deprehenditur. Discorides uerò Alexādreus, Terebinthi, inquit, cutis eminentiæ sunt rotundæ & oblongæ, atrouirides, terebinthi fructibus consimiles. Quocirca his quoq; perinde atque alijs phymatum tumoribus, succurrendum, ex prædictis huc transferendo præsidia.

De Carbunculis anthracibus ue. Cap. 25.

Cum sanguis copiosiore atra bile infectus & feruidus cuiuspiam corporis parti incubuerit, carbunculi exoriri solent, quæ crustacea sunt hulcera, magnaq; parte ab ampulla, igne ambustis non dissimili incipiunt: quandoq; sine ea emergunt. Loci omnino pruritus quiddā præcedit, mox una interdū quidam pustula, nonnunquā uerò plures etiā pusillæ milij instar

Y 5 sequuntur

sequuntur: quibus disruptis, crustaceum huius succedit, cuius
 modi ferramentis candentibus excitatur, cum crusta nunc ci-
 neritia, nunc colore nigra, sic ut imæ radici adhæreat, & quo-
 dam modo affixa serpat. Caro in ambitu reliqua feruidissi-
 ma efficitur atra, & bituminis aut picis modo splendida. eius-
 modi autem bilis est exquisitè atra. Verùm qui carni tantum
 inhæserint carbunculi, breui circumscribuntur: qui uerò in
 membranis aut neruis gignuntur, longo tempore durant, &
 subiectas partes ad affectionis cōsensum trahunt, ita ut inflan-
 tiones erysipelatosæ in ipsis excitentur, non paucis in supe-
 ratione uertatur: plurimis febres superaccedunt. Oboriun-
 tur autem & ex populatim grassante aliqua causa carbuncu-
 li. Occurrendum autem ipsis, nisi perpusilli fiat, sanguinis è
 uena ad animi deliquiū usq; detractione. Mox à phlebotomia,
 locū profundis punctiōibus ob humoris crassitiē scarificare
 alienū non est. parti uerò languenti, quæ reprimendi & discu-
 tiendi uim habeant, adplicabimus: cuius est modi cataplasma
 ex plantagine, & quod ex lente elixa, panisq; conficitur, su-
 mendo panis fornacei molle, quem neq; purissimū, neq; sordi-
 dissimū esse cōuenit. Ipsi uerò hulceri, uehementius aliquod medi-
 camentū inducimus: cuius generis est, Andronis, et Polyidæ, et
 Pasionis, diluētes eadē passo usq; ad strigmentū balneorū consi-
 stentiā. Massaleoticū itē aridū, uel et ipsum pariter eliquatū,
 dracunculiq; radix, uel aristolochiæ uel laserpitij liquor, uel
 Cyrenaci, singula ex aceto scitè illiniuntur. At quæ erysipe-
 lis naturā sortita sunt, præsidys eidē uitio suprā dicatis delin-
 tur. Quæ uerò partes ad affectionis cōsortiū duci creduntur, la-
 na succida, œnelæo imbuta irrigada sunt. Placato iam ferro
 re, carbūculis, cerata cephalica, remittentiāq; filatim discer-
 pta linamenta, admoueantur. Præstantissimū est, quod ex hen-
 bis, & quod ex nitro constat, & quæ hulceribus depascenti-
 bus conferunt, arida, priuatim & cum rosaceo admota. Duri-
 tia autem perseverante, melina Serapionis utēdum. Dandaq;
 opera,

opera, ut quamprimū ad suppurationē ueniant carbunculi. quod fiet, si bis quidem interdū, noctū uerò semel cataplasmata remediaq; cætera permutentur. Sed quo radicitus carbunculos euellas, & loca continuè uicina asseras, mala Punica acerba minutim discissa, in aceto elixato: & ubi tabuerint, lauigato, linteoq; illita superimponito: ubi aruerint, aceto humefacto. Carbunculos ad suppurationem perducet & diffringet nucis basilicæ ueteris nucleus, uel etiā non ueteris interius farsum. Cupressi folia, & uirgulta, recentesq; et teneriores galbuli, cū polenta, uua passa acinis excussis, ficus aridæ in uino elixæ: papaueris cornicularis flores, liquor laserpitij cū rusta, exiguoq; melle, pix liquida, cum uuis passis, et adipe suillo

Ad carbunculos impendio utile.

Spumæ argenti libra, olei ueteris sesquilibra, auripigmenti uncia: oleū, argentiq; spumam tantisper dum recrementum exuat, decoquito. ubi ab igne sustuleris, auripigmentū immitto: rursusq; donec nigrore suffundatur, decoquito: tritis in mortario, linteolis filatim conceptis utere.

Ad gangrænas, uetera hulcera, chironia, strumas, podagram, & proprie ad carbunculos, eosq; comprimis qui in palpebris oriuntur.

Opj, acaciæ, misyos torrefacti, squamæ aris, uniuscuiusque drachmas duas, atramēti sutorij unā, seminis herbæ apolarinaris tantundē, lauigatis ex aqua utere. Confert etiā eximie tetrapharmacum quintā partē thuris continens. Ad pudendorum carbunculos: Chalcitidis, atramēti sutorij, singulorum drach. octo, spumæ nitri duas cū aqua terito, & utere. Subuenit etiam fimus ouillus torrefactus, cum melle subactus. In Alexandria sarapiade (quæ etiam orchis atq; triorchis uocatur) uiridi, cum mica panis, modo cataplasmatibus aduersus carbunculos & omnia crustacea utuntur. Vbi uerò crusta deciderit, trivialis hulceris modo reliquam curationem proseguere.

De

Cancer in qualibet corporis parte oriri potest: siquidem in oculis & locellis (quemadmodū de ipsis suo loco tradidimus) atq; alijs corporis partibus bene multis, uerūm præcipuè in fœminarum mammis prouenit: quoniam natura laxæ & fungosæ crassissimum atræ bilis (unde hoc malum gignitur) materiam promptius excipiunt. Ex eo nanque humore cum referbuit, canceri contrahuntur: qui si acrior fuerit, cum hulceratione. Ob hoc, colore atriores quàm inflammationes sunt, citra caliditatem tantam: uenæ circa id malum turgescunt & intenduntur instar pedum animalis canceri, unde etiā appellatio huic uitio indita est. Quidam uerò hinc nomen sortitū asserunt, quod ab his, quas occupauit, partibus ægrè euellatur, ueluti cācer animal aquaticum. Hoc malum ob humoris crassitudinem nulla medicina eliditur, ut quod neq; repelli, neq; discuti queat, neq; purgationi totius corporis cedat, uel quod mitiora remedia contemnat, asperioribus autem irritetur. Possunt uerò canceri inchoantes, quo minus augeatur, impediri, si atribilarius humor priusquam in mēbro affecto radices egerit, euacuetur. Euacuabimus autem primitus quidem, nisi quid obstet, sanguinis detractione: mox purgatione simpliciora quidem intra primordia statim exhibendo: uerbi causa, epithymum quatuor unciarum & semissis quantitate, in sero lactis, aut aqua mulsa. Deinde hiera, quæ belleborum atrum assumpserit, euacuentur: Solani succus loco languenti illitus, sine molestia exhulceratis subuenit, si linteolū molle duplicatum in ipso irrigetur, et imponatur. Foris autē circa ipsum lana mollis, eodem succo madesacta, iniicienda est: prospiciendumq; eadem succi infusione crebrius repetita, ne exarescat. Utatur insuper quis longo tempore exhulceratis canceris ex pompholyge medicamento. Expediunt etiam, quæ libro tertio de fœminarum locorū canceris descripta sunt, remedia.

Ad

Ad cancerosa & malefica, adq; sedis tuberosa hulcera,
pudendorum item aut testiculorum, mamma-
rum ue inflammationes.

In plumbeo mortario cum pistillo plumbaceo, lemnia si-
gillatam è posca & mulsa, lacte ue conterito, ut nigrescat, uel
rosaceu, uel omphacinu oleum, uel succu semperuiui, uel um-
bilici Veneris, uel lactuca, uel laserpitij, uel uuae acerbæ, trita
cõpari modo illinito. Manducet aut languens cremoris ptisa-
næ plurimum, serum item lactis: ex oleribus maluam, atripli-
cem, blitum, cucurbitam: Ex piscibus uero saxatiles, & aues
omnes, exceptis ijs quæ in paludibus degunt.

Archigenis ad carcinode & malefica hulcera.

Cancrorum fluuiatiliu combustorum, & cadmiæ æquas
singulorum partes læuigatas insperge: uel eiusdem animantis
cinerem cum cerato superinducito, uel erysimi semen subas-
tum cum melle superaccommodabis.

De œdemate, laxo tumore. Cap. 27.

QVum super tumoribus qui ex calidioribus succis generan-
tur uerba fecerimus, rursus de contrarijs tractabimus:
principiu à tumore laxo, quod œdema Græcè uocant, sumen-
tes. Quemadmodu enim ex biliosis humoribus sacer ignis, quæ
erysipelata appellant, gignitur: ita pituitosi humoris cõfluxu
œdema, mollis quidẽ & doloris expers tumor exurgit. Neq;
nos fugit, œdemata præcipuè in pedibus in aquæ subtercutem
afflictionibus, in tabe & prauo corporis habitu, contrahi. In
his quippe, istiusmodi tumor afflictionis hominẽ opprimentis,
accidens est, nullã peculiare medelã efflagitans. Abudẽ enim
est, si crura perfricẽtur, interdum quidẽ cum oxyrhodino, ali-
quando uerò cũ oleo & sale, uel oxyrhodino sale adiecto. At
si propter pituitosi humoris in membrũ aliquod confluxum,
œdema coeat, opis interdũ satis tulerit spongia posca madẽs
cũ ameto clementer stringẽte imposita, ex inferioribus quidẽ
partibus inchoans, superioribus uerò terminans. Caterũ spon-
giam nouã esse conuenit. At si ad manũ non sit eiusmodi, eam

que

quæ in præputio est nitro, et lixiuio potius stillatio appellatur, mundabis. Quod si his tumor non reprimatur, poscæ nomen tum aluminis admisceto. Idoneum item fuerit elychnion molissimum, humore eiusmodi imbutum, atque impositum. Probatum etiam glaucium. Si oedema uetustas occupauerit, illito prius cum oleo membro, spongiam ex lixiuio stillatio imposito, uolentiusque constringito, et sanabis. Distrabit uero et comprimit tumores laxos quælibet terra illita, et uehementius Aegyptia, et isatis satiuæ.

De inflatione: Cap. 28.

Spiritus flatuosus, sub cute aliquando, interdum sub membranis Sossa uel musculos ambientibus, collectus, inflationem producit. Congregatur autem quandoque in uentre, et intestinis, et inter utraque ipsorum, et peritonæum membranam, ceu in tympanis, ut uocant, intercutibus. Dirimitur hæc ab oedemate, quod digitorum compressioni cedens, non tantum relinquit fossulam, quam illa dum premuntur, et strepit instar tympani. Efficit autem corporis densitas, crassarumque partium spiritus, ne idem spiritus halitu diffletur. Unde curationis scopus est, corpori raritatem inducere, crassiorem spiritum extenuare, quod medicamentis tenuium partium, calidæque potentie absoluitur. Quamobrem ad uentris et uiscerum inflationem, oleum tenuium partium in quo ruta fuerit elixa, aut cyminum, aut apij semen proficit: non raro cucurbitula ingens, non incisa cute scalpello, umbilico bis aut ter adglutinata, flatum discussit. Cum autem muscoli ob contusionem, ceu in pulsationibus inflantur, membra calidis admodum rebus acrioribusque indignantur, doloresque intenduntur. Quocirca à principio statim mitigantibus remedijs, plurimum occupari expedit: in declinatione uero, discutientibus. Sapa igitur cum oleo exiguo utendum, quod lana succida calide excipiat, uel ceratum ex æsypo confectum immiscetur: cura adhibita quod caliditas permaneat, frigus enim non expedit. Mitigato iam membro, et ægro mitius se habente, acetum admisce, nitrumque uel nitri spiritum.

nam, post hæc percolatū lixiuiū. Postea emplastris discutiendi facultate præditis, ut inflatio subsideat, utitor, cuiusmodi est quod subijcitur: Balnearū strigmentum elixatū excolato, ut purū reddatur, atq; rursum in cacabū conijcito. Et calcem extinctā farinæ modo contritam, tantisper dum cœni crassitudo inducatur, inspergito, et uteris. Cæterū efficacius quàm hoc tensetur pharmacum è fico Aegyptia, quem sycamoron uocant contextum.

De luxatis, intortis ue & contusis. Cap. 29.

ADuersus articulorū luxationes & contusiones conferunt lancæ succidæ, uel spōgia oxelæo irrigata, et imposita. Bulbus elixus cum melle, tenera uiticis folia, sal, nitrū assum, læd uigata cum cerato: utere item fotu aquæ dulcis, uel marinæ calidæ. Sed ubi iam inflammatio doloresq; sedati fuerint, membra eluxata perfricentur.

De carnibus contusis, & sanguine subter cutem collecto. Cap. 30.

CArne à graui aliquo corpore illapso contusa, exilibusq; in ea uenulis disruptis, sanguis exudans per subsultū trāscolatur: qui sub cute collectus, ecchymoma appellatū inducit. Cute nullum diuortii experiente, tumoris instar moles tacuī sedens, liuidi coloris absq; dolore ut plurimū comitatur. Noster igitur medendi scopus eò tendit, quò grumi sub cute contenti distrabantur, idq; sine mora, prius quàm nigredo superueniat. Inter principia statim astringentia quædā discutientibus sunt admiscenda, eo quòd tunicæ uenarum contusæ condensari postulāt. Post hæc uerò sola discutiētia admouebimus, scarificatis initio ecchymomatis, ita deinceps reliquam curationē aggredimur. Ad inueterata ecchymomata accommodatus est raphanus, cataplasmate adglutinatus: discutit enim ipsa, ubi erodere cœperit: uel raphanorū cremor cum micis panis impactus. Species aut ecchymomatis sunt suggillata, et rupturæ uenarū, liuoresis ex ictu proueniētes, hyposphagmata nūcupata,

cupata, & sanguinis ex plaga inter ungues coitus, de quibus suis actū est locis, uolumine tertio. Atqui de unguis uitis in chirurgico opere fusius explicabitur.

De ruptione & conuulsione. Cap. 31.

Ruptura nunquam sine ecchymosi prouenit. Succurritur aut medicaminibus mediocriter calorificis: cuius classis habetur, è nigris populis acopū, et quæcunq; uiribus huic, naturaq; respondēt. Oportet autē ruptionibus, acriora, magisq; incidentia adhibere. Proficit ita afflicti cucurbitulae usus. Siquidem per halitū confestim fuerit uniuersum ecchymoma discussum, facile diducta caro coalescet. At si malum in uetus statem inciderit, sordesq; subius alta succreuerit, ruptio deinceps uniri non potest, labia tantū fractura simul inuicē colligentur, ita ut quauis occasione facile separentur, spaciūq; inter ipsa medium humore aduentitio repleatur, & continuē quodā modo ecchymoma creetur primo persimile: nisi quod hoc quā illud citius discutitur, ueluti saniem tenuē continēs, cum illud ab initio ex grumis sanguinis cōstaret. Conuulsio autem contusis et distractis neruorū fibris contigit. Quæ solā mitigationē usq; ad indolentiā requirit: cōglutinari namq; fibrae nequeunt. Aristolochia igitur rotūda, rupturis & cōuulsionibus, si quid aliud, accommodata est. Compari etiam modo & centaurij grandioris radix, eiusq; succus, rheum, costus, bdellium, cum oxymelite hausta.

De scirrhis. Cap. 32.

Exactus quidē scirrhus, præter naturā tumor est insensilis, durus et insanabilis. Sed non exactus uix sensibilis est, non incurabile quidem, sed nō facilē tamē medicabile malū. Oritur enim à tenaci crassoq; humore, indissolubiliter mēbris induratis impacto. Quādoq; cōfestim intra principia coit, et augetur. Plerunq; uerò medici eius mali autores sunt, cum sacros ignes et inflāmationes immodicē refrigerauerint, astringerintq;. Quamobrē si quis quæ uehementius dissipant medica
menta

menta corporibus scirrhus oppressis adhibeat, manifesta scirrhi diminutionem breui tempore efficiens, reliquias passionis reddet insanabiles: tenuiore quippe humiditate ipsius discussa, reliqua arida et perinde atq; lapidea elinquitur. Oportet itaq; medicamentū diaphoreticū aliquā etiā emolliendi uim, citra uehementē calfaciendi et arefaciendi potestatem habere: cuius facultatis sunt medullæ omnes, atq; in primis ceruina & uitulina. Ex adipibus probantur, leonis & pardalis, ursinus & taurinus. In auibus uerò, anserinus, gallinaceus, & phasianicus: aridior uerò, caprarum & hircorum. Ad hæc præterea, gutta ammoniacæ, quæ ad odorem uaporatur, & bdellium, præsertim Scythicum, & styrax liquidior ac pinguis, mastiche itē Aegyptiaca. Quocirca in alijs quidem partibus scirrhus infectatis, his seorsim utendum est, & his quæ inde componuntur. Cæterum in tendonibus & linamentis, lapidem igneum aceto acerrimo extinguere expedit: si copia est, pyritem: si minus, molarem, in quo languentis membrum hinc inde permoveatur: atq; ita agitetur, ut uaporem sublatum excipiat. Post hoc denuò remedium emolliendi uim habens, præstat imponere: tenuiumq; partium oleo, non aqua, membrum ab initio ad morbi metam quotidie fouere: interdum in oleo altheæ radix, uel cucumeris syluestris elixatur. Lauacris uerò continuis uel in totum, uel magna saltē ex parte abstinendum. Scirrhus autem mediocriter mollificato, gutta ammoniacæ pinguis aceto peracerrimo liquefacta, membrum afflictum ad plurimos dies perungemus. Deinde rursus ad emolliendi uim habentis remedium usum reuertendum, quod galbano et opopanace pinguisimis compos sit: cuius generis præcipue habetur, ex perna conflatum, & Amythaonis, atque ea quæ strumis consecrata sunt medicamenta.

De strumis. Cap. 33.

Strumæ glandulæ sunt obduratæ, quibus collum, axillæ & inguina frequentissime occupantur. Cōmuniter curatio

Z

ni proxi-

ni proximè de scirrhis in mediū allatæ subijciuntur. Priuatim
 uerò lupinorū amarorum farinā in oxymelite decoctā cata-
 plasmatis modo inducito: eadē & tuberibus phymatis' ue pro-
 dest. uel bubulum stercus cum aceto elixum, cataplasmate im-
 ponito, id quod tumores etiā obduratos omnes discutit. Egre-
 giè uerò strophas disycit calx aqua non extincta, melle, uel
 strigmeto palastræ excepta, uel oleo, uel adipe suillo. uel cal-
 cis uiuæ & nitri par pondus, nasturtij & fœnogræci quas
 duplum cum melle, instar cataplasmatum impadum, durities
 distrabit, et in pus cōuersas rumpit. Ioleacea farina cum fimo
 columbino, & semine lini, in uino decocta: grossi syluestres
 atq; satiui, aut nasturtium candidum cum pice liquida cōtris-
 tum in malagmatis specie imponitur. Vel cucumeris agrestis
 radicis aridæ, et foliorum lauri aridorum crematorum cine-
 rem cum resina terebinthina superinducito: uel herbe pedicu-
 laris, nitri parē modum, erucæ duplum cum resina immitte-
 uel stercus capriuum aut bubulū in aceto percoctum: uel erui
 farinam in lotio pueri uenerem non experti maceratam, &
 pice, & cera, & oleo eliquatis exceptam. Vel serpentem ex-
 tinctum in aulā coniectum, et gypso illitam, in fornacem quo
 concremetur ponito, cineremq; ipsius cum tantundem fœno-
 græci misce, atq; melle excepto utere. Compositio ex aspidi-
 bus ad miraculū usq; remedio est, atq; ea quæ ex struthio con-
 stituitur: necnon quæ è cucumere syluestri, & è cedrio itidē
 liquore conficitur. Strumas ad suppurationem perducūt, uel
 diffundunt, myrrhæ drachmæ decē, guttæ ammoniacæ thy-
 miamatis duæ, uisci quercini drachmæ octo, galbani drach-
 mæ quatuor, propoleos drachma, in pila contūdantur. Ad
 strumas mammarum, & durities, uisci elaborati, resinæ ar-
 idæ, ceræ, uniuscuiusq; libra, galbani uncie tres conferunt.

Ad strumas ex h ulceratas, et h ulceribus carentes:

Accipe ceræ, resinæ piceæ, adipis porcini insulsi, marru-
 bī, eruginis rasæ, singulorum uncias sex.

Chæradicū,

Chœradicum, hoc est strumis curandis factum.

Olei ueteris libras duas, ceræ unam, colophonie uncias quatuor, nitri tantundem: allia duodecim detractis tunicis, in oleo per triduum macerato, deinde donec frixa sint elixata, porrice. Vbi ab igne detraxeris, eliquatis oleo, læuigatissimè quoq; nitrum inspargito: abscessus etiam rumpit. Aliud: Cineris ex ficu arbore sextans, aluminis fisci uncia, nitri spumæ tantundem, liquidæ picis uncie septem.

Erodendi uim habens chœradicum.

Aluminis fisci, sandarachæ, uniuscuiusq; semuncia, squamæ æris denarius, auripigmenti tantundem, arido strumate cōssperge. Quod si cācri speciē sortiti sint, rosaceo maceratis, bis per diem utere.

De steatomatis, atheromatibus, & meliceridibus. Cap. 34.

Quum hæc in genere abscessuum (quemadmodum in illis explicuimus) enumerentur, singula propriâ à rerû quæ in tumoribus continentur, similitudine, nomenclaturam inueniunt. Est etenim earum quædam instar adipis pinguedinisq; alia uerò mellis specie, & alia pulti similis. Scopi autē curationis cōmunes sunt, quod tunica illa inuolutum continetur, discutere, uel totum medicamentis exedere, uel sectione auferre. Nonnullis enim ex his tumoribus triplici hoc consilio subuenitur, bisce nimirum qui tenuiorem humorem possident, ut est meliceris. Quidam uerò duplici solum ratione curantur, quale est atheroma, quod non tam abscindere, quàm remedijs tollere licet. Steatoma neq; medicamentis exedi, neq; dissipari potest, sed manu ac scalpelli dūtaxat præsidijs curatur. Vniuscuiusq; igitur horum agnitionē in opere de Chirurgia reperies. Eorum uerò quæ discutiendi uim habent materiam, inter hæc quæ de strumis edocuimus, inuenies. Priuatim uerò meliceridas discit illud: Vuas passas excussis acinis octo, squamæ drach. treis, parti prius sotæ imposito. Aliud: Ladani, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamatis, propolis, terebinthinæ, cuius libet portiones æquales in pila cōtūde. cōducit id quidē etiā

Z 2

strophis

strophis, post, secundumque aures abscessibus, dothienibus, phymatis. Contra meliceridas, Archigenis sententia, spuma nitri, ueratrique, duplici cum cerato duriore imponitur. Medicamentis uero exedendi ut praeditis, cute circumfusa uti non licet. Meliceridas itaque et atheromata, uel ipsas etiam strumas medicamentis adurentibus denudare expedit: est quorum numero simplicius quidem est, quod constat ex calce aqua non extincta, sapone, lixiuioque, stillicidio. Varium autem magis, et quod repositum seruari potest, habet calcis aqua non extincta drach. quatuor, sphecles, quae uini fex est, crematae, nitri liquidi torrefacti, singulorum drach. duas, miny unam, dilue in lixiuio, mellisque, liquidioris spissitudine inducitur ter feruefacito, donec aliquantulum consistat, et in plumbae pyxide recode, instillans lixiuium, ne subito areseat. Confert ad acrochordanas uerrucas, formicas, pterygia, clauos, callos, cicatrices eminentius excrecentes, uini fex non admodum uetusta, duorum modum mensuram, cuti illita. Quod simulatque arescere coeperit, spogys madidis lota rursus inungito: ubi nigror contraxerit, denudus quae crusta inducunt, lauabis. Postquam crusta deciderit, medellae erodendi facultate praeditae adhibeantur. Erodit autem citra morsionem abunde, quod habet squamae aeris drach. quatuor, sandarachae, atri bellebori, singulorum drach. duas, utere cum rosaceo. Aliud: Squamae, sandarachae, seminis urticae exiccatae, aequali pondere: utitor cum rosaceo. Aliud. Brinasceorum deustorum, saepiae testae, auripigmenti aquas partes cum rosaceo: omnes uero particulas, quae in circuitu sunt, circulatim prius delinito cerussa cum oleo. Efficax etiam compositio, quae ex calcis aqua non extincta et illaboratae partibus duabus, chalcitidis parte una, auripigmenti tantundem conficitur.

De fauis. Cap. 35.

Fauis tumor est pluribus et continuis in cute foraminibus te-
rebratus, per quae mellis crassitudine humor emanat. Vnde
igitur passae ipsi sunt imponendae, cum ruta, uel fici folia molli-
ma cum melle, uel nasturtium cum semine lini et melle; uel cucume-
ris sae

vis satiui radix cū melle, uel sulphur ignem non expertum, ce-
rato aut terebinthina commixtum. Cæterum expeditius mas-
gisq; uarium remedium reddes, si quæ superiore uolumine, de
manantibus capitis huiusmodi relata sunt, huc transferas.

De simplici hulcere. Cap. 36.

Quoniam hulus simplex non nisi hiatus quiddam est, cuius si
quis labia diducta, fascia undiquaq; coronæ instar circū-
posita committat, dissite partes facile absq; ulla alterius rei
ope coalescunt. Vbi uero in aliquo labiorum foraminibus per-
foratorum hulus transversim spectauerit, hinc deligaturā molie-
ri, etq; in contraria uertere competit. Si utraq; eò labia detor-
quentur, apprehendendū est duobus inijs ligamentū, et labia
hoc pacto contrahēda; siquidē nihil, ueluti neq; pilus, aut are-
na, aut oleū, aut festuca, uel id genus quippiā inciderit, hulus
omnino cōglutinabitur. Quod si hulus adeo magnū extiterit.
ut nequeant diductæ partes omnino prædicta deligatione glu-
tinari, cōsutionibus ipsæ prius sunt cōmittēda; deinde hoc pa-
cto futura commissæ, remedijs cōglutinandi uim habentibus
utendū, et quæ arefaciendi consumendiq; humorem collectū,
et ne alius quispiam se insinuet, arcendi potestatem obtinent.

Quæ huiusmodi glutinandi uim habeant. Cap. 37.

Conglutinare hulcera possunt quercus folia cataplasmae
tis modo impacta, et salicis brassicæ, fructus oleaginis fru-
ticis, quæ chamælaia nuncupāt, folia item et cortex et succus
austerioris plātagnis. Papyrus posca uel uino irrigata, orbis-
culatimq; circundata. Recētia uero hulcera cōglutinant pini
et picæ folia, et cortex recēs amēti modo circūactus cū aqua
aut posca, uinōue, caseus recēs solutus. Foris aut rumicis folia
applicato, aut uitis, aut betæ, siue lactucæ. Cæterū caseus, qui
eo quod ex acido lacte fit, oxygaladinus nomē obtinuit, uulne-
ra quoq; ampliora committit. Pyra itē syluestria, quæ achra-
des dicuntur, fluxū reprimēdo sistūt. Equisetūq; ut cataplasma
impactū, etiam si nerui dissecti fuerint. Isatis satiuia in duriorio

bus quidem corporibus, etiam si in capitibus musculorum extⁱ terint, pulchrè admodum hulcera conglutinat: item cupressⁱ folia & ramuli, galbuliq; iuuenes & molles in corporibus duris. sed admiscere conuenit tenuissimum farinae puluerem, qui à pariete molæ propinquo assumitur. Myrrha cum aqua illita, uel lachryma thuris, & lubrici terræ, neruorū præcisi- ones glutinant pentaphylli folia cum melle, alliaq; testa cata plasmatis instar imposita. Hulceribus autem uetustis conducit anagallis cū cerato, hordeū com bustū, cerussa, cū cerati myr- tei triplo. Capitis porrò hulceribus myrrha arida insparsa, nō irrigua, prodest, celerrimè nanq; cōglutinat. Vel aloen ari- dam, uel aristolochiā tritā, melliq; et uino simul, quoad in me- diocrē crassitudinē deuenierint incoctā, in linamentū concer- ptū illiniens imposito. Ex cōpositis autē cōglutinandi uirtute præditis, sunt, Barbara et chrysa, et medicamentū Nicolai, tū quod ex salicibus, quodq; dictāno cōstat, et id genus alia, quæ ingentia potissimum uulnera contrahere possunt.

Ad dolentia & inflammata hulcera. Cap. 38.

Idolor & inflammatio uulnera exercet, adbibenda sunt Siccifica, et quæ inflammationē extinguūt, medicamēta. Ex liquidis igitur probatissimū creditur uinū, deinde posca. Si ue- rō cū sordibus angat inflāmatio, etiā mulsā aquosa conuenit. Ex aridis autē pharmacis cōmuniter expediūt, quæ aduersus inflāmationes facere prædicta sunt, demptis oleosis & acri- bus. Priuatim illud commendatur: Mala punica dulcia uino elixa, & cōtrita, cataplasmate superinducito: suspiciendū id, et multiplicis usus. nam capitis quoq; hulceribus cōducit, et ad uerēdorū et uniuersi corporis infestātia hulcera, item cōtra oculorū inflāmationes. Quod si erysipelas, aut simile quiddam hulceri accesserit, ijs utēdū est præsidys quæ illis dedicata sūt.

Ad immatura & necdum purulenta hulcera. Cap. 39.

Recentia quidem hulcera, atq; ob id etiamdum inflāmata, necdū suppurantia, maturant, et ad suppurationē ducunt, simplicia

simplicia quidē aqua temperata inspersa triticea farina, uel chondrus, uel panis, uel glutinū quo in libris utuntur, cum terebinthina illitum. Adhæc cera, crocus, thus, pix, rosaceum: adeps porcinus, et uitulinus. Ex compositis autem tetrapharmacum emmotum rosaceo imbutum. Cæterum hulcera antiqua & callosa maturant, ex simplicibus quidem uua passa satiuā, styrax, galbanū, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrū, mastiche Aegyptia, et æsypū. Cōposita uerò ex rhicinino acceros GALENI, medicamentū liquidū quod linteolis cōceptis excipitur, uulneribusq; inditur, oleo uetere aut rhicinino subactū: drichromos itē, & Basilicū, atq; eius generis cætera.

De h ulceribus cauis. Cap. 40.

HVLcus cauum amissæ carnis instaurationem expetit: cuius procreandæ materia, sanguis cum moderatus, tū inculpatus est. Huius ergo commodationē ex sufficiente cibo conciliabimus. Medium uerò temperamētum, non tã ex probis alimentorum succis, quàm ex bona membri, quod hulcere premittitur, temperatura. Cæterū recrementum quod excernitur, ulceris statum arguit: siquidem tenue, humidius efficit h ulcer: crassum uerò, sordes ipsi coaluisse innuit. Quamobrem medicamentis mediocriter arefacientibus & abstergentibus indiget: qualia sunt, thus, farina hordeacea, fabacea, eruina, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Vbi uerò medicamentum ad incarnandum adplicatū non profecerit, ad aliud est transeundum. Verū siquidē sordities ingenti multitudine scateant, humidiusq; h ulcer sit, sciendum est, medicamentum infra id quod requiritur desiccare, eoq; mellis admixtione intendendum esse. At si mundum & siccius deprehendatur h ulcer, nimium desiccauit, & oportet cerotum oleo permulto dilutum adhibere. Accidit autem aliquando ut medicamento potentiore caro eliquetur, ita ut sordidius humidiusq; appareat h ulcer, simile ijs quæ minus quàm requiritur, exiccantur. At qui h ulcer hoc eliquatū, cauius se ipso euadit, protuberantibus

Z 4 in cauis

in cauitate labris, rubefcente præterea cū inflammatione quādam crepidine. Sæpe etiā numero morfionē manifestam languens percipit. Alterum uerò, quod præsidys minore arefaciendi facultate præditis humescit, nihil horum potest subsequi. Quamobrem lignorum caries, atq; eorum in primis quæ moderatam constringendi, abstergendiq; facultatem sortita sunt, ueluti ulmus, expurgat, et carne replet hulcera iam pura, uel anemonæ appositæ. Pini quoq; corticē detractum, atq; cum cerota contritum, penicillo illitum, cauis hulceribus præsertim recētibus, superinducito: carnē etenim ea implet. Composita uerò, mundatis iam hulceribus probatissima cēsentur, ex ostreis compositio, Manaethonis medicamentum ē uini fæce confectum, item illud ex aloë: necnō Meletera cognomento aridum, & quod constituitur ex amyli, mannae thuris, aliscæ, erui, æquis partibus. consimiliter etiā quod thure constat. & Aphroditarium. Sordidius uerò quodammodo hulcus, quæ cephalica nomen sortita sunt, arida expetit, & quæ linteolis concerptis medicamenta excipiuntur: quæq; Trophos appellationem obtinuit: & Isis, & cui titulus Athena, & ex colorustica (atractylis appellata) confectum. Est præterea cui appellatio Italicum est indita: & breuiter, quorumcunque factum est periculum.

Quæ sordida expurgant hulcera. Cap. 41.

Sordida hulcera, siue caua, siue plana, egregiè aristolochia cum melle purgat. Resina itidem terebinthina cū pari mensura rosacei & mellis, uel loco rosacei butyrum, iris Illyrica cū melle, oliuæ salsæ colymbades uocatæ, cataplasmatibus more impactæ. Ad ea uerò quæ neruosa occupant, terebinthina liquefacta cum butyro adhibetur. Sed immodica sordium uiobrutis, & eorum quæ depascendo serpunt, naturam respicientibus, marrubium cum melle expedit, hoc etiam crustas porricit. Mixta uerò præsidia hæc sunt: Amurcæ decoctæ, mellis despumati, aluminis phorimi, quod est liquidum, par modus.

du. Aliud: Sarapiadis herba, quam triorchea dicunt, aridæ
 ireos Illyricæ, marrubij exiccati, mali terræ, singulorum
 drach. octo. farinae crui drach. decē: arido utere, atq; cū melle.
 Porro aduersus hulcera impura, Aegyptia quoq; facit: nec-
 non ex salibus cōtexta cerota colliquata, Indiciq; et Athene,
 & uiridia diluta, ex pumice præterea, & ex eruo consarcina-
 ta arida: ad hæc Melanchloros pastillus, consimili deniq; mo-
 do & Ocriogenes.

Ad hulcerum uermes. Cap. 42.

Arcendis quæ in hulceribus prognati sunt uermiculis, pri-
 mum quidem omnium est, humiditatem putrilaginēq; uer-
 mium parentem abolere. Interimunt autem uermes in genere
 quidem cuncta, quæ auriū lumbricis dicata sunt. His uerò qui
 in hulceribus nascuntur, Archigenes cerussam et poliū æquis
 partibus, cum liquida pice illinienda asserit.

De carnum in hulceribus præter naturam incre-
 mentis. Cap. 43.

Carneis in hulceribus superexcrescētes medicamēta acris
 ter arefacientia demoluntur: è quorū numero est diphry-
 ges calaplastatis instar inductum, & squama æris, & quæ-
 cunq; testacea cremata, erinaceiq; combusti, tam terrestres
 quàm marini, cum toto corpore. Verū hæc non admodum
 eximiè purgant, & superexcrescientia compescunt. sed Asiæ
 petræ flos longe ualidius id muneris obit: hoc adhuc uehemen-
 tius, sory, sarcocolla, chalcitis, & misy: uerū deusta minus
 rodunt, flos itidem æris. Cæterum ærugo uiribus omnia præ-
 cedit. Sales porro combusti carnes cum humore flaccidas con-
 sumunt. Consimiliter & linamenta filatim ex reijculis pan-
 nosis discerpta, in muria maioris acrimoniæ irrigata, & de-
 nuò arefacta atq; imposita, mediocres carnum excrescientias
 auerruncant. Sed rubigo cum squama æris incrementa poten-
 tius retinet. Composita autem Rhodia (quæ dicitur) arida, psal-
 ron, præterea xanthum, absque morsu excrescientia suppræ-
 munt.

unt. Vastissimas uerò carniū excrementas in altum usq;
crusta obducunt Phaulstiani pastilli friati atq; insparsi, & he-
liocæs, à solis æstu appellatum, aridum. Conducit pariter,
quod accipit calcis aqua nō extincti, squamæ æris, mannæq;
partes æquales: idem incrementa immodica, et fungis similia
cum melle repurgat, & cum cerato carne implet.

Aridum incrementa carniū coercens.

Spuma argenti, chalcitis, rubigo, plumbagocon, & quis por-
tionibus. Aliud efficaciter sine morſu reprimens, subueniens
præterea nomis, et epulidibus, hoc est carnis gingiuarum ex-
crementijs, & dentes deniq; candidans: Calcis uiuæ libra, au-
ripigmenti uncia sex: auripigmento arido aqua læuigato, cal-
cem aqua non extinctā, cadmiæ modo lotā adyctio, cōtritaq;
arefacito, & utere. Ex pastillis Pantolmius, & quicunq; po-
lypis medendis dedicati sunt, scitè admodū hulcera reprimūt.
Emplastraq; uiridia, præsertim quod ex Cappadocicis salis
bus cōfectum est. Isis item summè carnem in hulceribus super-
crescere prohibet.

De nomis, putredinibus, atq; phagedænis. Cap. 44.

Vincunt hulcera, quæ depascēdo serpūt, putridaq; existūt,
fomenta ex aceto & posca, uel uino adstringēte, aut aqua
gelida, aut marina, aut iure lenticulæ, malicoriorū, balustio-
rum, lentisci, myrtorū, spinæ Aegyptiæ, aut aliquo ex ijs quæ
astringendi & arefaciendi uim obtinent. Cataplasma ita af-
fectis accommodabitur, ex erui farina, alumine liquido, panis
filiginei mica: gobio ueteri, uel alio salsamento antiquo car-
nis illotæ: terebinthina insuper liquida æquali pōdere læuiga-
ta imponitur: uel malū terræ, uel rhicini norum foliorum cre-
mor & quis partibus, rubiginis dimidiū ex aqua mellis crassi-
tudinem habens illinito: si crusta non deciderit, elaterij aqua
pars ærugini admisceatur. Putridis prodest sory læuigatum,
& insparsum, & super carptum linamentum aridum, uel
malum terræ rotundum, uel gallus, & quis partibus cum oleo
inungito:

inungito: uel cucumeris syluestris radicem, uel brassicæ, aut betæ, aut rumicis folia illigata calidis cineribus reconde. Quæ autem remollita fuerint, cū sale trita impone, efficaciter repurgant. uel extremos ramorum oleæ colicolos teneriores, in uino decoctos, cum melle illinito: uel chalcitim cataplasmate superinducito: uel apij semen contritum, uel semen lini friatum cum atramento sutorio impingito: uel ex thymo, & uua passa, & ficibus decoctis cataplasma adhibe: uel ex ficulneis folijs læuigatis cum melle: uel nitrum & cuminum, & farinam cum melle imponito: uel cucumeris syluestris radicem, uel scillam coctā cum melle. uel foreos drachmas duodecim, chalcitidis decem, misyos quatuor, cum aceti acerrimi dimidio acetabulo donec exarescāt conterito, detractisq; utitor, specillum intingens, huleriq; circumagitando inuoluens, & superne duplum lintecolum ex ænelæo imponito. Quod si inflammatione confluentur, altercum cum polenta, uel brassicam cum melle adplicato,

Ad putredines quæ singulis locis contingunt, & hulcera depascentia.

Calcis non extinctæ, chalciteos, uniuscuiusque drachmæ duæ, auripigmenti drachma: hoc aduersus etiam digitorum pterygia, & phagedænas proficit: contra carbunculos pudentorum cum melle, in reliquis aridum utiliter adhibetur, splenio supernè ex resina superaccommodato.

Ad serpentia omne genus hulcera, quæq; os affligunt, & ad sanguinis eruptiones, & excrescentias carnis coercens multiplicis usus puluis.

Habet chalcitidos, misyos, utriusq; crudi drach. uiginti, squamæ ferri drachmas sex, gallæ immaturæ drach. octo.

Medendis depascentibus & putridis ulceribus.

Salis drach. duodecim, aluminis qualiscunq; combusti drachma, squamæ, pumicis cremati, æquis portionibus. bene etiā
facit

facit rubigo rasilis cum misyi deusto, pice liquida excepta, & squama ferri cum oleo.

Ad serpentina uerendorum hulcera.

Non tam haec, quam dictum meleterium conueniunt: Confectio ex acuta myrto, et ex charta medicamentum aridum, ad depascentias quasque proficit & ex oxymelie Coracium, atque Andronis pastillus, & id genus alij. Ceterum haec eadem ipsa medendis quoque phagedaenis apprimere quadrant. nam & phagedaena hulus est depascens, nomae naturam resipiscens

Ad hulcera cum humore flaccescentia, tetrico odoris.

Lemnia sphragis ex aceto, uel aceto mulso, uel posca, aut xino subacta, tantisper dum cenosam induat crassitudinem, illita optime facit. Vel cupressi folia, ramuli & galbuli molliusculi, uel cucurbitae aridae deustae cinis, uel platani corticis tosti, & anethi combustis similiter, uel lanae sordidae crematae, uel plantago, uel isatis per se, uel cum polenta, aut peucedani radix arida.

De hulceribus cicatrice obducendis. Cap. 45.

SI carnem hulceris quae cicatrice egent, desicemus, et astringamus adeo, ut non id modo quod praeter naturam redundat discutiatur, sed id etiam quod secundum naturam est, attingamus, extimam carnis superficiem cuti similem efficiamus, & cicatricem, ei inducemus: ad quam functionem idonea sunt, galla immatura, & malicoria moderate exiccantia: & quae praeter astringentem citra morsum arefaciunt, eadem cicatrice quoque obducunt, ueluti myrrha, spuma argenti, ostrea combusta, si inspargantur, arida. Haec quoque cicatricem saepe inducunt, cortex pini cum cerato myrteo, hederis flos cum cerato, lily radix cum rosaceo, resina pityina arida, pumex affatus, squama aris, pari potest, aridis utitor: hoc etiam reprimat. Vel pumici trito, mannae & diphrygis cuiusque momentum admisceto, & utere: uel spumam argenti partem unam, diphrygis dimidiam, cum cerato ut splenium impone. Veteribus cicatricem inducunt, uiscus cum ibure, arugo cum diphrygis tantundem, atque cum cerato myrteo:

teo: uel centaurium minus recens adglutinatum. Sed humidioribus cyprini radicē impinge. Ad sedis & pudendorū hūlcera maximē inflāmata, aloē utere læuigata, arida, uel ex aqua: uel squamam aris, uel chrysocollam in sole cum cera emollita, superaccommodato.

Aridum ad cicatricem inducendam.

Ostreorū drach. duodecim, mannæ sex, cadmiæ quatuor, proficit et hūlceribus quæ depascunt. Aliud: Mali terræ denarij sex, corticis pini, mannæ, cuiusq; denarij sex, pumicis, colophonis, ireos, singulorum denarij quatuor. Aliud: Cornu ceruini deuisti drachmæ quatuor, corticis pini scilicet, cerussæ triens, æruginis rassæ dodrans, cadmiæ denarij duodeviginti. Aliud: Florum mali Punici, tramenti sutorij, singulorum sextās, squamæ aris, aluminis scissi, uniuscuiusq; uncia, gallæ drachma. Aliud: Cerussæ, spumæ argenti, uniuscuiusq; uncia octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ, singulorum drach. quatuor.

Cicatricem inducens.

Aluminis scissi uncia, læuigata in aqua sextario maceratur: ubi dissolueris, aqua linamenta concerpta imbuito, et siccatis utitor.

Emplastrum ad cicatricem inducendam ex simplicioribus.

Ceræ drachmæ quadraginta, spumæ argenti triginta quinque, diphyrgis octo, myrtini hemina dimidiata. Facit etiam ad hæc emplastrum ex dactylis palmæ Phœnicine appellatum, & ex cadmia, & myrsinatum, & id genus alia. Ad ea uerò quæ ægrè cicatricem contrahunt, ceræ, myrtei, singulorum drach. sex, cadmiæ uncia sex, plumbi, thuris, singulorū drach. duæ, aluminis scissilis, aris cremati, uniuscuiusq; uncia, rubiginis rassæ drach. duæ, alternis diebus soluuntur.

Inueteratis & cicatricem uix contrahentibus.

Cadmiæ, chrysocollæ, aluminis scissi, singulorum drach. octo, æruginis, squamæ aris, uniuscuiusq; drachma, resinae ex pinu

pinu drach. quadraginta, ceræ drach. centum, myrtini quantu-
tum satis est. Aliud: Ceræ, resinæ ex pinu, singulorum seli-
bra, cadmiæ tantundem, chalcidis crudæ quadrans, myrtini
quod sufficit. Cadmia in uino dissoluitur, & chalcitis, tēpori-
bus Caniculæ platysmate utitur. super id aut linamētum con-
cerptum, et spongiā ex uino, inducito. Aliud: Aeris tosti, alu-
minis fissi, singulorum sextans, salis ammoniaci denarij duo,
ceræ selibra, colophonæ tantundem, myrti sextans. Arida
ex aceto in sole diebus uiginti diluantur. Cum autem mellis
spissitudinem acceperint, liquefacta & refrigerata cera mol-
lificando miscetur. Confert ad hæc præterea medicamen-
tum ex pumice, item lsis, & consimilia.

De maleficis hulceribus, quæ Chironia, Telephia
dicuntur. Cap. 46.

Nueterata, & quæ ægerrimè ad cicatricem ueniunt hulce-
Ira, alij Chironia, tanquam Chirone medico excellentissimo
in curatione egerēt: alij uerò Telephia, quod eiuscemodi hulce-
re Telephus diu uexatus fuerit, nuncupant. Considerandum
igitur, num uniuersum corpus prauo succo redundans, id ge-
nus affluentias hucēri transmittat, humorq; superfluus ido-
neorum medicaminum officio euacuandus est. Quod si uarix
crura hulcere occupata quem infestauerit, tum etiam quem
admodum in Chirurgia explicabitur, tollendum est. Vel san-
guinis detractione euacuandum, non parè auferendo san-
guinem: mox topicis uiendum adminiculis, quæ instaurano-
di potentiam absque rosione contineant. Simplicia ergo quæ
ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calceq; mediocri-
ter lota constant, alumen item scissile læuigatum insperges:
Hysopi drachmas quatuor, nitri duas, uue passæ quatuor, al-
lito prius melle, cataplasmatibus modo inducito. Squamæ por-
rò æris drach. decem, aluminis duas, cum ceræ drach. decem,
subactis in sole, superimponito.

Compo-

Composita sunt hæc. Emplastrum ad Chironia.

Cerussæ uncia octo, aluminis scissi dua, squamæ aris drachmæ dua, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasa, corticum malorum granatorum, uniuscuiusque sextans, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrti libra una cum dimidia. arida uino dissolue. Hoc callum statim à principio tollit, & depositum seruetur. Postremò autem remollitum myrtino, cicatricem inducit. Aliud: Spumæ argenti libra, olei libræ dua, chama leontis herba nigra, radicis aristolochiæ, gallæ immaturæ, singulorum uncia, galbani, ammoniaci thymiamatis, thuris, uniuscuiusque uncia dua: præparato, cum radicibus uiridum harum dinum mouendo.

Archigenis ad Chironia, cum in tibiis, tum in mammis cacoethe, strophulas & parotidas.

Adipis bubuli libræ tres, terebinthinæ quincunx, manna septunx: terræ Sardæ appellatæ, qua pictores utuntur, quincunx. his quæ liquari possunt lachrymæ, cum aridis confusis utitor. Aliud Archigenis: Ceræ triens, olei omphacini, polinis uel lachrymæ thuris, diphrygis, squamæ, singulorum drachmæ quatuor, cum aceto arida terantur, mellisq; crassitudine facta, misces cerato, & utere, linamentum conceptum immergendo. Aliud ad fœminarum, & aliorum tenerioris cuticulæ hominum maligna hulcera: Ceræ Tyrrhenicæ drachmæ octo, pinguetudinis taurinæ, terebinthinæ, plumbi destili, & eloti, cuiusque drachma una: utere cum linteolis, rosaceo uel myrtino imbutis.

Ad cicatrices atras. Cap. 47.

Vscas cicatrices exerit oleum, in quo radix bryoniæ candida, & nigra, donec succus extrahatur, decocta sit, impositum. Nepeta item in uino elixa, spuma argenti elota cum rosaceo candido. Quæ lichenas sequuntur cicatrices, & alias, reliquæ cuti concolores facit asininus adeps illithis, crucæ semen contritum cum felle caprino,

¶

Et bouillo, et ouino illitum, cum spuma argenti. Ouillus talus deustus uino adstringente leuigatus, ammoniacum thymiam cum suillo felle illitum. Composita porrò ex argenti spumæ, mentæ, thuris, æquis partibus cum melle. Aliud: Nitri, ammoniaci thymiamatis, sulphuris igne intacti, myrrhæ, æquas singulorum partes in aceto albo, uinòue aut aqua friatis, parcißima manu, ne exulcerationem excitent, illinito. Aliud: Cretæ cimoliæ, stercoreis columbini, saponis, thuris, par pondus ex aceto. Smegma tollendis cicatricibus nigris: Cretæ cimoliæ drach. octo, spumæ nitri quinq;, ueratri albi tantundem, liquoris glandis unguentaria drachmæ quatuor, in balneo cicatrices absterge.

De hulcerum lacunis. Cap. 48.

Quando cutis quæ hulceribus adiacet, longo temporis spacio, subiecto corpori non coalescit, et cõglutinatur, Græci colpon, Romani sinum appellant. Proinde cum in superiorem hulceris partem sinus porrigitur, facili destillatione per os sanies excernitur, et promptius coalescit. Cõtrà autem, qui ad inferiora uergit, inherens sanies cõtiguas aliquot partes intus corrodit: et nisi incisionem prius, quo subterfluat, machinatus fueris, nihil egeris, neq; ipsum carne replendo, neq; cõglutinando. Quod si lacuna alicui membrorum, uerbi causa, brachio, aut crure, insinuata sit, absq; diuisione ex aduerso facta poterit decliuis figurata cõglutinari. In brachio nanq; prope cubitum hostiolo existente, summam manus partem altius protendens, sinum in fluxionem conuerteres. At si in femore prope genu terminetur sinus situm eius pronum reddes, si popliti ceruical molle subieceris, quod inguina inferiore situm habeant quàm genu. Quapropter si carnis impletionem sinus nõ requirat, cõtinuò per tubulum rectò perforatum uesiculam intus habentem ad abstergendam simul inhaerentem saniem, aquoso melicrato potabili eluendus est: sed ad futuram cõglutinationem, uino uel mulso, deinde ad ea quæ cõglutinandi uirtutem habent, deuenia

LIBER QVARTVS.

deueniendum est. Sin cauus sinus incarnationē desideret, primum quidem est, exiguum medicamenti ē charta arida cū rosaceo immittere: proximum, linamento filatim concepto ostium obturare. Ab hoc medicamentum Isidis, aut Machæ-
rionis, uel id genus aliud emplastrum, cum rosaceo cerato li-
quidiore cōpari modo inijcere. Sinu uerò moderatè iam car-
ne impleto, conglutinans aliquod medicamentū imposito, per
inde atq; recens cruentum uulnus curabis. Bius ordinis sunt,
Barbara, dichroma, et rubra, fuluæue adpellata: sed omnium
præcipuè id quod ex rhicinino, & metallicis, sine cera præ-
paratum est. Rubrum Galeni emplastrum conuenit. Post me-
dicamenta adhibita, sponsia recens, uel ex mulso, uel ex uino
circunquaq; admodum molliſimè adplicanda est. Deliga-
tura autem à fundo sinus inchoans, ad os ipsius terminabitur.
Vinculorum reuolutiones fasciæq; lintæ, fundum sinus citra
dolorem constringant: deinde paulatim remissæ usq; ad sinus
oris laxius connectantur, emplastro sinui foris circumposi-
to, forcipe secundum orificium ita discisso, quò sanies possit
excerni. Pusillo interim alio in excisi locū emplastriolo im-
posito, ex eodē medicamento ad effluxionem laxo. Sinito autē
ipsum ad solutionem usq;: qua tertio quoq; die facta, auferes id
ipsum, atq; permutabis, medicamento totum sinum ambiente
semper dimisso. Indicium autem tibi sit, nunquid profundior
pars sinus probè sit conglutinata, sanies emanans pauca &
concocta, uel si nihil effluat, sensilis. Præterea si eodem in sinu
neq; dolor quispiā, neq; tumor percipiatur, sed locus omnis cō-
tractus, aridus, & indolens appareat. Quin si pus quoq; matu-
rum in ore cōspicias pauculum, noli omnino de conglutinatio-
ne desperare: sin primo uel altero die sanies aliqua tenuior ē
sinu excernatur, de eodem conglutinando spem non abijcias.
Sæpe etenim medicaminis uires uehementer ex subiacentibus
partibus humore prætenuè exprimūt. quo quidē expresso, lo-
ca moderatè siccata contrahuntur et cōglutinantur. Tertio ue-

A a

ro, uel

rd uel quarto ab initio die, si cruda sanies per os appareat, sinum non coaluisse intelligito. Insistendumq; eodem medicamento: et si, ut solet, propter madorem quempiam decidat, eadem etiam mutare, nihil est absurdum.

De sinibus ac laceris.

Si in abscessus curatione serius ad incisionē, uel medicī impeditia, uel eius cui medetur timore deuentū sit, cutisq; sinum ambiēs tenuis, et dirupta ueluti attritum uestimentū euaserit, fieri nequit, ut memoratis collutionibus elidatur. glutinatoriū idcirco medicamentum, substantia quidem liquidū, sed facultate aridum, utiliter applicabimus. Cuius classis est, cōpositio ex chalcitide, quæ Phœnicina adpellatur, oleo imbuta ueteri, quæ nondum induruerit, neq; manus inquinare desuerit: mox uerò cum uino mediæ ætatis macerata: deinde orbiculatim competenti cum deligatura imposita. Subuenit autem lacinia rum instar detrita, ceu traditum est, cuti haud parum, mel ad spissitudinem usq; emplastri elixum, et superinductum. Satius uerò fuerit, post illitionem per cribrum in subline suspensum myrrham in puluisculum exquisitissimè tritam, uel aloen, uel thys, uel pariter omnia inspergere. Expertus uerò sum, tene centaurium admirandæ opis esse in hac re præsidium: proximè uerò est simphytum: ab hoc tertium bonitatis locum habet illyricæ iridis radix: post quæ cruinam comperi farinam cum primis utilem. Atqui inter coquendum nonnunquam eadem melli inferimus, cum aufrendus est à flamma lebes. Præstiterit uerò, si illo ab igne sublato hæc fiant: deinde agitetur, ubiq; tepidum euaserit, sinui imponatur, atq; perinde ut tradidimus, illigetur.

De fistula. Cap: 49.

Fistula sinus est callosus: ex abscessibus plerunq; oriens, sumpta per translationem ab harūdinum fistulis appellatione. Quare si ad os usq; decumbat, curari hanc absq; manus opera imposita

impossibile est, nisi temporis spacio sua sponte squama uel os abscedat. At si in os non desinat, medicamentis callum elidentibus et cōglutinātibus curabitur. Sunt igitur hæc quæ callos adimunt: spondilij radix circumrasa & imposita, fistularum callos abscindit: ueratrum item nigrum fistulis impositum, in duobus tribusq; diebus callum expungit: amurca cocta, et ad collutionē offusa: Sory crudum uel tostum, cum exiguo uino immodicè diluto, infusum. Sory item, et crocomagma, cū hydromelite: aut elaterium terebinthina exceptum, in collyria formato, et superinducito: aut laserpitij radicis succū infundito. Cōsumit callos etiam illud: Aeruginis drach. duodecim, guttæ ammoniacæ duas, aceto exceptas, in longum fingito.

Collyrium quo ad erunctionem calli fistularum utimur.

Ammoniacy suffiminis, atramenti sutorij, rubiginis, misyos, chalcitidis, gummi, æquales partes excipiuntur aceto. Aliud ex Heliodoro Chirurgica: Cadmeæ, misyos, atramenti sutorij, æris cremati, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drach. treis, lotio pueri impubis excipito, et in collyria redigito, de quib. uno fistulæ imposito, panis medullā aqua maceratā exterius applicato, mutans subinde, tātisper dū inflammatio quicuerit, et crusta exciderit. Aliud, quod in Alexandria accepi: Anchusæ radicē, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis fissi, atramenti sutorij, aloes, singulorū uncia, cantharides quinque, aceto læuigata in penicilla coguntur. Aliud: Atramenti sutorij drach. duas, chalciteos, rubiginis, singulorum drachmam ammoniaco excipito, & utere. Callo autē discusso, rubigine tosta cum mulsæ purissimæ octuplo factis collyrijs, repurgantur. Vbi callus extricatus fuerit, remedijs carne replētibus utendū. Collyrium procreandis carnibus: Aloes, myrrhæ, guttæ ammoniacæ, ouorum testarum crematarum cineris, æquas partes aqua diluito, facitoq; collyria, & applicato. Aliud: Myrrhæ, aloes, thuris, malicorij, par singulorum pondus aqua excipito: sunt qui felle taurino excipiant.

Carnibus etiam ex uuis acerbis succum in collutionem adhibent. Nouimus ipsi quempiam, qui cedrio liquore fistulas coluebat: et uoti compos subinde factus, admirandus habebatur. Postquam autem fistula carne expletur, medicamentum conglutinandi potentia praeditum, est adbibendum, eodem, quem in alijs sinibus explicui, modo. Sed cum angusta pariter et oblonga fuerit fistula, inquit Galenus, nec dum callum, sed sordium modò illuuiem contraxisse appareat, ante omnia lixiuium immisi: deinde in fistula tandiu permisi, dum sorditiem uniuersam radicitus emanasse sperabam: post haec pharmacum imposui. est illud uerò, quod rhicinino oleo constare, superius dictum est.

De ruptis hulceribus. Cap. 50.

Hulcerum uerò nonnulla cicatrice obducta, postea temporē haud ita multo interiecto, denuò inflammantur, ac dirumpuntur. Osse etenim quopiam male affecto, caro quidem ambiens faciliè cicatricem contrahit, ac sana in totum esse uidetur. Rursum uerò humoris colluuiē ualenter influente, ex osse sensim in alto contabescente, inflammatio cum purulentia cicatricem deradens superuenit. Curatio igitur istiusmodi hulcerum, tantam desiderat siccitatem, ut os afflictum decidat. Promptè igitur ossium lacunas replebunt papaueris syluestris, ficiq; folia, cum tenuissimo hordeaceae farinae flosculo lauita, et uino cataplasmatibus more inducta. Vel alterci semen, et atramentum sutorium pari modo trita, imposita: peucedaniq; radix ossium squamas breuissimè remouet.

De hulceribus articulorum. Cap. 51

Articuli sicciores, carnosius sunt partibus: cuius ergo cum hulceribus impetitur, aridioribus egent medicaminū praesidijs. Pastillus igitur Polyidae cum uino, tantisper dum strigmenti balneorum crassitudinem induat, contritus, magnificè opitulatur: et quae huic similiter exiccant medicamina. Melius insuper se habuisse uidimus, si aqua maris uel muria frequentius

quentius irrigentur. In articulis itaq; utēdum ijs, quæ maiore arefaciendi facultate sunt prædita.

Quæ paxillos, tela, spinas, & consimilia extrahunt. Cap. 52.

Tbla, spicula, culmos, surculos, & spinas educunt, anagal-
lidis utræq; species, aristolochia rotunda, gutta ammoni-
ca cum melle, herba apollinaris fructus læuigatus, & cata-
plasmatis modo impositus. Harundinis radix contusa, mel-
liq; commixta, in lintecolum amplum illita, superq; accommo-
data, celerrimè extrahit.

De sanguinis e uena & arteria eruptione. Cap. 53.

Quando corporis membra sanguinem fundunt, sius ei qui
in simbus relatus est, cōtrarius, competit, sursum uidelicet
uergens sed intra modum. periculum nanq; ne dolore confla-
to sanguis rursus e uase prorūpat. Nihil enim uero uehemen-
tius sanguinis eruptionem concitat, inflammationesq; adau-
get, atq; tolōr. Sanguine igitur ex membris proficiente, confe-
ssim digitum osculo hūlceris uasorum inijcito, clementer inni-
tens: & ne quem dolorē inferas, reprimens. pariter enim san-
guinem cohibebis. & grumum uulneri conciliabis. Quin etiā
si uas unde sanguis emanat, profundius deliteat, exactiore di-
ligentia perdisces cū positum, tum quantitatem ipsius, &
uenā ne sit, an arteria: post hæc uerò uase existente exiguo,
eorum aliquo quæ sang. m suppressunt, utendum. Præci-
pua eius ordinis sunt ea, quæ obstruendi gratia inducuntur,
composita ex colophonia, farina triticea, polline, et gypso,
& quæcunq; id genus, oui albore eliquata, & cum leporinis
pilis imposita. Spacioso autem existente uasculo, hamulo im-
misso, ipsum extendito, & moderatè circumagito. Suppresso
uerò sanguine si quidem uena fuerit, citra laqueum conaberis
sanguinem ipsam ipsis medicaminibus coërcere. Sin arteria,
è duobus aliterum facies, uel funiculo circūducto, uel toto præ-
ciso conceptaculo, sanguinis effusione cohibebis. Filum quane-
doq; magnis etiā uenis circumponere, quemadmodum & dis-

secare interdum totas transversim nimirum cogimur. In hanc necessitatē devenies in his uenis, quæ rectæ è profundiore corporis loco ueniunt, præsertim per angustias loci, uel principes particulas. Sic enim pars utring; repellitur, & uulnus à corporibus adiacentibus premitur, & contegitur. Tutius uerò fuerit utrumq; facere, funiculum quidem uasis radici circumponere: quod autem inde profertur, amputare. Hæc ubi sic perpetrata sunt, uulnus quamprimum fieri potest, carne repleto, priusquam conceptaculi uinculum decidat. Nam si protinus carne impleatur, locus uerò alibi uacuus offendatur, malum quod Græci aneurysma nominant, oboritur. Discernes autem, uenâ ne an arteria sanguinē fundat, quod arteria sanguis flauior & tenuior esse consuevit, et cum pulsibus exhauritur. Venæ autem sanguis atrior, & sine pulsu. Omnium igitur, quæ nouimus, medicamentorum ad incarnationē optimum est, quo etiam aduersus sanguinis membranarū cerebri eruptiones tutissimè utimur, aduersusq; ceruicis uulnera, et ad iugulares colli uenas. nam harū quoq; nullo adhibito funiculo, sanguinem compescit: Accipit autē thuris pinguißimi partem unam, aloës in delicatoribus quidē corporibus partem dimidiatam, in durioribus uerò tantundem: & thuris præterea loco, pollinis eiusdem æquale pondus, cū oui albugine ad melioris consistentiam subiges: postea leporinis pilis mollioribus excipito, inde uasi & hulceri uniuerso liberalius imposito. Deligetur autem foris fascia ex lino, cuius primæ nexuum reuolutiones quatuor aut quinque, ipsi uasculo unde sanguis erūpit, injicientur. Postea uerò ad radicē ipsius nexibus deuolutis distribuuntur. Deinde ubi tertio die soluerimus, si quidem medicamentum hulceri etiā dum solidè adhæserit, nouū rursum orbiculatim superaccommodabimus, & madefacientes, contegētesq; haud aliter ac prius fasciabimus. Quod si primū linamentum reiectum sponte exciderit, leuiter summis digitis conceptaculi radicē premendo, ne quid influat, illud quidē sen-

sim

sem detrahe, sed alterũ applica, ab hoc curãdi ordine nunquã recedens, donec carne expleatur conceptaculũ, semper membrũ in accliuũ figura sine dolore seruãdo. Cãterũ quã crustas pariunt, glabriorẽ magis, q̃ secundum naturam fuerit, de lapsa crustula partem efficiunt. Plerosq; ex ijs quib. crusta decidit, difficulter cõpescibilis secuta est sanguinis eruptio: utendum tamen est illis, cum ingens urget necessitas. Extremã autem necessitatẽ utendi medicaminib. crustam inducentibus, uel cauterijs candentibus, censeo, cum ex erosione putredinẽ respiciente sanguinis profluiũ oboritur. Vbi in id genus affectibus, totum quod putredinẽ sensit, exciderimus, minore cum discrimine, aut ipsius ueluti radicem deurere, aut remedijs incrustandi naturam tenentib. uti licebit. id uerò in uerendis et anopotiũ solet contingere. Scopus uerò medicamentorũ crustas inducentiũ erit, cum stipticitate caliditas, perinde atq; in chalcitide, misyi, et atramẽto sutorio existit. Sed quã calce uiua constant, his uehementiora quidẽ sunt: sed quoniam constringendi uirtute calx destituitur, crusta citius ipsorũ applicatione decidunt. Præstaret autem ut manerent diutius: festinat quippe caro ad basim ipsam supercrescere, & tanquam operculum uasis promanantibus effici. Cãterũ eiusmodi sanguinis profluium, isatis satiuũ si inspergatur, eximiẽ compescit, uel galla tollat: expedit autem cauteria ignita aceto uel uino extinguere. In summa, sanguinis profluvia supprimunt, incõposita quidẽ, aloẽ, thur, manna, Samius aster, ærugo ferri, lana arum similiter crematarũ læuigatissimus cinis, sterces asini & equi, malicoria, diphryges, galla, myrtus arida, alumẽ omne genus, tum crudum, tum combustum, colophonia, uitis cortex, uel folia arida platanorum, galbulorum puluisculus tenuissimus, præsertim cum humorem concretũ abiecerint. Priuatim uerò narium sanguinis profluvia impositu sistũt, iunci marini semen, foliorũ urtica succus, chalcitis, solastrum deustum, pili leporis, ferula dimidiũ crematum cum aceto, asininum

A4

4

sterces

stercus siccum aut humidum, succus porri cum thure elychnio exceptus. Composita autem cuiuslibet sanguinis profluvij remedia hæc sunt: Spōgiam recentē liquida pice imbutā, & bitumine circumlitam in olla recēti combure: cineris uerò partibus duabus miscētur plumbi, & stibij, singulorum pars una. Aliud: Thuris, mannæ, sulphuris uiui æquas partes infere. Aliud: Chalcitidis drachmæ octo, thuris uel mannæ sedecim, resinæ frictæ octo, gypsi deusti tantundem. Aliud crustas generans, sanguinemq; cōpescens: Chalcitidis, æris tosti, atramenti sutorij, misyos assati partes æquales. Ad hæc, Rhodia cognomento, & Xanthe, sanguinem optimè cohercent.

De neruis faucis. Cap. 54.

Nerui faucij, uel punði, ob sentiendi, qua præditi sunt, excellentiam, inflammationem doloremq; immensum experiuntur. Proinde febres & conuulsiones ipsis superueniunt: nonnullis uerò deliria, propter neruorum ad cerebrum continuitatem. Verum quandoq; in alijs etiam uicinis uulnerato membro locis, inflammationes & abscessus secundum neruū uulneratum, ob commercij quod cum ipsis obtinet, oriri assolent. Cutis itaq; uulnus nullo glutine commissum, diductumq; quo per id sanies excernatur, seruandum est. At si punctus in alium, ita ut in conspectum non ueniant, descenderint, duplici sectione et decussu se mutuo secante opus est. Sed quod ad opis ferendæ attinet iudiciū, si corpus deprauatis succis infartum sit, inflammatioq; magna affuerit, protinus à sanguinis detractione medendi inchoanda est ratio. Si uerò uitiosis scateat humoribus, medicamēto etiam purgante utendum. Pharmaca aut uulneri adhibeantur, quæ dolorem sopiūt, et aperiendo sanici emissarium promoueant, non facta præsertim dissectione. Aquam proinde calidam cæteris quidē inflammationibus utilissimā, scito uulneratis neruis esse quā infestissimā. Satiùs ergo fuerit neruos idios oleo tenui, adstrictione prorsus carente, ad sensum calido perfundere. Nec enim frigidū, neq; etiā tepidum aded

adeo innoxium est. Cæterum ex medicamentis, resina terebinthina accommodatissima est, per se quidem cum pueris, tum sceminis, et carne mollicula præditis: eliquata uero cum euphorbio, in carne durioribus. Et si quando duriora obuenerint corpora, cum oleo quopiam tenuium partium macerata. Si nerui inflammatione confluentur, et putredinem sentiant: cataplasmatibus hordeaceam habentibus farinam, aut fabaceam, aut eruaceam in lixiuio stillatio cum oxymelite coacta, utendum. Citra coacturam uero, in puncturis cerato etiam eiusmodi quis utatur: ceræ uncias tres, euphorbij unciam, uel sterces columbinæ: in duriusculis carne corporibus, olei uncias duas, et terebinthinæ nonnunquam unciam. Emplastri uero instar remedium efficies, si in euphorbij unciam, ceræ, colophonice, olei et picis pinguis, singulorum selibram injicies: uerum si resinæ loco propolim pinguissemam indideris, reddes id præstantius. Ad punctos sane neruos illud excellens est, conferens etiam ictibus rabidorum: Aceti sextarium, picis pinguis libram, opopanax quadrantiem. Opopanax solutum aceto, amplius laugato, et picem eliquatam decoquito. Hoc neruorum puncturis expedienti est præsidio, non permittens puncturæ os conuiuere, ueluti neque rabiosorum morsuum hulus cicatricem ducere: sed duris duntaxat prodest corporibus. Sin uero in pueris, aut mollioris caruncula hominibus punctis uti uelis, liquefaciendum est aliquo discutiente medicamento: uerbi causa, amaracino, uel opobalsamo, uel oleo ueteri. Cõuenit etiam medicamentum Basilicum, quod nitrum aut calcem uiuam, aut euphorbium, aut sulphur igne intactum, aut syluestris palumbi fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut succum Cyrenaicum, aut castoreum continet. In libram uero medicaminis, dictorum alicuius unciam conijcito. Conducit autem ad neruos uulneratos optime, in primisque, compunctos. Poterit autem quispiam ruri, nullo horum ad manum existente, propolim recentem et pinguem uulneri imponere, uel fermentum, præsertim antiquum, per se, aut cum propoli

Aa 5 mixtum,

mixtum, uel unà cum succo tithymalli. Cataplasmatibus præterea ex oxymelite, uel lixiuio stillatio, cum farina fabacea, aut eruina, aut ciceris, aut lupinorū amarorū, aut hordeacea, aut tenuissimo farinae polline: nō solū cū inflammationē experiuntur, uerū ab ipso cōfestim initio, utitor. Cataplasmata uerò relaxantia, in neruorū uulneribus, semper uitentur. Quod si non prædum neruus, sed casim euidentē diuisione sauciatus fuerit, ita ut præiacētē etiā cute diuisa, neruus nudus et rectus appareat, minimē aut transuersim dissectus, prædictorū ex euphorbio et alio tantē ac credinis medicamine nullo uteris. nudatus quandoquidē neruus, uehementiorē ipsorū uolentiā non feret. Calcē itaq; assumes, iterū atq; iterū tempore calido ablutā, et libera liore oleo irrigatā. Vtilis etiā cōfectio ex pōpholyge, necnon ex melle contexta, in rosaceo multo eliquata. Neq; uel tantillū ex his uulnerationem cōtingat, cautio est. quoniā plurimū sub sensum uenit neruus, et est tēperatura frigidus, ac summo primariū partiū principi cōtinuus. Quin ne oleo quidē id genus hūlceris, quoniā cōtaminatur inde, aspergendū est. Sanies ergo tantū nucleari specillo, lana molliore implicato, abstergēda est. Omnibus uerò ex animi sentētia succedentibus, citra periculū datur passio madefacere. Atqui in fortioribus: Polyidae etiā pastillo cū defruto calido, linamento discerpto illito utere. Vbi uerò neruū denudatū contexeris, linteola discerpta foris adhibēda sunt, aliquo eorū quæ ad angusta uulnera conducūt adiecto: uerbi causa, medicamine ex euphorbio, aut ex stercore columbino, ita ut ampliter sanas etiā partes amplectatur. Si uerò uulneratio per transuersum fuerit, magis periculū si obtegatur: uel maius conuulsionis periculū imminet. Huic illiq; medendo eadē prorsus adhibēda est curatio: cū in uulneratione etiamdū recēte, cōsutionibus quidā usi sint, et glutinantibus quibusdā medicamētis. Verū oportet cōsutiones non admodū superficiarias moliri, ne profundiora incoalita debiscant: sed altiores, rursus obseruando, ne neruum acui compungas.

compūgas. Scire uerò in uniuersum oportet in neruorū uulneribus, quod medela puncturis subueniens natura calidior, non potest nerui hiatum sanare: mordicationem enim ipsarum, & effrenem feruorem sustinere non possunt. Neque quicquid medicamenti diuisionibus subuenit, punctiōibus statim congruit: quoniam uis eius altius non penetrat, quum arcta admodū existit cutis diuisio. Nutricatus hic tenuis esto, culcitra mollis: calidoq; oleo axillæ, caput, & ceruix perfundentur. Si eris, inguina, sumen, et finitima loca neruorū uulnera experiātur, ualeant in totū, usq; ad inflātionis remissionem (cum aqua attactus ipsis, ut dixi, infestus sit) balnea. Quoniam autem nonnulli propter solennē lauandi consuetudinē, lauacris abstinere non sustinent: siquidē membrum uulneratū fuerit manus, danda est opera pro uirili, ne hæc, aqua uel calida, uel multo magis gelida made fiat. Sin pedum uulnus exerceat, cum fieri nequeat, ut non irrigetur aut humectetur, sub balneum sauciæ pedis parti emplasticū aliquod medicamentū inducatur: foris insuper, multiplicatis linteis quamplurimis oleo madidatis muniat. Iterū extrinsecus uinculum è linteo injiciatur, atq; post hæc rursum in balneo ligamentum oleo prius perfunde, iam ægro in solium descensuro: ubi lauerit, cuncta quæ adplicata fuerant porrice, uterisq; præscripta totius curationis regula. Contuso aut solum neruo, si cutis simul cōtundatur et exulceretur, appositū fuerit remedium ex farina fabacea, et oxymelate cataplasma. Licet etiam interdum crui farinam & iridis adycere. Quod si cum contusione dolor insisteret, picem liquidā admiscebis: sin cutis contusa nō sit, summū erit discussoriū, calido oleo, anethino inquā, aut rutaceo, aut irino, aut amaracino locū iugiter irrigare. Neruo aut uniuerso prorsus dissecto, discriminis quidem nihil incumbit, sed membrū languidū et ignauum redditur. Huic uerò curatio cum alijs h ulcerib. compar adhibeatur. Hactenus quidē de neruorū sauciorū, quæ simpliciorib. adminiculis peragitur, curatione sufficiat. Nonnulli uerò

uerò ex pluribus rebus cōpositis uti consueuerunt, qualia sunt è metallicis confecta, cognomento Barbara, & Cissinum, & quod ex senecione preparatur, & Melanchlorū, ipsaq; indica, Harmonia, & Athenae: quorum compositiones, utendi rationem septimo reperies uolumine. Quoniam autem locupletissimi quidam sumptuosius in neruorum uulneratione medicaminibus uti dignantur, Galenus ad punctiones neruorū huiusmodi tradidit: Cinnamomi, diadani, fœniculi, uniuscuiusq; uncia, amaraci sextans, ceræ bebis, opobalsami dextans, resinae terebinthinae uncia. Aliud: Liquoris Cyrenaici uncia, ceræ quadrans, succi balsami libra. Facit ad neruos denudatos: Ceræ unguentariae uncia tres: unguenti spicati, aut phulliatu, uel nardini uncia duodecim: pompholygos, spica nardi, amomi, folij singulorum uncia. Atq; hæc quidem ad miraculum usq; pollere, Galenus ostendit.

Ad contractos seu ligatos articulos. Cap. 55.

ANcylos & ancyloses nuncupare solent articulorum detentiones ex redundantium humorū infartura, uel neruea quadam tensione conflatas. In quibus emolliendi & relaxandi uiribus præditis medicaminibus opus est. Communiter his remedia, quæ in membris scirrho infestatis, adhuc uerò magis, quæ de dissolutis enumerata sunt partibus, succurrunt. Priuatim uerò confert ex hydrilæo fœtus, in quo cocta sunt semen lini, fœnograecum, alibea, laurus, cucumeris syluestris radix, & ipsum quoq; sicyonium. Post hanc articulorū asperzionem adhibeantur acopa. primum quidē simpliciore, ueluti sunt ex nigra populo, ex abiete, bromium, basilium, pyxis: post quæ etiam Aristophanium, & quod ad Azanimum. Vehementissima uerò sunt, Lisoponiū appellatū, & Pæcilum: & ex emplastris seminis roris marini, non modò Amythaonis, sed & Anicetum. Probatissimum uerò: Bdelly, adipis uitulini, guttæ ammoniacæ thymiamatis, ireos illyricæ, singulorum drach. sedecim, opopanacis, galbani, styracis, thuris, uniuscuiusque drach.

drach. octo, piperis grana centum & sexaginta, ceræ libra dimidia, resinæ terebinthinæ tantundē, fecis irini quantum satis est, uini quod sufficit. Tusile est medicamentum. Probatur etiā non contusum (aut laesitudinem tollens) dilutum irino, uel cyprino, uel laurino. Inter acopa uerò et emplastra numerantur ex petasone polymagmatum. Cæterum acoporum usus cum molli et constanti frictione adhibebitur, factò prius periculo, nunquid flecti extendiq; possit affectus articulus.

De laxatis artubus. Cap. 56.

In diuturnis quæ cum febre sunt morbis, & in colicis, paralyticisq; ægritudinibus, articuli sæpenumero relaxati flaccescunt, maximè si calidior ipsos & humidior intemperies occupauerit: hinc etiam motio impeditur. Quibus acaciæ succus aqua dilutus, & fotu adhibitus, congruit: uel rubi, uel myrti, uel lentisci, uel ulmi radicum corticis decoctum, uel malicorria cataplasmatibus modo impasta, uel myrti folia unà cum cesrato myrteo imposita. Robur quippe neruorum nexibus est inducendum, cū stipandi & arefaciendi uirtute prædita materia. Huius itaq; farine artubus medicamenta sunt adhibenda, cuiusmodi ex salicibus constituitur, & oxyra, & phoenicina, quæ uino astringente, uel aceto constat. Permulti uerò ex algore istiusmodi languorem creari autumantes, calidioribus usi adminiculis, detrimentum multo acerbius intulerunt.

De lumbricis. Cap. 57.

Res sunt omnes lumbricorum differentie: una quidē, tereuforma secundum crassitudinem est: altera uerò latiore, unde latos nominant: tertia, eorum quos ascaridas nuncupāt. Omnium uerò generū origo ex cruda, crassa, pituitosaq; materia, & putrefactioni idonea est, cuiusmodi in pueris, & in alijs, qui plenis faucibus auidè liguriunt, colligitur: nunquam autem à calida, acri, uel melancholica materia. nam hæc nutrimentum naturam supergressa, ad lumbricorū procreationē inepta redduntur. e contrario hos biliosa potissimū excrementa interimunt, si quādo unā cū lūbricis flaua bilis, siue per inferna,

na, siue etiam per uomitum excernatur, ipsos in intestinis consistere: biliosum uerò humorem, uel in ore uentris, uel in aliquopiam membro hæere scito. Singularū itaq; differentiariū specie, ortum, locum, notas, & curationem explicabimus, principium à tereti & rotunda sumentes.

De lumbricis teretibus ac rotundis:

Lumbrici igitur teretes formam nemini obscuram continent, quoniā hi reliquis frequētiore sunt in gracilib. plerumque intestinis consistunt, & in superiorem uentriculum procurrunt: proinde per os non rarò eijciuntur, nonnullis uerò per narces. Quod quidem uermiū genus infantibus, quàm ceteris, peculiarius, & magna quidē ex parte cū febre existit. Verū si circa febriliū principia proueniant, subsistentiā ex subiecta corruptione recipiunt. Circa summos uerò uigores, ex morbi malignitate. In declinatione autē, totius in melius trāsmutatione. Tradit enim Hippocrates, bonū esse lumbricos rotundos ægrimonia ad iudicatoriū tendente, progredi, qui ocysimè etiā pereant. Accidit uerò lūbricos teretes habētibz, morbus intestinorū, et uentriculi, tusses non magnæ, aridæ, et irritantes: quibusdam etiam singultus: dormientes palpitant, et si ane ratione experrecti eriguntur. Nonnulli cum uociferatione expergiscuntur, sed rursus in soporē prosternuntur. Pulsus inæquales sunt, et augentur febres absq; ordine, quæ cum extre marum partiū algore, ter quaterūq; interdū uel noctū præter rationē inuadunt. Infantes superuacue mandent, et linguā temerè exerūt, dentibus stridēt, oculis conuiert, silentiū amant, excitātibz indignantur, oculi apparēt, suffundūtur malæ rubore, atq; rursus mutato colore liuescūt: atq; hæc quidem per exigua interualla. Quibusdā ad uentriculū procurrunt, nauſeāq; et morsum efficiūt: cibūq; laborantes auersantur, coacti uerò nauſeabūdi uix deglutiunt: et si quid sumpserint, euomūt. Non paucis uerò uenter etiā multas esculentorū corruptiones excernit, atq; tympani instar inflatur. Reliquum uerò corpus præter rationē tabescit, neq; fame, neq; ulla euacuatiōe immoderata

LIBER QVARTVS. 131

Herzla admissa. Cæterū nō in omnib. omnia prædicta sunt singulatim inquirenda indicia, sed quæ principatū tenēt: aliquādo uerò plurima. Accidūt hæc, cum animalia sese in intestinis circumuoluunt, et morsum inferunt, et febrilis ardor uapores ad cerebrum eleuat prauos, ex coaceruato in uentre putrido humore exhalātes, in quib. partim quidem utrisq; iuxta cū febrī, tum lumbricis prospiciendū est: partim uerò febrim haud magnopere curātes, prorsus expellere uentris animalia cōueniet. Pleriq; etenim cum lumbricos negligērēt, corrofi ab ipsis, conuulsiq; extincti sunt. Nec desunt, qui asserunt se uidisse, per inguina languentis lumbricos prorepisse. Expelles autē ipsos, si prius enecaueris: enecātur autē præsidys potissimū amarīs. Cum igitur quartanæ febris, et animalū uentris communis sit curatio, expedient præsidia simpliciora. Ius igitur chamæmelorū, uel myxariorū, ut uocāt, potui, uel ipsa myxaria decocta esui offerātur: succus item sereos, aut coriandri semē, cum aqua calida, siue cū posca, uel auriculæ muris herba decoctum, uel cornu ceruini ramentū, uel etiam rubrica sinopis lauiatissima: olei præterea ex nondū maturis oliuis expressi amari cochliaria duo paulatim absorbeantur. amarulentia namq; lumbricos perimunt, lubricitate uerò ipsos unā cum oletulo expellunt. Inflammatione uerò distentioneq; uiscerū exuperante, ē semine lini & farina lolleacea, absinthio & bryonia radice uterium cataplasmate ex hydromelite, uel asperagine cum oleo chamæmelino, uino fructuq; absinthij, uel aloë præcordijs adplicata. Quū febres nō uehementer fatigāt, miscenda est myxarijs mentā, atq; præbēda. Quū ad infebricitationem uentū est, etiā efficaciora: uerbi causa, seriphij decoctū, uel nepitæ, uel filicis, uel semē cardamomi, uel mali Punici acicidi radicis ius ad tertias decoctum, uel fridī cymini, & nitri fului, uniuscuiusq; diobolos tres: uel sandonicū, uel abrotonū, uel utrūq; unā cū melle catapotijs factis, uel lupinorū amarorū dioboli tres, aut brassicæ, aut erucæ semē cōtritū, uel absinthium

thium, quod unum saepius satis profuit. Exhibentur insuper aloes lotae dioboli tres, quod ex his quae probantur est nobilissimum: in robustioribus etiam, illota usurpatur. Quoniam autem pueri aloen non admittunt, instrumento quo os diuarcatur, supinis fasciola ipsis uiolenter detentis, ore distento, per clysteridium quodpiam fistula non fragili munitum, inuitis aloen quanto plus fieri potest intimius transmissam iniiciamus: quae quidem admiranda curandi ratio puerorum molestae aloen ferentium est, quibus sorbilia saepe etiam numero alimenta, ceu iis qui cibum respuunt, infundimus. Et Cyphi, et Masuaphium utiliter adhibetur. Cornu item ceruinum deustum, cum pipere et melle, uel oxymelite: et reliqua quoque ex aceto mulso tentanda sunt. Praestat uero, si scilliticum acetum fuerit, praesertim in adultioribus: uel sinapi, cum olei et aceti cochliarij quantitate. Caeterum quibus lumbricorum culpa fluore aluius perturbatur, his succus plantaginis propinandus est: uel ipsa etiam arida exhibenda est platago. iuxta namque utriusque suppetias cum defluxioni, tum lumbricis contulerit. Cataplasmatibus modo adglutinanda sunt, polenta hordeacea cruda, filix, absinthium, farina lupinorum, sandonicum, et abrotonum. Iam uero malicoria quoque, acacia, galla, uel balauustum admisceantur. Quoniam uero saepe potionibus amaris offenduntur aliqui ex iis quae iam pridem enumerauimus, haud euidenter amara exhibe. Adhaec etiam chamæpitum, marrubium, enulam campanam, baccas lauri, cassiam, thymum pulcgium, carpesium, cyperum, polypodium, irin, cnicum, rubiam passiuam, spinam Aegyptiam cum pipere, æquis portionibus pondo diobolorum sex, uel decoctum mentae, uel radicis mori succum, uel elixationem petroselini, et id genus alia fragrantia semina. Extrinsecus aloen cum melino, uinoque adhibeto. hoc utique et appetitum excitat, qui summo uix studio reparatur. Admiscetur non raro aloae absinthium: uel umbilicus felle taurino, additis aliquibus amaris enumeratis expleatur: uel oleum rhododaphne

pbnes crebro illinetur: uel cedrius liquor priuatim, aut cum cerato uniuerso uentri inducatur: uel pix arida laeuigata inaspergatur: uel mentam, aut melanthium cum rosaceo adhibe: uel seriphij decoctum ipsis admisce, uel fraxini Persicæ folia contrita cataplasmate imponimus. Iam uerò medulla quoque ceruina unguinis modo circa umbilicum, abdomen, inum uentrem & lumbos utendum. Ceratum insuper illud, si res poscere uidebitur, applicabimus: Aloes, absinthij, farinae lupinorij, seriphij, nigellæ, uniuscuiusq; diobolos sex, ceræ unciam unā & dimidiam, chamæmelini quantum sufficit, felle taurino laeuigantur quæ sunt arida. Malsa porro subinde est immitenda, ut dulcore mellis inescata eadē uentris animantia, subducantur per inferna. Atqui si iam putrefacti in profundo, nō excernantur, sed magis euaporationes ab eis exurgant, sunt uel aloes potu, uel ex hac medicamento amaro subducenditz quandoquidem etiam ipsis neutiquam inutilis mediocris alui est subductio.

De tæneis lumbricis latis.

Latus lumbricus est, intraneæ succingentis intestina membranæ, in corpus quoddam instar animalis mobile (ut ita dicam) permutatio, quod per partes interdum redditur, plerumq; totum simul excernitur, incredibilem longitudinis speciem exhibens: dissolutus uerò non coalescit. Abundat quandoq; in non febrientibus, quandoq; febricitantibus per diuturnas ægritudines accedit, continuos stomachi morsus inferens, appetitusq; ad cibos intemperatos. Quod enim animatum est in intestinis animal, escam ita obiectam deuorat, ut confestim alia opus sit: quæ nisi præstò sit, arrodit intestina. Comittatur affectus corporis gracilitas, & pulsus imbecillitas cum inæqualitate. Infallacissimum autem indicium est, si cum alui excrementis quædam semini cucurbitæ similia excernantur. Curatio cum superiore concordat. propinationes enim acres, & illiorum esus, conueniunt: filicis item, uel centaury decoctio

Bb

pota,

potā, & aluo cœnematē immiſſa: aut nepitā, uel diſſamni, aut
 pulegi. Inſundēda inſuper ab infernis partibus interdum mu-
 ria. Propinato etiā illud, quod neq; his qui alijs lumbricis con-
 turbantur inutile, potiſſimē ſi liberi à febre fuerint: Nitri ru-
 bei, piperis, cardamomi, par modus, exhibentur dioboli tres
 in uino, aqua' ue calida. Alius linctus: Piperis, baccarum lau-
 ri purgatarū, cymini Aethiopici, maſticheſ, par pondus, mel-
 lis quantum ſatis eſt, præbetur cochliarium unum, mane, &
 noctu ſomnū inituro. Quod ſi id efficacius reddere uolueris, ni-
 tri quoque ruſi tantundem adijce. Aliter: Enulæ campanæ,
 ammoniaci thymiamatis, piperis, alijs ſilicis, ſingulorum
 drach. quinque cum oxymelite calido. Per interualla potui
 dato euphorbij drachmam, uel geminas ætate prouectioribus.
 Aliud: Filicis acetabulum, nitri drach. duæ, cochleare unum
 aquæ præbeto, iam antea euocato. Præſtantius redditur adie-
 cto ſcammoniac momento. Aliud: Mali granati acidi radice
 cum corticis, extima ſemota parte, drach. quatuor. piperis tā-
 tundem, cardamomi drach. ſex, marrubij duæ, in melle ei qui
 prius porrum ſumpſerit, exhibentur. Caterum quo æger
 exactē à morbo uindicetur, theriacen, niſi uehemens febricula
 uetet, porrigito.

De aſcaridibus. Cap. 58.

Aſcarides etiā, cœu modò demonſtratum, lumbricorū ſpe-
 cies ſunt, uermibus perſimiles, qui in extremo inteſtini re-
 ſi & muſculi anum ſtringentis initio (ſpindere Græcis ap-
 pellato) cōſiſtunt, uehementem his partibus pruritus inferen-
 tes. Quæ uentris animalium ſpecies, ex prauis alimentis, fri-
 gedine, ciborumq; corruptione prouenit. Euacuādi ſunt itaq;
 in pueris glandibus ex melle, cum ſalis momento, aut nitri. in
 natu grandioribus, ex acri muria, uel centaury decocto cum
 nitro & melle: uel colocynthidis, aut abſinthij, uel chamæle-
 ontis, uel anchuſæ, uel cnici, uel hyſſopi, uel pulegi, uel nepi-
 tæ, uel lupinorū decocto. Poſt clyſteres rectum inteſtinū ſuba-
 ungendum

ingendum est, simplicibus quidē acacia, hypocyssideūe, addito nitro, uel rhu Syriaco cum liquido alumine. Sed quorum alius astrictior est, lemnio sigillo cum uino. Compositis uerō, Andronis pastillo, atq; id genus alijs. Liquor præterea cedrianus per clysterem multis foraminibus terebratum (cuius sunt modi, quæ metrenchyte nomē habent) discutiendus est: uel carnem salitam scitē adaptatam podici intrudemus, ligamentoq; adhibito, quā longō subsistere possit tempore sinemus, atq; hoc ipsum identidem repetemus. In uniuersum, omnes qui lumbricis infestantur, ichneumonis pili iuuant suffiti. Alimenta præbeantur probi succi, & quæ facillē in membra distribuuntur: nec lumbricorum effœdicem materiam accumulānt, neque corporis robur labefactari permittunt. Proinde uinum exhibebimus ualde aquosum. Crebrius uerō cibaria ob hoc ipsum affœdis largius præbeto, ne nutrimento destituti lumbrici, morsibus impetant. potissimum autem alendi tempus, cum nondum inaniti copiam adhuc alimonie habent. Quod si profluuium uentris adsit, sciendum est lumbricos magis redundare eduljs non distributis. Et iam sorbiles a grotantibus dapeministrare conuenit, adiecijs quibusdam etiam adstringentib. quale est pyrum, aut pomum cotonium, aut malum Punicum, præsertim acidum. Foris autem uentri remedia, quæ alui recrementa adstringunt, sunt applicanda, quorum sylua superius est enumerata.

De dracunculis. Cap. 59.

In India, regionibusq; supra Ægyptum animalcula quædam luma lumbricis similia, dracontia ab animalis specie nūcupata, in musculosis corporis partibus, puta brachys, cruribus, suris: in pueris etiam in lateribus sub cute consistunt, aperteq; mouentur: deinde ubi diutius extremum aliquod dracontij remanserit, locus suppurat, & aperta cute foris progreditur dracontij principium. Si trahatur, cruciatus excitat, maximē quando disrumpitur. Cuius ergo laminam plumbi appendens

Bb 2

dam

dam dracontio quidam affirmant, ne uniuersim, sed particu-
latim graui plumbi pondere decidat. Alij uerò eam curandi
rationem damnantes, propterea quod nihilominus gravitate
plumbi dracontium abrumptur, grauioreſq; dolores conci-
tet, præcipiunt membrum in aquam calidam immergendum,
quo dracontium percalfactum foras prodeat, mox digitulis
membratim extrahendum. Soranus autem non animal planè
principium, sed neruuli alicuius substantiam dracontium eſſe
autumat, opinionem duntaxat animalis, eo quod moueatur, in-
ducentis. Cæterum ſiue hoc, ſiue illud, cuius ſuperius mentio fa-
cta eſt, fuerit: cum Sorano, tum Leonidæ, tum etiam cæteris
uiſum eſt, in his ſotu calido, cataplaſmatisq; maturantibus eſſe
ſe utendum, nempe ex melicrato, farina triticea, aut hordea-
cea concinnatis. Emplaſtri præterea eiſdem facultatis uſum
interdum approbant. Ex re porro uſuq; erit conſectura è bac-
cis lauri, et quæ ex melle conſicitur adhibita. Ex horum nanq;
remediorum uſu extincta iam dracontia, quod cõtinetur cor-
puſculum excidit. Suppuratione autè facta, niſi exciderit, di-
uide cutem, & parte denudata, quod continetur auſerto, inſi-
nuatisq; cuti linamentis, conſentaneam puris opificem curan-
di rationem deinceps aggreditor.

LIBRI QVARTI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI QVINTI.

In hoc uolumine operis uniuerſi quinto, de theriacis & alexiphar-
macis, eo qui ſubſcitur ordine tractabitur.

CAPITA LIBRI QVINTI.

Quomodo quis ſe a h omnibus	quæ metu	3
communiter uirus eiaculanti	Aduerſus non rabientium ca-	
bus uindicet	num morſus	4
Cap. 1	De erabronibus & apibus	5
Communis omnium qui uiru-	De phalangis	6
lenti animalis morſu iſtuſq;	De cranæ iſtu	7
læſi ſunt, curatio	De ſcorpû iſtu	8
De rabioſi canis morſu, & a-	De ſco-	

LIBER QVINTVS.

589

De scolopendra terrestri & marina	9	De chamaeleone	38
Aduersus ascalabotæ morsum	10	De alterco	39
Contra felis morsum	11	De ceriandro	40
De mure araneo	12	De pulicaria herba	41
De anguibus & uiperis	13	De cicuta	42
De amphibia & scytale	14	De papaueris liquore	43
De dryino	15	De carpesiæ succo	44
De hæmorrhoidæ, et prestere, et diptera	16	De mandragora	45
De hydro	17	De aconito	46
De cenchro	18	De ixia	47
De cerasse & aspidæ	19	De ephemero	48
De basilisco	20	De raxo arbore	49
De pastinaca marina & muræna	21	De solano furioso	50
De dracone marino	22	De sardonis herba	51
De scorpio marino	23	De papauere corniculato	52
Præparatio sanguinis testudinis marini	24	De pharico	53
De crocodili icibus	25	De toxico	54
De hominis morsu	26	De fungis.	55
De uenenis	27	De sanguine taurino	56
De uenenorum præseruatione	28	De lacte cui admixtum est coagulum	57
Communis quorumcunque uenenorum curatio.	29	De melle quod ad Heracleam nascitur.	58
Enumeratio simplicium uenenorum	30	De gypso	59
De cantharide	31	De cerussa	60
De buprestis	32	De calce, sandaracha, & auripigmento	61
De salamandra	33	De spuma argenti	62
De pinorum cruce	34	De plumbo	63
De lepore marino	35	De argento uiuo	64
De rana rubra siue palustri.	36	De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta sylvestri, nigella, & pappis	65
De hirudinibus.	37	De familiaribus & contubernali- bus, uino & aqua frigida.	66

FINIS.

Bb 3

PAULI AEGINETAE

LIBER QVINTVS, ALBANO

Torino interprete.

Quomodo quis se ab omnibus communiter uirus
eiaculantibus uindictet. Cap. 1.



De feris uenenum iaculantibus tractaturi, ab
iis quæ in omnibus eiusmodi communiter cõ
ferunt, exorsi, præcautiones primùm quib. se
ab illarum iniuria quis tueatur, exequemur.
Quocirca si urgente aliqua necessitate, som
num capere alicui, in locis ubi uenenatæ complures bestiolæ
diuersari consueuerunt, contigerit, præsertim ubi salamandræ,
aut phalangia, uel serpentes aliqui magna copia degunt, ob
turanda sunt ferarum lustra allio cum aqua contuso, uel alia
quadam ex his de quibus agemus, herbula. Adolenda sunt fusa
fitus gratia cornua cerui, ungulæ caprarum, aut pili, gagates
lapis, bitumen, bdellium, galbanum, cupressi uel cedri scobes,
nigella, peucedanum, uiticis folia, nepita, sagapenum, castori
um, radix roris marini cachryn ferentis, conyza, uel aliquid
id genus aliud tetrum odorem spirans. Culices autē peculiari
ter arcent, suffitus ex atramenti sutorij, nigellæ syluestris se
minis cymini portionibus æquis, & sterco bubulum: adhuc
etiam crebrior ignis accensus: magna etenim ex parte bestio
læ ignis splendorem fugiunt. Substernenda est culcitra: ex al
bucis, nepita, uitice, pulegio, polio, conyza, abrotono. At si
totius huiusmodi culcitrae usus non datur, imponenda saltem
sunt stratui. Attendere item animum oportet esculentis, quæ
coctione experiuntur, aquis, uasisq; uinarijs, ut accuratè sem
per cooperiantur. Focus autem sub arboribus quibusdam non
instruetur, maximè sub picea, aut pinu: in his enim uero sala
mandræ aut bruchi pestilentes scatent, qui quum aliquē ignis
tempore senserint, decidunt in fercula, uel in alias patellas,
si casu

si casu non fuerint operculata. Sed quæ adhuc tutius seruare
studemus, eius cerotam liquidiores illinemus, ex cera & rosa
ceo, et galbani momento, & ramento, cornu ceruini modico,
aut cymino quoq; Aethiopico. Ab apibus uerò & crabronibus
compungi prohibent folia maluæ, oleo lauigata, & illita.

Communis omnium qui uirulenti animalis morfu pun-
ctu ue læsi sunt, curatio. Cap. 2.

Quod si contingat ab animante quopiam uirus iaciente, per
cuti aliquem, aut morderi, aduuum exuatu utendum est.
Qui exuadionis munus obit, ieiunus non sit, sed uino etiã os col-
luat, & oleum in eo contineat: deinde loco admittente, cucur-
bitulam cum plurima flamma ad morsum adhibe, proximaq;
loca scarificato: uirus namq; cū flatus ac sanguinis attraçtio-
ne iuxta educitur. Inurere uerò morsus, & ad crustã produce-
re, adeoq; amputare expedit. si morsus fera letalis sit: ut aspi-
dis, cerastæ, uiperæ, et consimiliũ. quemadmodũ Galenus me-
morat, uiniore quẽpiã morfu à uipera petutum, ubi animan-
tis naturam cognitam haberet, falce protinus digitiũ cõmmor-
sum amputasse, periculũ omnino euasisse. Quod si uirus iã cor-
pus subierit, sanguinis detractione quamcelerrimè utendũ est,
præsertim si morsus omnibus pariter humoribus scatere ui-
deatur. Cũ cibo edendũ piper et alliu præbeto. Potui uinũ po-
tens, quo recētibus uaporibus, caloreq; naturæ cõgruo corpus
repleatur. Post hæc cataplasma quod uulnus calfacere et ex-
hulcerare possit, inducatur: cuiusmodi est cinis brassicæ, aut fi-
ci arboris aceto mixtus, aut lixiuio stillaticio, uel garo, et cæ-
pe cū polëta, panëue, et porri plurimũ cū sale, uel pix liquida
cum sale calida, aut cedro, aut recremento caprarũ. Competit
præterea ipsis conspersio aceti calidi, in quo nepita elixa sit,
uel ex accio & aqua marina, uel oxalme. Locis insuper idis
gallinæ superimponantur, & potius galli gallinacæ, aliãue
animalia per mediũ dissecta calida: uirus namq; exugit, et do-
lores leniunt. Utendum et medicamentis emplasticis, ex sale
& rore marino, atque adarce, & in totum quæ acrioris sin-

Bb 4

potentie

potentia. Ceterum omnibus cōmuniter morsicatum pūctimq;
 à bestia uirulenta petitis, nisi partes profundiores nō omnino
 in offensa uideantur, ex uino propinanda seris est, uel erice,
 uel astragalus cum aceto, siue bitumen, paliurus similiter, aut
 rhu ueteris decoctum: uel mustelæ inueteratæ drachmæ duæ
 ex uino sumptæ, omnium ore probantur: uel testudinis mari-
 næ sanguis, uel castorij drachma, ad dito uino nimiti diluto, uel
 libanotidis drachma, uel sicyoniæ radicis aut porri cremor,
 uel chamæpitys, uel smyrnium, uel cinnamomum, uel aristolo-
 chia, uel uiticis semē, uel galbuli cupressi, uel seseli, uel piper,
 uel trifolij semē, uel baccæ lauri, uel cæcri fluuiatiles tā tosti
 quàm elixi. Vtilis ad hæc theriace composita est eiusmodi.

Theriace aduersus uenena, herbas toxicas, morsus uipe-
 rarum, iētusq; scorpionum.

Bryoniæ, opopanax, iridis Illyricæ, roris marini radicis,
 zingiberis, singulorum drach. quatuor, aristolochiæ quinque:
 thuris, rutæ syluestris, uniuscuiusque tres, farine cruacæ
 duas, uino redige in pastillos, & cum uino porrige triobolū.
 Purgatio deniq; omnibus proderit, & sudoris proritationes,
 & theriace, quæ ex uiperarum carnibus constituitur.

De rabiosi canis morfu, & aquæ metu. Cap. 3.

Super rabiosi canis morfu præ cæteris sermonē facere ma-
 luimus, quoniam id animantis frequens & cōtubernale est,
 rabieq; concitatur identidem, & uitatu perdifficile, & pericu-
 lum ex eo fit inuitabile, nisi quis ope multa, atq; ad hanc rē
 factis utatur præsidijs. Corripiuntur autē rabie canes in uehe-
 mentiori æstu potissimè: sed ut Lycus memoria prodidit, in-
 terdum etiam per intensissima frigora. Rabidi autē cūm escu-
 lenta, tum poculenta auersantur: sitibundi quidem sunt, pota-
 re tamen nolunt, anhelant quamplurimum, auriculas demit-
 tunt, sputum largum atq; spumofum eieciunt, & sine uoce atq;
 amentes redduntur, aded ut ne domesticos quidem agnoscant.
 Erruunt sine latratu in omnes, feras pariter ac homines, &
 nullo

nullo discrimine mordent. Vbi momorderint, nihil infestum primò, nisi pro uulneris ratione dolorem afferunt: temporis autem progressu morbum, quem Græci hydrophobiã, id est, aquæ timorem adpellant, inferunt: qui cum neruorum conuulsione, rubore totius corporis, maximè uerò uultus, cum sudore, languore, suiq; et suorum ignorantia euenit. Fugiunt aquã intuentes, admonitiq; alij humorem prorsus omnem auersantur. Sunt qui canum instar latratus edunt, & interuenientes mordificatim impetunt, mordicibus que suis in alios eiusdem rabiei causam transferunt. Aliorum porrò symptomatũ causa manifesta est, ubi uirus scilicet uniuersas corporis partes occupauerit. Formidinem autem aquæ, nonnulli quidem ariditati immensæ adscribendam censuerunt, quasi in contrariũ habitum mutata penitus eorum substantia. At Ruphus insanie ex atra bile genus id esse testatus est, quod id uidelicet uirus illum amuletur humorem, haud aliter quàm alios atrabile insaniẽtes nouimus alia timere, quæ utiq; causa nihil discrepat ab his qui perhibent canis, à quo demorssi sint, spectrum in aquis opinari se cernere. Eorum uerò qui ad id perueniunt malum, neminem nouimus seruatum, dempto ex historia uno aut altero: eosq; non à rabido cane morfos, sed à morso homine mordicus petitos. Verùm ante huius affectionis occupationem, non pauci etiam à canibus morssi sospitatem recuperauerunt. Hinc itaq; auspicanda est curatio. Sed quoniam frequentissimè eo quod non confestim hydrophobica corripit afflictio (plerunq; etenim post quadragesimum à morso diem solet ingruere, quibusdam uerò post sex menses, alijs fertur etiam post septem) nonnulli canem qui momorderit non fuisse rabie percitum arbitrati sunt, & proinde cicatricem bulceri inducere festinauerunt, atq; hoc pacto ipsimet huius affectionis auctores fuerunt. Proinde huiusmodi usus experimento facilè deprehēdes, morsus rabiosi canis fuerit nec ne: Nuces iuglandes accuratè tritas cataplasmatũ instar bulceri adglutinato. Po-

Bb

s

stres

stera die demptas gallinaceo, gallinae uel in cibo obijci, primum quidem non attingent: fame autem pressi, si uorauerint, curiosius attendito. enim uero si canis qui momordit, non rabierit, superstites euadent: si in rabie percitus fuerit, mortem obibunt postridie, tunc ad uulneris dilatationem maturandum est. Eademque probatio post paucos dies iterum tentanda. Et si quidem non interierit gallinaceus, tum hulceri cicatricem inducito, nihil formidans periculi. Huius igitur indicationis autor fuit Oribasius. Quod si ex praedictis notis rabire canem exade cognouerimus, medicamentis aperiendi facultate praeditis repente utemur. Ex aperiuntibus itaque primum honorem habet, quod est pice acetoque; auferissimo, nec non opopanace conficitur. de quo in capite de neruorum uulneratione differuimus. Porro si morsus teneriore cuticula praeditus sit, diluendum est ipsum irino, seu balsamo, uel alio quopiam eiusmodi. Vel hulcera prius fota, alio obstruantur. Hic etiam puluis crustam inducit.

Aridum rabidi canis morsus crustam inducens.

Salis fossilis drach. octo, chalcitidis sedecim, scillae tantundem, ruta uiridis quatuor, aeruginis rase totidem, seminis marrubij una. utere primitus arido, quo crusta inducatur: deinde cum rosaceo, ut excidant crustae. Custodiantur autem partes affectae, ne cicatricecant, dies ut minimi quadraginta duos.

Cataplasma quod in rabidi canis morsu os hulceris diductum seruat.

Cepam cum sale et ruta more cataplasmatibus applicato, uel laserpitium cum sale, uel salsamentum uetus, uel cinis sarmentorum cum oleo, uel allia, uel sambuci folia, menthae, seu apiastrum quodlibet per se, uel adiecto sale: uel iuglades cum cepa, sale et melle, aut cinis ficum, cerato exceptus. Abluendum uero hulcus aqua, in qua chamaemelum syluestrisque; rumicis radix elixa sint. Nec desunt qui causticis etiam ferreis hulcus adurunt. Potior tamen si sint affecti, ex simplicibus quidem lycio, absinthio, succo laserpitij, et trixaginis, scordio et polio. Ex compositis uero, Cancro rum flumatilem, malleolorum uitis caudam in uase Cyprio aut

aneco

aneo tostorum cochliaria duo, gētianæ radicis læuigatæ cochliariū, cū uini meraci ueteris cyathis duobus, potui per quadriduū præbeto. Quidā sanguinis perdicū cochliaria duo porrigunt. Ceterū cancri luna crescēte sunt capiēdi, priusquā sol exoriatur. His qui eodē die potionem intermiserint, duplā postea portionē, aut triplā interdū præbeto. Quinetiā ex uiperis iheriaca magna cōmoditate exhibetur. Purgādi aut sunt quotidie medicamēto ex sicyonia, cū saluie decocto, aut sideritidis Heracleæ, quam aliās dialyson uocant, propinato. Sunt qui canis qui morsum intulerit, hepar ad edendum exhibent. Porro uicūs ratio eiusmodi obseruanda est, quæ ueneni uolentiā pariter hebetet, ac extinguat, simul & penetrationē ad interiora prohibeat. Vtrūq; autē horum præstabit uini passi meracioris, uetusti, purioris, lactisq; potus: consimiliter etiā ally, capis & porri esus. Si autē commemoratis remediorum adminiculis ob impedimentum aliquod ab ipso statim principio uti superfederit laborans, minimè permittendum est quo caro scalpello circuncidatur, aut cucurbitulæ apponantur, aut bulcus aduretur, quum uirus iam altius penetrauerit: sed metasyn criticis potius adpellatis medicaminibus utendū, hydrophobica uidelicet affectione nōdū oborta. Vincit purgatio ex hiera, et lacte scisso. Sudoris itē excitatio, dropacismus et sinapismus particulatim per totū corpus adhibebitur. Efficacissimum tamē omniū auxiliū helleborismi frequētiōr usus deprehēditur.

Aduersus non rabientium canum morsus. Cap. 4.

Morsus uerò canum nulla rabie percitorū, quum & ipsi uenenosæ cuiusdā essentiæ sint cōpotes, protinus acetū irrogantes, morsum expassa palma uerberato: deinde uerò nitrū cū aceto contritū desuper ex alto destillabis, spōgiamq; nouā aceto, aut ipso acetoso nitro imbutā imposito per triduū, id ipsum irrigās, malū enim tandē discutit: uel eruaceā farinā oleo mactratam impingito: uel spongiā recentē, aut lanam succi dā, aceto et oleo madefactā imposito. Vel rubi folia cū aceto
contusa

contusa superinducito: aut capam cum melle subactam: uel origani coma, & sale, & quis portionibus cum melle: uel marubium nigrum, quod & balloten nuncupant, cum sale. Feruidis iam mordicibus, plurimum contulerit, si eruina[m] farina[m] melle maceratam imposueris, quandoquidē peculiariter hisce prodesse creditur. Sed eis qui iam inflammationem experientur, spumam argenti aqua contritam inungito.

De uespis & apibus. Cap. 5.

A A apibus percussos, dolor idus comitatur, & rubor loci, cum tumore partium in ambitu sitarum, aculeus in loco percusso relinquitur. Eadem quos uespa pupugit concomitantur, sed intensiora, praeterquam quod spiculum uespa non relinquit. Succurritur autem utrisq[ue], si obliniatur locus luto, seu stercore bubulo, aut liquore ficulneo, uel sycamori folijs lauisgatis, uel maluae, aut etiam farina hordeacea cum aceto ut cataplasma impacta. Fouendus praeterea locus muria, uel aqua murina est.

De phalangiis. Cap. 6.

P Percussis à phalangio locus quidem ipse quasi ab impacta aculeo rubescit: neq[ue] intumescens tamen, neq[ue] per ambitum calidus, sed mediocriter subrubidus, perfrictionibus horret, & pruriginosus est. Concomitatur à phalangis percussos, frigiditas, tremor, totius corporis grauitas, sudor gelidus, dolor intensus, pallor, & continuus eiciendae urinae pruritus: quibusdam uerò eiusdem in expellendo difficultas, ueretri intensio, oculi humentes & lachrymosi, distentio rigorq[ue] circa inguina & poplites, conuulsionibus non dissimilis, uellicatio stomachi uehementior, linguae torpor, obscuritasque, ut impeditus reddatur sermo, uomitiones aquarum, uel aranearum textis similia. Neq[ue] desunt quibus per lotiū aluumq[ue] eadem feruntur, dimissi in aquam calidam, dolorē nullum sentiunt, mox ualidissimè dolitant. Praesidio est, forinsecus cinis ficulneus appositus, cū sale trito in uino maceratus: uel radix syluestris mali Punici

Punici cōtrita, uel malū terræ cū farina hordei aceto immersum. Marina aqua calidiori fouēda sunt hulcera, aut apiastrū decocto, cuius etiā folia pariter sunt modo emplastri inſcienda. Lauacris insuper frēquētibz indulgere utile est. Utendum iā potionibus quæ ex abrotoni cōstāt semine, anetho, aristolochia, cicere syluestri, cymino Aethiopico, baccis cedrinis cōminutis, platani cortice, trifolij herbæ semine, et fructu myricæ: horū uniuscuiusq; drach. duas cū uini cyatho potui dato. Et uiridiū cupressi foliorū galbulorū decoctū cū uino tēperatū. Sunt qui cancrū fluuiatilē in succū redactū, addito lacte & apij semine exhibitū, præsenteam opem conferre asserunt.

De araneæ icū. Cap. 7.

Est quoddam etiam arancorum genus, quod ubi hominē pupugerit, ualidus circa medium præcordiorum labor excutatur: rubor itidē, et lotij expellendi difficultas sequitur, quandoq; etiā suffocatio quædam. Leuantur autē idi hisce remedijs: Cymino syluestri Thebaico, uel uiticis semine, et populi albæ folijs epotis, uel allia sola sumpta, conferunt: uini insuper meracioris sorbitio ob omni periculo subtrahit.

De scorpionis icū. Cap. 8.

Inflammati cōfestim à scorpj icū percussuq; locus incipit, durusq; & ruber ac distentus, supraq; modum rigidus cū dolore redditur, et nunc quidem feruor, mox etiam algor alternatim occupat: quandoq; sequitur dolor, qui itidem alternis nunc decrescit, mox iterum intēditur. Accedit insuper sudor, horroris sensus, tremor, & extremarum corporis partium frigus, extolluntur inguina, ueretrum intenditur, sæpius item feruntur cum strepitu per sedem peditus, rigent pili, discolor redditur cutis, dolorq; tota percipitur cuti tanquam ex acupungente. Succurrit quamprimum instillatus uulneri ficulneus cremor. Ipse etiā qui percussit, plaga sua dissipatus, attritusq; & impositus scorpius. Post hæc sal tritus cum lini semine, & alibæ herbæ semen salubriter imponitur. Subuenit & sulphur

sulphur uiuū terebinthina resina exceptum. Prodest pariter et galbanū emplastelli more extēsum, et parti affecta impositū: nepita quoq; laeuigata, et cataplasmatibus modo imposita: et hordeacea polēta uino confecta, et in ruta decocto exhibita. Neq; minore efficacia succurrit semen trifolij herbae, tritū uulneri inditū. Præterea potionandi sunt his satis efficacibus: Aristolochia drach. duabus, præcipuē corticis cū uino, gentiana tusa, pulegioq; ad summū elixato, lauri baccis numero decē laeuigatis, et nepita diu multūq; cum posca elixa. Cyperis etiam cum uino sumpta. Similiter et ruta, et ficulneū lac, et laserpitij, si ad manū sit: si non sit, Parthico liquore utendū erit. Conducit ad hæc trifolij et ocymi semen in potu sumptum. Valet etiam argentum statim plagæ præter opinionem impositum. Omnibus his præualet lauacrorū cōtinuus cum multo sudore usus, temperatūq; nimia aqua uini meracior potus. Cōposita uerò in potu sumenda hæc sunt: Sulphuris uiui, Aegyptiæ fabæ quantitas cū piperis granis octo in dimidiata uini cotyla, uel succus laserpitij cum cancro laeuigato in uino: aut nigellæ, cymini Aethiopici, uiticis semen, æquis cum uino partibus.

Aduersus scorpionum periculosum et phalangiorū ictus.

Fecis drach. sedecim, pyrethri quatuor, seminis rutæ syluestris tres: castorij, crucæ seminis, singulorū duæ, excipiātur sanguine testudinis marinæ: Dentur oboli quatuor cum uini meraci, aceti uel cyathis tribus. Aliud: Pyrethri, aristolochiæ cuiuslibet uncia quatuor, piperis uncia duæ, liquoris laserpitij drachma. Exhibeatur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

De scolopendra terrestri & marina. Cap. 9.

Communitè aut̃ is quos scolopendra momordit, locus plagæ in orbem liuescit, & attollitur. Interdum fecis speciem præferēs, rariuscule rufus apparet, exulceraturq; sumpto à morsu principio, hunc quodā laborioso, et remedijs inuincibili. Adhæc uniuerso quoque corpore quasi pruriginis sensus percipitur. Peculiariter uerò his quos marina scolopendra pugit,

pugit, aquæ perſimilis, et ueluti transparens quãdoq; inſurgit tumor. Rubicundus aut̃ his, quos ſcolopēdra terreſtris ſaucia uerit. In horũ utriuſq; igitur curatione, oportet circa morſum et plagam ſalem ex aceto tritum, aut cōciſam et læuigatã rutam imponere: uel cinerem aceto contritum et maceratũ ſeu ſcillam. fouendus etiam oxalme locus eſt. Cãterũ Archigenes oleo largiore feruido, prædicta, eo quo dixi modo, imponere ſolebat. Potui uerò præbēda eſt ariſtolochia cum uino, uel ſerpillum aut nepita, uel ſylueſtris ruta, uel trifolium, uel ſuccus radicis albuſci, meſura dimidiatæ ſerē hemina cum uino.

Aduerſus ſtellionis morſum. Cap. 10.

Sesamum contritum cataplaſmatis modo imponitur.

De felis morſu. Cap. 11.

Qui felis morſu percuſſi ſunt, uehementiore admodum dolore afficiuntur, luridumq; uulnus redditur. Succurras aut̃ iſis, ſi quamprimũ ictu cataplaſmatis inſtar capas alliaue impoſueris. Iſdem etiam ueſcentes, uini meraci ſorbitione inſuper hauſta reſtituuntur.

De mure araneo: Cap. 12.

Muris aranei morſum cōſequuntur dolores pulſatoriũ, rubores ſecundum unumquodque dentis ueſtigium, puſtulæ circa morſum ſanioſo humore turgētes exurgunt, liuorẽ contrahit propinquæ partes omnes, detracta q; puſtulæ cuticula, candidum apparet hulcus: ad membranas enim neruoſas læceratur. Adhæc, depaſſione his quæ ſerpunt non abſimili orata, partes corruptæ decidunt. Accedunt poſthæc, grauiffimus inteſtinorum dolor, lotij reddendi difficultas, gelidi que ſudoris undique fluxus. Succurrit autem iſſis ex galbano ſplenium per ſe, uel tritum ex aceto impoſitum, uel hordeacea farina cum oxymelite cataplaſmatis modo impaſta. Quin et ipſe araneus mus, qui morſum inſlxit, diſſectus, ſuoq; uulnere impoſitus, ſubuenit: et pyrethrum emplaſtri more adhibutum, malicoria q; dulcis mali Punici decoſta, uel malua ſylueſtris, allia item trita, et ſinapi læuigatum cum aceto. Præterea

ex

ex calida muria facta fomentatio: deinde ex hordeo combusto cōcinnatum cum aceto cataplasma. Salutare est in potu propinare abrotonum cum uino decoctum, uel sisymbriū, uel serpyllum, uel herbam erucam, uel galbanum, uel saluiā, uel cusprēssi molliores galbulos cum oxymelite, aut pyrethrum cum uino, aut chamaeleontis radicem, aut coagulum hœdinum, asgnumūe, gentianæ radicē, seu uerbenacam: cæterum eadem cataplasmatibus quoq; modo impingitur. Murem etiam ipsum qui momordit, in pollinem contritum cum uino hauriunt. Prodest medicamentū etiam illud, myrrhæ drach. sex, corticis aristolochiæ quatuor. Cæterum contra aranei muris & scolopendræ morsum, sales cum liquida pice emplastri modo illinito, uel liquorē cedriū addito melle, uel alliū cum folijs ficulneis, aut cymino, uel folia nepitæ, seu hordeū etiā cum aceto.

De uiperæ maris & fœminæ morfu: Cap. 13.

A Vipera quum mare, tum fœmina, uel id genus alijs animalibus uenenum relinquentibus demorsos, intra principia statim dolor in loco morfu compuncto, inde in uniuerso corpore comitatur. Apparent autem bina in uulnere foramina perexiguus admodum interstitibus inter se spacijs, unde à principio sanguis saniosus, aquosusq; humor defluit, deinde oleosus, in omnibus indiscriminatim uiridi æruginis colore, quod uiperarum esse uenenum quidam autumant. Consequuntur tumores circa idē rubicundi ac luridi, pallor corporis, uertigo, resolutio stomachi, animi deliquium: nonnullis uomitiones biliosæ, mictionis angustie: insurgunt præterea iuxta locum haud aliter atq; in ambustis, pustulæ. Occupat & hylcus depascendo serpens, pragrediens ad finitimas partes. cruentantur his etiam gingiue: accedit his tremor, sopor, et frigidi sudores. Minore uerò periculo euadere creduntur, qui ab echidna, id est, fœmina, quàm qui ab echi, hoc est mare, fuerint idē: sed minus etiam ex iisdem periclitantur, qui nutrimentum præsumpserunt. Cæterum in medendo efficacissimum præstat

stat auxiliū ally esus, meraciorisq; uini potio, adeo ut si quis ea
 ius sustineat usum, alijs sanè nullis opus habeat præsidijs. Co
 medant etiam porra, cepas, et salsamentum acerrimū. quidam
 Panarum ius, ipsasq; decoctas in cibo dederunt. Cōducunt hæc
 quoq; in poculis cum uino singula, marinæ testudinis sanguis
 exiccatus cum cymino syluestri, leporis hinnuli uē triobolari
 pondere coagulū, aridi ceruini genitalis drachma, anchusa te
 nui folia tota: hanc uerò aliqui etiam pro amuleto, collo suspen
 dunt: porri liquoris dimidiata hemina mensura in melicato,
 foliorū apiastrī succus, et ruta syluestris, cōtubernalium galli
 naccorum cerebrū, panacis radix cum uino decocta, agarici
 drachma, baccæ iuniperi, asphodeli radix, pistacea læuigata,
 uiticis semen, mustelæ inueteratæ & siccata drach. dua, echi
 ni cū radix tum liquor, cancri non tam fluuiatiles quàm
 marini, cū priuatim, tum adiecta pediculari herba, saleq;
 & polio, mali terræ radix cum myrrha & gentiana, bac
 carum lauri aqua portione melle excepta. Mirificum porro
 contra uiperæ morsum, Oribasij illud: Anisi acetabulū, pipe
 ris drachmæ quatuor, aristolochiæ corticis, opij, castory, myr
 rhæ, uniuscuiusq; drachma. Passo diluta ad fabæ Græcæ ma
 gnitudinē in formato, habita cuiusq; uiriū ratione cū uini im
 modicè diluti cyathis tribus exhibeto. Aliud ex Lyci cōmenta
 riy medicamētū, ad uiperarū morsus efficax: Myrrhæ, casto
 ry, piperis, sandarachæ, singulorū drachma, seminis anethi a
 cetabulū, passo trita exhibe. Aliud ex Archigene, Căcros ui
 ginti cū sufficiēte farina triticea in mortario summa cura cō
 iūdito, nepitæq; salisq; momentū cōfundito, redige in pastila
 los, et arefacito. In usu uerò, cataplasmatīs modo cū lacte im
 pingito, unūq; cū mulsa potui dato. At si ad manū fluxiales, in
 quit, căcri nō sint, marinis utitor. Extrinsecus uerò opē stre
 nuè uiperinis morsib. fert stercus caprillū plagæ cū uino illis
 tū: uel lauri folia cocta cū oleo, aut baccæ lauri: aut nepita, er
 ce, ruta, apiū, abrotonū, galbanū, splenij modo inieciū, origa

nū uiride læuigatum: pulli gallinacei discerpti, ac calidi etiam dum admoti. Adgluinanda insuper crebro erui farina in uino macerata, raphani cortex læuigatus, scilla elixa, polenta hordeacea ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cum tenuissimo hordeacea farine polline, fex uini pariter cū tenuissimo hordeacea farine flosculo: ruta, sale, melleq; adhibitis, fursures elixi in aceto, cinis cum aceto, cedrius liquor addito sale, pix liquida utidem cū salibus. Foceri locū trifolij decocto expedit, aut pulegij, seu muria acetosa: Vbi uerò pustula sanguis nolentē euaserint, ipsas confestim scalpello exasperabis, ita ut cutem non detrahas, mox inde largiore aqua foueto, lenticulam coctam cum melle, donec sanitatem recuperent, illinito. Cæterum ex uiperis antidotus peculiari quadam efficacia in huiusmodi morsibus, pota & imposita opitulatur.

De amphishæna & scytale. Cap. 14.

Comparia in amphishæna & scytales morsibus eueniunt. Remedia sunt igitur eadem, quocirca priuatam descriptionem sortita non sunt.

De dryino, Galeni uero præfatio. Cap. 15.

Vitam dryinus in radicibus quercus agit, tam malefica parataq; ad nocendum ui, ut si quis calce modo eū premat, cute hominis pedes denudet, & totis cruribus tumore laxū ac spaciosum inducat. Ferūt præterea, quod maiori admirationi fusturū est omnibus, nudari cute manus pariter eorum, qui curationem eius tractauerint: & si quis pœnam ab eo illatā iniuriæ sumpturus, bestiolam perimere tentauerit, tetri admodum odoris fluxum emittere, suoq; graucolenti odore omnium aliorum odorum sensum tollere. Ab hoc animalculo percussis, circa morsus locum cum rubore tumor excitatur, & emergunt in iisdē partibus orbiculatim pustulae, defluit aquosa saniei aliquādo humor, urgent morisiones stomachi, & circa umbilicū torsio. Succurrit cū uino pota aristolochia, trifolium item herba, et hastulae regiae radix pari modo sumpta, & quercus cuiuscūq; glandes cōcisa, ac pota. Illicis itidē radices

ces

res tuse, locoq; idō cataplasmatīs more imposita auxiliatur.

De hæmorrhō & prestere, quod est dipsade. Cap. 16.

AB hæmorrhī morsu graues statim dolorū uexationes insurgūt, et ex cruciatu cōtinuitate breuia strigosaq; reddūtur corpora, multus etiā erūpit ex morsu sanguis: & qui quid est toto corpore (in aliā ue parte) cicatricū rūpitur, & sanguine manat, cructa egerūtur excrementa. Et qui effluit sanguis, in minimos quasi globulos dējatus est. A' pulmone sanguinē ex-
tussiunt, euomētes auxilio destituti ut cōclamati pereūt. A' di-
psadis morsu & stus intolerabilis premit, sitisq; adeo indomita
ac pertinax, ut neq; satiari, neq; intermitti queat, poculētaq;
assatim & gri hauriunt: eadē tamen sitis perpetuo exeruciat,
haud aliter quā si ne tātillū quidē potionis sumpsissent ab in-
itio. Idēq; iugiter totius, ex continuo licet poculorū haustu, si-
tis durat habitus: unde ab urēdo prester, et ab ardēdo causon,
ab inexplēbili siti dipsas appellatur. Cæterum à plerisq; pri-
scis autoribus hæmorrhō ac dipsade morfi, ceu deplorau et in-
sanabiles relinquebātur. Proinde si peculiaria aduersus bestio-
lā desiderantur remedia, cōmunia experiri opera & precū est.
Cōfodiēdusq; scalpello cōfestim et urēdus locus, etsi liceat par-
te præcisa mutilādus, deinde acerrima quæq; applicāda sunt
cataplasmata. Profueritq; omnis acrium eduliorū ad cīcādam
uomitionē esus, maxime ex alimentis sale maceratis quæsitus.
meraciq; uini potus, pariter et lauacrum. Expedit aut, breui-
bus hæc temporū interuallis continuare, priusquā grassentur,
que morbū comitātur accidētia: his enim semel emergētibus,
opem ferre nulla medicorū opera potest. Quæ uerò affectæ
parti foris adhibentur remedia, eorum sylvam cōtra morsus
descriptam deprehēdimus. In dipsadis quidem morsu, portula-
cæ folia cum aceto trita, polentaq; & rubi folia accuratē ex
melle concisa, plātaginē item et hyssopū, allium albū, porrū,
rutam, urticam. Aduersus uerò hæmorrhū omnia sanē eadem
hæc faciūt medicamēta, atq; supra hæc uitis etiā folia elixa,
cū melle concisa et eliquata. Per os aut, hæmorrhī ipsius qui

morsum intulit, caput crematum potetur, aut scordium cum oleo irino: manducandæ sunt etiam uuae passæ.

De natrice. Cap. 17.

A Natrice, quam Græci hydron dicunt, demorsis uulnus dilatatur, & liuescens spaciosum euadit, saniosus ex eodē humor ater ac largus, tetroq; odore spirans, perinde atq; ex desperatione profluit. Medicatio mali spacio tēporis, et ægrè succedit. Succurrit itaq; origanus concisa, & aqua subacta uulnere superinducta: uel lixiuia querna cum oleo: uel hordeacea farina cū melle eliquato sumitur, & aristolochiæ geminæ drachmæ, in cramate, uel in poscæ binis cyathis. Deinde cremor marrubij, uel decoctum cū uino, uel nasturtium syluestre, uel fructus hastulæ regiæ, aut flos, aut fœniculi semen cum uino, & fauus deniq; recens cum aceto comestus.

De cenchro. Cap. 18.

Cenchri morsus per omnia uiperino idui respondet, accedit putrida exulceratio, carnes antea prætumidæ ut in aqua intercutem defluunt: lethargici præterea, & ueternosi, & mali saporis delationi obnoxij euadunt. Erasistratus iccur & uesicam, & laxius intestinum ipsis affecta esse prodidit. Dissectis namq; eorum corporibus, corruptæ quodāmodo partes offenduntur. His igitur lactuca semen cum semine lini castaplasmatis instar impositum succurrit: nec non & saturcia læuigata, & ruta syluestris, et serpillum cum asphodelo triuū. Potui autem quamprimum centaurij radicis drach. duæ cum uini cyathis tribus, uel mali terræ radix itidem, nasturtiumq; pariter & gentiana salubriter exhibentur.

De cerasse & aspide Cap. 19.

Tres aspidis esse species Galenus testatur. nam unam ex eis chersæam, id est, terrestrem nuncupat: alteram chelidoniam, tertiam ptyada. quæ omnium perniciosissima est: siquidem erecto in anteriorem partē collo, ex interuallo longitudinem quod satis fore coniecerit emensa, uenenum in hominis corpus iaculatur. Hanc ferunt Aegypti reginam Cleopatram, quum

quum deuſo Antonio, Auguſtum uictorem timeret, ſiniſtræ
mammæ feriendæ admoſſe, ab eaq; demorſam occubuiſſe.
Ita enim mortem longè celerrimam inuehit. A' ceraſtis porro
morſu, locus cum duritie in tumorem attollitur, & puſtulas
agitæ iſto autem loco aquoſa ſanies fluit, quandoq; nigra, in
terdum ſubpallida, & colore porraceo; uniuerſum uaricum
modo corpus tumet, pudenda arriguntur, mente capiuntur,
oculorum caligo exoritur, conuulſione tandem rigentium mo
do decedunt. Ab aſpide iſtis uulnus his quæ acu puncta fuerūt,
ſimile, exiguum admodū, & abſq; tumore apparet. Sanguis
non multus, ſed paucillus & ater deſtillat, caligo ſubita ocu
lorum acies obnubilat, uniuerſoq; ſtatim corpore multiplex,
ſed leuis, nec ſine uoluptate dolor urget. Proinde ſcitè Nican
der cecinit, Ac uir perit abſq; labore.

Color demorſi permutatur, atq; uireſcit, aliquantulus oris
uentriculi morſus infeſtat, frons perpetuò conuellitur, palpe
bræ abſq; ſenſu, quaſi in ſomno uacillent, contremiſcunt, et in
ter hæc mors inuadit, uix diei quadrantem immorata. V triſo
que igitur his ocyſſimè mutilatio ſuccurrit. Quam ob cauſam
maturè pars iſta ſi fieri poſſit, à reliquo corpore amputetur:
aut, conſeſtim omnis circumſecanda ad os uſq; in uulneratis
partibus, illisq; adiacētibus caro eſt, deinde etiam quæ ſuper
ſunt cauterijs perſequenda. Horum nanq; uirus, ueluti & ba
ſiliſci, taurino ſanguini ſimiliter, ſanguinem in arterijs ac ſpi
ritum perniciſſimè congelat.

De baſiliſco. Cap. 20.

Hæc fera in mortalium conſpectum rarenter quidem ue
nit. Braſiſtratus uerò tradit, quum baſiliſcus momordea
rit, plaga ſub aureo colore fulget. Eiuſdem iſtibus ſuffragari
putat caſtorij ſi potentur, drachmas treis, ſimiliterq; papaue
ris liquore. Nos uerò horū nihil experientia cōprobauimus.

De paſtinaca marina, & muræna. Cap. 21.

Inter marinas, paſtinacæ quidem et murænæ cognitio om
nibus patet. nobiles enim, atq; omnibus cogniti, piſces ſunt.

Cc 3

Morſi.

CL 3

133 morſi

Morsibus autem horum succurrunt succi ficulnei stiriac quatuor, uel paulo plures, cum folijs serpylli tribus aut quatuor pota, & quae aduersum uiperam morsus remedio sunt.

De dracone marino. Cap. 22.

Marini draconis idus plumbo confricandus est, uel trito serpyllo, lentè ue decocta, aut sulphure cum aceto obstruendus, uel ipso dracone euiscerato. Locus hominis urina fouendus. Dandum insuper absinthium in diluta uini potione, uel saluia, aut ficulneorum surculorum ex dulci uino dilutum, aut piscis ipsius cerebellum.

De scorpio marino. Cap. 23.

Ictui scorpionis marini medetur nullus dissectus, & impositus, sulphur igne intadum cum aceto infricatum, baccæ lauari tres trita, & in potu sumpta.

Preparatio sanguinis testudinis marinae. Cap. 24.

Testudinis marinae sanguis ad reponendū hoc modo parandus est. In ligneo fictili uase supinam testudinem inclinato, eiusq; caput protinus amputato. Congelatum autem sanguinem in plures particulas per harundinem secato, impositoq; uasi operculi instar cibro ad solem collocato: arefactū uerò auferens, in uiperarum morsibus, quemadmodum traditum est, utere, drachmis duabus cum uno aceti cyatho: sequenti die drachmis quatuor, cum duobus cyathis: tertio drachmis octo, cum ternis aceti cyathis,

De crocodili idibus. Cap. 25.

Aduersus crocodili idus, nitrum cum melle laeuigatum, tantisper dum hucus repurgetur, imposito: mox melle, butyro, medulla cerui, adipe anserino impleto. Galenus testatur à crocodili morsu percussos, adipe ipsorum uulneribus imposita, exactè periculo liberatos cognouisse.

De hominis morsu. Cap. 26.

Non ab instituto aliquid fuit, cum uenenatis animalibus hominis quoq; morsus describere. siquidē longè perniciosiores ceteris hylceribus uidentur, praesertim si icinus morsus

morderit, & prius legumina pro cibo sumpserit, maximè lentulam. Bapropter quacumq; communiter alijs uirulētis prodesse docuimus, eadem in his quoq; extrinsecus morsui interpreticia adhibere conueniet, exceptis nimium acribus, & deurētibus. Priuatim uerò morsu prius oleo peruncto, fœniculi radicem cū melle tritā ut cataplasma impinge, uel fabaceā farinam cum posca & oxyrhodino emplastri modo impone, identidem immutans. Emplastro aut utere ex squamæ aris, galbani, æruginis, uniuscuiusq; uncia, ceræ libra, plumbaginis libris duabus, olei sextario. Plumbago cum oleo prius elixata æruginem assumet, & squamularum: ubi coierint quæ lique fiunt, adiunguntur. Postquam uerò inflammatio quicuerit, ueluti commune uulnus, hæc etiam curato.

De uenenis. Cap. 27.

Postquam de uenenum idu morsuue relinquentibus bestijs compendio tradidimus, consentanea ratione sermonem de uenenis quoq; aggredimur. Simplicia quidem persequentes, & horum significationes remediaq; tum communia, tum pecularia. Composita autem de industria præteribimus. Sunt enim, qui uariorū lethalium medicamentorū compositiones cōfecerint, quæ legēbus officere plus quàm prodesse possunt. Neq; enim indicia horū exacta in his qui assumpserunt deprehēduntur, ut quis ipsis conueniens applicet auxilium. Quum autem hæc uaria, ex ea quæ in ipsis præpollet facultate conspiciantur, id etiam quod administrabitur, quispiam uarium sedula propensione accommodans, modò ex æquo, modò ut præualeat, medendi obibit operā. Auspicandum igitur etiam hic de nudo à methodo præseruatiua.

De præseruatione uenenorum. Cap. 28.

Inter ea quæ de letalibus uenenis traduntur, id quod de præcautione agit, arduū magis ac difficillimum est, propterea quod qui uenenis homini insidiantur clanculū, tanto astu id machinantur, ut peritissimo cuiq; facile imponā: quoniā uenena antiquiudine, admixtis dulcibus spoliant, et odoris grauitatem

Cc + odora

odoramentorum mixtura adimunt. Non rarò ceu ad leuandam ualitudinē, opīs q̄; ferendæ gratia in ægritudinibus hæc propinare crediti, puta, absinthium, abrotonum, opopanacē, castorium, quibus uenena permiscet, etiam in cibarijs, nempe solidioribus, uel obsoniorum uarietate adumbrantes ipsa exhibent. Quam ob causam qui in istiusmodi suspitione fuerit, condita elaborataq̄; cibaria omnia uitare debet, omnesq̄; intensas gustu qualitates, quæ ex dulcibus uidelicet salsisq̄; et acidis saporibus constant. Maximè uerò, aqua quantum satis est, præsumere cōuenit. Restincto enim hoc appetitu, cæteræ postea qualitates à stomacho difficillimè corripuntur. Sed aliud adhuc est efficacior præcauēdi ab iniurijs uenenorum modus, ut uidelicet in suspitione ueneni semper præcomedatur aliquid quod uenenorū uires retūdat, inefficacesq̄; reddat: cuius farinae sunt, carica cum iuglandibus, ruta, grumo salis, et mala medica, quæ citria dicuntur, naporum item semen drachmæ pondere cum uino potum, uel nepita foliorū, uel sigilli lemnij par modus, aut ruta folia uiginti, et nullo sic ueneni genere lædentur. Iā uerò antidoti cū uino sumptæ quotidie Aegyptiæ fabæ instar, tutissimè præseruant: è quorū grege cēsētur, quæ scinco, id est terrestri crocodilo et animantium sanguinibus temperaturi; et Mithridatis antidotus, qua olim rex ipse Mithridates quotidie usus est, quo se à letali ueneno assereret, ac tueretur. Quocirca à Romanis captus, quum iterum atq̄; iterū letale ueneni potasset, atq̄; mori nequiret, se ipsum ense cōfodere aggressus est. Verū quoniā fortunæ temeritas sæpenumero in itinere locisq̄; desertis, periculo expositis, similia sine insidijs hominū discrimina adfert, si forte fortuna sub aliqua arbore, uerbi causa, pinu uel picea cibus sit capiendus, animaduertenda sunt quæ ex his, uel laquearibus letifera delabuntur interdū animalia. Vasa itē uinaria, et aqualia. Ollæ adhuc in quibus decoquuntur edulia, suo accuratè cooperiantur operculo, quæadmodū in præcautione animalium uirulentorū traditū est.

Commune

Communis quocunq; modo sumptorum ueneno-
rum curatio. Cap. 29.

SI qui lethale medicamentū ultro, ut sibi lethum consciscāt,
assumpserint, qualia multa in hominum uita solent acci-
dere, uel quorundam etiam insidijs: siquidem nobis sumptum ue-
nenum, liquidò quale fuerit constet, quamprimum ad idoneum
ac peculiare descendamus remediū, ueluti in horum enumera-
tione memorabitur. Verū si nulla nobis pharmaci exhibi-
ti cognitio præbeatur, protinus ad ea properandum, quæ com-
muniter in cuiuslibet ueneni haustu opitulari consueuerunt. nā
quæ comitantur indicia expectare, curationē nō recipit, a grīs
iam propter moram conclamatis. Proinde sine mora calidum
oleum priuatim, uel cum aqua propinantes, uomere cogamus.
Si id desideretur, butyrum olei loco cum calida aqua ingeren-
dum, aut malua, aut seminis lini, uel tragi herba, uel fæno-
græci, uel urticae seminis decoctum. Hæc quippe non modò uo-
mitione euacuabunt, sed aluum quoq; subducent, & maligni-
tati uirus aduersabuntur, accrementum eius hebetantia: præ-
fertim oleum, quod euidenter ex eo datur argumento depre-
bendere. Si quispiam cantharide, aut calce aqua non extincta,
aut quauis acriore alia recutem exbulcerare statuerit, is si
prius oleo præunxerit corpus, non exbulcerabitur: imò neque
spissare, si antea oleo oblitum fuerit, corpus poteris. Vomitus
præterea non ob id modò quod uacuet, & noxium humorem
educat, salutaris est, sed quod assumptum interim ueneni, odo-
re, coagulatis grumis, colore arguit. Odore quippe & amari-
tudine cicutam, colore cerussam & gypsum, globulis cōcretis
lac, uel nuper iugulati animalis sanguinē: uiroso halitu, mate-
riæ qualitate, et odore, leporē marinū et rubetā ranā prodit,
ita ut per hæc facile ad accommodata singulis remedia iter pa-
teat. Oleo autē malua decoctū admisceatur, uel adeps anseri-
na, uel pinguiū carniū ius, uel gallinaceorum, uel lixiuiū ex
lignorum cinere factum. Facit item ad hoc, nitrum cum hy-

Cc 5

dromelite

dromelite tritum et haustū, et uinū uetus copiose potū, & quæ ex adipe et butyro cōstant. Deinde uerò per uomitū quod hæserat in uētriculo, acerrimo clystere reliquias in intestino delapsas educemus. Post hæc uerò propinandū est lac. nā quod molestū est et uirulentū, facillē ab illo permutabitur. Dātur in super quæ cōmuni dote cū his uenenis accommodata sunt remedia: cuius generis habētur, rubrica lēnia, abrotonū, agaricū, irion, radix eryngij, pastinacæ erraticæ semē, aut nepitæ, nardum Celticū, castoriū, uiridis ferulæ medulla, nery, quod rhododendron appellant, flores, uel rhododaphnes, marrubij cremor, silphiū, eiusq; liquor, sagapenum, panacis, aut peucedani succus & radix, aristolochia lōga, ruta syluestris semē, betonica (quā cestron dicūt) folia singula cū uino drachmæ unius pōdere. Cōfert in super et poly elixatio, et pix liquida in ecligmate sumpta. Egregie uerò præter cetera opitulātur antidota prædicta, & magis adhuc ex uiperis concinnata theriaca, uerū ne utiquā eandē potestātē habēt, quā letalib. uenenis succedunt, & quā eadē anteuertunt. Quæ enim antidoti quātitas præsumpta sufficeret contra afflictionem et calamitatē, quæ uirus comites habet, cauendū, idem antipharmacum post ueneni haustum adauctum in quadruplū aut quintuplū exhibitum iuuat: neq; id semel modò per diem, sed bis ita enim ad miraculum usque in arte præclaro uidetur ipsi quoque Galeno.

Enumeratio simplicium uenenorum. Cap. 30.

Ex uenenorū catalogo, animalia mortifera hæc sunt: Cātharis, buprestis, salamādra, piccarū eruca, lepus marinus, ranarubeta, et muta palustris rana, haustæ hirudines. **E**x seminibus: Apollinaris herba, coriandrū, psyllū, cicuta, nigella. **E**x liquamentis aut meconiū, quod opium dicūt, carpasi liquor, thapsiæ succus, elateriū, et mandragoræ. **E**x radicibus: Chamæleon, aconiū, thapsia, ixia, helleborus, agaricū atrū, et ephemeron, quod colchicū nonnulli à Colchide ubi nascitur appellant. **E**x ramosis & holeribus: Smilax, quam aliqui thymion,

thymion, Romani uerò taxum appellant, solanum furiosum, quod & dorycnion dicitur, sardoniam herba, quæ ranunculispacis est, corniculatum papauer, pharicū, toxicum, rut a syluestris, & fungi. Ex animalium uerò partibus: Recens taurinus sanguis, coagulatum lac, melq; in Heraclea Ponti genitum. Ex metallicis: Gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, adarce, plumbum, et quod nomen obtinuit argentum uiuū. Ex his quæ in usu quotidiano habentur, uinum liberalius à balneo sine interpiratione potū, aut passum, uel aqua gelida consimiliter.

De cantharide. Cap. 31.

His qui cantharides hauserint, notæ accidunt omnium grauiusima. nam ab ore sermē ad uesicā usq; cuncta morderi sentiuntur, gustu picæ aut simile quiddam cedrio liquori resipit, inflammantur in dextra parte præcordia, urinam ægerrimè emittūt, sæpiusq; per eā sanguis fertur. Quinetiā excernūtur per aliū strigmenta haud aliter atq; dysentericis, animæ deliquis, satietate et stomachi fastidio laborāt, et uertiginibus cōcidunt, postremò ab alienantur mente. Succurrit ipsis uomitus citatus cū hydrelæo, et lactis potus, cretæ cimolix drach. quatuor, cum mulsā: nuclei pinei, cucumeris semen, ias bubulum pingue, uel anserinum, & ouinū. Carnes præbeantur gallinæ, ceorum, aut agnæ, uel ouillæ, uel porcellorum, omnesq; flaccescentes longiore coctura, et pingues cum lini semine clixæ. Vinum largum et dulce, thuris corticis drach, quatuor. A ciboducenda aliū est, iniectio clystere ex succo oryzæ, uel chondri, uel tragi, uel ptisanæ, uel maluæ, uel seminis lini, uel altheæ, uel scænogræci. Quandoq; mulsā cum nitro absterfo intestino, oportet hæc rursus infundere: Postea uerò inflammationem experta, præsidio ex semine lini, ac boracæ mitigare, intra initia namq; statim offendunt. Deinde dulcium aquarum balneis utendum. Utile fuerit ipsos ungento cū irino, tum rosacco potionari.

De

De bupreste. Cap. 32.

Qui buprestidem potauerunt, uiroso nitro simile quiddam in sapore sentire uidentur: urget stomachi et alui grauissimus dolor, inturgescunt eadem partes difflatæ, ut in cutem subeuntibus aquis: totoq; corpore cutis extima intenditur, lotiumq; supprimitur. Opitulatur aut his eadē quæ haustis cantharidibus opē ferunt, priuatim post purgationes, quas uomitibus clysteribus molimur, carica in cibo remedioq; sunt, & cum uino pota earum decoctio, uel cū lacte hausta, uel ænomelite. pirorum omne genus esse, & lac muliebri potare expedit.

De salamandra. Cap. 33.

Salamandram qui hauserunt, lingue inflammationem, & loquelæ impedimentum subeunt, & cum torpore quodā resolutioneq; aliqua tremorem, liuor corporis partes aliquas per ambitum inficit, perennanteq; ueneno diutius, sæpenumero putrefactæ defluunt. Quibus præstabis cuncta quæ contra cantharidas instituta sunt: priuatim uerò resinam picæ, uel pinus, aut galbanum cum melle, uel nucleos pineos cum chamæpityos decoctio, uel urticæ folia cum lilys in oleo decoctæ. Conducunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestris ex lixa: ranunculorum item esculentum ius, quo cum eryngy radix pariter decocta sit.

De picearum eruca. Cap. 34.

Picearum erucam haustā comitatur illico oris et palati dolor, lingueq; inflammatio uehemens, stomachi & intestinorum dolor, cū pruriginoso tēisionis sensu: corpus uniuersum aestuat, ciborum fastidium urget. Quibus haud aliter, quàm ijs qui cantharidas deuorauerunt, succurritur. peculiariter tamen simplicis olei loco Melinum exhibebimus.

De lepore marino. Cap. 35.

Qui leporem marinum potu ingesserunt, corruptis piscibus similem in gustu uirosum saporem sentiunt: progressu deinde temporis aluus intenso dolore afficitur, lotium supprimitur:

mitur: etsi quando eruperit, purpureū colorem refert. Omne piscium genus auersantur, & odio habent. Sudor comitatur graueolēs, uomitus biliosus, et quandoq; cruētus. Quibus opis ferenda gratia lac asininū, passum^u ue continuē exhibendum est, uel radicis maluæ foliorūq; decoctū, uel peucedani (aliās ciclamini) radix cōtusa cum uino, uel ueratri nigri, aut scammonia succi drachma in aqua mulsā, suoq; calore adhuc tepens anserinus sanguis. Solos fluuiatiles caneros, si sustinere queant, offerre conuenit. Indicium autem salutis est, quum piscibus quoq; uesci poterint.

De rana rubeta, siue palustri. Cap. 36.

Rubeta, seu palustris rana deuorata, tumores corporis cum pallore buxio intenso cōcitāt. Superaccedūt spiritus difficultas, grauis animæ orisq; fœtor, & singultus, quandoque inuoluntarium seminis profluuium. Restituuntur autem facili post uomitum largo meraci uini potu, radicū harundinis binis drachmīs, uel cyperi totidem. cogendi, in eo discrimine cōstituti, sunt, multa celeritate deambulare, & cursui operā dare, ob stuporem qui in hoc malo contrahitur. Quinetiam lauare quotidie expedit.

De hirudinibus. Cap. 37.

Hirudines simul cum aqua haustas, & faucibus inhaerentes, hinc adeo deprehendes, quod os uentriculi quasi exuorionis sensum morsumq; percipit. nam hoc deglutitæ hirudinis argumentum est. Interdum etiam sanguinem floridum foras expuunt, gutturi affixis hirudinibus. Quas muria paulatim absorpta excutit, uel laserpity aut betæ folia cum aceto, uel cum posca niuis glebula hausta. Gargarizetur præterea nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhaerint, ubi in calidam aquam descenderint, lupinorum farinam, & aquam frigidam in ore retinendam exhibeto, eaq; ratione expelluntur: proficient enim ad gelidam promptissimè. Sunt qui cimices his qui hirudines biberunt, uti
liter

liter exhibuere. Ipse, inquit Galenus, alijs in hirudinis haustu
usus, cimicibus non indigui.

De chamæleonte. Cap. 38.

Sequitur chamaeleontis nigri haustu, cum morsus uehementis,
tum dolor etiã ingens, cū uniuerſi corporis subuerſione, tre-
mor: mox ingruit etiã cōuulſio, et uomitiones pituitosa et ſpu-
mosa, et perdita uoce ſingultus cū peruerſitate et contorſione
uultus. Subuenit his triticeus cremor pinguis, calidus in potu
ſumptus, & dulce uinum aquoſum calidum, uomitus, lacti po-
tatio, mollis clyſter, fotusq; ex cataplaſmatis. Aduerſus autē
eum qui ſuffocationem ſpiritusq; anguſtiam inducit, & luridi-
tatem, abſinthium uel nitrū cum oxymelite, uel raphanū pro-
pinare cōuenit. Prod. ſt inſuper et præcordiorū fomentatio.

De alterco. Cap. 39.

Pollinaris herba, pota manſaue, ebrietati ſimilem inducit
Amentis alienationem: citra tamē difficultatem curatur qui
eam hauſerint, ſi liberali mulſa potu, et lacte, præſertim aſini
no: ſi id deſideretur, caprillo, ſeu bubulo, caricarumq; decocto
uière. Efficaces præterea ſunt nuclei pinei, cucumeris ſemen
haſtū cum paſſo, uinumq; ſalſum, cū adipe ſuillo recenti &
paſſo, urtica ſemē ſimiliter: uel nitrū cū aqua accommodatū
eſt, et intybi erraticus, quod cichoriū uocant: ſinapi, naſtura-
tium, raphanus, caſſia, et allia, ſingula cum uino ſumpta con-
ferunt. Quies porro imperanda his eſt, ut, uelut ebrj uillum
edormiunt, ſomno concoquant.

De coriandro. Cap. 40.

Nequit ob odoris uehementiam latere coriandrum, uocem
autē haſtum denſiorē raucamie reddit, furorē inducit,
ebrietati non abſimilē. turpia dictu qui hauſerūt, blaterant, to-
toq; corpore odorē coriandri ſpirant. Succurritur, ſi antea, ut
præmonſtratū eſt, uomitione oleo aut irino citata uirus eduxe-
ris, merū unā cum abſinthio & per ſe potum, ouaq; euacua-
ta, in ſeiſa detrita cum muria abſorpta: quin ipſa ſeorſim
quoq;

quoq; muria in eundem usum potatur. Prodest etiam salsum ius, quum gallinaceum, tum anserinum, atque passum denique cum lixiuio sumptum.

De pulicaria herba. Cap. 41.

PSyllium potatum, toti corpori algorem & torporem, cum resolutione animiq; tristitia infert. Cui omnia conueniunt, quæ contra coriandri haustum remedio sunt.

De cicuta. Cap. 42.

Cicuta potus tantâ oculis caliginē offundit, uertiginēq; excitat, ut ne minimū quidē eminus possint cernere, singulūq; cit, a mentia inuabit, et extremarū frigiditatem: suppresso deniq; à motu omni in arteria spiritu, conuulsione suffocantur. Quam ob causam inter initia statim, ueluti in alijs decretū est, uomitui operā dātes, cicutā excutiemus. Postmodū euacuatione facta, quod ad intestina prolapsum est excernamus: tū deniq; ad id quod primas in hac prouincia tenet adminiculum deueniemus, merum per interualla propinantes: in quibus profuerit lac bubulum uel asininum potui datum, uel absinthiū cum pipere, et uino uulgarī & castorio, rutā itidem et mentā cum uino: et cardamomi, uel styracis drachmam, uel piper cum urtica semine ex uino, uel lauri tenuiora folia: silphium itidem & laser cum uino & passo exhibebimus. Vinum etiam dulcē seorsim potatum abundē proficit.

De papaueris succo: Cap. 43.

Papaueris succi potū, sequitur sopor ueternosus, cum tā uehementi algore et pruritu, ut sæpenumero inualescēte ueneno tanta erūpat prurigo, ut ab ea qui id potarunt excidentur. Odorq; opij per totū corpus exhalat. Proficit, post citatū oleo uomitū acrioris clysteris usus, et acetum mulsum cū sale potū, uel mel cū rosaceo calido, et mieri multū cū absinthio, et cinnamomo, et acetū calidū per se, nitrū itidem cū aqua, cū lixiuia, passoue, rutāq; semen cū pipere, piperq; ipsum cū castorio & oxymelite: uel satyria, uel origani decoctio, cū uino. Oportet etiam

etiam eos qui papaueris liquorem potarint, naribus odoramentis adhibitis excitare, & in calidum soliam deducere, fomentisq; ob enatam pruriginem fouere. A lauacro confert iuriū esculentorum pinguium usus, cum uino aut passo. Proderit etiam medulla cum oleo pota.

De carpesiæ succo. Cap. 44.

ET carpesiæ succus in potione haustus, soporē grauiorem, præcipitemq; strangulationem inducit. Opem his sentiunt, quibus, qui cicutam biberunt, succurritur.

De mandragora. Cap. 45.

Sopit etiam protinus graui somno, pota mandragora: comitaturq; exolutio, inexpugnabilisq; somni necessitas, nihil à morbo quem leibargum nominant, dissidens. Proficit, priusquam aliquid eorum accidat, uomitus, à uomitu mulsa, & nistrum, & absinthij decoctum cum passo aut uino dulci sumptū. Caput rosaceo & aceto irrigandum. Corpus excitandum, & commouendum. Iuuat olfactus piperis, sinapis, castorij, rutæ tritæ in aceto, liquidæ picis, combusti & extincti lucernarū funiculi odor. Quod si difficulter excitabuntur, quæ sternuta menta eliciunt, ad mouere, alijsq; communibus auxilijs aduersus mandragoræ haustum uti conuenit.

De aconito. Cap. 46.

Aconitum repente inter bibendum cum adstrictione quædam linguam edulcorat, uertigines, præcipue in assurgendo offundit, humiditatē oculorum cit, grauitatem pectoris & præcordiorū inducit, sic ut plurimi flatus edantur. Quocirca ueneni educendi gratia ciendus est uomitus, & ducenda clystere aluus. Vtemur etiam ad expellendum uirus aconiti, potionibus origani & rutæ, uel marrubij cum uino, uel absinthij, uel crucæ, uel abrotoni, uel chamæleæ, aut chamæpiæ theos. Expediit præterea, liquoris balsami drachma cum uino, coagulū itidem hædi, uel leporis, uel hinnuli cū aceto. Ferri etiam recrementum, aut uinum in quo ferrum uel aurum uel argentum candens extinctum sit. Lixiua insuper cum
uino

uino confert. Blixæ item gallinæ, uel carniū pinguiū ius cum uino epotum. Chamæpitys priuatim aduersus aconitum succurrit: quæ in Heraclea quidē Ponti, ubi aconitū prouenit, holocleros nuncupatur: Athenis, didonia: in Eubœa, sideritis.

Deixia. Cap. 47.

IXis, quæ ulophonon quoq; uocatur, quum bibitur, ocymo quiddam simile gustu & odore præfert, uehementem linguæ inflammationem & amentiam excitat, omnes retrimentorū uias obstruit, & cum animi deliquio strepitum latratumq; intestinorum suscitatur, neq; tamen uel tantillum excernitur. Opẽ his præsentaneam adfert post uomitionē, aluiq; deiectionem, potum cum largiore uino, aut aceto, uel oxyme lite, absinthij dilutum: rutæ syluestris semen, uel lascrii radix, necnon hirciæ næ origani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, uel castorio, uel laserpitio, quorum singuli oboli cum uino expediunt. Et iuglandis nucis nuclei cum uino laeuigati, aut resina, rutaq; ita ut singula pondus drachmam æquent. Conferunt itidem oleastelli herbæ drach. duæ, uel bini succi thapsiæ denarij, cum mulsa, & acetum deniq; calidum per se potum.

De ephemero. Cap. 48.

SI quis ephemerum, quod colchicum aliqui, quia in Colchiæ nascitur, aut syluestrē bulbum appellant, acceperit, pruriginem uniuerso statim corpore sentit, non secus quàm ij qui urticæ aut scillæ irritamentis laceffuntur. Mordetur interea, & cum ponderosa grauitate stomachus æstuat. Incrudescente autem malo, cruenta strigmentis mixta per aluum secedūt. Quibus sanè non aliter atque ijs qui salamandrum hauserunt, uomitionibus & clysteribus succurrendum est, priusquam ueneni inualescat. Exhibenda est potui foliorū quercus, aut glandiū, aut maliciorū, aut serpylli decoctum cū lacte, aut sanguinalis herbæ succus, aut palmitum uitis, rubi uel tenera

De
rum

rum ferularum medullæ, myrtiue cū uino. Quin baccæ etiam myrti tussæ, friatæ, & in aqua maceratæ, earum diluto epoto, præsentī remedio sunt. Efficax pariter est medius castanearū (quas glandes Sardonias dicunt) liber, cū aliquo prædictorū succorū haustus. Vtilis quoq; est origanus, si cū lixiuio in potu sumptitetur. Salutem consequuntur, asininū, bubulūne lac bibentes, aut si in ore modò contineat atq; uoluent: aded ut si huius lactis adsit copia, nullum aliud desideretur remedium.

De similace. Cap. 49.

Arbor quæ similax, & à quibusdam thymion, à Romanis uerò taxus appellatur, pota, algorem uniuerso corpori inducit, strangulationes & cecorem interitum infert. His qui eam hauserunt, eadem remedia, quæ cicuta in potu sumpta, auxiliantur.

De solano furioso, quod dorycnien quidam uocant. Cap. 50.

DOrycnium, quod aliqui furiosum solanum nuncupauere potum, comitatur in gustu ueluti lactis qualitas, continuus singultus, linguæ ariditas, & conferta sanguinis excreatio. Per aluum mucosa quædam, perinde atq; in intestinorū torminibus efferuntur. Quibus antequam aliquid horum consequatur, remedio sunt quæ in Bphemero comprehensa sunt, uomitus inquam, & clyster, simmatimq; omnia quæ potum uenenum possunt elidere. Propriè uerò subueniunt ipsi, mulsæ, lac asininum, aut caprillum, & passum tepidum cum anisi momento potum. Itidem amygdala, & gallinaceorum elixæ pectuscula, & omnes marinæ conchulæ cū crudæ, tum tostæ in cibo assumptæ. Item locustæ marinæ, & gammari, & haustum ex ipsis esculentum iusculum.

De sardonias herba. Cap. 51.

Herba quæ Sardonias nomen habet, et ranunculi herba generi adscribitur, dum esur, aut potatur, dementia infert,

fert, & neruorum conuulsiones, cum labrorum in ridum contractione, ut risus imaginem præferat: à qua quidem affectione Sardonijs risus, nefasti ominis praua q̃; famæ adagio omnium ore iactatur. Cui quidem malo obnoxys, post uomitum propriè malsa prolixius exhibita confert: pariter etiam lac, uniuersiq̃; corporis irrigatio, & illinito cum calfaciendi uim habentibus unguentis. Conducit præterea in hydrelæum calidum descendere, post egressum ex folio, infecti ualide unguendi, frictioneq̃; plurima perfricandi sunt. Atq̃; ut uno uerbo perstringam, curationem omnem perinde atq̃; in neruorum conuulsione, exequere.

De papauere corniculari. Cap. 52.

Papauer, quod cornutum appellationē obtinuit, siue esum, siue potum, eadē quæ papaueris succus infert symptomatica, & proinde iisdem etiam expugnatur præsidys.

De pharico. Cap. 53.

Nardum per omnia sapore & gustu æmulatur, quod pharicum uocant. Id in potu sumptum, cum mentis alienatione, & neruorum conuulsione, paralytim adfert. Educto per uomitiones ueneno, uinum absinthite, cū cinnamomo, aut myrrha, aut nardo Ciliſſa, quam isatim aliqui nuncupauerunt, potui dato. Aut spicæ nardi obolos duos cum passo commixtos, aut iridem cum croci flosculo ex uino. Derasum præterea caput, hordeacea farina cum ruta trita, & aceto delibutum, redere confert.

De toxico. Cap. 54.

Videtur toxicum inde nomenclaturam mutuasſe, quod barbari sagittas, uæ toxemata appellantur, eo inficerent. Consequuntur eos qui ipsum biberint, labiorum & lingue inflammationes, tunc oer cita insania, uarijs mentem perturbans

D d 2 im aginis.

imaginibus obuersantibus. Quocirca difficilis eorum est curatio, raroq; ad pristinam incolumitatem perducuntur, qui toxicum hauserunt. Vinculis ergo cobibendi, ut curæ subijciantur: & uiolentia quadam cogendi, ut uinum dulce cum rosa ceo potent, & uomitionibus reddant. Raporum semen itidem cum uino bibitum. Peculiariter ualet quinquefolij radix, & sanguis hircinus, atq; caprillus compari modo epotus. Adhæc cortex quercinus, aut fagi, & ilicis cum lacte tritus. Mala etiam cotonea comesta, uel cum pulegio concisa, & aqua bibita: præterea amomum, & balsami cum uino semen. Longo tandem temporis spacio conualescunt, ita tamen, ut qui iam periculis defuncti sint, lectulo diu decumbant: & ubi surrexerint, stupore consternati, nec mente satis constantes reliquo uitæ curriculo degunt.

De fungis. Cap. 55.

Fungorum alij genere, alij nimietate efficiunt: omnes tamē sumpti, præfocationes strangulationibus ei suspendio similes concitant. Quibus absq; dilatione quamprimum suppetias ferre communi subsidio conuenit. Oleo igitur ad uomendum, qui fungos hauserunt, cogantur. Mirabiliter autem iuuantur: lixiuium ex uitium sarmentis, & pyrastrij ligni cinere percolatum, cum posca, saleq; aut nitro potantes. Prosunt & pyra ipsa syluestria, aut folia una cum fungis elixa. Siquidē quam habent fungi strangulandi uim, auferunt, eademq; in cibo auxiliantur. Conferūt præterea gallinarum fimus decoctus, et in posca sumptus, addita mali terræ drachma, uel absinthij cum uino. Prodest mel linctum, & cum aqua potum: apiastrum itidem cum nitro, uel panacis radix, semenq; ex uino: fex item uini deusta cum aqua, & atramentū sutorium cum aceto: raphanus quoq; aut sinapi, aut nasturtium, esu proficiunt. Sed quoniam fungi quidam à uenenatis bestiis corrosi nō tantum strangulant,

gulant, sed etiam intestina exulcerant, exhibendum in eo di-
scrimine largius absinthium, & ficuum origaniq; decoctum.
Aqua porro mulsa & uomitus inde petitus, descensus item in
calida aqua solum, hordeacea deniq; polenta præcordijs im-
posita confert.

De sanguine taurino. Cap. 56.

Sanguis tauri recens mactati potus, spiritus angustiam &
strangulationem ingerit, tonsillarum gutturis & ingluuiei
meatus non sine ualida conuulsione obturans. Inuenitur au-
tem horum lingua rubra, dentes eodem colore infecti, & in-
ter eorum commissuras coagulati sanguinis globuli. Non ten-
tandæ in hoc periculo uomitiones sunt, densantibus magis in
stomacho grumis, quoniam uomitus attractione in sublimia
trahuntur, eleuanturq;. Exhibenda uerò sunt, quæ coaduna-
ti sanguinis concretionem discutiendi, aluum deiciendi natu-
ram obtinent. Grossi itaq; succo turgentes cum posca & nitro
præbentur. Conducit huc etiam omne coagulum cum aceto,
pariter & laseris radix cum suo liquore, itidem & brassicæ
semen, & ex ficulneo cinere lixiuium, conyzæq; folia cum
pipere, & ruborum succus cum aceto. Alius præter hæc suba-
ducetur. Solenne est his qui periculo defuncti reduces sunt, per
inferna teterrimi odoris excrementa reddi. Stomachum ala-
uumq; hordeacea farina et mulsa delibutam reddere expedit.

De lacte intus coagulato. Cap. 57.

Lac intus derepentè congelatū, magnum strangulatum pro-
creat, eo quòd in grumos quosdam coalescit. Quibus iuuu-
dis antidoti loco, coagulum cum aceto exhibeas, & sæpius id
sumere compellas. Succurrunt etiam nepitæ folia arida, item
eorundem succus, aut laserpitij radix liquor' ue cum posca.
Thymus itidem cum uino, & lixiuium quo pilcarij utuntur,
falsilago nulla admittetur, ne magis lac coeat, & in cascum
densetur. Vitari debet in hoc malo uomitus: siquidem hæc

De s rens

rens in uentriculo conglobatum in grumulos lac, ad exitum eludendo suffocat.

De melle, quod in Heraclia nascitur. Cap. 58.

Qui mel in Heraclia Pontica natum comederint, aut biberint, eisdem planè incommodis obruuntur, quibus qui aconitum hauserunt. quare eadem quæ relata in aconito, conueniunt. Saluberrimo autem remedio existit, qui id deuorauerunt, aquæ mulsa, admixtis rutæ folijs, continuus potus.

De gypso. Cap. 59.

Gypsus hausta in lapidem durefcens, strangulationem præcreat. proinde eadem auxilia quæ contra fungos competunt, huc transferre conuenit. Inter quæ maluæ decoctum olei uice præbetur. Pingue enim quum sit, lubricumq; uomitum inducens, interiora non patitur deradi corpuscula, quod lapidescens gypsus efficit. Expedit oleum cum aqua mulsa & ficuum decoctum; uel ex ficulneo cinere, aut sarmentitio factum, cum largiore uino lixiuium. Quin etiam origanum, aut thymum cum lixiuium, siue aceto; passum deniq; & maluæ decoctum, hoc modo affectis per clysteres infundenda sunt.

De cerussa. Cap. 60.

Cerussa suo se prodit indicio, utpote cuius color celari non potest. nam uoluntariè sumpta, palatum, linguam, interstitium qua se dentes contingunt, niueo candore inficit. Singultus præterea cit, tußim, linguæ ariditatem, artuum frigiditatem cum delirio & mentis percussione, corporisq; torporem, motumq; difficilem ingerit. Quo in periculo constitutis aqua mulsa utiliter exhibetur, aut ficuum, aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamum in uino solutum, aut ex uitium sarmentis lixiuium, aut amaracinum oleum, aut irinum. Et persicorum ossa cum hordei decocto, uel thus, uel prunorum gummi, uel qui in ulmorum folliculis continetur liquor, cum tepida aqua: sed ab unoquoque euomant. Confert etiam

etiam thapsiæ succus, uel scammonij cremoris triobolus cum aqua mulsâ potatus.

De calce, sandaracha, & auripigmento. Cap. 61.

Differuntur alui & interaneorum cum grauißima mordicatione doloribus, qui calcem, sandaracham, & auripigmentum hauserint. Præbentur igitur omnia, quæ ea temperare & soluere possint, quæq; uomitiones faciles, aluumq; lubricam reddant: cuius farinæ, hibisci, & maluæ succus, seminis q; lini decoctum existit. Aut tragi, aut oryzæ. Lac etiã cum mulsâ liberalius sumptum, iurâq; esculenta pinguiâ, quæ inculpatum succum generent.

De spuma argenti. Cap. 62.

Stomacho, aluo, & intestinis ingentem grauitatē, cum grauißimis circa umbilicum torsionibus, ingerit spuma argenti potata: præterea pondere nouunquã suo intestina sauciat, supprimit lotium, intumescit sumentibus eam corpus, & plumbeo colore inficitur, deformitatemq; concipit. Confert igitur, à uomitione statim syluestris hominij semē cum uino potui dare, myrrhæ itidem drach. octo, absinthij, hyssopi, aut apij semen. Prodest etiam piper, uel cyperi flores ex uino: columbarumq; agrestium finum siccatum, cum nardo, uinoq;.

De plumbo. Cap. 63.

Comparia planè his qui plumbi ramentum, uel loturam hauserunt, accidunt: ysdem itaque remedijs, quibus spumæ argenti, succurritur.

De argento uiuo. Cap. 64.

Argentum uiuum non secus quàm spuma argenti, potatum afficit. Similibus igitur auxilijs utriq; subueniendum. Lac tamen liberaliter haustum, peculiarius ipsis uidetur succurrere. Sed euoment etiam illi.

De ueratro candido, thapsia, ciaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, pappis. Cap. 65.

Pari industria prospiciendum etiam ijs, quæ homini salubritatis gratia exsultent, sæpe tamen numero calamitates

Dd 4 nibilo

nibilo minores alyis inuebunt: cuiusmodi sunt quorū iam meminimus, helleborus inquam albus, thapsia, elaterium, agaricum nigrum. Strangulatus etenim hæc inferunt, uel purgando iustum modum excedunt: quocirca strangulationib. illis, non secus quā de fungis & similibus demonstratū est, medebimur. Purgationes uerò æquo copiosiores, his quæ excretiones compefcere nata sunt, supprimemus. Neque socorditer tractanda sunt, quæ minus quidē offendere uidentur, uitā tamen discrimen nonnunquā afferunt: e quorum genere censentur, ruta syluestris, nigella, atq; recētes pappi, qui flores sunt spinæ, quam cadum nominant. Solus uomitus reficit, qui ea sumpserunt.

De his quæ contubernalia, & in quotidiano usu habentur, uino & aqua frigida. Cap. 66.

Strangulatus & dolores inducit, aqua gelida confertim hausta, uel meracius uinum largius potum, aut dulce liberius sumptum, præcipuè à balneo, aut cursu, aut concitatore exercitio. Vbi sanguinis detractio maturè facta, atq; inanitio, ingruentia iam pericula auertunt.

LIBRI QVINTI FINIS.

HYPOTHESIS LIBRI SEXTI.

In hoc uolumine totius operis sexto, omnis Chirurgia exponitur, quæ tam carnis, quam ossis uitia considerat, inque fracturatum & luxationum explicatione concluditur.

CAPITA LIBRI SEXTI.

Proœmium in artem medendi, quæ administratione manuū absoluitur	Cap. 1	De syncipitis quadam incisione, quem periscyphismum appellant	7
De combustione, quæ capiti inlippientibus, ægre spirantib. & elephanticis adhibetur.	2	De consusione superioris palpebræ, aliisque modis	8
De affectione Hydrocephala	3	De uisione palpebrarum medicamentis facta	9
De arteriarum incisione	4	De leporario oculorum affectu	10
De nasorum dissectione & aduisione	5	De sutura & aduisione per medicamenta	11
De frontis incisione, qui hypospasimus dicitur	6	De cætropio	12
		De	

LIBER SEXTVS.

43

De euulsione pilorū palpebram irritantium, & adustione per ferrum	13	De cancro	45
De uesiculis palpebræ	14	De maribus quibus perinde ac fœminis mammæ turgescunt	46
De palpebris coalescentib.	15	De iecoris adustione	47
De grandinibus, palpebræ tu- berculis	16	De lienis adustione	48
De uerrucis & in angularib. tu- berculis	17	De stomachi adustione.	49
De oculorum Prerygiis	18	Aqua intercutē qua ratione edu- catur	50
De uinationibus oculi, seu sta- phylomatis	19	De his quibus prominet umbili- cus	51
De oculo suppurato	20	De abdominis membranæ uul- neribus, deque intestini, uel o- menti prolapsu. Inibique uen- tris refarciendi ratio ex Gale- ni commentariis, traditur	52
De suffusionibus	21	De recutitis	53
De egilope abscessu oculi	22	De Hypopadiazis	54
De auditoris meatibus nō per- uiis	23	De phimo	55
De his quæ in auditorium mea- tum inciderunt	24	De præputio glandi adhærescen- te	56
De polypis	25	De circumcidendis	57
De curis, quæ colobomata di- cuntur	26	De thymis naturalium	58
De epulidibus & parulidib. gin- givarum abscessulis	27	De syphone & clystere uesicæ immittendis	59
De dentium euulsione	28	De calculo	60
De ancylio	29	De partib. circa testiculos	61
De onfyllis	30	De hydrocele	62
De uua	31	De carnosio tophaceo ramice	63
De spinis guttæ infixis, exime- dis	32	De uaricoso ramice & flatuoso	64
De gutturis incisione	33	De hernia intestinorum	65
De abscessu	34	De bubonocèle	66
De strumis	35	De scroti laxatione	67
De seuarionibus, pultationibus & mellisauis	36	De ratione faciendi eunuchum	68
De aneurysmate	37	De hermaphroditis	69
De hernia gutturis, quam bron- chocele appellat	38	De nymphe amputanda & cau- datione	70
De ganglio	39	De muliebrium locellorum thy- mis condilomatis, & hæmor- rhoidibus	71
De uenarum sectione	40	De muliebrib. genitalibus non perforatis, & phimo	72
De cucurbitularum impositu	41	De uteri abscessu	73
De adustione axillæ	42	De foetuum extractione, & ex- cisione	74
De adnatis digitis & sedigitis	43		
De suppuratorum adustione fa- cienda	44		

cisione	74	De brachio	100
De secundis relictis	75	De cubito & radio	101
De coxarum adustione	76	De summa manu, ipsiusq; digi-	102
De fistulis & fauis	77	tis	103
De anifistulis	78	De femore	104
De hæmorrhoidibus	79	De genuum patella	105
De condylomatis, seu tubercu-	80	De tibia	106
lis & rimis	81	De pede summo	107
De ano non perforato	82	De instauratione carnis	108
De varicum excisione	83	De fracturis, quæ cum uulnere	109
De dracunculo	84	accidunt.	110
De extremarum partium am-	85	De immodici fracturarum cal-	111
putatione	86	li superexcrecentia	112
De unguum pinnulis	87	De distortorum membrorum co-	113
De ungue colliso	88	cretionem	114
De clavis, formicis, & uerrucis	89	De fracturis quæ non occalle-	115
De telis extrahendis	90	scunt	116
De fracturis, & quæ sint ipsorum	91	De luxatis	117
differentiæ	92	De inferiore maxilla	118
De fracturis in capite	93	De iugulo & summo humero	119
De cerebri membranæ inflam-	94	De humero luxato	120
matione	95	De cubito	121
De narib. fractis ei contusis	96	De brachialis & digitorum lu-	122
De inferiore maxilla cōfracta	97	xationibus	123
& aure collisa	98	De spinæ uertebri	124
De fracta clavicula	99	De coxæ luxatione	125
De scapula	100	De genu luxatione	126
De pectore	101	De malleoli luxatione, inibi	127
De costis	102	etiā de pedum digitis	128
De coxendicib. & pubis ossib.	103	De luxationib. cū hūlcere	129
De uertebri, spina dorſi, & os-	104	De luxatione cum fractura	130
se sacro	105		

FINIS.

PAVLI AEGINETAE

LIBER SEXTVS, ALBANO

Torino interprete.

Proœmium in artem medendi, quæ administratione manuum
absolvitur. Cap. 1.

SERMO NEM super arte quæ manuum
opera exercetur, bifariâ dispescimus: in ea
quæ in carne, et ea quæ in ossiū quum fractu-
ris, tū luxationib. contēplantur. Sūptōq; in
præsentiariū ab ijs quæ carnē infestare solēt
exordio, de more hic quoq; nostro, rē cōpēdio perstringemus.
Rursus

Rursum itaq; à supernis partib. inchoantes, ad affectionē quæ capiti ac uertici eius potissimū admoueri cōsuevit, explicabimus.

De combustionē quæ capiti in lippientibus, ægre spirantibus, & elephantice adhibetur. Cap. 2.

Humore desuper in oculos fluente, & graui spiratione, ob excremētū humoris abundantia urgente, qui ē capite ad throacē descendēs, partes eius cōtinuo fluxu affligit, mediū capitis hac quodāmodo ratione perurūt. Detōso prius ad cutē uertici ferramēta instar specilli mucronata inijciunt, & offsetenus cutē adurūt; quod deinde, ubi crusta exciderit, radunt. Quidā uerò ubi os ipsum adusserint, ut squama inde tenuis resoluatur efficiūt, quo facilius humores in capite detēti illinc euaporatu diffluētur, et exinaniātur. Seruato tamē aliquādiu hūlcere, postea ita ad cicatricē perducūt. In elephātiāsi autē mēdēda, quinque nōnulli adustiones capiti infligūt. Vnā in anteriore parte supra id quod sinciput nūcupatur. Alterā paulo hac inferius, supra frontem tamē ubi capilli finiūt. Tertiā ad occipitiū. Binās reliquas iuxta ossa quæ squamata adglutinamēta uocātur, paululū supra aures. Vnam ex his latere dextro, alterā lauo. Vt plurib. squamis detractis, humorum copia crassitudoq; per spiratu ab imis partib. capitis deriuata extrahatur, atq; ita luminibus nihil detrimenti inferat. Lienī quoq; aliud ferramentum inuistorium adhibetur, quo principi melancholici recrementi membro per cuti inductam crustulam succurratur.

De affectione hydrocephala, hoc est aqueo humore in capite concepto. Cap. 3.

Qum humor qui essentia aquosus est, capitis cutem inflat, morbus peculiariter hydrocephalus nūcupatur. Accidit autem infantibus secundum illico partum, capite ab obstetricibus inscitē compresso, uel ex abdita causa, uel ex uasis, uasorum ue ruptura, & sanguine qui effusus est in ociosam & crudam substantiam conuerso, uel cum materia ob meatulorum raritatem resudante, seque inter cutem & caluariæ membranā recipit. Aut enim hanc caluariæ pelliculam

pelliculam & cutem, uel membranam caluariæ et os, uel
 & membranam cerebri humor intercedit. Quibus igitur i-
 ter cutem & membranam quæ caluariam uelat, humor coi-
 gitur, tumor tractabilis comitatur, concolor, doloris exper-
 in sublime incuruatus, & ad digitorum contrectationem faci-
 cedit, quoniam in proximo est, rursumq; leuatur. Quibus uerò
 inter caluariæ membranam & os humor confedit, cætera q-
 dem respondent, tumor uerò durior multo existit, ac tardius
 cedens, utpote pluribus etiam succumbens partibus, maiore
 cruciatu afficit. Quibus uerò humor cerebri membranam &
 os interiacet, tumor quidem existit, sed non adeo mollis, nequ-
 nisi uiolenter comprimatur, cedens. Siquidem infantium c-
 recens adhuc compactum quum sit, facile cedit, ac potissimum
 ubi rarefactis suturis humori exitus datur. Id quod uel inde c-
 facili cognoscitur, quod cum ex aduerso locus impellitur, hu-
 mor ex constrictione in altum refugit. Dolorem hi maioren-
 sentiunt, caput uniuersum distrahitur, frons ipsis foras prom-
 net, fixis luminibus intuentur, perpetuoq; illachrymant. Qui-
 bus sanè tanquam conclamatis manus curatio deneganda est.
 Tameiſi chirurgicorum nonnulli terebratione undiq; adactos
 exemerint, ueluti in capite de fracturis capitis referemus. Cū
 uerò cuti & membranæ caluam tegenti humor interiacet,
 cum pusillo tumore, una incisione per medium transversim ca-
 put secandum est. Si inter pericranium & os humor cum gran-
 diore tumore conſtiterit, duas per medium se mutuo secantes
 incisiones moliemur. Si grandior adhuc tumor emergit, ter-
 nas, ~~et~~ litteræ figuram æmulantes. Post manus curationem, ex-
 ampta humoris colluie, conceptis linteolis insertis scitè deli-
 gabimus, & in tertium usq; diem ceneſcum inspargemus. Post
 hæc fasciis resolutis emmoto mederi studebimus. Si os
 longiore temporis spacio carnem contrahere cū
 æstus, parcente manu radatur.

De

De arteriarum incisione. Cap. 4.

IN diuturnis oculorum defluxionibus, et uitio uertiginoso arterias post aures secare solemus. Tondenda igitur prius posterior capitis pars, & notanda digitis. Ex loci etenim pulsus arteriæ situs ex facili deprehendetur. Mox ipsam ad os usque diuisione duos digitos longa incidere conuenit, quæ scriptorio tamen atramento antea fuerit insignita. Si uerò arteria tactus percipi nequeat, interuallum trium circiter digitorum, ab auribus metiendum est: atque ita manu iniecta, arteriæ per transversum incidantur, tantisper dum pulsatorius sanguinis liquor abunde fluxerit, diuisa caluariæ membrana, ne extensione inflammetur, rasoq; osse cuneolum ex panniculo uulnere inferemus. Deinde modo per linamenta medicamine imbuta curandi utemur. Si etiam hic os carne non recepta nudum manserit, similiter rasura adhibenda est.

De uasorum dissectione, quæ angiologia uocatur, eorumq; adustione. Cap. 5.

IN doloribus qui alteram modò capitis partem exercent, tamen diuturnis quàm breuibus et acutis, cum calido et acri in oculos fluxu, ita ut temporum etiam musculi cum tumore incallescant, uasorum capitis diuisionem omnes approbarunt. Detonsis igitur primùm temporum capillis, locoq; calfacto, uel collo constricto, uasa digitis notabuntur. Si hoc modo eadem in conspectum uenerint, atramento signabimus. Cutem à lateribus læuæ manus nostræ digitis, famuliq; leuabimus, ipsiusq; uenam linea leuiter incidemus. Mox ubi totam penetrauerimus, hamulis oris excipiemus, instrumentisq; ad id factis, hanc denudatam undiq; absolutam suspendemus. Et si tenuis fuerit, retuso hamulo, subiecto & circumtorto uno in loco præcidemus, ita ut partem ipsius quandam apprehendamus. Si uas amplum fuerit, acus cui duplex filum subiectum fuerit: uel linum crudum, uel tale quippiam haud imbecille, transmittenda est. uenaq; primùm in rectum scalpello diffecata, sanguineq; quan-

tuma

tum opus est, fuso, in utraq; extremitate quod denudatum est lino uincire, & partē quæ intercepta est, uel illico ubi soluetur, abscindere ac tollere conuenit. Sunt qui cauterijs mucronatis uasa absq; incisione ad multā profunditatē adurāt. Post quā manū opera absoluta est, discriptis filatim linamētis aridis uulnere oppleto, splenioq; superaccomodato deligandum est. Post solutionē uerò, quā uidelicet uincula deligaturæ computruerint, atq; exciderint, medicamentis carnem generantibus aridis, & linteolo concepto exceptis, cicatriciq; inducendæ idoneis, curationem quæ restat absoluemus.

De frontis incisione qui hypospatismus dicitur. Cap. 6:

A B instrumenti specie nomen Chirurgiæ inditum est. Vtendum autē hypospatismo in ijs, in quorū oculos defluxio multa et calida descendit, et uultus ruber apparet, et in fronte sensus quidam ac discursio uermium modo aut formicarū percipitur. Detonsis itaq; primum iuxta frontē capillis, mandabimus aegro, ut inferiorē mandibulā commoueat. Musculorumq; ad tempora motū uitantes, treis lineas in frōte rectas paribus inter se spacijs distantes secabimus, quarū singulæ longitudinem binorū digitorū æquent, altitudine usq; ad os tendāt, trium in uicē digitorū interuallo diductas. A sectione hypospathisterē spatham ue subter injicientes, à sinistri temporis linea ad mediam usq; incipiemus: totum illud spacium quod interiacet, unā cum caluariæ membrana excoriantes. Deinde rursum spathulam à media incisione ad reliquam adigemus. Mox scolopomacharij aculeati cultelli aciem in primam sectionem conjicientes, ut acies eius interiori cutis carni, retusa pars ossi accommodetur, usq; ad mediam lineā adigemus, ut omnia à capite ad oculos descendētia uasa, non tamen usq; ad summam cutem secemus: rursumq; à media ad extremam ipsum demitemus, simili modo uasa amputantes. Post uerò mediocrē sanguinis inanitionem, expressis accuratē grumis, tria linamenta contorta singulis lineis singula insinuabimus, linteoloq; cōplicato

tato, aqua imbuto, superaccommadato deligabimus. Postero die cœnæ o non hulnera modò, sed temporum etiam musculi, auresq; inflammationis ergò inspergantur: tertio die resolventes plurimo fotu utemur, & basilico rosaceo diluto linamentis madentibus insertis, reliquam curationem prosequemur.

De syncipitis quadam incisione, quem periscyphismum appellant. Cap. 7.

Quibus complures aliæq; uenæ copiosum ad oculos fluxum demittunt, his periscyphismus adhibendus est: quod maxime indicia comitantur huiusmodi. Primum quidem offendentes, lumina hoc morbo laborantium alimentum non sentire, parua, & ad intuitum impotentia, hircus ipsorum corrosis, palpebris exhulceratis, pilis defluis, lachrymæ adhæc tenues admodum, & cum caliditate acres, tormentum in capitis profunditate acutum & infestum, sternutatio continua. Quocirca capite prius detonso, & musculis qui in temporibus moventur, ut dictum est, cuitatis, transversa plaga, à læuo tempore in dexterum usque perducetur: quæ, ubi motus nullus existit, fines habeat, paululum supra frontem impacta, sicut coronaria caluæ commissura non offendatur. Licet Leonides per mediam frontem lineam deducendam censeat. Denudato uerò osse, cuneolis aut linamentis filatim conceptis, pluribus incisioni iniectis, oras eius à se inuicem diducemus: finesq; linea deligabimus, cum cœnæ, ut prædictum est, adspersione. Post solutionem uerò ubi declinauerit iam inflammatio, os, quoad caro suppullulare incipiat, radendum est: ratio neq; carnis producendæ curabimus, medicamentis aridis in id efficacibus usi. Cuius notæ est, quod constat farinæ triticæ partibus duabus, colophonice una, & cognomento Cephalicum, & carnem generantia, in quibus pumex adhibetur. Crassiuscula etenim cicatrice cute astricta, & orificijs uasorum occlusis, solitus pituitæ impetus in oculos descendere prohibetur.

De

De consutione superioris palpebræ, aliisque modis. Cap. 3.

Distichiasis nuncupata pilorum succretio præter naturam est, sub ordine naturali pilorum palpebræ exorta, rheumatici affectus soboles: quum copiosus quidem, sed minimè rodens et acrimoniæ expers destillans humor existit. Nam si acrior, magisq; salsus, aut alio quodam modo mordicans fuerit, diutino fluxu etiam naturales palpebrarum pilos corrumpit. In hac igitur dispositione, interim consutione utimur, interim in phalangosi, quum tarsus seu ciliū introrsum spectans, secum pilorū phalangē inuertit. aliàs aut et in palpebris relaxatis, quū naturales pili bulbū irritant. In sella itaq; laborās, uel ac uersus uel à latere sinistro collocabitur, superiorq; illi palpebra inuertetur. Siquidē demissos habeat pilos, illos ipsos digitis indice & pollice sinistrae manus adprehēdimus. Sin admodū breueis, acu filiū trabente mediū tarsum ab interiore parte extrorsum trāsuimus, deinde filo læua apprehenso palpebrā attollimus. Dextra specilli mucrone foris impresso sinuantes ipsam inuertimus. Postea interius quàm pili pungentes habeantur, subtus à maiore hirquo ad minorem usq; pertinens, per cilium incidenda linea est: mox filum post incisionem inferiorem subicientes, pollice sinistrae manus duplici quodā lineae teolo obiecto, supercilium sursum extendimus, aliaq; exigua linamenta complicata extremis hircis immitentes, ministro à tergo stanti præcipimus, ut palpebras per ea distendat. Atque tūc scalpello fibulis aptato, paululum supra naturales pilos incisuram, uerū figura ab hirquo ad hircum tendentem perducimus, folius cutis altitudine: post eam aliam lunarem adhibemus, initio ibidem accepto, ubi prior obelo similis linea coeperat, adeò sursum tendentes, ut omnem superuacuam cutē circumscribamus, desinentesq; similiter ibidem ubi commemorata linea. Deinde cum cutis duabus lineis circumscripta myracetum folium imitetur, in angulum qui ad dextram nostram respicit, hamulo infixo, cuticula hæc uniuerſa excorianda est.

Mox

Mox uibicibus spōgia deterfis, tribus aut quatuor futuris uul-
neris oras committemus, à media incisione auspicientes, sic ut
acus in interiore illa sectione defigatur, filum autem ex lana
sit. Superfluum eius amputantes, non prope futuras, sed ut trē-
um circiter digitorum lōgitudō ociosa supersit, quam ad fron-
tem retractam aliquo emplastro gluten habente adglutinabi-
mus, palpebræ pilos mucrone acis à suturarum nexu libera-
bimus. Modus hic quidem curationis, quæ manuum opera ad-
ministratur, communis & tutior est. Sunt qui excoriationem
planè deuitent, eoque post illam subtus factam lineam palpe-
bria uulsellā, hoc est, specillo ad palpebræ rotunditatem fige-
rato, superfluam cutem scalpro eleuatam excidunt, fibulasq;
ut dictum est, injiciunt. At si in parte modo aliqua palpebræ ex
pilis oriatur stimulatio, illi etiam soli manus opera adhibenda
est. Post hæc panniculis implicitis, posca irrigatis ac superaco-
mōdatīs, deligabimus, ad tertium usq; diem dilutiore posca
ipsam imbuentes particulam: tertioq; die ligaturam soluemus,
ac superfluis filorum partibus amputatis palpebris, uel cro-
co, uel glaucio, uel aliquo prohibente inflammationem colly-
rio oblinemus: uerbi causa, ex croco rosīsq; composito. At si in-
flammētur fibulæ, emplastrum etiam aliquod lene superimpo-
nendum, & ueluti lacre instillato oculum leniemus, relaxatas
postmodum fibulas præcidendo extrahemus. Nouimus ipsi
quendā, qui palpebra, ut cōprehensum est, excoriata, futuras
minimè adhibebat, sed cicatricem inducente medicamento cū-
rationem prosequēbatur. Plaga enim ad cicatricem perducta,
palpebra particulatim sublata pilos in exteriorem partem in-
clinare cōgebat. Non secus etiā alius quidā, neq; excoriatione
palpebræ, neq; externis duabus ipsius incisionibus utebatur,
sed interiore tamē ducta linea uel digitis uel hamo rugas pala-
pebræ subleuabat, duabus itē harundinulis uel recisamētis bra-
deis quibusdā, palpebrā longitudine, scalpellū uerò angustum
latitudine æquantibus, totam superuacaneā cutem mediam in

B c

terceptā

terceptam extremis utrinq; reuinctis oris ipsius, constringebat. Atq; ita tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriens, intra decem aut quindecim ad summum dies unā cū arundinulis aut lamellis illis bracteis, absque ullo ferē cicatricis uestigio excidebat.

De uestione palpebrarum medicamentis facta. Cap. 9.

Vestitionem palpebrarū cum medicamentis adurentibus, prisci omnes, ut paucis expediam, respuerunt, quum ob medicamenti acrimoniam oculis infestam, tum quod ex immodica adustione lagophthalmica nascitur affectio; qua quum hient palpebræ, qualicunq; ex occasione oculorum acies offenditur. Quandoquidem uerō multi pilorum punctiōem usq; experiunt, ne uocabulum quidem consutionis crebro audire sustinent, nosq; inuitos detinent, tanquā deploratis hanc ex medicamento adustionem molimur. Compositio quidem medicamenti huiusmodi est. Calcis uiuæ partes duæ, saponis Gallici uel communis tantundē. Sunt qui spumæ nitri parteis quatuor adijciūt. Hæc omnia percolata lixiuio, uel saponario, uel alio, ficulneo, uel querceo laeuigata, urina incorrupti pueri excipientes mucrone specilli myrtacei folij figura, palpebræ iniiciemus, tantum spacij deurentes, quantum etiam in futura fuisset à nobis comprehensum. Quum prima iniectione cutis fuerit adusta, medicamēto spongiola detracta, rursumq; aliud impositū tamdiu cuti inhaerere sinimus, donec nigrorem contrahat. Sin autem minimè nigrescat, etiā tertium iniiciemus. Nigrefacta iam cute, et crusta oborta, reliquum medicamentum detergendum est. Balineis deinde et perfusionibus, quousq; crusta deciderit, utendum: à cuius casu, rasilibus linamentis, et collyrijs leuibus plagæ cicatrix molienda est.

De leporario oculorum affectu, qui lagophthalmon dicitur. Cap. 10.

Lagophthalmi dicuntur, qui superiorem palpebram sursum retractam habent. Quod uitium uel è natura, uel ex cicatrice uul-

ce uulneris, cuiusq; uel sua sponte facti, uel ex cōsutione, uel adu-
sione, ut modò dicebamus, inartificiosa prouenit. In qua uel
mediocri tantum adhiberi potest correctio, si idoneam crassi-
tiem palpebra nacta sit. haud enim conuenit, ipsa cicatrice di-
uisa, & oris cū linteolis diductis, deligatione etiam usq; ad ultī-
mam prorsus curationem uti: neq; nimium exiccantia, sed re-
laxantia magis unguenta adhibere. Cuiusmodi est scēnogracci
cremor superfusus, et basilicum tetrapharmacum resolutum,
& linteolo illitum.

De futura & aduisione per medicamenta. Cap. 11.

QUOT pilorū affectibus superior palpebra, totidē etiam infe-
rior obnoxia est. Nā naturā suā modo amplior effecit,
inuertitur, & phalāgosin et geminatum pilorū succrescentiū
ordinē, Græci distibhā uocāt, sustinēt. Eodē igitur suturā mo-
dulo hic quoq; inuerso tantum linearū ordine, utendū est. prius
enim, lunaris, ne sanguinis fluxu opus impediatur, mox obeli
figura, linea incidi debet. Sub pilis prorsus repudianda est se-
ctio, quoniā inferior palpebra genuina sua grauitate prōptē
innectitur. Reliqua curadi ratio perinde atq; in cōsutione tra-
data est, hic quoq; competit: nisi quod restantia filicrū capita,
frōti minimē sunt adglutināda. At si in hoc etiā casu, manuum
administratione repudiata, uisionem potius per medicamenta
deligere malis, hanc quoq; à nobis iam traditam habes.

De ectropio. Cap. 12.

VT in palpebra superiore uitium lagophthalmū uocatū, sic
in inferiore ectropiū accidit. Nisi quod hoc naturaliter nō
euenit, sed interdū ex relaxatione. medicamētis in id effica-
cib. illatis, præcedente inflāmatione: interdū ex sutura uel adu-
sione parū dextrē administrata, palpebra inuertitur. Acum
igitur quā duplex linum habeat, in carunculam à sinisterio-
re hirquo ad dextram usq; trañcimus, postea extremis utrisq;
que acus lino adplicato, carunculam attollimus, & scalpelo
succidimus, simul cum caruncula acu sequente. Si palpebra

Bc 2

sic for

sic formā suam receperit, & æqualiter fuerit restituta, de manibus opera erimus contenti. Sin carne ablata adhuc inuertatur, cyathiscum scalpelli iuxta mucronē sedæ palpebræ subiiciemus, internāq; parte palpebrā binis lineis secabimus, quā à duobus factæ incisionis angulis auspicantibus in fastigiū mucronatum ad Λ literā Græcæ instar coeant, carunculam detrahemus, ut uertex ipsius deorsum ad oculum, basis sursum ad cilium adpellatum respiciat. Deinde hiantes plagæ oras, acilaneum filum trahente coniungemus, geminis consutionibus contenti. Cæterum si ex sutura uel uestione acciderit inuersionis, sub inferioribus etiam palpebræ pilis iuxta priorem cicatricem simplex linea incidenda est, labrisq; diductis linamenta insinuanda, & reliquis deinceps præsidys, ueluti in leporina adfectione docuimus, utendum est, exceptis fotibus, donec sutura conglutinetur.

De euulsione pilorum palpebram irritantium, quam anabrochismum uocant, & adustione per ferrum. Cap. 13.

IN quorum palpebra pili, qui oculum pungunt, multi non sunt, sed unus modo, aut duo, uel ad summū tres mutuo intersc propinqui, anabrochismum, id est illaqueationē probamus. Quæ fit hoc modo: Acu tenuissima accepta, per auriculā eius capillum muliebrem, aut simplicissimum byssinū filum transmittimus, duobus simul capitibus commissis, sic, ut filum duplicem habeat ansulam instar sinus, alterumq; filum huiusmodi uel capillum in ansulam conyicimus, transmissaq; acu per cilium ubi pili agnati cernuntur, pilum seu pilos in sinum ansulæ iniectos specillo detrahemus, etsi quidē palpebræ pilus præbens fuerit, fili ansulam attrahimus. Sin autem unus plures. ita exciderint, per initium iniectum, rursus ansulam deorsum trahemus, iterumq; pilo seu pilis immisissis attrahemus. Quod si unus duntaxat fuerit pilus, & idem gracilis qui oculum stigmatulet, eum unā cum alio ex naturalibus pilis euellemus, illi tum antea gummi aut alio quodam glutinoso, atque ita donec
pili

pili in unū coalescant deligabimus. Nō desunt tamen qui huic laqueationi ustionē præferentes, palpebram inuertūt, uulselāq; pilis irritantibus, siue uno siue duo, seu tres sint, candente scalpelli mucrone oliuari forma, aut specillo auriculari, aut eiusmodi aliquo tenui instrumēto locū adurēt, unde pilus pilisue sint euulsi. sic cute densata, nullus pilus amplius renascitur.

De uesiculis palpebræ, quæ Græce hydatides dicuntur. Cap. 14.

HYDATIS pinguis quædā est essentia, sub cute palpebræ præter naturam conflatā. In nonnullis uerò, & præsertim pueris, utpote natura humidioribus, increscens grauiorum causam causa euadit, dum oculū aggrauat, eoq; fluxionibus exercet. palpebræ itaque his aquosæ infra supercilia apparent, neq; ut decorum est sursum queunt attolli. Si eas digitis inter se distantibus deprimamus, quod medium inter digitos existit, inflari cernitur. Matutino autem diluculo defluxione potissimum infestantur. Neq; ad solis splendores nisi lachrymanes lumina conuertere possunt, & continuis lippitudinibus tñantur. Aegro igitur adpositè collocato, binis digitis, indice & medico paululum diductis, palpebram comprimemus, collectionem quandam uesiculæ inter digitos molientes. Deinde famulo posterius stanti, & caput sustinenti, ad medium supercilium palpebram paululum attollat iubebimus. Nos sumpto scalpello eam lineā transversa per medium secabimus, plaga tamen non maiore quàm in sectione uenarū fieri solitū est, nec altiore quàm ut uel totam cutem secet, uel hydatidem ipsam attingat; animum ad hoc sollicitius aduertentes. multi enim aliter per incuriam demisso scalpello, uel corneam membranam fauciauerunt, uel certe palpebræ musculum. Et si uesicula oculis protinus sese obiecerit, ipsam illico euellemus: sin minus, rursum suspensa leuiter manu lineā moliemur, ipsamq; si properuerit digitis molli linteolo adprehensam huc illuc agitan-
tes, & in orbem nonnunquam circumagentes extrahemus.

Be 3

A' detra-

A' detractione duplicato linteolo posca imbuto & superimp-
sito deligabimus. Nonnulli salem contritum mucrone specill
nucleum imitante incisuræ injiciunt, quo hydatidis reliquiae
si quæ fuerint, consumantur. Post solutionem, si non urgeat in-
flammatiō, illitis collyrijs, uel lycio, uel glaucio, uel croceo
medebimur. Si inflammatione cōflāntur, cataplasmatīs a
hoc comparatis, alijsq; præsidijs curabimus.

De palpebris coalescentibus. Cap. 15.

Committitur interdum superior palpebra cum cilio infe-
riore, interdum cum tunica adnata, nonnunquam cū ips
quoq; oculi cornea coalescit. Vitium hoc oculū ad munia su-
ignauum ac difficilem reddit, proinde uel specillo patenti pa-
pebræ loco inserto, uel hamulo subiecto eleuabis, & scalpelli
pterygijs secandis idoneo coherentiam dissoluito, circumss-
dē ne cornea membrana saucietur deuitans, ne procidentia
ex hoc detur occasio. Post abscissionem oculo liquorem instil-
labis: palpebris cum linamentis, ne rursus cohaerescant, didi-
cis, lanam oui albore imbutam inserto. A' tertio dein die at-
tenuantibus, & cicatricem inducentibus collyrijs utendum.

De grandinib. palpebræ tuberculis, quæ chalazia dicuntur. Ca. 16

Chalaziū est crudi cuiusdā humoris in palpebra cōcretio.
Quod si exteriori palpebræ subsidet, incisione transuersim
forinsecus scalpello facta, specillo deinde uel aliquo id genui
instrumēto tolletur. Si spaciōsa et hīdēs est diuisio, sutura ora
cōmittemus, et emplastrū inducemus. Si exilis plaga est, simi-
li modo curabimus. Si ab interiori parte sub cartilagine pel-
lucet, inuersam palpebrā linea transuersa interius incidētes,
chalaziū extrahetur: quo factō, muria instillatione utimur.

De uerrucis & inangularibus tuberculis, quæ Græce acrochor-
dones et encanthides dicuntur. Cap. 17.

Palpebrarū uerrucas & inangularia, quia in maiore can-
tho oriuntur, adpellata tubercula, (Græcè encanthidēs)
uulsella comprehensis, scalpello amputamus, friatam deinde
in pollinem chalcitidem superaccommodamus.

De

De pterygiis, hoc est oculorum unguibus. Cap. 18.

Hoc uitium accidit, quum membrana quadda neruosa à maiore angulo ut plurimum orta, paulatim ulterius ad interiora procedit, oculumque offendit: tum quia contrahendo bulbum moueri non sinit, tum quia procedendo uniuersam pupillam operit. Tenuibus sane et albicantibus, quoniam facilius curantur, hunc ad modum manuum curatio adhibenda est: diductis palpebris, unguem hamulo paululum mucrone intus recuruato excipimus, sublaturumque acu pilum equinum et linum ualidum ducen- te, paululum in summitate inflexa, per medium traicimus, li- noque uinctum sublimem suspendimus. Secta equina partem pupil- lae uicinam quasi ferrando defecantes, ad finem usque excoria- mus. Totum uero ipsius reliquum, quod angulo maiori inhae- ret, radicitus excidimus, ita ut naturalis anguli caruncula re- linquatur, ne ea ablata rhyas sequatur, hoc est perpetuus bu- moris descensus. Sunt qui uinguem sublaturum, ut diximus, scalpel- lo huic muneri dicato totam succidunt, excoriant, summa ta- men cura adhibita, ne cornea membrana attingatur. Post ma- nuum operam laeuigati salis momentum loco inijcimus, lanam- que candido oui liquore irriguam deuincimus. Facta aliquan- diu post solutione, muriam instillabimus. Si inflammatio subs- sequitur, dedicatis huic malo auxilijs utemur.

De uuationibus oculi, seu staphylomatis. Cap. 19.

Vuatio siue staphyloma est, membranae quae cornus speciem ha- bet, una cum acinali, quae ragoeidis nuncupatur, debilitatae incuruatio, modo ex defluxione, modo ex ulceratione origi- nem trahens. Huic autem uitio manum administramus, non ut luminis speciem iam abolitam restituamus (hoc enim nequit fieri) sed ut laboranti mediocrem uenustatis gratiam conciliemus. Oportet igitur acum ab inferiore parte sursum per radices staphylomatis traicere, deinde alteram acum duplex filum trahentem, ab angulo qui ad manum spectat, ad alterum per radi- ces uuationis transmittere, tum manente priori acu lini sinus am-

Be 4 putari,

putari, atq; ita uuae superiora, inferioraq; filis deligare, mox acu extracta lanam albumine oui insuccatam superaccommodare. Ab huius inde solutione blandis infusionibus oculis fovendus est, quoad unà cum staphylomate fila excident.

De oculo suppurato, quod hypopyon dicunt. Cap. 20.

DE purulentis oculis abunde erit, Galeni orationem apposeuisse, quæ ad hunc modum se habet. Ocularius quidam nostræ ætatis medicus, Iustus nomine, ex capitis concussionē pleurosq; suppuratione oculorum vindicavit. In sella quippe repositos collocabat, mox capita ipsorum utrinq; à lateribus comprehendens, ita quatiebat, ut prius ipsis descendere euidenter conspiceremus, quod deorsum propter substantiæ gravitatem manavit, tametsi suffusiones nequaquam permanere, nisi accuratè admodum constringantur, valeant. Progrediens rursus idē Galenus, inquit: Sæpe autem puris multum simul eduximus, cornea tunica paululum supra locum illum, qui iris à quibusdam, ab alijs corona appellatur, ubi omnes tunicæ inter sese committuntur, incisa: id quod Galenus in libro Curatoriæ artis prodidit. A puris excretionē, uel ex aqua mulsa: uel succo fœnogræci melle temperato instillationibus expurgantes, deinceps reliquam curationem accommodabimus.

De suffusionibus. Cap. 21.

SUFFUSIO est crudi cuiusdam humoris in membrana quæ cornus speciem refert, iuxta pupillam colluviens, quæ uel uidere, uel lucidè uidere impedit. Ex frigidityte potissimum et imbecillitate spiritus uisorijs prouenit, eamq; ob causam senibus magis et longo morbo confectis accidit: ex uiolento item uomitu et plaga, alijsq; plurib. de causis euenit. Atqui de suffusionibus, quæ adhuc efficiuntur, nullam manus administrationē requirentibus, in tertio uolumine facta est mentio. nunc eas quæ consummatam concretionem et firmam constitutionem acciperunt, indicijs suis denotabimus. Cuncti igitur suffusi fulgorem uel multum, uel paucum intuentur, eoq; discrimine ab hebetudine

hebetudine & glaucedine distat suffusio, quod hebetudine & glaucedine affecti, ne fulgorem quidem penitus cernunt. Rursum itaq; suffusionum & concretionem, & differentiam, & quomodo his manuum administratio sit adhibenda, Galenus te docebit. Oculum, inquit, suffusione laborantem concludimus, polliceq; compressam palpebram ad oculum hac illac impellimus. Postea oculo recluso, animaduertentes suffusionem intuemur. In quibus humor nondum exacte concreuit, fusio quaedam ex digiti impressura obuenit, quae primo latior comparet: deinde rursus in suam figuram & magnitudinem redit. Sed in quibus humor ad perfectam duriciem coaluit, nulla neq; latitudinis, neq; figurae ex compressione immutatio obuiat. Quoniam uero haec earum & quae modice, & quae supra quam par est induruerunt, nota communis est, colore ipsas discernemus. Nam quae ferri colorem uel caeruleum, uel plumbi referunt, mediocriter coaluerunt, & ad deductionem accommodatae sunt. Quae uero gypso aut grandini simile colorem habent, ultra modum compactae & induratae sunt. Haec ubi ex Galeno didicimus, collocato in sedili homine in lucido citra solem loco, sanum oculum summa diligentia colligabimus: tum aperitis alterius palpebris, ab iride appellata, cum ad minorem hinc quum, aliquantulum ad specilli mucronis instar deducemus, & retuso punctorij stili capitulo, locum ubi pungendum est notis designamus, in laeuo quidem lumine dextra, in dextro laeva manu operantes. Mox teretem specilli mucronem inuersum acriter notae designatae impingimus, usq; dum inani loco incidimus. Ba nobis erit mensura, ut tam alte penetremus, quantum a pupilla ad iridem interest spacij. Ex superiori igitur suffusionis parte acu adacta (euidenter enim ferrum, propter corneae membranae pelluciditatem, conspicitur) humoris concretionem per ipsam ad inferiorem regionem deducimus. Et si statim deducta fuerit, persistemus, quiescentes aliquantulum. Sin reuersa fuerit, iterum deriuanda est. Post autem humoris colluiri

Ecce deduc

deductionem, sensim circūuertendo stilus extrahendus est, tū alis capadocis momentū aqua dilutū oculo eloto instillandum est, lanamq; luteo oui liquore imbutā cum rosaceo foris impositā deuinciemus, ita ut oculus sanus, ne unā cū altero moueatur, simul deligetur. Deinde in domuncula subterranea laborantē prorsum quiescere, et tenui uictu uti præcipimus, oculis ita ad septimū usq; diē, nisi quid prohibeat, deligatis: à quo resoluemus, et ex rebus quibusdā uisibilibus obiectis uisionis periculum faciemus. Quod inter manus curationē et ab hoc protinus fieri non debet, quoniā ex nimia intuitus intentione facile rursus redire suffusio solet. Si qua inflammatio urgebit, etiam ante septimum diem facta solutione certatim occurrendū est.

De ægilope abcessu oculi. Cap. 22.

A Egilops tumēs abcessus est, inter maiore hircū et nares medius. Quod uitū remedijs difficulter eliditur, tū ob partium tenuitatē, tum ob periculū, quod ex cōsensu oculo imminet. Quare si ad summam cutim eruperit abcessus, omne id quod extuberat, offetenus circumcidendū est. Si ad malā hulus debiscēs ceu fistula subierit, totum ipsum aperiemus, et os etiamdū incorruptū rademus. Sin iam carie uexetur, cādenti bus ac retusis ferramentis aduremus, spongia frigida aqua irrigua oculo imposita. Quidam post caruncula excisionem terebra usq; humorem uel pus in nares traducūt. nos sola adustione contenti sumus, eo usq; ferramentis ægilopi dicatis adurentes, ut squama abscederet. Post ustionem medicamentis ex lētis cula et melle, uel malicorio, sidiotōue, et reliquis exiccantibus præsidijs utimur. Quod si ægilops non ad summā cutem, sed ad hircum tendat, scalpello uel ad pterygia secanda, uel ad uenam aperiendam idoneo, totam eam quæ inter hircum existit particulam, ad abcessum resoluentes, carnes ex imo euellimus, et moderatē exiccabimus. Vitri aut puluisculus inspersus mirificē desiccet. Idem aloē cum manna præstat. Reliquam ægilopum curationem tertio libro tractauimus.

De aut

De auditoriis meatibus non peruiis. Cap. 23.

Hoc uitium à primo natali die accidit, membrana quadam auditorium meatum obstruente, nunc in summo tantum, nunc in alto: postea facta prius secundum meatum exulceratione, caro enim superexcrefcens ipsum cicatrice obturat. Si igitur in alto fuerit membrana auditum impediens, difficilis erit omnis conatus, diffecare tamē ipsam tenui aliquo instrumēto tentandum est. Si in summo, aculeato cultello, quod Græci scolopomacherium uocant, hanc diuisam, si opus est, etiam detrabemus. Si carnis incrementum fuerit, id scalpello ad ungues accommodato, uel spathula polytica auferemus. Deinde linteolum ex lacinijs adpositū ad meaculi mensuram contortum, aqua imbutum, in lauoremq; detrita chalcitide, uel tali aliquo arido aspersum, inuolutumq; ne caro rursus increfcet, in meatum demitemus: quod tamen si inflammatio infestat, protinus tollendum est. Si meatus sanguine manat, spongia aqua frigida madens imponenda est: aliaq; ad hoc consecrata remedia conuenienter adhibebimus.

De iis quæ in auditorium meatū inciderunt. Cap. 24.

Incidunt in aures nō solū calculi, sed etiā uitrum, fabæ, et siliquarū ossicula. Vitrum utiq; et calculi propriā magnitudinem seruant: fabæ et siliquarū ossicula, et id genus reliqua naturali corporis humiditate inflata, extremos cruciatus inducunt. Oportet itaq; specillo auriculario, uel hamulo, uel uulsel la hæc eycere: uel uiolēta capitis concussione, aure supra circum alique[m] posita. Sæpe etiam numero hæc per calamum sugendo extrahimus, exuentes quemadmodum aquam quæ auribus inciderit, cera circumquaque calamum quæ auri inycitur obturantes, ne uspiā spiritui exitus pateat. Lapillos et reliqua huiusmodi corpuscula, specillo lana inuoluto, resinaq; terebinthina imbuto, uel glutinoso quodam oblito, leniter in aurem demisso, extrahimus. Si uerò nō successerit, sternutamentum proliciente remedio naribus indito, os simul

et

et nasi foramina obturato. Si ne horum quidem ulli obtemperauerit, antequam inflammatio et conuulsio, uel periculum demum aliquod fuerit subsequutum, manuum scalpelliq; opera auferemus. Collocabitur itaq; laborans, ut auris eius auersa sit: retro eam quae fibra dicitur, ad basim ipsius et lunata figura, linea exilis inciditur, latiusculaq; specilli parte corpusculum quod inhaeret, extrahemus. Deinde ablato illo, plagam consuetam haud aliter atq; cruenta medemur.

De polypis. Cap. 25.

Polypus tumor est, qui praeter naturam intra nasi foramina concrescit, à marini animalis polypi similitudine nomen sortitus, tum quia carni eius simile est uitium: tum quia quemadmodum ille suis cirrhis piscantes ulciscitur, manus ipsorum suis flagellis implicans, ita et hoc uitium nares laborantium obstruit, difficultatem quum respirandi tum loquendi exhibens. Duri itaq; et tactui resistentes polypi, subliuidi et malefici, utpote cæci naturam resipiscences, non sunt attingendi: fragiles autem magis, laxiores, torpentesq; neq; maligni, manus opera curandi sunt. In sella igitur aduersus solarem radium hominem figurabimus, laeuamq; manu narium eius meatum dilatatum tenentes, dextera spatula huic rei dedicata, polypicam uel ad myrtacci folij formam robusta polypum, uel excrementum carnis in orbem circumcidemus, eam in partem ferramenti acie imposita, ubi naribus adhaerescit: deinde auersa manubrioli parte, excisam carnem eximemus. Et si nasi meatum purum effectum uiderimus, ad remediorum auxilia deueniendum est: si qua polypi particula superfuerit, alterius ferramenti, ad polypum eradendum facti, acie immissa, reliquum corpus cum tensione, torsione et rasura strenue educemus. Maleficos autem polypos gracilibus et oliuaribus ferramenti candentibus aduocare conuenit. Post adustionem, praesidia uestitioni dicata adhibenda sunt. A scalPELLI uero usu, manuumq; opera, spongia oco exacte detergo, poscam uel uinum in nares infundimus.

Et si

Et si liquor per palatum ad fauces transierit, bene se habebit functiones manuum. Sin minus, indicat polypi carunculam circa ossa, quæ à colando ethmoides dicuntur, hære: uel superius, quæ instrumenta polypica nondum comprehēderūt. Linum ergo mediocri crassitudine funiculi aut fasciæ instar, ueluti per duorum, aut trium digitorum spacium nodis innoxum, in foramen specilli inferimus: deinde alterū extremum sursum ad colatorios usq; meatus propellimus, idem per palatum ad os usque eijcientes, utraq; manu apprehendentes ultro citroq; trahimus, tanquam nodis seu serra superfluam carnē perforantes. Post hæc meatus funiculari linamento apertus seruandus est. A tertio dein die pastillo Musæ, et id genus alijs reliquias uitij absuramus, unaq; locum exiccabimus. Pastilli postremo quæ cicatricē faciūt, adhibendi sunt: plūbeis fistulis scitē, si res exigat toto curationis tempore naribus iniectis.

De curtis quæ colobomata dicuntur. Cap. 26.

Curta uerò in auribus aut labris hoc compendio sanantur. Principiò sanè cutem ab inferiore parte excoriamus, ac leuiter detrahimus: postea commissis inuicem uulnecum oris. Et eo quo in callum induruit ablato, mox fibulis consarcinamus, et conglutinamus.

De epulidibus & parulidibus, gingiuarum abstessibus. Cap. 27.

Epulis caro quædam est superflua, iuxta dentium aliquem in gingiuis exorta. Parulis uerò, pusillus circa gingiuas abscissulus est. Epulidem ergo uulsella aut hamulo sublata excidimus. Parulidem orbiculatim excisam, linamentis impositis curamus. Scio ego parulidē sæpenumero phlebotomo solū punctam, pure euacuato desisse. Post scalpelli usum uino protinus, sequenti die mulsæ collui mandamus. Tertio die puluerē antherum appellatum uulnecū, donec absoluat curatio, inducemus. Si putrilago gingiuas infestat, et conuenientia huic remedia nihil subueniant, tenuibus, retusis, candentib. q; ferramentis aduretur.

De

Dentem qui eximendus est, usq; ad radices circumscarificatum, forcipe paululū concutiētes, euellimus. Si dens erosus est, id foramē tenui linamento replendū est, ne strictus sub forcipe cōfringatur. Buulso dente, restantes carunculæ sale tenuissimo infriatæ cōsumentur. Mox uino uel posca, quoad sanatio finiatur, collui debet. Quoniam aut̃ superflui quidam dentes agnascūtur, eos qui radici inserti concauitatib. hærent, scalpro excisorio excindemus: qui non ita inseruntur, forcipe educendi sunt. At si dentium aliquis supra quā par excreuerit, uel cōfractus fuerit, quod prominet et superuacaneū est, lima, rhinariō ue atterendum est: adhærescentesq; ipsis, ceu affolet, squamulæ, uel specilli latiuscula extremitate, uel rasorio cultello, uel limula deniq; expurgandæ sunt.

De ancyllo, id est incuruatione, aut retractione linguę, quæ laborantes ægre sermonem faciunt. Cap. 29.

Ancyloglossū uitiū est linguę, quod aliās ex natiuitate enanit, quā membranæ quæ linguam continent, duriusculæ ac breuiores à natura productæ sunt. Aliās ex causa accidentaria, quum sub lingua ex hulcere aliquo durior cicatrix relicta est. Quibus natura hoc uitiū cognatū est, ex eo quod tardè in sermonē prorūpunt, et nulla præcedente exulceratione uinculū iusto maius cōspicitur, cognosci possunt. Qui ex aduentitia occasione hoc patiuntur, cicatricē euidenter conspicuā præferunt. Desidere itaq; in sedili ægrū oportet, ita figuratū, ut lingua eius sursum ad palatum attollatur, & nerueum illud pertransuersum succidetur. Quod si ex cicatrice aliqua curuitas linguę prouenerit, uncino callus apprehensus extrahendus est, & laterali linea incidendus, sic ut incuruatio illa dissoluatur. Animaduersione simul habita, ne altè fiat incisio, & subiacentes uenæ dissecentur. Profluium enim sanguinis incompescibile frequenter inde fieri consueuit. Ab opere autem patrato, ex aqua frigida uel posca uulnus eluendum est, deina
de

de ea curandi ratione quæ relaxet, et carne repleat, utendum.

De tonsillis. Cap. 30.

PBrinde atq; in collo glândula indurata, struma nūcupatur: ita etiam paristhmia inflammatione tentata, uel supra quam par est aucta, et quasi exiccata, difficultatēq; transglutitioni et spiritui exhibētia, ē regione utrinq; sibi inuicē opposita, Græcè Antiades, hoc est tonsillæ appellantur. In quibus quā adest inflammatio, ab opere abstinendū est: quū illa uerō aliquantulū finita fuerit, manus admouenda, præcipuē candidis in arctū coactis, et ad radices angustis. Nam quæ madore flaccescunt, rubentq; et latā basim habēt, facillimē sanguinis eruptione periclitantur. Collocato igitur aduersus solis fulgore homini hiare præcipimus, famulo caput posterius continente, et lingua eius ab altero spatula ad id facta ad inferiorem maxillam depressa, nos uncino tonsillæ iniecto, ipsam pro uisibili mēbris intactis, attrahimus. Post hæc totā ipsam à radice amputamus, scalpello incuruationi linguæ dicato. Bina enim habētur id genus instrumēta, aduersa inter se acie recuruata. Post excisionem unius, alteram eodē modo, uice conuersa aggredimur. Postquam munia ferro sunt obita, laborans ex aqua gelida, aut posca gargarizabit. Si sanguinis profusio superueniat, rubi etiā, rosarūq; et myrti decocto tepido utendum est. Si copia sanguinis feratur, plantaginis et solidaginis succo, et ex succino pastillo, et lemnio sigillo posca diluto collui debent. Eruptione autem sanguinis finita, sequenti die, rosarū flore, croco et amylo, cum lacte uel aqua, uel oui albore, uel aqua mulsā rosacea perungentur. Si sordes hucera contraxerint, ex melle collutiones, illitusq; salubriter adhibentur.

De uua. Cap. 31.

Vrgulio quū uocis plēdum quoddā existat, identidem à capite fluxionē excipit. Idēq; præter naturā auctus, si oblongior et tenuis euadit, columella: si inferiore eius parte crassior et orbicularis fiat, uua adpellatur: utrunque à similitudine nomen inditū. Huic affectui, si neque uniuersalibus præsi-

dys,

dys, puta sanguinis detractioni, & pharmaco concitatis evacuationibus, neq; ijs quæ exterius loco injiciuntur, astringentibus inquam, uel repellentibus, uel discutientibus remedijs succurri potest, ad Chirurgiam deueniendum est, ne assiduo irritatu tussim et uigilias, & strangulatum etiam aliquando inferat. Contractas igitur uuas, orbiculares, non oblongas, cruentas uel liuidas, manu non attingamus. Tenuēs autem, oblongas, in summo muris caudæ modo attenuatas, resolutas, non aded sanguinolentas, sed albicantes e manu curabimus. Statim enim ab inflammatione uindicantur. Idq; tantum præcidendum est, quo longior uua quàm secundū naturam existit. Nā si prorsus tota præcidatur, ut summum thoracis regionibus adfert nocumentum, ita multos interdū efficit. Collocato itaq; ad solis radios laborante, os quantum potest diducere iuebimus: deinde uuaria forcipe aut uulsella, quod superuacuum est præbensum, & ad inferiorem partem tractum, ferramento ad id facto, uel scalpello sutorio, præcidimus. Ab opere autem parato, agenda eadem sunt, quæ in uenarum sectione comprehensa sunt. Non rarò autem propter ægrotantis pauorē, uel ob sanguinis profluuij metum, uel ob medicamentū siccitatem ferum deuītamus, et adurēte potius medicamentō eā consumimus. Vbi illud quod in palpebrarū adustione dictū est medicamentū, uel id genus aliud adhibere cōuenit, eoq; instrumēto quo uas aduritur sinus implere, et homini os quāmaximē potest diducere iusso, lingua per ministrū forcipe ad id accommodato depressa, tantā uuæ partē instrumēto dilatato apprehēdimus, quantā amputari cōpetit. Medicamentū autem substantiam habeat neq; nimis liquidam, ne diffluens ab uua deerret, inferiora autem membra adurat: ob hoc etiam homini præcipimus, ne per uniuersum adustionis tempus deglutiat: neq; nimis durum, quo facilius uua infadat. Si uno iniectu summa uua nigritiem contraxerit, contenti simus, si minus, bis utemur, toto administrationis tempore ægro os apertum deorsum inclinante, ut

te, ut sputum eliquatum, & medicamento portumculæ ex ore effluant. Horæ enim unius spacio uua emoritur, tertio quarto uel die excidit. Post uisionem indice molli lana aut stippa in uoluto, gurgulionem undiq; extergimus, uel aqua os collui iubebimus. Colli autem regionem ex chamæmelino fouebimus: quemadmodum in illis quibus tonsillæ fuerunt ablatæ, ob communem quam cum his habet affectionem. Gargarizationes in super & illitus pari modo adhibenda sunt.

De spinis gulæ infixis eximendis. Cap. 32.

Dum estur, sæpenuero spinæ tum piscium, tum aliorum quorundam diuersis gulæ partibus deuorantur. Quæ igitur oculis subiacent, uulsellis ad spinas eximendis factis, quæ priuatim acanthobola dicuntur, extrahendæ sunt. Si uerò in inferioribus gulæ locis ad glutienti orificium hæserint, alio modo educentur. Nonnulli maiora corpuscula, ueluti caulem laëucarū, aut panis buccas deglutiendas exhibēt. Alij spongiolam puram ac mollem cum filo ipsi alligato deuorari iubent, & mox apprehenso filo, rursum extrahi, idq; sæpius, ut spina spongiæ infixa simul educatur. Leonides autem cataplasmata quæ concoquant exterius imponere præcipit, cuius modi ex cruda polenta oleo & aqua subacta conficiuntur, ut spina suppurata ultrò excidat. Si eadem hora qua spina infigitur, uel priusquam in uentriculo fiat concoctio in laborantē inciderimus, eo quod infixū est in conspectū nō ueniēte, digito uel pinna in os demissa euomere mādabimus. Sic enim interdū accidit, ut unā cum uomitu quicquid infixum est, eijciatur.

De gutturis incisione. Cap. 33.

Chirurgicorum optimi hanc quoq; manuum curationē descripserunt. Antillus igitur ita tradit: In his qui angina laborāt, ut de ratione uicūs docebitur, manuum administrationem repudiamus, quum inutilis futura sit incisio, ubi arteriæ omnes & pulmo affectus est. In ijs autem, qui circa os et mentum inflammationem experiūtur, aut etiam tonsillis, quæ fau-

ff cium

cium os operiunt, nulla laborante arteria, non alienū est, quo strangulationis periculū euitetur, gutturis incisione uti. Mox quū in opere sumus, infra gutturis caput spacio triū ipsius aut quatuor orbū partē quandā aspera arteria (tota enim diuidi sine periculo nequit) amputabimus. Nam hic locus est accom-
modus, tum quod ex carnis sit, tum quod uasa procul à parte diuisa sint disita. Reflexo itaq; in posteriorem partem ægrotantis capite, ut guttur manifestius in conspectum ueniat, transuersa linea inter duos circulos ipsum incidemus, ut cartilagine intacta, membrana tantū cartilagine inuoluta, discindatur. Quod si quis meticulosior in hoc opere fuerit, uncino is cutem eleuatā prius diuidet. Postea sic guttur ipsum aggressus, uasis omnibus, si fortē occurrāt, præteritis, sectionem faciat. Hactenus Antyllus. Coniebat autem is gutturis incisionem, tum ex spiritus quodam cum murmure eruptione, tum ex uocis interruptione. Quum autem strangulatus periculum præterit, oras plagæ renouatas suturis commitemus, ita ut cutis sola absq; cartilagine cōsuatur. Et quod cruentis facit medicamentum adhibebimus, si nō glutinetur, carnem inducente remedio utemur. Eadem curatio erit adhibenda, si quis nobis obtigerit, qui finiendæ uitæ desiderio iugulum sibi sauciauerit.

De abscessu. Cap. 34.

Quod abscessus, carniū, seu carnearū partiū corruptio & mutatio sit, et quā nā origo eiusmodi, quotq; eius sint discrimina, quarto libro satis superq; dissertatū est. Nūc eos tantū quibus citra manū scalpelliq; operā mederi nō datur, persequemur, quū exacta in pus facta fuerit mutatio. Quam ex his facile cognouerimus, q; dolores, febris si præcesserit, robur, pulsus, et reliqua inflammationis signa diminuuntur, & in mucronē tumor acuminatur, & ad digitorū cōpressurā pus sublabitur, potissimè in abscessib. qui summa occupāt, tūc ad manū ministrationē ueniendū est. Si uerò neq; tactu sentietur, neq; fastigietur tumor, eo quod in alto delitecat, alias mutationis
in pus

in pus notis animo reputantes, scalpellum adhibebimus. Sciendum aut, quod abscessus ante absolutam interdum in pus mutationem, incidi uel crudos conuenit, si uel prope articulos, uel principem aliquam partem consistant, ne immorante putredine uel ligamentum, uel membrum aliquod necessarium pariter corrumpatur. Abscessus porro sedi uicinos ante perfectam maturationem, uel crudos aperire, precipit Hippocrates, uertus ne in perforationem procedant. Incisiones itaque non pari linea sunt omnes faciendae. Nam in fronte naturales, in capite capillorum exortus sequemur, cura decoris, quatenus fieri potest, habita. Recta uero linea brachia secamus, & crura secundum musculos & tendones: neruis & arterijs principibusque corporis partibus magno studio cuitatis: nunc in rectum, nunc transuersum, prout res exiget, abscessum diuidentes. Minores quidem abscessus una, maiores pluribus, iuxta magnitudinis rationem, tenuioribus tamen, et effusioni idoneis lineis incidemus. Plurimum fastigiati, crudi, tenues, et emortui latius sunt excidendi, ut plaga in trianguli, aut myrtacei folij, aut alterius anguli figuram euadat. nam orbicularis ad cicatricem difficiliter perducitur. Qui uero non sunt fastigiati, simplici duntaxat linea sunt aperiendi. Sed quum ingentem sinum inuenimus, si carnosae cute & ad glutinandum sufficiente operiuntur, sat est, si idoneis ad puris exitum sectionibus utemur. Si tenuis et excarnis admodum cutis superiacet, in longitudinem diffecetur. Deinde facta simplici diuisione, si corpuscula utrinque sita gracilia ualde et macilentia uidebuntur, excidenda sunt. Functione manuum iam obita, sponsia locus abstergendus est. Si exiguus est abscessus, et unica facta linea, simplici linamentorum iniectione utendum. Si amplius et multotiens ferrum expertus, lemniscum, hoc est linamentum aliquod in longitudinem implicitum, per foramen est traieciendum, simili modo plagae linamentis implendae sunt. Si sanguis eruptio comitetur, aqua frigida, uel posca utendum. Si ita non sistatur, scobs chalcitidis est insper-

Ff 2 genda

enda, quæ sæpe ob flaccidâ putredinem admouetur. Splenia hyeme, & neruosis in partibus uino, cui oleû adiectum sit, madefacta imponamus. Æstate & carnosis partibus aqua oleo admixto, uel etiam ipso quoq; uino cum oleo, sed frigido tincta deligabimus. Postero die iisdem his liquoribus irrigabimus. Tertio post die soluentes, & spongia detergentes, linamentis tetrapbarmaco illitis utemur. Si inflammatio desit, eundem fomentum asperginemq; ramentorû custodiam superaccommodabimus. Sin adsit inflammatio, aspersione congruis prius usi, cataplasma ad concoquendum idoneum, inijciemus. Finita uero inflammatione maturantibus, et carnem inducentibus præfidijs medebimur. Sinus quoq; glutinantibus medicamentis, ueluti in quarto memoratum est libro, sanabimus.

De strumis. Cap. 35.

Strumæ sunt adenes indurati, quæ in collo axillis & inguinibus præcipuè consistunt. Chærades Græcè appellati, mutato à chæradibus scopulis nomine, uel à suis multiparis animalibus, uel quod eiusmodi collum chæri, hoc est porci habebant. Generantur autem strumæ in anteriore ceruicis parte, uel in altera tantum, uel utrinque una, uel binæ, aut plures, inq; suis membranis singula perinde ac steatomata, atheromata, & melicerides complectuntur. Quæ dolore afficiunt, attrituq; manuum, & medicamentis efferuntur, ac deteriores fiunt. Maleficæ sunt, quas etiam carcinodis quidam dixerunt. Patetq; omnibus has neq; manu, neq; ferro cedere. Illis igitur tantum quæ attactu, & opportunis medicamentis morigeræ ac benignæ, hoc modo manus adhibendæ sunt. Superficiaras & in cute serpentes, simplici diuisione facta, ab incumbens particulis absoluemus, orasq; hamis cute distenta membranis excoriamus, sicut in uasorum dissectione docuimus: ac paulatim euellemus. Maiores autem strumas hamo infixo suspendemus, & simili modo excoriatæ à coherentibus partibus undiquaq; liberabuntur: cura adhibita, ne soporaria arteria, quas caroti

carotidas dicunt, uel nerui recurrentes attingantur. Si uerò uena aliqua incisa cruore opus adumbret, laqueo adstringatur. uel nisi amplior fuerit plane etiam abscindatur. Atq; quum ita strumæ radix in arctum uenerit, scitè admodum amputabitur. Demissoq; indice diligenter perscrutabimur, nūc aliæ strumæ adiaceant, quæ similiter tollantur. Quod si, num in strumæ fundo uas aliquod ingens, uel plura etiam subsint dubitemus, ferro abstinere, laqueoq; excipere conuenit, ut particula tim tutò sponte sua excidat. Tunc linamentis medicamento illitis, curatio tentabitur: nam si excindantur, ora committuntur. Incisiones autè rectis lineis sunt faciendæ: et si nihil superfluum habuerint, illico cōsuendæ. Si ex tumoris cute quid reddat, parte ea myrtacci folij instar exempta, suturis utemur, medicamentumq; ad cruenta idoneum superaccommodemus.

De seuationibus, pultationibus, & mellifauis, quæ Græci steatomata, atheromata, & melicerides uocant. Cap. 36.

HAec quoq; in abscessuum genere quum sint, eo tamē discrimine disident, quod qui propriè abscessus dicuntur, inflammationem experiuntur, & dolore afficiunt, acremque humorem et corrodentem continent, neq; peculiari aliqua membrana seu tunica amiciuntur. Quin & hæc quoq; inter se differunt. In adipinis enim nodis, steatomatisue contentus humor adipi sit, ut præ se fert appellatio similis: qui in pultaceis nodis seu atheromatis, atheræ, id est frumentacæ pulti: qui in mellis siue meliceridibus humor, mellis speciē refert. Discernes autem hoc modo: nodus adipinus seuatiōne durior est alijs, tactui renitens, basimq; firmiore habens. Mellis uerò nodus, tangentibus quasi laxum quoddam corpus subsidet, & lentè quidem locum mutat, ceditq;: celeriter autem succrescēs, ad situm pristinum reuertitur. In manuum functione haud aliter ac strumæ curantur, incisione, excoriatio, suturis, & reliqua medendi ratione. Solum, ne membrana uioletur, cautio est, ne humor qui continebatur, effusus manuum actioni impedimēto

F f 3 sit,

sit, et partem aliquam relinquat. Vnde occasio fit, ut plerumque circa brachialia, & malleolos, et articulamenta ad mouendum facta, denuo uitiū tale renascatur: sicuti et struma, si uel tota uel portio ipsius relicta. Si huiusmodi quid inciderit, præstat non suere, sed exedentibus medicamentis reliquias consumere.

De aneurysmate, id est dilatatione. Cap. 37.

Aneurysma tumor est mollis, digitisque cedens, cuius origo ex sanguine & spiritu est, de quo Galenus sic tradit: A perito arteriæ orificio, affectus aneurysma appellatur. Accidit interdum ex uulnere, quotiens cutis exterior ad cicatricem perducitur, permanente absque cicatrice arteria, nec coalescente, nec carne obstructa. Deprehenduntur his notis affectiones huiusmodi arteriarum pulsū: imò si manu comprimamus, tumor quodammodo euanescit, recurrēte quæ ipsum efficiebat in arterias, substantia. hæc Galenus. Nos uerò ipsas inter se hunc in modum discernimus. quæ apertione uenarum obueniunt, proceriores sunt, & in alto consistunt, & ad compressuram digitorum sonitus quidam exauditur, quum nullū huiusmodi sonitum, quæ ex ruptura eueniunt, efficiant, & circulares magis sunt, et in summo subsident. His itaque quæ in axillis, inguinibus, & ceruice existunt, quæque alia loca infestant, & præ grandi magnitudine sunt aneurysmatis, propter uasorum amplitudinem manus adhibenda non est. Quæ extremis partibus, brachijs, cruribus, & capiti obueniunt, ferro aggredi hoc pacto conuenit: si per nerui arteriæ uel dilatationem tumor emergerit, cutem recta linea per longitudinem incidemus. Deinde arteriarum labia uncinis distracta, quemadmodum in uasorum dissectione comprehensum est, excoriantur, & instrumentis huic rei dicatis circumpurgata arteria denudabitur, traiectione acus duobus funiculis & lino utrinque facta deligatione utendum, secta arteriæ parte scalpello per medium, & cum ambiente membrana unita, quæ pus maturant, usque dum funiculi excidant, medicamenta sunt inducenda. Si rupturæ fertur

fertur acceptum, aneurysmo totum id, quatenus fieri potest, unà cum cute digitis prehendendum est, postea acu duplex filum ducente inferius transmissa, et fili ansula forcipe præcisa, sic binis utrinque filis, ueluti de staphylomate diximus, tumor est deligandus. Si metus est ne fila hæc corrupta dilabantur, altera duplici similiter filo inserto traicienda est acus per totum quæ priorem premat. atque pari modo ansula præsecta, quatuor filis tumor est uinciendus: uel tumore per medium ad aperto atque exinanitio, cutis circumcidenda est, ea quæ ligata est relicta. Splenioque ex œnclero superaccommodato, linamentis medicamento imbutis medebimur.

De hernia gutturis, quæ bronchocelen appellant. Cap. 38.

Bronchocoele ingens et rotundus in ceruice tumor est, mutatio ab interioribus colli partibus nomine. cuius differentie sunt duæ. Siquidem aliæ adipationes, aliæ partium dilatationes præsentant. Quas ex iisdem quibus aneurysmata notis cognoscemus, & ceu uitium conclamatum deuitemus, quum omnia similiter aneurysmata, maxime quæ in collo oboriuntur, cum periculo propter arteriarum amplitudinem manuum operationem admittant. Scuationes autem referentes, perinde atque adipationes curentur, separatis, intactisque uasis: quemadmodum in scrofularum curatione explicuimus.

De ganglio. Cap. 39.

Ganglium est nerui in nodum coitio, ex ictu uel defatigatio ne magna quidem ex parte, in brachiali et malleolo, et locis quæ articulis mouentur, alijs uero corporis partibus, proueniens. Comitatur hoc malum tumor concolor, renitens et dolore uacans. Quem si uiolenter quis premat, torporis quendam sensum exhibet, non aliter, sed sub ipsa cute oriens, ad latera tantum nutans prorsum aut retrorsum, nequaquam etiam si uiolenter adigatur. Ab his quæ crura, aut brachia, aut extimas partes occupant, scalpelli operam arcemus. periculum enim, ne si quid illic excidatur, membrum illud mutilum reddatur. Quæ in capite

Et fronte eueniunt, opere chirurgico ita curamus. Cutis scalpello diuiditur: Et siquidem parua sunt uulsella, comprehensa ex radice præciduntur. Si grãdia, uncinis transfixa excoriantur; auferuntur, futuris oræ committuntur, medicamentumque cruentis uulneribus dicatum inicitur.

De uenarum sectione. Cap. 40.

Quamquam sanguinis detrahendi ratio per uenas neminem fugiat, tamen ut ea medicinae portio, quæ manus opera ad ministratur, numeris omnibus consummata sit, Et ob artificiosas eius distinctiones, non erit etiam hic nobis silentio tanquam despicabilis prætereunda. Prima igitur incisionis uenarum intentio est, ut sanguinem superfluum euacuetur. Sanguinis uerò redundatio duplex indicata est. una quidē ad uires, etiam si uenæ fartæ non uideantur: quo in statu homines illico imbecilles infirmi que redduntur, quum natura onus ueluti sarcinam quandam sustinere non queat. Altera uerò ad ipsa, quæ sanguinem continent, receptacula, ipsa sanguinis transfusione speculata, etsi uirtus citra molestiam id perferat. Vnde ruptis interdum uenis, sputum cruentum, uel aliæ sanguinis fluxiones accidunt. Redundantiam ergo sanguinis, quæ ex uirtute spectatur, corporis grauatio arguit: uenarum copiam, distentio, Et quod illæ fartæ inturgescent. Vtraque autem exinanitio nem necessariam esse significat. Quocirca in primo agitudinis die, si necessitas urgeat, sanguinem per uenas detrahas, sola prius ciborum in uentriculo concoctione, aut etiã iusta sanguinis in iocinore elaboratione cõsiderata. Quod si per initia alicuius ergò uenæ sectio prætermissa fuerit, ultra etiam septimū diem eam incidere haud erit absurdum, si id usus Et necessitas expostulet, Et agri uires non renuant. Oportet autem eum qui sanguinem detrahare uult, diligenter dispicere, num multa recrementorum in intestinis retentio sit, Et deprehensam leni prius clystere euacuare, ne uenæ ab intestinis putridā aliquam retrimentorum essentiam attrahant. Atque is quidem.

qui

qui propter urgentem affectum sanguinis detractionem postulant, quouis tempore, accessionum duntaxat particularium febrium uigore cuitato, uenam incidemus. Si continua fuerit febris, matutinum tempus omnino magis erit opportunum. Qui uerò nullo infestante morbo, sed tutelæ potius, aut præcautionis gratia sanguinis euacuationem exigunt, his uer competit. In ætatibus porro cautio est, ne ad quartum & decimum usque annum: item post sexagesimum annum unquam sanguis per uenas detrahatur, nisi irrecusabilis aliqua necessitas huc nos compellat. Et in uniuersum, qui imbecillioribus uiribus præditi sunt, ab eiusmodi exinanitione arcendi sunt. Iam in membris recens inflammatione correptis, ex aduersa parte, in diuturnioribus ex propinqua facienda est euacuatio. Ex qualibet sanè corporis particula, sed plerumque ex interiori cubiti uena sanguis mittendus est. Vbi studiose animaduertendum, quod in teriore & alari adpellatæ uenæ, arteria, mediæ, neruus perpetuò subijcitur. Superior, quæ et humeralis uocatur, omni periculo uacat: quam in capitis quidem affectibus secare nihil ambigimus. In his qui infra collum afficiunt, alarem, in utrisque mediam. Fascia igitur arcta partem brachij aliquam circa musculos deuincire conuenit: mox frictione manuum inter se muscula repletam uenam usui idoneam, transuersim per totam ipsius latitudinem tantum diuidere. Ampliores namque hac plaga, difficulter ad cicatricem perducuntur. Nimis angustæ, præterquam quoddam crassioris succi transitum impediunt, etiam inflammationibus tentantur. In quibus autem secundo aut tertio, interim uerò etiam quarto die sanguinem adhuc detrahendum esse speramus, obliquiori linea uenam secare conuenit, quo in manus inflexione debescens, cicatricem non facile admittat. Ita quidem placuit Antillo. Quantum autem humoris euacuandum sit, ex uirium robore, et morbi magnitudine erit metiendum. Si ergo humoris, feruentisque materiæ copia suberit, semel uel ad animi usque deliquium erit detrahendum, quum uis

delicet æger ualida adhuc uirtute, animo destituitur, nō ex humoris alicuius in uentriculū colluuiē, cuius ergō, multi per inītia statim ante iustā detractiōem anima deficiunt, uerūm ex inanitionis ratione illud animi deliquium usuueniat, opus est. Si enim multa euacuatio desideratur, & uires sunt enervatæ, distribuenda erit uacuatio, ac primūm parcius quā debeat, secundo rursum, & item tertio, si res postulat, detractio sanguinis. Neque si humoribus tantum æquabiliter redundat corpus, uniuersum simul exinanire solemus, ut Galenus docuit. Verūm propter affectus etiam alicuius uehementiam, & si totum corpus in humorum iustā commoderatione constitutum uideas: uerbi gratia, si ex naribus, uel alio ex loco sanguinis profluium concitatur, non abundantiore copia. Ex opposita etiam parte auertendæ materiæ gratia, uena incidēda est, imō etiā in his qui uehementē inflammationem experiuntur. Veluti in colicis, renibus calculosis, lippitudinibus, ac cæteris quæ tā acriter urgent. Dolor siquidē et partis inflammationis calor causam defluxioni præbent: & si totum corpus excrementis uacet, parcius id igitur tunc faciendum est, ea euacuatione adhibita, quæ maximē & ætati, & naturæ ægrotantis conueniat. Considerato etiam anni tempore, regione, & laborantis consuetudine. Quibus uerō iuxta uenam quæ aperitur grandis inflammatio extiterit, ueluti in pleuriticis & hepaticis, commodissimum est expectare dum sanguinis tum color, tum essentia seu habitus conuertetur. Alius nanque in inflammatione sanguis, quā secundum naturam existit: quoniam supra modum incallescens, siquidem prius erat crudior, rubicundior et flauior euadit. Sin prius eiusmodi extiterit, in atrum ex adustione permutatur. Non perpetuò tamen hæc expectanda mutatio est, sed non rarò priusquam hæc fiat, desistere cōgruit, idq; duplici nomine, uel ob uirū imbecillitatē, quæ ex pulsuum attrectatione cognoscēs: nam tum uehementia & magnitudine inæquales sunt, uel etiam obscuri: quin & te-

hor

per fluxionem frangens, exhaustas iam vires portendit: uel ob inflammationis malignitatem, quæ interim nihil remittit, sed uehementius impacta est. At si nihil horum obstiterit, laboransq; uigenti ætate sit, expectanda erit sanguinis mutatio, eoq; magis, si ambiens aer temperatus fuerit. Quod si sanguis ante conuenientem euacuationem sistetur, id quod uel propter timiditatem & animi deliquium, uel propter grumum, uel ob uiolentam constrictionem, aduersus singula certabimus. Animi defectum, odoratis naribus adhibitis, reficientes: constrictioni relaxato uinculo subuenientes: grumum sanguinis, uel olei infusione, uel digitorum fotu dissoluentes. Reliquus mittendi sanguinis apparatus nulli non cognitus est, sed ita incubiti uenis agitur. In fronte autem sanguinis detractio, ut in capitis doloribus, hoc modo fieri debet. Fronte prius ablutio ne fota, ceruicem habenula excipimus, inserto tamen iuxta guttur digito, ne afflictus præfocetur, turgentem iam in fronte uenam acie phlebotomi aut scalpelli diuidemus. Ad eundem quoq; modum iugulares uenas extantes, ob inueteratam lippitudinem acuto specilli capitulo secamus, sanguinis eruptionem promouentes. Venas insuper linguæ subditas, in anginarum affectu, uitata constrictione, linea transversa incidimus. Quidam eas quæ in magnis hircis conspiciuntur uenas, in capitis uel oculorum diutinis afflictionibus pari modo feriunt. In quibus etiam internas narium uenas uel mucronato specilli nucleo contundunt, uel asperatis quibusdam instrumentis irritantes disrumpunt. In capitis itidem morbis post aures sitas diuidunt. Sicuti quæ poplites perreptant, in renum cruciatibus. At quæ in extremis corporis partibus propagantur, superiacentibus membris uinculo exceptis, et manuum frictione et pedum incessu plenitate sanguinis turgescerent aperient. In liene laborantibus læua manu, eā potissimum uenam quæ minimum digitum & proximū intercurrit. Si iecur male habet, in dextra. Extremarum namq; partium inanitio, quo

ex

ex longinquiore loco fit, eo efficaciorē auersionem efficit. Sed in pede, sicuti in coxendici & locellorum affectionibus, ea quæ supra interiorem malleolum extat, aperienda est.

De cucurbitularum impositu. Cap. 41.

Cucurbitulæ neq; inter morborum initia, neq; corpori plethorico sunt applicandæ, sed toto prius exinanito corpore, cumq; nihil amplius particula influit, & mouere quippiã, agitare item & ad exteriora trahere opus est. Leuis igitur cucurbitula inflationes dissipat, stomachi fluxiones cohibet, sanguinem attrahit, & profluentem compescit aduersæ parti adglutinata, & ex alto in summa traducit: uno uerbo, humorum traductionem, spirituum extraductionem molitur. Sed quæ cum scarificatione adhibetur, efficaciorē causis difflationē præbet, ita ut sensibilibus ex alto noxias materies euocet: neque enim sanguinem solum, sed alios quoq; humores elicit, præcipuè cum flamma maiore accommodata. At si à corpulentioribus particulis, multaq; carne præditis, sanguinem detrahendum molimur, concisa prius scalpello cuticula, cucurbitulam defigimus. Si à gracilioribus & excarnibus magis, leuem prius cucurbitulam adglutinabimus. Vbi uerò intumuerit eadem in parte membrum, cute scalpello exasperata, ipsam denudè applicabimus. Et si paululum detrahendum statuimus, unica: si amplius, pluribus incisionibus utemur: si sanguis qui continetur, tenuior appareat, summa leuiter: si crassior, scalpello altius adactò, ima scarificabimus, & quum ex ictu in grumum coactus sanguis erit euacuandus. Terminum autem moderatæ incisionum altitudinis, sola cutis crassitudo præscribet. Quidam ut uno ictu tres plagas inijcerent, instrumentum in hoc excogitarunt, tribus scalpellis æqualibus simul iunctis. hoc nos inutile existimantes, simplici scalpello utimur. Alij uitreis cucurbitulis usi sunt, ut per eas sanguinis, qui exinanitur, mensura in extraductione perlucesceret: sed in attrahendo æneæ cum maiorem sustineant flammam, longè efficaciores sunt uitreis, quæ

uæ facile franguntur. Quin etiam qui cornibus corpori adallicatis, ore sugentes trahunt, inaniunt quidem minus, sed nihil exiccant: sicuti quæ cum flamma, quum res exigit, adhiæentur. Applicaturi autem cucurbitulam, particulam prius ream constituamus, dehinc ei ex latere hanc imponamus. Nam iacentibus ipsis desuper ardens linamentum ex lucerna inuicamus, miserè adurit, nullo id usu exigente. Cucurbitulæ mplitudo nonnunquã particulæ subiectæ accommodabitur. Quæ de causa complures sunt cucurbitulauum in paruitate et mplitudine differentia. Quemadmodum etiam proceriore illo, & inferiore spacio seu uentre latiore, ad extrahendum fficaciores formamus. Cauendum uerò est, ne mamillis cucurbitulæ adglutinentur. in ipsas enim cum inciderint, & in imium tumorem excrcuerint mammae, non facile auelli possunt: quod si acciderit, spongys aqua calente imbutis, cucurbitulas circumfoueto. ita enim remittuntur. Sin ne sic quidem accesserit, cucurbitulas perforabis.

De adustione axillæ. Cap. 42.

Vxato in humeri membratura articulo, in quibusdam brachij caput subinde & frequenter excidit, uel propter humilitatem immodicè superantem, uel quod continuò prolapsu locus luxationi obnoxius euaserit, quo in casu ad uersionem deueniendum est. Oportet igitur ægro uel supino, uel in sanum latus inclinato, interiorè alæ cutē quā potissimū articulus excidit, duobus leuæ manus digitis, uel uncinis eleuatā, tenuibus et oblongis ferramentis cādentibus adurere, quoad cauteriū contraxerit, duas una impressione crustas excitauerit: cūsi magnum inter has fuerit interuallū, mucrone specilli per utraque foramina traiedo, aliam in medio crustam faciemus, tantisper dum ferramentum specillo inciderit, adurentes. Et Hippocrates, binas alias inuersiones faciendas censet, iuxta utriusque præfatæ mediam, æquali illis spacio distantes, quadratæ figuræ instar. Alius tamē cute non aduremus, quoniam ner-

ui,

ui, glandulae, & alia subiecta sunt: quæ inflammationem cre-
re, & difficultatem officiorum adferre possunt. Curantur a-
iusta autem porri cum sale trito impositione, et alijs crustis in-
ducendis opibus. post hæc manus cautè exerceatur.

De adnatis digitis & sedigitis. Cap. 43.

Gnascuntur digiti in manu, modò quidem ad pollicem, m-
Adò uerò ad minimum digitum, iuxta autem alium quem-
piam rarò uisum est. Horum itaque agnatorum alijs sola car-
ne constant, alijs ossa etiam & ungues quandoque in se conti-
nent. Ossa habentium, alijs ab articulo communi cum altero di-
gito commissura innixi, alijs ab internodio & digitorum fissu-
ra procedunt. Atq; ij qui inde exoriuntur, perpetuò sunt immo-
biles, reliqui interdum motu agitantur. Carneorum uerò digi-
torum expedita est præcisio. Nam totum quod superuacaneum
est, semel scalpello tollitur. Qui uerò ab articulo emergunt, he-
rum difficilior est tractatio. Ab internodijs exorsi ita curan-
tur. primo caro undiq; usque ad os exciditur, deinde os ipsum
uel scalpro, uel ferra comminuitur. Reliquam uerò curationem
radendo, & cicatricem inducendo, sicuti in ossium uulneribus
comprehensum est, absoluiimus.

De suppuratorum adustione faciendâ. Cap. 44.

Vulsionem suppuratis efficacissimas ferre suppetias cõper-
tum est. Oportet igitur radice longæ aristolochiæ oleo im-
buta, ipsis imposita, candenti ferro crustas excitare. Vnam in-
ter iugulorū compagem cute sursum reducta, duas nò altas iux-
ta mentum seorsim ab arterijs soporarijs, quas carotides uo-
cant. Sub mammillis item, inter tertiam quartamq; costam,
duas altiores grandioresq;. Binas alias inter quintam et quar-
tam, paululum uersus dorsum spectantes: aliam in medio pe-
ctore, rursus aliã supra uentriculi os. à tergo uerò treis, per me-
diũ dorsum unã, utroq; spinæ latere geminos, quæ in dorso fa-
ciã crustã excedant altius impressas. Alij uerò, quemadmodũ
etiã Leonides asserit, ferro nuclei oliuæ simili candenti inter
costas

ostus, ea in parte quā abscessus est, usq; ad pus adurunt. Quis-
lam scalpellum quoq; confidenter adhibent inter quintam et
extam costam transuersa incisione, paululum tamen infra cu-
im incidunt. Deinde acuminato scalpello membrana quæ co-
las succingit perforata, pus excernunt. Verum isti quoque,
t qui ferramento ad imum usq; adustionem moluntur, uel il-
ico mortem inferunt, unā cum pure, uitali etiam spiritu con-
ertim ex inanito, uel fistulas irremediabiles efficiunt.

De cancro. Cap. 45.

Cancer tumor est inæqualis, crepidinosus, deformis, subli-
uidus, et molestus, modò citra huius, quē latentē appella-
it Hippocrates. is admota manuū opera, magis irritatur, mo-
dò cū huius proueniens: ex atra enim bile originē trahens,
et plurimū eroditur ac serpit. Plurimas quidem corporis par-
tes, præcipuè uerò mulierum locellos ac mammas occupat,
habetq; uenas undiquaq; intentas atque turgidas, haud aliter
utq; animal cancer pedes: unde ei nomen est inditum. Curatio
gitur, quæ per medicamenta adhibetur, in quarto: et eius quæ
circa locellos exoritur, in tertio uolumine satis disputata est.
Quandoquidē partes putrefactæ, uel quæ ex toto præter na-
uram sunt, amputationem sui desiderant: uteri canceris ma-
nus et scalpelli opera non potest, neque utile est adiuucri.
Eorum qui foris et circa mammas potissimum eueniunt, admini-
strationē curationis in præsentia tractabimus. Sunt qui totam
partem uitiatam cauterijs absumunt, alij totam mammam
excisam adurunt. Galenus autem sectionis tantum chirurgi-
am admittens, in hunc modum tradit. Si quando cancerum ma-
uum et scalpelli opera curare ausus fueris, inuacuationem ab
atra bilis purgatiōe auspiceris. Dein uniuersa penitus affecta
parte, sic ut nulla radix supersit, exactè præcisa sanguinē ef-
fluere permittas: nec prius cohibebis, quā uenas quæ circū
sunt cōprimendo, crassiorē ex ipsis sanguinē expresseris. Tum
nō absimili aliorū huiusmodi ratione curationē obibis, hæc qui-
dena

dem Galenus. Cætera autem maligna & putrescentia huiusmodi, uerbi gratia, phagedenæ, gangrenæ, et consimilia, parimodo curanda sunt.

De maribus, quibus perinde ac foeminis mammæ turgent. Cap. 46.

Quemadmodum mulierculis, ita & masculis etiam sub pubertatis tempus mammæ aliquatenus turgent, sed plerisque rursus subsidunt, nonnullis uerò ut semel orsæ sunt, pinguedine subalescente crescere pergunt. Quæ res quum indecora corporis figura effoeminatæ naturæ probrum adferat, digna est cui scalpelli curatio admoueatur. Lunata igitur per imam mammillæ partem incisione facta, cuteq; excoriata, ad partemq; è medio sublata, oræ futuris committitur. Si fortè ob magnitudinem, partibus suis sicut in foeminis ad ima inclinauerit mammilla, duabus lunari figura plagis in extremis inuicem cocuntibus, sic ut minor à maiore comprehendatur, secandum est. Cuteq; quæ inter duas lineas existit, à carne diducta, exemptaq; pinguedine, simili modo fibulis est utendum. Quod si aberrantes minus quàm conueniat exciderimus, tunc habenule quæ superest rursus adempta, suemus, medicamentumq; crucentis uulneribus dicatum inducemus.

De iecoris adustione. Cap. 47.

In quibus in iocinore abscessus est, cruciatus cum grauitate sobuenit, carnositas ipsius uisceris substantia afflicta portenditur. Si acutior dolor magis infestarit, pus in tunica potius collectum indicatur, adustioq; in hunc modum est facienda. Ferramentum candens oliuari figura mucronatum, paulo supra inguen ad terminum iocinoris adurendo injicimus, quò crusta excitet: uniuersaq; cute exusta, & ad tunicam usque adustione adacta, pus excernetur. Post euacuationem phacomelite, & his quæ aqua mulsa constituuntur, & speciebus carne replentibus, postea uerò cicatricem inducentibus utemur.

De lienis adustione. Cap. 48.

Cutem lieni circumfusam, hamulis subleuamus, lōgoq; fer-
ramento candenti penitus adustionem traicimus, ut unico
adactu gemine crustæ inducantur. Hoc ter facimus, quo om-
nes numero sex crustæ confiant. Marcellus tamen tridente fus-
scinula, uel tridenti simili ferramento usus, treis unica impres-
sione crustas excitauit.

De stomachi adustione. Cap. 49.

N diutinis stomachi fluxionibus recentiores adustionē adbi-
buerūt. Alij cauterijs mucronatis treis crustas excitauerunt,
unā iuxta gladiālē cartilagīnē, alias duas inferius triāgulārī
figura totius cutis altitudine. Alij solam unam ad uentriculī
orificium, sed ampliorem moluuntur crustam. Non desunt qui
ne ferro quidem, sed ijs quæ iscæ adpellantur, adurunt. Sunt
autem iscæ spongiosa quædam corpuscula, quæ in quercubus
ac nucibus proueniunt, barbaris frequentiore in usu. Sinunt
autem hulcera aliquandiu absq; cicatrice aperta manere: quin
etiam prius lacerant, quo plurima per ipsa euaporatione ho-
stium uentriculi ab influxionibus illasum permaneat.

Aqua inter cutem qua ratione educatur. Cap. 59.

Aquæ intercutis constitutionē, quotq; eius differentie, quæ
cause, quibus notis deprehendi, quibusq; medicamenti cu-
rari possit, tertio uolumine tradidimus: ibi demq; demonstraui-
mus, solum Asciten manuum & scalpelli operam postulare,
quam in presentiarum explicabimus. Rectum igitur hominē
constituamus: sin mixus, in sedili collocabimus. Si ne hoc qui-
dem ob imbecillitatem tolerare potest, huic curationi minimē
idoneus est. Recto itaq; homine constituto, famulis à tergo stā-
tibus mandabimus, uētre mianibus comprimere, tum orem q;
deorsum ad pubem usq; depellere. Nos scalpello sumpto acu-
lato, seu quo uena secatur phlebotomo adpellato, si intercus
ex partibus iuxta intestina originem habuerit, sub umbilico
ad perpendiculum tribus digitis interpositis abdomen usq; ad
peritonæum membranam incidemus. Si à primario iocineris

G g

affectus

affedu uitium hoc ortum contraxerit, à læua umbilici pariter
 si à liene cæperit, à latere dextro sectionem moliemur. Nec e-
 nim ea in parte cui incumbunt incidamus, cautio est. Cuiusq; su-
 periacente instrumenti acie excoriata, paulo superius quàm
 prima linea incisa sit, membranam peritonæum uocatâ, quo-
 ad inani loco scalpellus excipitur, perforabimus. Mox æ-
 neam fistulam ad scriptorij calami instar iemperatam, per peri-
 tonæi foramen conijciemus, per quam humor pro cuiusq; uiri-
 um ratione effundendus est, quas ex obseruatione pulsus de-
 prehendemus. Quare peracta, recipienda fistula est, & hume-
 ris sistenda effusio, linea quippe hoc alternata continuò siste-
 tur fluxio. Nos tamen securitatis gratia linamentis intortum
 in solam abdominis plagam conijcimus, afflictoq; lecto recum-
 bente, & refocillâ, sequenti die rursus humoris momentum
 pro uirium ratione per fistulam euacuabimus. atq; ita poste-
 rioribus etiam diebus faciundum est, donec quamminimū hu-
 moris relinquatur: summa ubiq; cura habita, ne uniuersim eu-
 cuemus. Complures etenim imperitè admodū manum admo-
 ti, unâ cum humore uniuerso, uitali etiâ spiritu euacuato, homi-
 nem subindè interfecerūt. Qui uerò securitati magis cōsulunt
 tantum humoris per hanc chirurgiam educunt, quantum la-
 borantis uirtutem ingenti pondere subleuare posse uideatur.
 Reliquū medicamentis aqua grys, sabulo, sole, siti, exiccantibusq;
 cibarijs consumunt. Vtione uerò utuntur in stomacho, iocini-
 re, liene, abdomine, umbilico, quinq; crustas adhibentes. Al-
 ferramentis tenuibus et candentibus, alijsq; adpellatis, uel a-
 lia id genus materia inducentes. Maximaq; pars hac potius
 metodo nullam prorsus perforationem (quam paracentesis
 nuncupant) experta, sanitati restituta est.

De iis quibus prominet umbilicus. Cap. 51.

Vmbilici prominentis uitium nunc abdominis membran-
 ea in parte rupta, uel omento, uel intestino prolapso pr-
 uenit: nunc segni humore sub umbilico collecto, carne interd-
 succresce-

succrescente. Interim sanguine ex uena & arteria ruptura
 profuso, ceu in delatationibus (quæ Græci aneurysmata dia-
 cunt) quandoque non sanguine, sed spiritu solum irrumpente.
 Si omentum prolapsum fuerit, circa umbilicum concolor tu-
 mor, mollis, dolore uacans, & inæqualis conspicitur. Si in-
 testinum, præter enumerata tumor in æqualior est, & digitis
 impressis aboletur, crepitans aliquando, balneis & distentio-
 nibus magis augmentatur. Si humoris colluies subest, mollis
 imiliter attactu apparet tumor, ad digitorum uerò compres-
 sionem non cedit, neq; minuitur, neq; increscit. Si præter reli-
 qua indicia tumor liuidior sit, carnisq; subcrescientia durior,
 tiam tactui resistit, semperq; in eadem amplitudine manet. Si
 ex flatu prominet umbilicus, tumor tangentibus mollis comi-
 titur, qui impulsus quendam sonitum edit, & digitorum com-
 pressu euanesceat. Manus itaq; opella hunc in modum adhiben-
 da est: erecto homini locato, spiritum continere ut uenter disten-
 latur præcipimus. Deinde tota umbilici excrecentia atramē-
 to scriptorio circulatim notata, resupinatoq; homine, scalpel-
 o tumorem quæ nota atramenti fuerit, undiquaq; scarificabi-
 mus. Post hæc media parte hamulo eleuata, lino uel neruo
 cui scarificatio est uinciemus (sic enim fortius, ne delabi possit,
 t, continebitur) ansulâ nexui superaccommodantes, mox tu-
 more qui constrictus est in uertice inciso indicem demitemus,
 scrutabimurq; adamussim nūquid intestini aliquod inuolucrū,
 el omēti particula simul uincta sit. Si intestinū fuerit reliquū,
 fixato funiculi sinu, ansula ue introrsum depellemus. Sin o-
 mentum, eo retracto, superuacaneam eius partem, deligato-
 rius quodcunque, ut solet, occurrit conceptaculo, amputabi-
 mus: duplicem inde acum simplex filum trahentē per scarifica-
 onē factā trañciemus, linorūq; ansulis præcisis, ueluti in a-
 ncurysmate cōprehēsum est, quatuor capitibus cōstringemus,
 q; ubi corpora supra uincula cōputruerint, excideriniq; li-
 amētis curationē reliquā consumabimus, operam dantes, ut

cicatrix caua magis subinde reddatur. Hæc quippe, si uel omento, uel intestino malum fertur acceptum, moliemur. Si uero caro, aut humor, aut sanguis uitium causerit, media tumoris parte orbiculatim præcisa, quicquid extra ab dominis membranam peritonæum nuncupatum incidit, detrahemus, iuxtaque umbilicum medelam carni creandæ factam adhibebimus. Si uero ex uasis dilatatione, aut spiritus euaporatu umbilicus emineat, his curationem omnino perinde atque aneurysmatis renuere expedit.

De abdominis membranæ uulneribus, deque intestini, uel omni prolapsu, inibi que uentris refarciendi ratio ex Galeni commentariis traditur. Cap. 52.

Quo nam pacto uulnerata abdominis membrana appositæ queat manu curari, deinceps considerandum est. Si uulnus aded exiguum sit, ut quod inflatum est, prolapsum intestinum nulloatenus reprimi liceat, aut flatum exinanire, aut uulnus ampliare necessum est. Præstat mea quidem sententia primum, si modo id assequi concedatur: cæterum qua potius ratione assequi datur, quam si causa, qua inflatur intestinum, tollatur e medio? Quæ igitur hæc est? ambientis nos aeris frigus, unde ex calore petendum est præsidium. Molli itaque, spongia aqua calente imbuta, recens expressa fouendum erit intestinum. Præparetur autem interim ad hoc uinum austerrum calidum, quod sanum magis quam aqua excalfacit, uiresque intestinis adijcit. Si uero in his aded nihil est auxilij, ut nihilominus intestini perseuere inflatio, abdominis membrana in tantum incidenda est, quantum ad prolapsum intestinum sufficit. Cui incisioni moliendæ, recta fistulamina, syringotomata appellata, sunt apposita. Situ ægrotanti idoneus fuerit, si inferioribus in partibus uulnus sit, ut ex aduerso sursum uergat: et si plaga in dextra fuerit, in laeuam partem corpus propendeat. Si in laeuam, in dextram inclinet. Hoc quippe tam amplius quam exiguis uulneribus commune est. Restitutio repositioque intestinorum in sedem propriam in amplis uulneribus prudentem, idoneumque desiderat. Debe enim

enim is, ubi manibus suis uulneris oras foris apprehenderit, in
tro conuertere & astringere, suentiq; ipsas paululum denuda
re, quodq; consutum est deprimere, quoad totum sutura fuerit
coniunctum. Iam uerò quis abdominis consuendi modus dexter
& commodus sit, memorabimus. Quandoquidem abdomen in
teriori membranae adglutinare conuenit, ordiendum quidem
à cute est, acusque ab exteriori parte introrsus demittenda
est: quæ ubi cutem rectum musculum totum traiecerit, præte
rea quæ ei subiacet membrana, nempe peritonæo, altera par
te ab interno extrorsum perforanda est. deinde abdominis mē
brana similiter traiecta, eademq; rursus ab exteriori parte ad
interiorem perforata, præteritoq; simili modo subiacente pe
ritonæo, ad contrarium ueniendum est: id quoque ab interno
extrorsum unà cum coherente toto abdomine transuendum
est: atq; ita quidem iterum atq; iterum, quoad uniuersum uul
nus pari modo consutum fuerit, faciundum. Interuallum uerò
sutarum, quo plaga quæ subest constringenda est, breuissi
mum esse debet: quo uerò cutis integra, firmaq; permaneat,
non admodum breue inter suturas cutis, ne alibi rumpatur, u
tile est. proinde euitatis utrisque extremis, mediocritas præfe
renda est. Badem sanè & in sutura habenda est fili ratio. Duo
rius nanque cutem abrumpit, mollius breui rumpitur. Vclu
ti etiam si summis orarum finibus acus inicitur, reliquum cu
tis, quoniam tenuissimum est, si uim patitur, rumpi cogitur.
Sin plurimum à sutura comprehenditur, inconglutinatum re
linquetur. Hæc quidem omnibus bulceribus quodammodo
communia sunt, maximè tamen in consuendo uentre seruand
a. Vel igitur, quemadmodum demonstratum est superius, no
bis agendum, huc diligentia adhibita, ut membrana, quæ peri
tonæum dicitur, cum abdomine coalescat: id quod quia neruo
sa est, uix sperare audeas. uel ut alij faclitant, ea quæ natura co
gnata sunt, peritonæū peritonæo, abdomē abdomini inuicem
committemus. Fiet autem hoc modo, abdomen solum ab exte
riore

riore parte introrsum acu est traiciendū, mox utrisq; perito-
 nœi labris transmissis, rursum acus per utraque hæc labra
 foris introrsum conijcienda, deinde ab interiore parte fora
 per alteram abdominis oram reducenda. Hæc ratio à com-
 muni illa & expedita, qua uno adactu per quatuor oras simi
 acus trajcitur, in eo differt, quod membranam abdominis to-
 tum intra abdomen occultat. Medicamenta ad hæc eiusdem
 materiæ, cum ijs quæ cruentis injiciuntur, accommodata sunt.
 Ne autem aliqua principalior particula per consensum af-
 ficiatur, totum quod inter inguina & alas existit, lana moli
 oleo moderatè calido imbuta, fovere ac circumdare expedit.
 Satiusque fuerit, si idem per clysterem intestinis infundatur.
 Nam si quid in intestinis conuulceratum sit, uinum nigrum a-
 sterum & tepens injiciendum est, eoq; magis, si totum intesti-
 num uulneratum sit. Crassa quippe intestina curationem
 promptius recipiunt, tenuia uerò difficilius. Ieiunum uerò, qui-
 niam uasorum multitudinem, amplitudinemq; tenuem ac nei-
 uosam tunicam continet, & quoddam bilem meracam totam re-
 cipiat, & quoddam ex omnibus iocinori proximum existat, irreme-
 diabile est. Hulcera quæ inferiores & carnosiores uentris
 partes infestant, curari sustinebimus, interdum enim bene
 succedit, non solum quoddam illæ crassiores sunt, uerum quoddam
 aptius est per sedem injiciendis medicamentis hic locus. Quæ
 uerò in ore ipsius & stomachi sunt, solo transitu medicamen-
 ta attingunt: quæ autem hostium ipsius infestant, his acutus
 etiam sensus aduersatur. Cum autem membrana peritonæum
 appellata rupta, omentum prolapsum est, liuidumque aut ni-
 grum sit, laqueo priusquam nigrescat exceptum, ne sanguinis
 eruptione periclitetur, infra uinculum amputandum
 est, atque in imo consutionis sine uinculi capita
 depõeant, quo facilius, cum ex uulnere
 suppurante eruantur, ex-
 imi possint.

De

IN recutitis, hoc est ijs quibus glans penis præputij penuria non contegitur, quidam decoris gratia duplicem curationi modum excogitarunt. Interim quidem in superiore parte iuxta pubem colis tergis orbiculatim incidentes, ut facto diuortio continui deorsum trabatur, quoad glandem ipsa operiat. Interim uerò subius glandis radice cutem scalpello ab interiore cole excoriantes, deinde inferius trahentes, mox linteolo quodam molli præputium undiquaq; deligantes sic utiq; ut linteolum aliquod inter cutem & colem, qua excoriata est, interponatur, ne glandi agglutinetur. Hic modus Antyllo magis arridet, fusius ipsum explicanti. Nobis summatim ea tantummodo recensere idcirco placuit, quoniam rarenter huiusmodi curationis opera exigitur, eo quod nullâ functionibus obsequiis difficultatem pariat hoc uitium: neq; ad id indecorum est, ut eo magis glandem, cruciatu qui manuum administratio ne conciliatur, deligere malis.

PLERISQUE à natali die glans minimè perforata est, sed sub cane nuncupato, quâ glans suspensa est, foramen habent: unde neq; mectere antè, nisi membrum abdomen uersus admodum reflexerint, neq; liberos procreare possunt, quum semen ipsorum in uulvam rectâ eiaculari nequeat. Accedit his, quod indecorum admodum hoc uitium existit. Omnium igitur ut simplicissimus, ita & tutissimus medendi his modus est, qui fit per amputationem. Resupinato itaq; homine, glans sinistra manus digitis ualidè attollenda est, deinde scalpelli acie iuxta coronam amputanda, plaga non obliqua, sed concaua & rotunda instar sculpturæ, ut in medio quædam glandem representans eminentia relinquatur. Quoniam autè sanguinis profusio sæpius comitatur, sanguinem sistentibus medicamentis utendum: sin minus, tenuibus, ferramentis candentibus adurendum.

De phimo, hoc est glande præputio præclusa. Cap. 55.

Phimosis causa duplex est. interdum enim præputium glandem operiens retrahi rursus non potest. Interdum retractum reduci nequit, quæ species propriè periphimosis nuncupatur. Prior differentia uel ex cicatrice in præputio concreta, uel ex carnis incremento: secunda ex colis inflammatio-
ne prouenit, quoniam retracto præputio glans ita innumescit, ut id amplius non admittat. Si igitur prima species phimosis causa fuerit, curationem hunc in modum moliri expedit. Aegro accommodatè collocato, præputium antè trahum, iniectionis in summitatem ipsius tribus aut quatuor hamulis, ministris quantum fieri potest, distendendum atq; aperiendū exhibemus: post hæc si ex cicatrice foris contractio nata fuerit, ab interiore parte tribus quatuorue locis scalpello seu aculeato cutello præputium lineis directis, æquali inter se spacio distantibus, incidimus. Est autem duplex circa glandem præputium. os itaque eius à parte interiore diuidendum est. dissoluta enim hoc pacto contractione, quæ ex cicatrice concreuerat, præputium facillè inducemus. Si uerò carnis eminentia ab interiore parte adnata phimosim creauerit, carnem omnē, præputio retracto, scarificabimus: carnis deinde excrescentias, quæ inter incisiones extant, derademus: postea tabulum plumbeum papyro sicca inuolutum, glandi uniuersæ circumdabimus. Sit autem tabulum binis foraminibus, undiq; æqualibus præditū: sic enim huius circumpositu inducto præputio, rursus coalescere prohibebitur, distenta tū à plumbo, tū ab inuoluta papyro, quæ ex amento turgescēs, magis adhuc cutē à cole diducet. Ad hunc igitur modū, siue ex cicatrice, siue carnis eminentia phimus extiterit, faciundum est. Si autem periphimosis nuncupata infestauerit, siquidem in uetustate inciderit, coalescit, & nullo remedio eliditur, nisi quis perinde ac recutitus tractari uoluerit. Sin autem nondum coaluerit, lacerationibus, bul-
cusculisq; in longitudinē ternis aut quaternis, aut pluribus ore
biculatim

biculatim excitatis, oleo copiosiore tepido fouentes, ulterius protrahemus.

De præputio glandi adhærescente. Cap. 56.

GLans & præputium inuicem coherescunt exulceratione præcedente. Oportet itaque aduersa scalpelli acie, uel ferramento polypo accommodato spatulam retrahere quantum licet, ea quæ resistunt subsecare, summa adhibita cura, ut glâs ab adglutinato præputio purè separetur. Si uerò id difficile sit, glandis potius aliquid ad præputium, quàm e contrario sumendum est. quum enim præputium tenue sit, facile perforatur. A dissolutione uerò commissuræ, linteolum tenue aqua gelida imbutum inter glandem & præputium, ne rursum coalescant, inferendum est, uino adstringente cicatricem inducendo.

De circumcidendis. Cap. 57.

Non de his qui gentili quadam religione circumciduntur, sermo nobis impræsentiarum est, sed de ijs quibus affectu inuerendis creato præputium nigrescit. His sanè totum quod nigruerit, circulatim excidendum est: deinde squama cum melle, uel etiam malicorio & cruo instar linamenti, utendum. Si uerò sanguen interdum promanauerit, lunatis candētibz ferramentis utendum, quæ utrisque simul accommodentur, sanguinis inquam profluuio, & bulceri depascendo serpenti. Et si tota glâs fortè absumpta fuerit, solenulæ plumbeæ in meacum urinariū inferentes, per eam lotiū proycere mandabimus.

De thymis naturalium. Cap. 58.

THymi carnosæ quædam uerruculæ sunt, quæ modò in glande, modò in præputio obueniunt. Ex his aliqui maligni quidem, aliqui uerò benigni sunt. Benigni scalpelli acie deradentur, & chalcitide inspergantur. In malignis post excisionem, adustione utendū est: quod si oppositi in præputio thymi concreuerint, alij in interiore parte, alij in exteriori, non debemus simul omnibus manum admoliri, ne fortè præputium structura tenui, imprudenter à nobis pertundatur. Sed prius

Gg 5 interiores

interiores auferre, & ad cicatricē perducere, deinde exteriorē res aggredi. Sunt uerò ex recentioribus aliqui, qui forfice ipsos auellentes, seta equina deligatos curant, quemadmodum alij frigido cauterio eosdem adurunt.

De siphone & clystere uesicæ immittendis. Cap. 59.

Lotio in uesica suppressa, propter meatum grumo sanguinis aliquo, uel calculo, uel alia quadam occasione obstructum, recti siphonis demissione (quem modum catheterismum Græci nominant) excrementum exinemus: sumpto eiusmodi siphone, ætati atque sexui accommodato, quem ad hoc adaptamus. Fiet autem adaptatio in hunc modum: lanæ momentum lino in medio deligatum, filoq; ex acuto iunco per recti siphonis fissulam traicdo, lanam extremo siphonis mucroni inserimus, sic, ut si quid lanæ emineat, forcipe præcidatur, siphonemq; in oleum conycimus. Post hæc laborante in subscelium aptè figurato, fotuq; prius nisi quid prohibeat asperso, siphonem in rectum usque ad colis finem demittimus, penè ad umbilicum reflexo. Nam ab hac parte obliquus uesicæ meatus est. mox siphonem ulterius adigemus, atque ubi ad taurum iuxta sedem deuenit, reflexo iterum in naturalem figuram genitali membro cum imposito instrumento (quia à peritonæo uesicæ meatus sursum uergit) siphonem quoad uesicæ finem penetrauerit, propellimus. Deinde filum siphoni iniectionē adducimus, quo unā cū lana urina etiā attracta subsequatur. quemadmodū in siphonibus cucurbitæ assolet. Eiusmodi quidē recti siphonis demittendi ratio est. Cæterū quoniā identidē incidit, ut exulcerata uesica collutionē necessariò postulet, ad hoc auricularibus clysteribus in præfatum modū inditis utemur, si modò illis in uesicam enema infundi poterit: sin minus, aluta uesicæ bubula siphoni adaptata, infusione colluemus.

De calculo. Cap. 60.

Quandoquidem aliàs de calculorū parente atq; rudimentis explicatum est, eosq; pueris in urinæ conceptaculo ma-

gis,

gis, prouectioribus in renibus creari, locus modum, quo excindi commodè possint, expetit: quem præscribemus, ubi notas prius, quibus calculus in uesica deprehendi potest, exposuerimus. Lotium itaque quod emingunt, aqueum est, sabulosum quod in eo subsidet, tentigine penis continenter pruriunt. Proinde illis absque ratione, modò relaxatur, modò arrigitur: quoniam irritati, præsertim pueri, frequenter illum demulcent & contrectant. Quum calculus in ceruicem uesicæ incidit, extemplò urinæ suppressio fit. Ex ijs porrò quibus calculus exciditur, pueri quidem usque ad quatuordecim annos propter corporis mollitudinem nullo negotio curantur. Senes contrà, quoniam corpus ipsorum rebelle, curationem nunquam ferme recipiunt. Mediæ horum ætates, etiam in hoc medio quodam inter hæc modo se habent. Rursum qui grandioribus calculis laborant, quia inflammationibus sustinendis assueti sunt, facilius malo subtrahuntur. Qui exilioribus, difficilius ad sanitatem perducuntur, contrarias ob causas. quum hæc ita se habeant, ad scalpelli operam profecti, concussione prius utemur, modò quidem per ministrum, modò ab ipso laborante ex alto aliquo loco deficiente, quo calculus ad ceruicem uesicæ decutiatur: mox ægrotante, currendo in sedili figurato, manibusq; suis sub femora porrectis, ut in angustum uesica compellatur. Si igitur attrectantibus nobis calculus in taurum procidat, quassatu illuc deiectus, ad scalpelli operam accingemur. Si non sublabatur, laeue manus digitum, si puer est laborans, indicem: si prouectioris ætatis, medium, oleo prius illitum, in anum demittemus, resupinisq; digitis ipsum perquirantes, reperiunt paulatim traducentes ad ceruicem uesicæ deducemus, digitoq; uno aut pluribus inibi constrictum, in exteriora propellemus. Deinde alteri famulo, ut manibus uesicam comprimant iubebimus: alteri, ut dextera manu testiculos sorsum trahat, sinistra taurum extendat in alteram partem, qua sectionem tentabimus. Nos sumpto ferramento quod litho-

lithotomum appellant inter anum & testiculos, non tamen in
 tauri medio, sed uersus sinistriorem clunem obliqua linea su-
 per lapidem parti secandæ subiectum incisionē molimur, sic
 ut plaga foris latior sit: intus non amplius pateat, quā ut la-
 pillus per eam queat eijci. Interdum enim digitorū uel digiti
 in ano innixi, unā cum incisione citra euulsionē calculus com-
 modissimē exilit. Si non exilierit, unco huic functioni dicato (li-
 thuncum nuncupant) iniecto eximendus est. Calculo iam ex-
 empto, medicamentis sanguinem supprimentibus, ex manna
 thuris, aloë, solidagine, uel etiam misy, alysq; id genus sangui-
 nis profluum coarcentibus, sistemus, lanam atq; linteolū im-
 plicitum uino & oleo imbutum, uulneri superinducamus, &
 calcularijs deligationib; sexicurijs utemur. Si metus eruptio-
 nis sanguinis sit, linamentū ex posca, uel oleo rosaceo, cui aq; a
 sit & immixta, iniiciendum est, quod ægroto decubente crebrius
 madefaciendum est. Tertio pōst die soluentes, hydreloxq; lar-
 giores fouentes, tetrabarmacum linteolis inducū adhibebi-
 mus, subinde propter urinæ acridinē soluentes atq; curantes.
 Quod si aliqua inflammatio superuenit, cataplasmatis & re-
 spersionibus in hoc consecratis utemur, & rosaceum uel cha-
 mæmelinum, uel butyrum in uesticam, nisi quāpiam inflamma-
 tio impediāt, iniiciemus. Pari modo si uel depascendo serpens,
 uel quodam alio modo maleficum huius efficiatur, singulis
 congruentia remedia accommodabimus. Si desit huiusmodi inflam-
 matio, lauacro illis adhibito, emplastrum diachylon, id est ex
 succis, super lumbos, & inum uentrem accommodabimus.
 Per uniuersum uerō curationis tempus, quo remedijs quiescen-
 di locus sit, femora quoq; deligare conuenit. At si lapillus par-
 uulus in ceruicem uesticæ colem uel inciderit, & mangendo
 excerni nequeat, præputium ualenter in anteriora retrahū
 supra glandis summitatem uinciendum est. Mox pudendi etiā
 am coles, iuxta finem ad uesticam spectantem uinculo iniecto,
 deligandus est. Deinde ab inferiore parte calculi incidemus
 super la

per lapidem, qui parti secandæ supponitur, flexoq; in super co
le calculus eijciendus est, solutis postea uinculis huius à grumis
uacuabitur. Vinculum itaq; posterius iniectum est, ne calculus
retrorsum remeet. Anterius, ne post calculi exemptionē, præ
putij soluti tergus, in oppositū recurrens, incisionem operiat.

De partibus circa testiculos. Cap. 61.

Quandoquidem ad Herniarij medici disciplinam, partium
testiculorū finitiones conferunt, et prius à nobis sunt pro
ponendæ. Testiculus igitur substantia est glandulosa, fra
gilis, ad seminis uim genitalem comparata. Parastata, id est
assistentes, & cremasteres appellati, hoc est suspendicula, ner
ui sunt, à spinalis medullæ & cerebri membrana propagati,
qui cum arteriosis uenis ad testiculos pertingunt, per quos se
men in pudendum permeat. Seminaria conceptacula, uenæ
sunt à caua uena in testes, quibus etiam alimentum præstant,
sinuosis anfractibus pertinentes. Et tunica est natura neruosa,
in gibba quidem & anteriore parte à testiculo libera, à con
caua & posteriore ipsi inhaerescit, ex abdominis membrana
originem obtinens. Partem eam, qua testiculo adnata est, po
steriorem adnexam siue inhaerentiam, Græcè prosthyis in co
gnominant. Darti sunt membranæ, quæ exteriorem pellem
erytroidi tunicæ adglutinant, quibus partibus & illa post tes
ticulos annexa est. Huic autem pelli exteriori rugosæ testicu
lis circumdatæ, scrotum Latinis, Græcis oscheos nomen
est inditum.

De hydrocele, id est hernia aquosa. Cap. 62.

Humorem quendam otiosum atq; hebetem in partibus cor
porum quæ scrotum implicant, collectum, tumoremq; sen
su perceptibilem inducentem, aquosum ramicē indigitant. Fit
igitur humoris huius magna ex parte circa testiculos in tuni
ca erythroide, iuxta partem anteriore, qua à testiculo separa
tur, raro extra erythroidē colluuiet. Subinde peculiari etiam
tunica humor comprehenditur. Appellantiq; hoc uitium chi
rurgici

rurgici herniā in tunica supergenita ortam. Si igitur ex præcedente causa, exempli gratia, partium harum imbecillitate hoc mali constiterit, sanguis alimenti ratione huc delatus, in aqueam, serosam, hebetemq; substantiam immutatur. Si autem ex plaga, cruenta, aut feculenta materia cōprehenditur, commune indicium est, tumor absq; dolore immobilis in scroto permanens, nulloq; casu evanesceus: sed cum paucus sit tumor, cedens: si copiosus, nō cedens. et quibus in erythroide tunica humor existit, tumor rotundus paulo longior oui instar apparet, testiculusq; his planè inibi occultatur, ut qui undequaque sit circumdatus. Si extra erythroidem membranā sub tunicis que darti nuncupantur, extiterit, per pauca corpora sublabitur. At si humor in supergenita tunica coierit, propter undiquaq; compactū conglobatumq; tumore, alterius testiculi imaginem refert. Si aquosa sit materia, concolor tumor perlucet. Si feculenta, aut cruenta, rubicundus aut liuidus per tunicā apparet: nam quibus in utrisq; scroti partibus signa hæc inveniuntur, duplicem ibi herniam esse sciendum est. Curationem quæ maximum operam desiderat, administrabimus ad hunc modum. De rasa pube et scroto, nisi puer sit, resupinum ægrotantem super sedili collocabimus, multiplici aliquo panniculo natibus subiecto, sponsia uerò amplicre scroto subdita, sedens à sinistra parte ægri medicus, ministro à dextra sedenti iubeat, ut pudendū in alteram partem reflectat, scrotiq; pellem abdomen uersus eleuet, sumpto, quæ scalpello scrotum à media parte orsus, iuxta longitudinem usque ad pubem ferè recta incisione secet, quæ à scrotum diuidente linea æqualiter distet, atque ad erythroidē usq; tunicam descendat. Sin in supergenita membrana humor hæreat, qua parte uertex super eiusdem tunica se ostenderit, ea in parte scalpellum erit admouendū, hamulo autem uulneris labia aperienda sunt, diductisq; herniario cultro scalpelloq; dartis, erythroides denudatur: mox phlebotomo eadē per mediū finditur, ea præcipuè parte, qua à testiculo recedit:

atq;

atq; humore iam toto, uel maiori ex parte in uasculū aliquod excreto, hamis erythroides membrana, qua tenuissima eius pars est, extrahatur. Anthyllus uerò postea futuris & medicina cruentis uulneribus accommodata, utitur. Recēiores, ea quæ carnē inducūt, adhibere assolent. At si testiculus putredine, uel alio quopiam uitio affectus deprehēdatur, uasa cū neruo cremasteri dicto annexa deligēda sunt, neruus ipse præcidendus, testiculus eximendus est. In duplici ramice laborantibus, bifariā similiter curatio adhibenda est, ab utraque parte scroto iuxta inguina inciso. Post hæc autem mucrone specilli inimum per incisionem demisso, scrotum ipsum sinuamus, ibiq; acuto scalpello paululū incidemus, quo sanguini cōcreto et puri exitus detur; ipso uerò scalpelli capitulo per exigū id foramen ad plagam usque superiorem implicito, in longitudinem linamentū traicimus, hulceribus in spongia deterfis, lana oleo imbuta, per inferiorem testiculum conijcienda est. foris aliam lanam uino, cui oleum admixtum sit, madentem scroto, abdomini, inguinibus, tauro lumbisq; superimponat. linamentū triplex super hæc explicandum est, uinculo sexicurio alysq; deligationib. accommodatis utendū: decumbente postea homine, lanis scroto subiectis, quo requiescat, alutaq; super ipsas molli explicata, ad fots superfusionē excipiendā. Fovebimus usque ad tertium diem, calētis olei rore: à quo resoluentes, tetrapharmaco linamentis madefactis in uulnere utemur. Lemniscumq; ex polline farinaceo immutantes, extrinsecus fomenta rursum propter inflammationem, usque ad diem septimum iniiciemus, postea linamentorum custode medicamento utemur. Expurgato hulcere, & carne mediocriter indurata, deinceps lauacris etiam adhibitis ager abludendus est, linamentum extrahendum, reliquaq; curatio, quæ admodum expositum est antea, adhibenda. Si quæ inflamatio fuerit, aut sanguinis profusio, aut id genus quippiā superuenerit, unicuiq; suis remedijs, ne battologizemus, occurrendū est.

Ceterum

Cæterum si adustionem potius in aquosa hernia, sicuti recentioribus placet, probabimus, omnia nihilominus quæ uel ante uel post manuum administrationem dicta sunt, exequemur: quinetiam in ipsa chirurgia, excepta modo sectione quæ feramento & incisione ad humoris emissarium, facienda sunt. decem itaq; aut duodecim ignitis ferramentis ad r Græcorum literam formatis, & duobus cultris primum scrotum in medio ferramento r imitanti aduremus, cultello autem aut retuso hamulo membranulas excoriantes, ferro candenti gladio simili præcidimus. Denudata uerò erythroide tunica, quæ facile, quoniã alba & angusta tenuis uel existit, cognoscitur, acie ferramenti ad r figuram perurentes, humorem effundimus, deinde totum id quod ex ea detectum est, hamulis attrahentes, candenti cultro ensẽ referenti, è medio tollemus.

De carnoso & tophaceo ramice. Cap. 63.

Caro in parte aliqua corporum inter scroti tunicas concre-
scens, carnosam herniam ramicem uel excitat. Oritur autem ex caca quadam causa, testiculo fluxionem experto & indurato, uel ex percussione, aut negligenti post ramicem sectum curatione. Comitatur autem hos una cum duritie, concolor tumor. Si tumor in scirrhum occalluerit, decolor & indolens: si malefici naturam respiscat, dolores pungentes consequuntur. Scalpellum itaque ita habenti admoventes, collocabimus ipsum sicut superius explicitum est, incidemusq; similiter. At si circa testiculum caro increuerit, utraq; membranam darton & erythroidem consimiliter secabimus: postea testiculo attrahito, atque ex erythroide exempto, uasa à neruo cremastere separata, uinculis excipienda, ipsaq; neruus præcidendus est. Testiculus autem, qui cum carne coaluerit, tanquam alienus eiciendus est: si hæc concretio quadam in tunica aut uase extiterit, scroto diuiso, subiectisq; carni membranis, quicquid ab excrescētia carnis occupatum est, auferetur: quod si posterior commissura hoc uitium experitur, omnibus quæ ambiunt ipsam

am excisis, testiculus quoq; ipſus ſimul extrahatur: fieri quippe nequit, ut ſine hac teſticulus permaneat. Tophi autem, & in teſticulo & in erythroide membrana concreſcunt, multaq; renix duritia & inæqualitate à carnoſa hernia & aquoſa diſcernuntur. His itaque eadem manuum, quæ & carnoſo rami ci, curatio adhibenda eſt.

De uaricoſo ramice, & flatuoſo. Cap. 64.

Venas ſcroti, uel membranarum quæ darti nuncupantur, inturgeſcentes, uarices ſimpliciter appellant. Si uerò illis quæ teſticulum nutriunt, hoc acciderit, uaricoſum ramicem nominant. Notæ huius conſpicuæ ſunt, locus paulo tumidior, modicè obliquus, racematim conglomeratus, teſticuli relaxatio manifeſta, & aliæ functionum diſſicultates, in curſu præſertim, exercitationibus, & itinere. Curatione quæ manu fit, talè admoliermur: a gro appoſitè figurato, ſcrotum manu per mulcetur: neruus quo teſticulus dependet, ad inferiorem partem depellitur. Is autem inde facilius agnoſcitur, quod cū ualens ſit uenis tenuior, ſolidior, magisq; renitens ſentitur, maioremq; dolorem adfert ex compreſſu, iuxtaq; colem conſtitutus. quo depreſſo, uafa digitis noſtris famuliq; in ſcrote adprehenſa, ualideq; diſtenta, cutem cōtra ipſas uenas ſcalpelli acie obliquè ductas ſecabimus: hamulis inſuper infixis, ſubiectas cuti partes eleuatas excoriamus, uenasq; ipſas denudatas, ut in capite de Angiologia & aneurysmatis explicatū eſt, acu duplex filiū trahente traicimus, anſaq; fili incifa, et qua incipit et qua deſinit uaricatio fune deligabimus, facta prius in longitudinē incifione, ac ſanguine collecto illic euacuato, remedys pus mouētibus ipſos curare tentabimus, tantisper dum unà cū uenis uincula quoq; ſua ſpōte excidant. Leonides uerò tradit, ſi aliqua ex uafiſ quæ teſticulo alimentum præbent, uaricata fuerint, ita eſſe faciundum. Si omnia affecta ſint, cum ipſis etiam teſticulus erit euellendus, ne alimento deſtitutus contabeſcat. Flatuoſo porrò ramici cum genere aneurysma exiſtat,

Hb manuum

manuum administrationem non esse ad mouendam idem autumat, propter præsentaneum, quod in uaricibus à nimia sanguinis profusione euenit, periculum. Recentiores autē, cum uity huius duplex sit generatio, alias ex quatuor uasis testiculorum nutritiis, alias quæ in dartis tunicis & scroto cōtinentur arterijs, hunc ceu conclamatum repudiant, illū manuum opera curant. Discernimus autem ipsos, quod qui ab arterijs fit, facile ad digitorum compressionem euanescit: qui à uenis testiculum alentibus enascitur, uel neutiquam, uel cum multo metu, his eadem quæ uaricofo ramici curatio adhibetur, singulis uenis funiculo exceptis ac deligatis.

De hernia intestinorum. Cap. 65.

Enterocele, hoc est intestinorū hernia siue ramex, est in scroto tumore, quæ fit ex membranae abdominis ruptione circa ilia, uel laxatione: utraque igitur hæc, ruptura scilicet & laxatio, uolentia quadā præcedit, nempe idu, saltu, aut clamore proueniunt. Laxatio autem propriè, ex resolutione alysq; corporis in becillitatibus accidit. Notæ utrisque communes sunt hæc: euadens in scroto tumor, qui in exercitijs, teporibus. spiritus retentione, alysq; huiusmodi occasionibus maior euadit, digitūq; compressus, lentius recurrit, celerius autem rursus relabitur. Intestinum insuper resupinatis, superna sua in sede permaneat, donec erecti steterint. Stercus autem in scroto interclusum, periculum sæpenumero ipsis intulit. dolor enim infestat, impressūq; interim etiam digitis crepitum edunt. Hadenus quidem communes: singulares uerò priuatim notæ ramicis, quæ ex laxatione membranae oritur, sunt, quod non uniuersim, sed particulatim, & quibuslibet de causis interdum intestinum deuoluitur, tumorq; æqualis, & profundiore in loco apparet, utpote intestino, quod delapsus est, abdominis membrana constricto. At quæ rupturæ euasit deuolutio, uniuersim ab initio, & uolētis de causis dumtaxat, tumorem immensum, inæqualem, & in summa statim

c480

cutē praeferat, eò quod extra peritonaeum elabantur intestina. Si igitur rupta membrana peritonaeo, omentum duntaxat in scrotum exciderit, epiplocele, hoc est omenti ramex: si omentum intestina secuta sint, epiploenterocele, hoc est omenti & intestini hernia appellatur. Si uero cum his etiam aqua in tunica erythroide nuncupata contineatur, ex tribus composita appellatio inditur: hydrenterepilocelē, hoc est aquae intestini & omenti ramex. Porro neque hos, neque ex ruptura intestinorum ramicem, manuum administrationi subijcimus: sed illud duntaxat, qui ex laxatione constiterit, ramicem hoc modo curamus. Laborante resupinato, inguinis cutem per famulum subleuatam, transversa linea, sicut in angiologia expositum est, incidimus: & si quidam non transversa, sed recta linea utantur, iniectionem; hamulo divisionem ita explicamus, ut per eam educi testiculus commodè possit: deinde rursus in intimam cutē, nempe quartā, tot hamis infixis, quot ad uulneris magnitudinem sufficiant, membranulas & adipem retuso hamo aut specillo excoriantes, scalpello excidimus, detestamurque undique & expedita abdominis membrana, indicem digitum in posteriorem scroti partē inter membranā hanc & dartū demittimus, eoque posteriorem connexum solvimus. Post haec dextera manu finem earum implicantes, sinistra abdominis membranā ad divisionem attrahimus, & testiculum unā cum membrana rubenti, educitum famulo attollendum tradimus: ipsi uero posteriore inhaerentiam penitus unā cum membrana rubenti dissoluentes, digitis contrectando, num intestini aliquis anfractus in tunica erythroide relictus sit, explorabimus: qui si inuentus sit, deorsum hunc ad alium propellemus: deinde acu magna, linum decies tortum duplex ducente, extremitate membranae abdominis qua divisionē respicit, per medium traicimus: sinuque succiso quatuor lini capita efficimus, atque his per uincula rursus inter sese decussatim implicatis, ex utraque parte peritonaeum uehementer dstringemus: iterumque ipsae capitibus cir-

Hb 2 cumuolatis,

cum uolutis, constrictionem repetemus. sic ut nullū ex uasis a-
lentibus queat amplius nutrimentum suppeditare: ne si id fiat,
inflammatio inde aliqua concitetur. Post hæc secundum uin-
culum minori quàm duorum digitorum intervallo à priori di-
stans, foris injicimus. Inde uincula, mēbranae abdominis par-
tem ad digiti amplitudinem relictam circulatim amputemus,
unā cum ipsa etiam testiculo ablato. Rursum scroto iuxta sa-
nici emissarium paululum inciso, lemniscoq; inserto, fomentis
oleo madefactis, deligationibusq; sicut in aquoso ramice adhi-
bitis, cætera quæ restant, perinde atq; illic explicitum est, fa-
ciemus. Noui nonnullos autem non imperitos chirurgos, qui
in membrana erythroide excisa, metu sanguinis profusionis,
ut uerisimile est, ferramentis candentibus extremum ipsius a-
durebant: idem post scalpelli administrationē ægrum statim
in solum ligneum oblongum aquæ calidæ, ad septimum diem
usq; demittebant, quinquies per diē noctemq; id facientes, præ-
cipue in pueris: resq; ipsis mirificè succedebat. nam absq; in-
flammatione secabant, & uincula unā cum partibus constri-
ctis illico decidebant: interim uerò dum ægri lauabant, prædi-
ctis superfusionibus utebantur. Alius quidam præter commea-
morata omnia, per id tempus etiam pipere ex oleo trito spi-
nam ipsorum dorsi perfricabat.

De bubonocèle, hoc est inguinis ramice. Cap. 66.

Inguinis ramex, intestini herniam ex laxatione natam præ-
cedere consuevit. exterso nanque primum peritonæo, laxa-
tum intestinum ad inguina delabitur, inibiq; inguinis ramicē
conficit, cui malo uetustiores eiusmodi scalpelli operam adhi-
bebāt, postea quā inguina intumescencia transversa incisio-
ne trium digitorum longitudine aperuerant, membranulasq;
& pinguedinem exemerant, peritonæo denudato, ea in parte
qua fastigiatur, mucronem specilli imprimebant. is enim in-
testina sursum repellit, duasq; peritonæi partes, quæ utrinque
à specillo exurgebant, suturis inuicem committebāt; mox mu-
cra

crone extracto, neq; peritonæo præciso, neq; testiculo exempto, neq; alio quopiam facto, præsidio cruentis uulneribus dicto, curabant. Quoniam autem recentiores in huiusmodi uitijs adustionē anteponebant, hanc quoq; opportunè trademus. Homo igitur post moderatam motionem paulo uolentius tussiat, ac spiritus retētionē intendatur. Vbi tumor in inguine apparuerit, locum qui aduri debet, atramentū scriptorio, uel collyrio triangula figura notabimus, transuersam lineā superius ad inguinis situm ducentes, puncto in medio triangulo signato: ægro deinde reclinato candens ferramentū medio illi puncto imprimemus, primū clauī, deinde lateribus triāguli ad Γ Græcæ literæ figurā. Postremo ad laterculi aut lēticulæ instar factis cauterijs, totū triangulū cōplanabimus, famulo per totam adustionem saniem panniculo extergente: tam altè adurētes, quoad in mediocris habitus corporibus adipē attingamus. Neque enim gracilibus propter siccitatem puncto illi ferrum imprimendum est, ne fortè imprudentes peritonæum aduramus: neq; etiam nimium obesis ac pinguioribus, in quibus etiam uel ante iustam adustionem pinguedo occurrit. Vbi sanè, ut medio crē adustionis habitum inueniamus, artificiosa cōiectura opus est. Secundum ustionē porrum cū sale tritū crustæ imponitur, et inguinale ad X literæ Græcæ figurā ligamēto utamur. Sequentibus diebus medicamētis quæ crustā adimunt, puta quæ ex lēticula et melle cōstāt, et id genus alijs curationē absoluemus.

De scroti laxatione, quam rhacosim dicunt. Cap. 67.

Quando scroti tergus sine interiorib. suis partib. laxatur, quitiū maximè indecorū, quod Græci rhacosim nuncupāt, euenit. Leonides itaq; resupinato homine, superuacanea scalpello super tabulam quandam, aut durū aliquod corium, excidebat, orasq; plagæ suturis cōmittebat. Sed Anthyllus ternis post aut quaternis suturis adhibitis, superflua cutē forfice acuta uel scalpello abscondebat, suturisq; conglutinatam perinde atq; cruenta curabat.

Hb 3 De ratione

Quoniam nostræ artis consilium atq; unicus scopus sit, ut corpora ab affectione, quæ præter naturam est, in naturalem restituantur, contrariam eunuchos faciendi ratio professionem sortita est. Sed quoniam subinde præpotentes aliqui nos uel inuitos castrare homines cogunt, huius etiã rei modus compendiosè referendus est. Duplex igitur est: unus collisione, alter excisione absoluitur. Collisione hoc modo, pueruli etiam dum infantes, in aquæ calidæ peluim collocantur, ut in ea desideant: deinde ubi partes illæ eadem pelui fuerint remollitæ & relaxatæ, digitis testiculi premuntur, quoad dissipati euascescant, neq; sub tactum amplius dissoluti occurrant. Excisione uerò, in hunc modum: homine in sedili resupinato, laua manus digitis scrotum unà cum testibus comprimitur, scalpellò que admoto in rectum duas lineas, unam per alterum testiculum incidimus: ubi proruperint testiculi excoriati, sola tenuissima illa naturali uasorum continuitate relicta, execabuntur. Atque hæc castrandi ratio collisioni in eo præstat, quod qui collisionem experti sunt, uenerem nonnunquam appetere solent, parte testium aliqua, ut credibile est, in collidendo subterfugiente.

Hermaphroditum uerum ex hermes & aphrodites, hoc est Mercurij & Veneris compositione, appellatione sortitum est, ualde utrique sexui indecorum. Cum enim quatuor sint iuxta Leonidem ipsius differentie, tres quidem in maribus, una in mulieribus consistit. In maribus siquidem aliàs sub scroto iuxta interfœmineum, aliàs in medio scroto genitalis fœminei pilis obsiti forma conspicitur. Tertia uerò his accedit, in qua quibusdam per eiusdem scroti quasi muliebris pudendi rimam urina destillat. In fœminis uerò supra pudendum iuxta pubem mentule subinde species inuenitur, quæ tribus quibusq; eminentibus corporibus uno quasi cole, reliquis duabus

bus quasi testibus. Tertia illa, quæ uiris accidit deformitas, quæ per scrotum urina excernitur, cõclamata & immedicabilis est. Tres reliquæ curationem recipiunt, partibus superuacuis è medio sublatis, & aliorum hulcerum modo curatis.

De nymphe amputanda, & caudatione. Cap. 70.

Nymphe quibusdam supra modum excrefcit, & indecentem uerecundiam præ se fert: & quemadmodum nonnulli tradunt, aliquæ partes hac haud aliter atq; uiri arrigunt, & in uenerem ruunt. quocirca resupinata muliere uulscella nymphe superfluum apprehensum, scalpello excindimus: cautio ne diligenter adhibita, ne nimis altè excindendo penetremus, ne rhyadica affectio inde excitetur. Caudatio porrò quam cercofim dicunt, caruncula à locellorum ore propago quædam est, quæ muliebri genitale replet, interdum etiam instar caudæ foras procidit, nymphe modo abscindenda est.

De muliebrium locellorum thymis, condylomatis, & hæmorrhoidibus. Cap. 71.

Thymus tuberculum quoddam est, modò rubens, modò candidum, plurima ex parte dolore uacans, thymi corymbis similis. Condylomata uerò rugosæ quædam extuberationes sunt, quemadmodum hæmorrhoides, us quæ in sede cœuiunt respondentes, interdum etiam sanguinem profundunt. Omnes igitur huiusmodi in mulieribus excrefcunt, quæ sub aspectum ueniunt, inter deregendum specillo comprehensæ, semispathula ferramenti acie exciduntur. Et g illa leuigata, aut fistili lumine curantur: deligaturam quippe quæ lino fit, in his clariiores chirurgi non concedunt.

De muliebribus genitalibus imperforatis, & phimo. Cap. 72.

Genitalia mulierum compacta & imperforata, interim à natura, interim ex superueniente occasione, morbo aliquo præcedente, fiunt, quandoque in imo, quandoq; in ipsis alis, quæ Græcè pterygomata dicuntur, uel in medio etiam spacio, idq; uel ex natura, uel ex obstructione. Obstructio autem uel

Hb 4 carne,

carne, uel membrana fit. Hoc uitium in uenereo congressu, in conceptu, in partu, nōnunquam in expurgandis mensibus graue impedimentum adfert: si uidelicet membrana, uel caro totum obstruat. nam in quibusdam foramen in medio patefcit. Causa itaque inuenta, uel ex promptu, uel etiam dioptra, hoc est exploratorio specillo ad uulua aperiendam demisso, si quidem conglutinatio solum fuerit, hanc recta linea scalpello ad fistularem incisionem facto dissoluemus. Si autem distentio, hamulis iniectis medium corpus siue membrana, siue caro sit, eleuantes scalpello diuidemus: deinde sanguinis profluuio exicantibus sine rofione medicamentis represso, cicatricem inducentibus utemur, priapisco, hoc est linamento priapi instar facto, supposito: atq; hoc in his potissimum fit, in quibus non admodum altè scalpelli administratio est adhibita, ne particulae rursus cocant. Phimus, hoc est præclusio, in uteri ostiolo succrescens, pari modo curandus est.

De uteri abscessu. Cap. 73.

Vbi circa os uulue abscessus emerferit, qui manus administrationem queat admittere, non protinus ad incisionem festinare consilium est, sed propter uteri excellentiam quoad absoluta dispositio eius, audaciq; plurima parte inflammatio creuerit, superiectaq; humoribus corpora attenuata fuerint, expectare, tū deniq; ferrū tentare. Inter agendum igitur mulier in se dili resupinata ita collocanda est, ut crura ad abdomen femina inter se diuarcata cōtrahat, cubitiq; eius poplitibus subycientur, ac uinculis accommodatis ad ceruicē deligabuntur. Tunc medicus ex dextra sedens, dioptra ad ætatem accommodata explorabit. Conuenit autem specillo sinus muliebris profunditatem metiri, ne si longior dioptræ tibia fuerit, uulua compriatur. Quod si dioptræ tibia sinu amplior reperiatur, duplicia linamenta alis inferenda sunt, sic, ut super ipsa dioptra firmetur. Oportet autem dioptræ tibiam cochleam habentem in superiora demittere, & dioptrā à medico cōtineri, cochleam uerò

però à famulo intorqueri, quo tibiæ compaginibus diductis, sinus muliebris distendatur. Si autem abscessus occurrerit, si mollis ac tenuis sit, quod digitorum attrectatione subsidet, iuxta uerticem spatula, aut scalpello incidendus est: deinde pure euacuato, implicitum in longitudinem linamentum mollissimum oleo rosaceo imbutum imponetur, uel potius extra plagam sinui muliebri leniter absq; compulso inseretur. Foris autem supra alas & pubem lumbosq; lana succida uel pura, oleo irrigua imponatur. Tertio post die mulier in hydrelæum calidum, aut maluæ decoctum insidebit, absterfis inde sudoribus. lemniscum tetrabarmaco per se, uel cum melle discocto in unguento plagæ, leniter insinuabis: tetrabarmacum uerò butyro uel rosaceo solutum esto. Cataplasmata extrinsecus superaccommodata sunt, donec inflammatio cessauerit, & huius expurgetur. Si autem difficulter expurgetur, auriculario clystere, uel iridis, aut aristolochiæ decocto, uel melle elui conuenit. Cicatrix postremo linamentis medicamento ex Cadmia uino soluta, imbutis inducenda est. At si intra os uulvæ abscessus constiterit, manus admouenda non est.

De fortium extractione & excisione. Cap. 74.

Vam accurata sit ægrè parturienti curatio adhibenda, Tertio uolumine tradidimus. Si autem ea ratione minus successerit, ad manuum & scalpelli operam meritò diuertendū, animaduerso prius mulieris affectu, num superstes futura sit, necne. Et si quidem salus speratur, manus præsidium aggrediendum: sin contrà, respuendum est. Quæ igitur exitium sui portendunt, ueternoso quodam torpore in somnum deferuntur, resolutæ sunt, & tanquam conclamatae difficulter reuocantur. Siq; clamoribus reuocatæ oculos sustulerint, imbecilliter muscitantibus rursus sopiuntur. Quibusdam etiam conuulsio et neruorum contractio superuenit, uel alimentum non sentiunt, pulsus admodum inturgescens, obscurus tamen & imbecillis deprehenditur. Quæ superstites futuræ sunt, nihil cuiusmodi pa-

Hb 5 tiuntur.

tiuntur. Resupinanda igitur in lecto mulier est, sic ut figura ipsius declinior sit, & crura sublata à mulieribus uirinq; aut famulabus aliquibus contineantur. Quarum si copia non sit, mulieris thorax uinculis quibusdam lectulo deligendus est, ne ad foetus attractionem sequens corpus robur eius proterat, ac refringat. Postea uulua alis per ministrum diductis, medicum leuam manum inunctam ualentibus digitis constrictis attenuatam in ostium uuluae inserat, ipsumque dilatet, et oleo infuso relaxabit, demissa manu inquirens, ubi uncus ad foetum extrahendum commodè inijciendus sit. Idonei autem ad infigendum uncum loci, si in caput conuersi deferuntur, sunt oculi, occipitium, os ad palatum, mentum, clauiculae, costarum et praecordiorum sedes. Si in pedes exeunt, ossa pubis, intercostalia & iugula: rursum deinde medicus uncum dextera manu continebit, flexura ipsius digiti occultata, sinistra manu paulatim intromittat, & alicui ex supradictis particulis, eum usque ad uacua infiget, tum alterum ex opposita parte inijciet, ne in alterum latus declinet, sed aequali libramento protrahatur. Deinde aequabiliter attrahere oportet, non solum recta, sed in latera etiam, perinde atque in dentibus eximendis fieri consuevit, neque inter agendum tensionem iterum remittere conuenit. Postea uero indice digito peruncto, uel pluribus etiam demissis, inter os uuluae & corpus inseritis, & orbiculatim circumactis, quasi excoriando resolvere. Si autem pro attractionis ratione uncus sequatur, erit subinde in superiores partes transferendus, quoad foetus perfecta fiat extractio. Si autem manus infantis porrecta fuerit, neque propter angustiam repelli queat, panniculo aliquo circumposito, ne dilabatur, modicè protrahenda, prolapsa que, tota ab humero abscindenda est. Idem si utraque prociderint, faciendum: simili etiam modo pedes procidentes reliquo corpore non consequente, ab inguinibus amputari debent. Tum reliquum corpus dirigere tentabimus. Ac si caput iusto maius, angustiasque facit,

acit, & hydrocephalus est infans, spatha polypica, uel scal-
ello, uel aculeato cultello inter digitos occultato, caluariam
ius incidimus, ut tumore exinanito concidat. Quod si natu-
raliter caput tam amplum sit, caluariam similiter forcipe-
lentibus aut ossibus extrahendis dicata, confringimus. Si ossa
liqua immineant, hæc quoque eximuntur. At si caput ad tho-
racem protrahum impediatur, partes circa clauiculas eodem
instrumento usque ad interiora secantur, ut humore effuso tho-
rax extenuetur. Sin minus, clauiculæ etiam ipsæ præciden-
tæ atque extrahendæ sunt: tunc enim concidat necessum est.
Quod si abdomen è mortuo fœtu, aut aquam subtercutem ex-
serto, inflatum deprehenditur, unâ cum interaneis eadem
atione ac uia euacuandum est. Si in pedes deferuntur, ad os
ulnæ inclinatio non difficulter dirigitur. at si thorax uel i-
nus uenter obstructionem præbeat, linamento circumposito
atrahantur: atque eodem, quo dictum est, modo, ea quæ ambia-
nt, findemus. Si uerò reliquis omnibus partibus detractis, ca-
ut solum reuersum altius inhaerit, & firmitus retineatur,
nec&am manum sinistram ad os uteri, si pateat, deorsum in-
iundum transferemus, caput' que inuestigatum ad ostium ip-
um digitis deuoluemus: deinde uno aut altero unco infixio pro-
pter hostioli inflammationem nullam uim adhibebimus, sed in-
fionibus pinguibus & copiosis, in seßibus, insperſionibusq;
utemur, sic, ut aperto uteri hostiolo aptè, quemadmodum
uperius demonstratum est, queat extrahi. Cæterum trans-
uersus infans, siquidem dirigitur, præfatis rationibus eximen-
lus est. Sin minus, concidi inius & particulatim educi debet:
cura adhibita, ne qua particula ipsius nobis nesciis inius relin-
quatur. Post manus scalpelli' que administrationem obitam,
præſidijs inflammationibus uteri dicatis utendum est.

Si uerò sanguinis profusio euerit, etiam
huius curandi rationem superius
traditam accepisti.

De secundis

Vbinde usuuenit, ut foetu extracto, inuolucrum ipsius (quæ etiam secundas appellant) in utero firmiter retineatur. Diducto itaq; uteri osculo, secundæ inibi relictæ, aliquo in loco globatim conuolutæ, faciliè educuntur. Læua siquidem manus calefacta, unctaq; in anum uulua demissa, secundæ sublabantes eiciuntur. Sed si in fundo uteri adnatæ hæreant, manus similiter demittenda est, & apprehensæ attrahendæ sunt, neque in rectum tamen, ne uterus procidat, neq; uiolenter admodum sed leniter prius in latus huc illuc agitandæ, tum aliquantulum ualentius excutiendæ. Hoc enim pacto à connexu absolutæ si quuntur. Quod si uteri orificium connueat, easdem medela quas ad hoc recensuimus, adhibere conuenit. Si uires infirmæ non fuerint, cientibus sternutamenta & aromatum suffitu efficiili utendum. Et si os uteri hauerit, manu inserta, secundæ eodem modo educere conabimur. At si neq; ita eximi queant non opus est negotium ægrotanti ulterius facere. Nam secundum paucos dies tabefactæ, & in saniem resolutæ, ultro excidunt. Quoniam uerò odoris grauitate caput aggrauant, et stomachum euertunt, suffitus ad hoc facti adhibeantur: quo in albo cardamomum & ficus aridæ maximè censentur.

De coxarum adustione. Cap. 76.

Vbinde atq; humerus, sic etiam coxendix, madoris nimietate prolapsus, in quibusdam adustionem efflagitat. Id quoque Hippocrates hac sententia asserit. Quil us coxendix ex diuturno suo cruciatu excidit, crus tabescit, & claudicant, nisi iustionem experiantur. Oportet itaque eo potissimum in loco adustionem moliri, è quo articulus excidit. si enim redundans humilitas exiccabitur, & locus ex cicatrice inspissatus, os amplius minime suscipiet, quocirca longè altius adurendum est. Recetiores uerò treis adurendo crustas concitant, unā retro ad cavitatem clunis, alteram supra genu paululum extrinsecus, tertiam supra anteriorem malleolum, quæ est carnosior.

De fistula

De fistulis & fauis. Cap. 77.

Voniam locus iam exigit, ut de ani fistulis differamus, Quid absurdum fuerit, si prius generatim de fistulis omnis explicemus. Est igitur fistula sinus callosus, dolore aliquantulus carens, qui plerisque in particulis, plurima uero parte ex abscessibus parui dextere curatis, exoritur. Callus uero conacta quaedam caro est, candida, madore priuata, eoque indolens iam, neque uena neque neruo ad ipsam pertingente. Sinus modò uidetur siccus, modò uero humidus est. Humor interdum absque inflammatione fertur, interdum certis quibusdam temporibus intermittit, ore ipsius obstructo, iterumque diducto. Fistulae nunc uidemur in os, nunc in neruum aut aliquam aliam principem arteriam terminantur, uel rectae, uel obliquae, uel uno ore, uel pluribus peruiæ. Quae igitur in grandes arterias, uel neruos, uel tendines, commetatione dignos, uel membranam costis inuoluentem, uel aliam eiusmodi principem particulam deueniunt, ut nequaquam omnino, aut summa artificiosaque cautione et diligentia pertractandae sunt. Reliquis uero hoc modo manu operam admouebimus. Explorabimus primum, si rectae sint, operario: si obliquae, specillo flexili: cuius generis stannica, atque ex ære tenuissima. Quae uero bina aut plura habent oscula, quae specillo tentari non possunt, sinu per unum ipsius os angusto, ex clysteris in reliqua ora transitu facile animaduertimus, fistulam ne pluribus orificiis dehiscens, an plures sint fistulae. Facta eiusmodi notatione, siquidem in summo fuerit sinus, ingustusque, demisso specillo expandentes accommodata figura scalpello callum tollemus, uel unguibus, uel acie scalpelli deradentes. Sique partes superfluae latius diffundantur, circumadiungi debent. Sin autem non per summa transuersae feruntur, sed penitus recte tendunt, ubi quam profundissime potest sinus, fuerit diuisus orbiculatim, uniuersum callum excindemus. Si quid ex eo relictum fuerit, adurenti id medicamento consumeamus: si amplius cum sit, medicamento non obtemperet, ferramentis

mentis candentibus ei crustam inducemus. Quod si fistula os desinit, id quod integrum est, tantummodo derademus: si riem, aut aliam quandam corruptionem senserit, totum quod uitiatum est, excisorijs scalpris oppositis auferemus, prius opus sit, terebratione adhibita, siue ad perspiratum usque tantummodo, siue ad medullam usque uitium penetrauerit. At si aliquod caulium modo trauersim fractum emineat, serra secandum est. Binis igitur sumptis habenis, unam medio si ossi eminenti subiiciemus, ministroque intendendam porrigimus alteram quæ crassior est, uel è lana constat, simili modo cani, quæ ossi subiacet, medietate insertantes, et initia eius inhi comprehendentes, carnem per habenam deorsum trahi iubemus, sic, ut caro deorsum depressa, lacerari à serræ dentibus nequeat. Et isto nos pacto excretionem molimur. Vbi uero præcipua aliqua pars subiecta est, ueluti membrana costas si cingens, uel spinalis medulla, uel tale quippiam dum os excidimus aut ferramus, quæ pelliculam custodiat lamina subiicienda est. Sin autem os uitiatum non sit, totum uerò circuletim carne denudatum sit, nihilominus eodem modo deradetum seu amputetur. Fieri enim non potest, ut ossa orbiculatim carne spoliata, eadem amplius obducantur. Pari modo si ossis extremitas iuxta articulum corruptionem experiat, serra secanda est. Si totum sæpenumero os, uerbi gratia, cubitus, radius, tibia, aut id genus aliquod uitiatum fuerit, totum amputetur: femoris autem capiti, aut coxæ, aut dorsi uertebrae, etiam si uitium acceperint, ob præsens tamen quod ex adiunctis artibus accidit periculum, cuiusmodi manuum operam admoliri recusabimus. Hac igitur ratione ac uia agendum est, ut in singulis ubique partium affectionum situs, uicinitatis et cognationis item morbi magnitudinis et uirium laborantis rationem habeamus. Iam uerò fauus cum sinus sit fistulosus, mellea diffuens humiditate, easdem quæ fistulae et alij sinus cum manu tum, tum medicamentori in suppetias effragiat.

De an

Edis fistulae ita sunt rimandae. caecis nullo ore apparente cruciatus accidit, et purulentus quidam humor ex ano proluit. Plerisque abscessus quoque notae praecesserunt. euidenter coparium specillum uel seta porcina demissa arguit: instrumentum quippe ad ima, donec inanem locum offendat, in eis penetrat, digitoque indici per anum transmissio occurrit, fistula nimirum interiore parte perforata. Nam si perforata non sint, instrumentum digito neutiquam citra medium occurru, sed per medium imperforati corporis sentitur. Oblituae et labyrinthi modo tortuosae inde cognoscuntur. Quod instrumentum iniectum paululum procedat, pus tamen ad illarum portionem copiosum fertur. At quae prope intestinum endunt, inde deprehenduntur, quod interdum et lumbrici, et stercus per os erumpat, atque omnes fere callum quendam in orificio praefertunt. Quae porro uesicae ceruicem perforauit fistula, uel ad femoris articulum, uel ad rectam intestinum endit, nulla medicina periculo subtrahit. Quae uero orificio caret, et quae abdita est, et in os terminans, et multiphasiam fistulae, aegre reliquae in uniuersum facile curationem recipiunt, manuum opera hunc in modum adhibita. Resupinato homine sic, ut cruribus sursum porrectis, femora ad uentrem inclinet, perinde atque in ijs quibus infusum alio immittitur, fieri consuevit. si fistulae extremum in summa cute terminabitur, specillo per os subiecto, simplici linea cutem excidimus. Si profundè in anum fistula tendat, demisso simili modo per orificium specillo, siquidem perforatam ab altero ipsam inuenimus, alterius manus, quae affixo annulo opposita est, indice per anum immisso, scalpellum initium apprehendentes, et paululum recuruautes, foras educimus: et quicquid specillo incumbit, simplici diuisione aperimus. At si perforata nondum fuerit, in aliu uero ani dextra terminetur, et caput specilli, tantum nobis sub squamea quadam, aut membranae cute digito indici sublabatur, specilli mucrone uolentius impulsio perforabimus, traie-

traiectoq; per sedem specillo, rursus scalpello corpora modo prædicto resolvimus. Si igitur terebræ aut falcule fistulis secandis dicatæ, mucrone sinus fundū in ano perforauerimus, eodemq; instrumento per anum traducto, totum id quod in medio est falcule mucrone defecabimus, & post excisionem uulSELLA uel forcipe omnes quæ ambiunt partes (sunt autem calli) ex toto adimendæ sunt, ubiq; uitantes ne musculum constrictorium, qui sphincter appellatur, offendamus. Nonnulli enim dum imperitijs minus altè incidunt, ipsum uulnerauerunt, atque ex eo inuoluntaria stercoris eiectione euenit. Vbi uerò quispiam meticulosior ferrum recusauerit, Hippocratica deligatio adhibenda est. Præcipit enim Hippocrates, linum quintuplex crudum, specillo perforato insertum, per fistulam demittere, innexiq; inter se initijs constringi, donec totum quod inter duo ora superiacet, dissectum, linum eructet. Quod si id designare detrectet, linum ipsum psara, uel eiusmodi quodam arido illinendum, & ultro citroq; extrahendum. Sunt qui foramini fistulariæ falcule linum insertū eodem quo diximus modo propellunt, quod mea sententia non conuenit. Nam cum scalpelli operam fugere student, præterquam quod id non assequuntur, curationem prolixiorem consequuntur. De abditis porrò fistulis Leonides hunc in modum prodiit: Cum autē profunda fuerit fistula, & sphincterem musculum forauerit, siue à sede incipiat, siue longius procedat, post notas indicatas, laxatorio instrumento dioptrio paruo muliebris sinus modo, anus distendetur. Cumq; fistulæ os apparuerit, specilli mucro in ipsum demittetur, in ipsumq; impelletur, supraq; ipsum semispatula aut spatula fistulis dicata diuidetur. Ipsi uerò cum in huiusmodi affectionem incidissemus, hac administrationis ratione uti minimè potuimus, eo quod fistulæ cuniculus sub aspectum uenire nequiret, quum esset inter anum & eius fibulam sphincterem appellatum, à dextra parte constitutus, & diductorium instrumentum operationem potius adumbrabat.

Caterum

Caterum distendentibus nobis cum digitis anum, rima quædam inter unam quandam rugam ani quasi fistulæ defluxio se obtulit, pus etiam per ipsam emanabat. Tentauimusq; per eandem specilli aciem in fistulam demittere, ceu ab ipsa manu ducti: deinde dextræ manus indice sphincteri immisso, medium quoddam tenue corpus inter digitum & instrumentum deprehendimus, quare cultello uiolentiùs digito adacto, fistulæ fundū sursum conuersum perforauimus, extractoq; specilli capite totum id quod inter duo fistulæ ora habebatur, sub aspectum nostrum uenit: dico autem, ab eo quod à principio ad humoris emissarium suum erat, & eo quod à nobis factum fuit, scalpello incidentes, specillum liberauimus.

De hæmorrhoidibus. Cap. 79.

Vum hæmorrhoidum notio ex ipso qui uacuatur humore conspicua sit, priusquam aggrediamur, copiosissimo infuso utendum est, quo & intestini retrimenta exinaniantur, & anus simul ad diuortium & exitum promptior reddatur. Collocabimus igitur ægrotantē supinū aduersus lumen lucidum, siquidem deligatione uti animus est, linum quinquies tortum ferramento, quo ora uenarum in ani corona uel uuas adurere consueuimus, labris hæmorrhoidum circumponentes, singulas hoc fune astringimus, una duntaxat relicta, qua sanguis redundans effluere possit. Idem & Hippocrates præcipit. Secundum uerò astringionem lintcolum oleo madens, & ligamentum sedi accommodatum adhibendum est, ægroq; quiescendum, oleo tepido, aut aqua mulsa ad uentris curationem utendum: cataplasmate item post hæc ex micis panis & croco, ubi hæmorrhoides exciderint, uino cicatricem inducimus. Leonides uerò deligatione non utitur, sed uulsella uua dicta, hæmorrhoidas ampliter prebensas, scalpello excindit. Post manuum administrationem, manna & amylo cum chalcitide, uel medicamento excremata spongia & pice, adq; absolutam aduersionem Faustino pastillo, utitur. Alij uerò infusus

li menti,

menti, quo uua aduritur, utriculis medicamento quod aduræ repletis, hæmorrhoidas perinde atq; uuam ufferunt.

De condylomatis seu tuberculis. Cap. 80.

Sedis condyloma loco solum ab eo quæ in muliebribus naturalibus suboriuntur, dissidet. Rugosum etiam ipsum anituberculum uel ex inflammatione, uel rima præcedente prognatum. Primò igitur tuberculum mox ubi occalluit, condyloma appellatur. Oportet igitur huic haud aliter atq; illis uulsella apprehensis, excisione, & crustam inducentibus medicamentis mederi. Rimas autem quæ ex duricie stercoris potissimum eueniunt, & cicatrice temporis spacio occallescentes, uel ungibus, uel scalpello perradentes, recentes faciemus, & ad cicatricem conuenienter perducemus.

De ano perforato. Cap. 81.

Infantibus recēter editis anus à natura imperuius interdum reperiatur, eo quòd membranæ obductione obstruitur. Hæc igitur digitis, si fieri potest, dirumpenda est: sin minus, scalpelli acie eam aperientes, uino curabimus. Quoniam autem adultis etiam subinde ex praua hulceris curatione anus conglutinetur, instrumento ad id factò coherentiam istam diruptam curabimus, fistula plumbea aut cuneolo quodam per totū curationis curriculum, ne rursus coeat, scitè imposita. Debet aut cuniculus medicamento prius, quod cicatricem inducat, oblini.

De uaricum excisione. Cap. 82.

Dilatatio quædam uenæ uarix est, nunc in temporibus, nunc in ima uentris parte sub umbilico, non rarò circa testes etiam, crebrius uerò in cruribus eueniens: hic sanè magna ex parte è melancholica materia originem trahit. Eorum igitur qui in testiculis insurgunt, administrationem, capite de uaricofo ramice explicauimus. Iis uerò quæ in cruribus oboriuntur, pari modo manuum operam admoiemur, ab interiori scilicet femoris parte, ubi etiam ipsorum origo in plurimum cernitur, auspicantes inferius siquidem in plures disperse si pre-

si propagines, impeditam tractationē exhibent. Homine ita
 quē prius loto, uinculum superiori femoris region inijcimus,
 & incedere præcipimus, uenam quē ita infartam attramen-
 to scriptorio, colliriōue iuxta uaricis situm, notabimus, di-
 gitis per longitudinem ternis, aut paulo amplius, interposi-
 tis. Reclinato postea homine cruribus extensis, altero supra
 genu uinculo deligamus. Turgescentem quē in fastigium ue-
 nam supra attramenti notationem scalpello scindamus, sic,
 ut cutem duntaxat scalpellum penetret, ne uenam incidamus.
 Deinde hamis plagæ oras diducētes, & membranas her-
 narijs specillis flexilibus exoriantes, uena undiq; nudata ex-
 plicata quē, femoris deligationibus solutis, uena quē ipsa per
 obtusum hamum suspensa, acum subter duplex linum tra-
 bentem transmittimus, lini quē sinum amputamus, & uena
 scalpello per medium dissecta sanguinis quantum opus est de-
 trahemus. altero deinde lino superiorem uenæ partem con-
 stringimus, crurē quē recto eleuato, manuum expressione, san-
 guinem qui in crure est, euacuabimus: deinde infra rursum
 uenam deuincientes, partem illam uenæ quæ inter duo uincula
 existit adimemus: uel relinquimus, quoad sua sponte unda
 cum uinculis excidat, & plaga uulneris linteolis siccis opple-
 ta, splenium æneleo madens superimpositum deligabimus, li-
 namento medicamine suppurationem inducente imbuto, cura-
 tionem prosequemur. Neque autem me fugit, ueteres non-
 nullos uinculis minimè esse usos, sed alios uenam carne indi-
 dem denudatum excindere: alios ab imo adhærentem uiden-
 tur extrahendo abrumpere. Atqui omnium tutior à me po-
 situs est manuum administrationis modus: uarices insuper qui
 imo in uentre suboriuntur, simili chirurgia tractantur. Illi
 utidem qui tempora infestant, ea ratione quam in capi-
 te super exemptione uenarum, angiolo-
 giam uocant, comprehendimus, eliduntur.

Super dracunculis sanè, quomodo maximū per medicamēta
præsidiū experiantur, quarto uolumine satis tractauimus.

Ex timore interdum corporis partes, uerbi gratia, manus aut
pes, eiusmodi putredinē experiūtur, ut ipsa etiā ossa corru-
pta, siue ex foris inchoante causa, fracta sint, siue ex præce-
dente putredinem experta, excisionem quæ serra fit deside-
rent, ante quā corpora ossibus circumiecta, primum incide-
re necessitas est. Quod dum primum fit, deinde longior in ser-
rando mora protrahitur, periculum est, ne sanguinis proflu-
uium sequatur. Merito Leonides non omnia primum corpo-
ra, nisi penitus putrefacta immortuaq; essent, excidebat. Sed
eam modo partem, ubi non plures esse uenas aut arterias opi-
nabatur, principaliter usq; ad os aperiebat: deinde os protinus
ipsum serra excabat, panniculo lineo partib. præcisīs super-
posito, ne serra per ipsas ultro citroq; tracta, dolores crearet:
deinde reliquū exciso ferramenti candentibus uasa adurebat,
& sanguinis fluore linamentis insertis represso, cōuenientem
deligaturam adhibebat, præsidioq; pus commouente curabat.

Pterygium in unguibus excrementia carnis est, partem un-
guis opperiens, tam in pedis quā in manus pollicibus po-
tissimum eueniens. in pedibus quidem, ex offensione ut pluri-
mum: in manibus autem, ex neglecta reduuia, cum inflamma-
ta, tum in pus conuersa, creatur. Siquidem pus cum inuetera-
uit, unguis radicem exedit, ipsumq; corrumpit, ac totum sub-
inde abolet, magnaq; ex parte mediam eius portionem omni-
no consumit. Iuxta unguis radicem particulam quandam pu-
trefactam, quandoq; totam radicem à rosione immunem relin-
quit: os etiam ipsum interim corrumpit, odor grauis sentitur,
digitus summo expansus ac liuidus cernitur. His in hunc mo-
dum manus admouenda est. Totam unguis partem reliquam
scal.

scalpelli acie subsecantes auferemus, deinde cauterijs exbulce-
ratam aduremus. Pterygium enim ex genere depascentium est,
quod nisi aduisione cohibeatur, continenter serpit: si negligat-
ur, totum digitum corrumpit. At si ossi et ungue integris, ex-
terior unguis angulus delitescens, carnem ipsi agnatam pun-
gat, inflammationemque excitet, oportet stimulantem unguis
particulam tenui specillo, aut tali aliquo instrumento subiecto
eleuatam, scalpelli acie præsecare, & quod eminet, aduren-
te, & crustas inducente medicamento consumere. Hac quippe
administrationis ratione plerique restituti sunt. Sin amplius fue-
rit quod eminet, primum id scalpello circumcidi, mox superin-
duci medicamentum debet.

De ungue colliso. Cap. 86.

Vando quidem sex penumero unguibus ex contusione colli-
quis, cruciatus comitantur, qui ad chirurgiam nos compelle-
lunt, abunde erit Galeni uerba hic apposuisse. inquit enim: In
unguibus contusis ipsa experientia liquidò edocti sumus, san-
guinis detractionem sopire dolorem, cum pulsus & cruciatus
intensissimi oboriuntur. Debet unguis non recta à superiore
parte deorsum uersus ad imam, sed obliqua linea acutæ aciei
scalpello incidi, sic, ut sanie excreta, resecta eius pars quasi op-
perculum quoddam subiacentium corporum efficiatur. Nam
si in rectum seces à superiore parte deorsum, qua carnis excre-
scentia unguem occupat, fit, ut subiecta ungui caro per medi-
am diuisionem excrescat, atque ingentes rursus inde dolores
non aliter quàm in paronychys nominauimus, pariat. Qua in-
cisione omnem prorsus ægro dolorem adimi cernes. Sequenti-
bus uerò diebus licet nobis succisam illam unguis particulam
leuiter attollere, uel unguis saniem excernere, ac rursus quasi
operculum quoddam subiectæ carni, quemadmodum memo-
rauimus, unguem imponere. Reliqua totius digiti
curatio, cum ad mitigandum, tum ad
discutiendum tendat.

Claui callus est rotundus, colore candido, clauiculi capitulum referens, in omni quidem corporis parte, sed in pedum plantis ac digitis præcipuè concreescens, dolorem functionisq; incedendi impedimentum adferens. Circumscarificatus igitur, uulsellaque apprehensus scalpello acutiore, aut phlebotomo, radicitus eximendus est. Nonnulli etiam, ne renascatur, candenti ferramento adurunt. Formica uerò cutis extuberatio quædam est parua, callosa, in orbem rotunda & crassa, latiori basi inhaerens, & in perfrictionibus sensum punctorum quarundam formicarum morsibus similem exhibet. Hæc etsi reliquum etiam corpus, plerunque tamen manus affligit. Quidam igitur, inter quos et Galenus existit, fistula durioris pinnae, cuiusmodi sunt ueterum gallorum, anserum, & aquilarum, in inum fortiter undique impressa, & circumtorta scarificare formicam præcipiunt, atq; ita radicitus tollere. Alij ænea, aut ferrea fistula idem faciunt. Recentiores contenti sunt, formicas scarificatas, specilloq; apprehensas, scalpello perinde atq; clauos excindere. Verruca uerò excrementia quædam exigua in summa cute est, indolens, callosa, in orbem magna ex parte circinata, basi angusta, ut suspensa uideatur. Nomen uerò huic inditum est acrochordon, quod chordæ summitati respondeat. Extensam igitur excrementiam amputamus: sin minus, lino aut capillo constringimus. Nec me latet plerosque esse, qui tam has, quam commemoratas omnes eminentias frigido, ut appellant, cauterio consumperunt.

De telis extrahendis. Cap. 88.

Quod ea operationis manuum pars, quæ de extrahitione iaculorum agit, perquam maximè necessaria sit, uates Homerus his uersibus testatur:

Vir medicus multis alijs æquandus honore est,
Seu iacula excindat, seu lenia pharmaca adaptet.

De tes

De telorum tamen differentia primum est dicendum. differunt inter se quippe tela, materia, forma, amplitudine, numero, habitudine, & potentia. Materia quidem, quod ea quæ bastilia uocantur, alia lignea sunt, alia harundinea: ipsa uero tela aut ferrea sunt, aut ænea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut uitrea, aut ossea, aut harundinea, aut etiam lignea deprehenduntur. Tanta quippe differentia potissimum apud Aegyptios inuenitur. Forma autem, quoniam alia teretia, alia angulata, qualia sunt triangula: alia cuspidata, quæ & Gonchota appellantur: quædam tricuspidata, quædam spiculata, quædam spiculis carent. atque spiculatorum, alia retro uergentibus spiculis munita sunt, ut dum extrahuntur, contra infigantur: alia antierius spectantibus, ut propulsata idem faciant. Quibusdam utroque uersum fulminis instar spicula extant, ut dum extrahuntur, dumque proPELLUNTUR, corpus lanient. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, quæ in impulsione contractæ, in extrahitione explicentur, atque ita telum educi prohibent. Amplitudo etiam uaria est: quoniam alia trium digitorum longitudinem implent, alia parua, ut unum digitum non excedant, quæ myia in Aegypto appellantur: alia media inter hæc reperiuntur. Numerus consideratur, quatenus quædam simplicia, quædam composita, tenuia siquidem ferramenta ipsis innectuntur, quæ cum in extrahitione delitescunt, in imo relinquuntur. Habitus forma quæ ea est, quatenus alia ferrum caudatum hastilibus infixum, alia hastile in ferri tubulum habent: ac quædam firmiter, quædam negligentius inserta sunt, ut dum euelluntur, intus separata remaneant. Potentia differunt, quatenus alia ueneno oblita, alia minimè sunt. Atque hæc telorum discrimina sunt. Locus nunc sermonem de extrahitione ipsorum postulat, siue in bello, siue extra bellum, sponte & inuito, quacunque de causa, & qualibet ex materia factis telis, quis uulneratus fuerit. Duplex igitur extrahendorum

telorum à carne modus est: unus per euulsionem, alter per impulsione[m]. ubi enim in summo telum impactum est, per euulsionem eximendum est; pari modo si altius infixum sit, opposita uerò pars, si aperiatur ex sanguinis profusione, uel ex aliorum membrorum consortio periclitantur. Propulsatu uerò utimur, cum & aliè inha[er]sit telum, & parum admodum carnis ex obiecta parte superest, neq[ue] præterea neruus, neque os, aut tale quippiam diuisionem impediatur. Osse autem uulnerato, telum euulsorio modo eximendum est. Si igitur telu[m] in conspectu fuerit, indidem statim extrahendum: si lateat, ita Hippocrate autore faciundu[m] est. uulneratus, si modò poterit, in e[ss]e statum figurandus est, in quo erat cum uulnus acciperet: si nequeat iacens, saltem quatenus licet ad eam figuram collocandus est, specilloq[ue] explorandum: et si carni inhaereat telum, manibus extrahemus, aut eius impositorio quod etià attractio appellat[ur], nisi exciderit quod ligneum plerunq[ue] esse consuevit. nam si excidat, forcipe dentibus uel radicibus eorum euellendis dicato extrahuntur. uel telorum extractorio, quod belulcum uocant, & alio quopiam instrumento ad id idoneo extractio molienda est: nonnunquam etiam carnem prius incidentes si uulnus instrumentum non admiserit. Quod si etiam in opposita telum processerit, neq[ue] possit ab ea parte qua infixum est, eximi, scalpello ab aduersa parte diuisa educendum est, uel euellendo, ut dictum est, uel protrudendo: uel instrumento propulsorio, si exciderit, demisso, ita, ne uel neruus, uel uena, uel arteria, uel tale aliquid incidatur. Turpe siquidè est, in extrahendis telis maiorem noxam, quàm tela effecerint, inferre. Si telum sit caudatu[m], quod specillo deprehenditur, propulsorii instrumenti fœminam, si tubulum habebit, marem demitemus: atq[ue] ita ferrum inserto instrumento propellemus, donec educi possit. Si telum exemptum crenas quasdam habere conspexerimus, in quibus alia tenuia ferramenta potuerint inferri, specillo rursus immisso, si quid fuerit inuentum, simili ratione auferre.

auferemus. Si autem telum spiculis in oppositum uergentibus munitum, ut solet, non sequatur, uicinus ei locus incidendus est, nisi necessaria aliqua contigua pars impediatur, denudatumque telum liberantes, absque uulsiōe tollemus. Nonnulli uero exiguā arundine cuspidibus tectis, nequid lacerent, ita telum euellunt. Quod si uulnus inflammatione caruerit, suturis usque, medicamento cruentis dicato curandum est: infestante autem inflammatione, fotu, cataplasmatibus, et cōsimilibus ei medebimur. In quibus autem uenenato telo uulnus inflicturn est, totam si fieri potest, carnem à ueneno mutatam præcidemus. ea facili cognosci potest, quoniam à sana carne differt: perpallida enim ac subliuida, quasiq; emortua conspiciuntur. Ferunt autē Dacos et Dalmatis cuspidibus elenium & ninum appellatum oblinire, quæ cum sanguine in uulnere commixta, interimunt: gustata uero, nihil nocuementi ipsis adferunt. At si telum ossi infixum sit, specillo rursum tentabimus: et si caro impediatur, hanc adimemus, aut diducemus. Si altius defederit, quod cognoscimus, si infixum telum nulla ui commoueatur, labatque, ossis partem circumicendam scalpris conminuemus, circumcirca loco terebrato, maxime si os crassum sit, telum dissoluemus. Si porro pars aliqua princeps icta sit, puta cerebrum, cor, guttur, pulmo, iecur, uenter, intestina, renes, uterus, aut uesica: sique letales notæ extent, neque sine cruciatu & magna uulsiōe queat fieri extra dno, manum admoliri recusabimus, ne præterquam quod nihil sumus profecturi, maledicendi & uituperandi occasionem idiotis exhibeamus. Quod si exitus fuerit incertus, præfati periculum manum admouebimus. multis etenim accidit, ut abscessu quoque in aliqua uitæ necessaria parte oborto, præter opinionem salutem consecuti sint, cum & iocinoris fibra & omenti pars aliqua uel abdominis membrana, quinetiam tota uulua sæpenuero adempta fuisse sine mortis periculo perhibetur. Guttur etiā subinde in anginis de industria inciditur, quemadmodum de gutturis sectione dicebamus. Si igitur in huiusmodi

telum relinquatur, in praesentaneam mortem praecipitat, & praeter quod haec ars ab omni humanitate aliena assimilatur, mors etiam certa sequitur: si eximatur, fortasse salus quae comitetur. Principum membrorum uulnerationem agnoscere difficile non est, ut quae ex accidentium proprietate, retrimentis, & loci affecti positura, deprehendatur. Vulneratis enim cerebri membranis, dolor capitis ualidus, oculorum incensio cum rubore linguae, & mentis error comitatur: si cerebrum quoque ictum sit, homo subito concidit, obmutescit, faciem peruertit, bilis uomitus, & sanguinis per nares auresque eruptio sequitur, albus insuper humor, & pultaceus per aurem emanat, sanies per uulnus, si exitus detur, profluit. Si in uacuas thoracis partes telum defigatur, si spaciosum sit foramen, spiritus erumpit. Si cordi impadum sit telum prope sinistriorem mammillam, id ipsum non uacuo loco, sed quasi ab altero exceptum apparet. Ac pulsatilem interim motum edit, sanguis niger, si exitum habuerit, effertur extrema frigescent, sudor promanat, animus deficit, & absque dilatione interitus subsequitur. Pulmone uulnerato, si latum intus spacium est, sanguis spumans per uulnus effluit: si non est, per os euomitur: uenae cervicis inturgescunt, lingua colorem mutat, aeger multum inspirat, frigidi appetens. Si septum transversum ictum sit, telum iuxta spurias costas infixum cernitur, inspiratio magna cum gemitu & dolore per totum humeri spacium oboritur. Si imus uenter uulnus accepit, ex ijs quae per plagam efferuntur innotescit: si spaciola laxitas est, uel telo exempto, uel impositorio intus fracto, succus ex uentre redditur, ex intestinis sterminus egreditur, quandoque etiam omentum uel intestinum procidit. Vbi autem uesica uulnerata est, urina ex plaga descendit. In cerebri igitur aut membranarum eius uulnere, caluaria undique terebrata, telum educitur: perinde atque in capitis fracturis propediem dicitur.

Cum thorax percussus est, nisi telum per moderatam intercostalium

Italiū incisionem sequatur, uel etiam una excisa costa, subie-
cto membranæ custode lamina, telum extrahendum est. In
eundem etiam modum in uentre, uesica, et reliquis quæ in imo
sunt particulis, si telum sequitur, citra negotium educitur: sin-
minus, rursum plaga facta curationem quæ cruentis congrue-
it, adhibebimus. In uentre si opus sit, etiam eius suendi ratio,
qua de suprâ comprehensum est, accommodabitur: sed quum
in grandiore aliquo uase, uerbi causa, in intimis iugularibus,
aut soporarijs, aut magnis arterijs quæ sub alis, aut inguini-
bus telum defixum, periculum sanguinis profluuij, si extra-
batur, minetur, debent uasa prius ex utraque parte funibus
constringi, deinde teli extractionem moliri. Quod si membra
compluria connexa inter se telo traiecta fuerint, exempli gra-
tia, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito alicui alteri
corporis parti, uel cruribus inter sese, siquidem non per to-
tum utrumque membrum telum penetrauerit, aut hasta, eam
ab exteriori parte apprehensam, non secus quàm in uno fic-
ri consueuit, euellemus. Si utraque totaliter penetrauerit, me-
dium lignum prius serra in duas partes rescatum, eas quàm
facillimè sigillatim extrahimus. Quoniam uerò etiam lapi-
des sæpe & buccinæ, uel plumbeæ glandes, uel similia quæ
dam fundis eiacularata, tum ui, tum angulis quibus prædita
sunt, corpori intruduntur: cognoscenda autem sunt ea, quod
moles aspera & inæqualis, si contrectemus, subesse sentitur:
quodq; plaga non omnino recta, sed amplior, caro item con-
tusa ac liuida apparet, dolorq; cum grauitate infestat: cuncta
hæc uncis, aut calyculis, aut uulnerario specillo agitata reci-
pienda sunt. Extrahi, si fieri potest, etiam forcipe dentaria,
aut radicibus dicata, debent. Multis autem infixæ tela intus
latent, quæ uulneribus cicatrice obductis, deinde
de multo post tempore abscessu circum
eam partem facto & dirupto,
exilerunt.

De fræ

De fracturis, & quæ sint ipsarum differentiarum. Cap. 89.

Postquam de uitijs quæ in carne manus ferriq; præsidium
efflagitant, abunde docuimus: consequens est, ut de ossium
etiam fracturis, & luxationibus inquam, uerba faciamus, si
quidem & ipse ex eo genere sunt, quæ manuum operatione
subiiciuntur. Et iam à fracturis sumamus principium, atq; alijs
præcipue quæ in capite fiunt, partim quod medium hæc uer-
ter eam quæ in carne, & eā quæ in ossibus sit chirurgiam lo-
cū obtinet: partim quod caluaria omnes alias partes præce-
lit. Fractura igitur, uno uerbo, ossis est diuisio, aut ruptura, aut
discissio, à uiolenta quadam extranea occasione inducta. Cum
plures sunt differentiarum. alia siquidem raphanatim, alia scan-
dulatim, alia unguatim, alia farinatim, alia iuxta refractionem
& abscissionem quoq; fieri perhibetur. Raphanatim quidē ru-
ptura ossis est, transversim per crassitudinem facta, quæ etiam
cucumeratim & caulatim, à fractorū cucumerum et caulū si-
militudine quibusdam nuncupatur. Scandulatim uerò ossis as-
sulatim in longitudinē scissi ruptio est. Unguatim ruptura os-
sis quedā est, quæ parte aliqua recta, in fine lunata efficitur,
quam etiā hirundinatum nonnulli appellant. Farinatim ruptu-
ra ossis est, cū id in multas minutim partes finditur, quæ ipsa
nucatum appellatur ab aliquibus. Refractio autem abruptio
est, partis alicuius ossis per summitatis rupturā detractio, sic
ut ablatum supernatet, atq; hæ fracturarum sunt differentiarum.

De fracturis in capite. Cap. 90.

Fractura in capite priuatim caluaria est diuisio, quandoq;
simplex, quandoq; multifida, ab exteriori quadam uolentia
inducta. Quæ hisce constat differentiis, fissio, excisio, effractio,
siue expressio, desessio, quæ engisoma, quasi corporum appro-
pinqvationem, dicunt: cameratio, & in infantibus contusio.
Fissio igitur caluaria per summa est diuisio, uel etiam altior,
in qua ad exteriorem partem ossis offensi nulla fit commotio.
Excisio, caluaria cum refractione ossis uitiati diuisio est: quod
si offensa

offensa pars à reliquo osse discesserit, dedolationem, apocri-
 nismon Græci nuncupant. Expressio est in multas calua-
 re partes effractio, in qua fragmēta quædam ossium profun-
 us delapsa, cerebri membranam premunt. Desessio, quæ ex
 soma uocatur, caluaria idus est, in quo os offensum à natu-
 ali situ ad cerebri membranam desidit. Cameratio caluæ est
 uisio, in qua partes ossis affecti cameræ modo eleuatæ incur-
 untur, autore Galeno, & ad interiora recedunt, & concaui-
 tes faciunt, ueluti in ecpiemate: sic enim ille autumat. Sunt
 in his etiam capillationem adnumerat. Est autem capillatio
 rarissima fissura, sensum plerumque fugiens, eoque subinde latēs,
 certam significationem non exhibet, mortisque causam adfert.
 Collisio uero thlasis appellata, ossis diuisio non est, eoque neque fra-
 ctura rectè dici potest, sed ossis caluæ ad interiorē partem im-
 pulsio & quasi inflexio, citra continuitatis diuortium conca-
 uitatem efficit: quemadmodum in æneis coriaceisque uasculis,
 si foris percutiantur, licet cernere. Collisionis huius binæ ha-
 bentur differentie. uel enim os caluum per totam affectionem
 uiam colliditur, sic, ut frequenter cerebri membrana recedat,
 aut comprimatur à caluaria ex toto penitus: uel non ex toto,
 sed extrinsecus dūtaxat in densa superficie ad duplicationem
 usque deprimitur. Quidam his speciebus resonationem, ape-
 thema, quasi ab echo responsione dicas, addunt: quæ est, ut ipsi
 aiunt, à contraria idus parte facta caluariae ruptio, sed fallun-
 tur. neque enim perinde atque in uitreis uasculis, ita in capite,
 seu illi docent, fieri solet: illa siquidem uacua sunt, id patiun-
 tur. Caluaria autem undique plena, & alioqui solida est, eue-
 nit in hoc idu ut multis alijs in partibus, non solum ubi plaga
 conspicitur, ut cadendo fit, in quo integra cutis cōtinuitate fa-
 cto abscessu, sed eoque fissura in conspectum uenit, à contraria i-
 dus parte eam extitisse autumant. Ipsa tamen caluæ rimula,
 haud aliter atque superior curatur. Si igitur fractura capitis
 facta fuerit, cognosci poterit tum ex eius quod percussit cor-
 pore,

pore, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, & uiolento impetu impactum. Item ex ijs quæ isto homini superueniunt, puta uertiginibus, uel obmutescencia, uel subito collapsu præcipuè in Engisomate, uel collisione, uel expressione, uel in interiorè partem facta cerebri cameratione. Ex notis item sensui expositis id licet percipere. nam si cutis latior fuerit discissio, per ipsam manifestè cognoscemus: si autem non per totum plaga ierit, uel angusta sit, fradum tamen os esse suspicemur, aperta cute, partim oculis, partim specillo demisso explorabimus. Si aliqua alia fradura fuerit, extemplo deprehenditur: si autem fissio tenuis ac capillaris sensum fugiat, medicamento aliquo nigro, liquido, uel scriptorio etiam atramento superfuso, os rademus. ipsa nanque fissio nigra ostenditur: rasuraque tantisper insistendum est, quoad uestigium fissurae euanescat. Si ad cerebri usque membranam plaga peruenerit, omissa rasura utrum membrana abesse recesserit, an etiam dum affixa permaneat, considerandum est. Si enim manserit membrana, mediocris inflammatio uulnus affligit, æger feбри paulatim liberatur, & pus maturum apparet: si recesserit, cruciatus augentur, & feбри similiter, os alio colore tingitur, pus tenue & incoctum fertur: & si negligat medicus, nec statim perforatione utatur, grauiora his accidentia superueniunt. uerbi gratia, bilis uomitus, conuulso, delirium, & acuta febris, quibus manuum administratio recusanda est. At si his absentibus membrana non recesserit, fissio autem sola sit, etiam solo rasorio scalpro, quanquam in altum usque penetret, curari potest. Si autem ad laminam usque secundam (quam diploen dicunt) fradura descenderit, eo usque etiam deradendum est, uel os fradum, ut postea docebitur, detrahendum. Si in minutas partes os comminutum sit, etiam has accuratè instrumento accommodato similiter auferemus, etiam si membrana non abscesserit. Principio autem cum uulneratus in manus tuas uenerit,

hyems sit, ante decimumquartum diem: si aestas, ante septiesimum, omnino os summo studio detrahito, priusquam præfatio accidentia eueniant. Manuum autem curationem admoliri oportet in hunc modum: detonsis prius super uulnus capillis, binas lineas ad rectos angulos se inuicem ad X literæ figuram transuersum secantes, incidemus. quarum tamen alteram se conuenit, quam pridem acceperis: deinde in uertice quatuor angulos excoriantes, ut totum os quod terebratum est, nudum compareat. Si quidem sanguis fertur, linamentis posita madentibus, uulneri obiectis, comprimemus: sin minus, cicis. Post hæc linteolo plicato, ceneleo imbuto, superimposito, conuenienti deligatione utemur: postero die, nisi quid noui superueniet, quod præpediat, ossis uitiosi perterebratio agrediunda est. Collocato itaque homine in sedili, lecto uerouit uulnus desiderat, auribusque ipsius lana obturatis, et appulsus sonitu uexentur, uinculum aliquod uulneris sollemus, exemptis que linamentis omnibus, et spongia loco uniusque detererso, famulis mandabimus, binis ut fasciis quibusdam tenuibus circumpositis, quatuor cutis quæ fracturæ inuoluit angulos, attollant: et si quidem os ipsum uel natura, uel ex fracturæ uitio infirmum fuerit, diuersis inter se scalaris excidendum est: primum scalpris, quos Cycliscos dicunt, adhibitis, à latioribus auspicantes, ad angustiores subinle transientes: deinde specillis excisorijs sensim malleolo addatis, ne capitis concussione laborans molestetur. Si autem os ualidum sit, eo prius terebri genere quod mergi non potest, perforabis. (Eiusmodi uerò existunt, quæ paululum supra nucronem eminentias quasdam habent, quibus demergi in cerebri membranam prohibentur.) Postea scalprorum circumscriptione adhibita, os uitiatum, non totum simul, sed particulatim digitis, si quidem fieri potest: sin minus, dentaria, aut ossaria forcipe, aut capillaria uulsella, aut eiusmodi quodam instrumento, auferemus. Tantam autem inter foramenta spaciunarelinque

relinqui debet, quanta est mucronis specilli uel maximi longitudo: altitudo uero eò usque descendat, quo ad interiorē ossi superficiem accedat, diligenti cautione adhibita, ne terebra membranam attingat. Quam ob rem terebra quæ ad ossis crassitudinem accommodata fit, est sumenda, cum pluribus id genus ad hoc præparatis. Si autem caluariæ fractura dupliciter secundam uel laminam non excesserit, ad hanc etiam tantum terebra adigenda est. Osse iam exempto, asperitatem caluariæ quæ ab excisione prouenit, scalpro aliquo uel rasorio, uel excisório lauigabimus. Lamina tamen quæ membranæ custo est subiecta, & ossiculis, si qua ut par est, remanserint, aut spiculis diligenter collectis linamenta inferemus. Hic communis simul & expeditior, periculoq; uacans chirurgiæ modus est. Mirum etiam in modum à Galeno commendatur illa, quæ per lenticulatum excisorium scalprum fit, curandi ratio, si absq; terebratione post insculptionē caliculatis scalpris factam, adhibeatur. Tradit enim ad hunc modum: **V**bi autem unam semel partem denudaueris, scalpellus inijciendus est, qui in cuspidē lenticularem eminentiam retusam leuemq; habeat: aciem uero per longitudinē erectā, atq; ita lata lenticulæ parte supra membranam defixa malleolo adigendus est, caluariæq; ita diuidenda. hoc quippe modo agentibus, quæcunque desideramus eueniēt. nam et membrana etiam dormitante medico, uolari non potest, cum sola lata lenticulæ parte attingatur. Quod si alicui ossi adhæreat, sine ulla molestia resoluitur rotunda lenticulæ extremitate, quā ueluti præuid à tergo caluariam excidens scalper subsequitur. Proinde neq; tutiorē, neq; celeriorē perforandi modū hoc inuenias. Sed quæ ferris & modiolis instrumentis à recentiorib. perficitur, ceu noxia improbat ad ministratio: ad hæc, quam de fisione exposuimus, commendatur. idem uero modus ossa excidendi, reliquis etiam caluariæ fracturis conueniet. Quantum uero ossis excidendum sit, idem Galenus nos docebit, aperte ita perhibens: Quātum uero ossis uitiati

litiati excidere conueniet, deinceps explicabimus. Quod uehementer contritum est, id totum auferri debet: si uero ab ipso rimæ quædam ulterius excurrant, quemadmodum accidere nonnunquam assolet, non erunt ad extremum usq; persequenda: probe sciētes nullam, ex ijs noxam euenturam, si reliqua ritē fuerint administrata. Secundū manuum operam linteolo simplici, uulncri æquali, rosaceo imbuto mēbranam cerebri operculabimus, exiguumq; supra id lanæ floccum rosaceo similiter irriguum imponemus, deinde duplex linamentum cœncleo aut ipso etiam rosaceo madens toti uulncri superaccommodabimus, studiose obseruantes, ne cerebri membrana grauetur: postea latiore deligatura, neq; ea multum cōstricta, sed ut linamēta modō retineat, utemur. Viētus qui inflammationem sedat, & febrientibus peculiaris est, exhibetur, mēbrana cerebri subinde interim rosaceo madefacta. A' tertio die, resolutis fascijs, sordibusq; spongia deterfis, medicaminibus cruentis uulncribus dicatis, inflammationemq; rebellentibus utendum est, membranæq; aliquod ex cephalicis nūcupatis aridis, quoad carne oppleatur, superaccommodandum. Os quoq; interdum radendū est, si res id exigat, uel ob eminentes aliquas spinosas summitates, uel etiam propter celeriore carnis productionē. Reliqua insuper remediorum materies, perinde atq; in uulnrib. explicitū est, adhiberi debet.

De cerebri membranæ inflammatione. Cap. 91.

Vandoquidem autem sæpenumero post manuum & scalpelli operam cerebri membranam: tanta perculit inflammatio, ut non modō caluariæ crassitudinem, sed cutem etiam ipsius cum renitentia quadam trāsgrediatur, & naturali ita eius pulsatili motu impedito, compulsio potissimū, aliāq; grauiā accidentia, uel ipsa etiam mors subsequitur. Experitur autem inflammatio uel ob ossis spinosam quandam eminentiam pungentem, uel ob linamentorū grauitatem, uel propter perfrictionem, aut nimium cibi esum, uel uini potionem, aut alia

K k

quapian

quapiam incerta occasione. Siquidem ex certa & euidēti occasione proueniat inflammatio, ea confestim amputanda est: sin ex abdita & incerta, maiore contentione incumbendum est, sanguinis uidelicet dimissione, si nihil præpediat, et uictu ad inflammationem congruo. Localia insuper remedia adhibenda sunt, calidi nempe rosacei fots, & ex altheæ, aut fenogræci, seminis lini, chamæmeli, & similium decocto. Cataplasmata etiam ex cruda polenta, aut semine lini cum præfatto decocto, & adipe gallinaceo accommodanda sunt, fomentumq; ex lanis insuccatis, capiti, ad hæc & occipitio meatui que auditorio oleum aliquod inflammationem arcens instillabitur. Viscerum quoq; cataplasmatibus admotis, totiusq; corporis habenda est ratio, aquæ calidæ balneis & unctionibus, ut par est, adhibitis. Si his inflammatio non sedatur, & nihil obstiterit, bilem educente medicamento purgare ipsos Hippocrates imperat.

De nigrefacta cerebri membrana.

Nigrefacta porrò cerebri membrana, siquidē in summo ex medicamento aliquo in id efficaci nigruerit, tribus mellis partibus cum rosaceo miscentes, & linamenta superadaptantes medebimur, & reliqua etiam consentanea exhibentes. At si nigrities sponte inducta sit, & altius, præcipue cum alijs grauibus notis descendat, certè conclamatū est. insiti namq; caloris mortificationem insinuat. Notus autē mihi quispiam fuit, qui post annū quā affectus esset, caluaria exterebrata euasit. Erat enim fractura in syncipite ex sagitta illata, quæ emissarium habebat, per quod cerebri membrana inoffensa conseruata est.

De naribus fractis & contusis. Cap. 92.

Narium inferior pars, cū cartilaginosa sit, non frangitur, sed contunditur, sima redditur, et distorquetur. Superior uerò, cum osea sit, frangi quandoq; solet. In his deligaturam respuit Hippocrates, ut quæ resinum efficiat & distorqueat:
ni

nisi in medijs naribus ex appulsu quippiam emineat. tūc enim competentem deligaturam cum medicamēto imposito admittit, eo quod compressus ea parte nasus naturalem figuram recipiat. Collisis itaque inferiore parte naribus, indice aut minimo digito subiecto, extrinsecus in situm suum redigantur. In teriore sp. cilli nucleo oliuari idem faciundum est. Statim à primo die, uel non multo post. Quoniam decimum circa diem narium ossa indurescunt, forisq; indice ac pollice utrinq; conformare cōgruit. Vt autem formatio, quā instituis, figurā suam conseruet, duo intorti cuncoli ex molli panniculo naribus imponantur, unus singulis, etiā si altera tantum naris pars distorta sit: atq; y tam diu permitti di, donec os aut cartilago corroboratur. Nonnulli tamen pinnas asferinas panniculo cinctas naribus insinuāt, ut figura custodiatur, & respiratio minime impediatur: quod necessarium non est, cum spiritus per os trahi ualeat. At si nares inflammationē experiātur, emplastrum aliquod ex his quæ inflammationes arcēt, imponamus: uerbi gratia, quod ex succis constat, aut oxelæo, aut id genus quippiā. Vel cataplasmata ex triticea simila cum mahnna, aut gummi decocta superaccommodemus, quibus inflammatio arceatur, & nares continentur. Si in alteram partem nares distortæ sunt, Hippocrates post congruam conformationem oblongam habenulam digitali latitudine circūdari præcipit, alterum habenæ extremum taurino glutino aut gummi illitum summitati narium ex latere quo inclinant adglutinari: quod ubi exaruerit, habena ultra oppositam aurem occiput uersus & frontem ducta, demum sub altero habenæ capite affirmatur, ut retractæ in latera naris mediam figuram dirigantur, quod non admodum recentioribus arrisit. Si porro narium ossa minutim fuerint confracta, diuisio uel ampliatio faciēda est, fragmentis que ossiculorum uulsellis extractis suturis partes diductæ committentur, remediaq; conglutinantia cruentis dicata inycientur. Si autem inter

kk 2 nares

nares huiusmodi excitatum fuerit, huic linamenta in longitudinem implicita, medicamine delibuta medentur. Quidam etiam plumbeis canalibus quoad cicatrice obducta sanescat locus, uti consueverunt, ne ex huiusmodi caruncula aliqua superincrescat.

De inferiore maxilla contracta, & aure collisa. Cap. 93.

Super auris contusione, tanquam huiusmodi affectio inter fracturarum numerum non sit, tertio volumine traditum est. Maxilla autem inferior pluribus de causis rumpitur. Si igitur extrinsecus solum oblata, non cautim reuulsa fuerit sic, ut introrsum cauetur, eius expedita quidem est cognitio, sed alterius manu opus est. Si quidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si sinisterior, laeva. Indice igitur, et medio digito in os affecti coniectis, interiorem fracturam gibbum foras scite compellere competit, altera manu extrinsecus id excipiente. Maxillam uero in suam sedem restitutam, ex eiusdem dentium aequalitate coniungere oportet. Quod si in transversum fracta maxilla fuerit, primum quidem tensione, deinde retractione usus a famulo eam retro continente, quemadmodum relatum est, dirigitur. Dentes qui in parte contracta diducti sunt mutuo, ut Hippocrates quidem tradit, auro, hoc est auro filato, seu aureo lino, chrysolino uel chrysonemate nuncupato, deligendi sunt. Quandoquidem autem non cuius huius copia datur, lino aliquo ualido, uel bysso, & seta equina, aut id genus aliquo inuicem committantur. Quod si fractura cum hulcere contigerit, specillo explorandum, num qua ossis facta sit abruptio. Si qua exigua sit plaga fragmentis ossis siue unum, siue plura remanserint, idoneo instrumento exemptis, suturis plagam oras committimus, & medicamentum cruentis dicatum supra deligandum est. Sin autem citra huiusmodi fracturam constiterit, simplici tantummodo cerato maxillae superaccommodato, conuenienti deligatione deuincimus ad hunc modum. Fasciam medio in occipite collocato, habenula utrinque ultra aures ad summum mentum dispensantur, inde iterum ad occiput: mox inde sub mentum

mentum reuoluuntur, postea per genas ad sinciput, indeq; rursus infra occipitium distribuentur, ubi desinere deligationem oportet. Postquam alterum rursus uinculum fronti circumdatum, à posteriore capitis parte cōiungetur, ut omnes has prædictas deligationes cōstringat. Alij uerò leuem ferulā, quem admodum alij alutam paris longitudinis maxillæ imponentes, ut dictum est, deligant. Alij eo deligationis genere, quod phorbiam Græci, capistrum latini nuncupant, utuntur. At si utræq; maxillæ in summo mento ea in parte qua inter se coeunt, contractæ fuerint, manibus ambabus paululum inuicem diductis, prorsus ita inter se coaptentur, & dētes, ut diximus, aduerti deligentur, conuenientiq; deligatione adhibita, tenuibus cibis ac sorbitionibus ægrotantem uti præcipito, quoniam manducatio ipsi perniciosa est. Si quid loco suo motum esse uidebitur, tertio die resolues, ac iterum deligabis: atq; ita tam diu facies, quoad callus concreseat. Maxilla uerò quoniam laxa ac medullosa existit, intra treis potissimum septimanis callo glutinatur. Quod si inflammatio aliqua accesserit, nihil neque ex fomentis, neque ex cataplasmatibus aduersus hanc idoneis prætermittendum est. Id quod in omnibus ex æquo obseruandum esse ducito.

De fracta clauicula.

Cap. 94.

Clauicula quæ iugulū dicitur, naturali situ, interiore suo capite pectori cōmittitur, exteriori humeri articulatione to innectitur: eoq; si humerum uel etiam ipsum brachium sustineat, si fracturam qualibet in parte experiatur, qua humerum suum spectat, magna parte infra interius extremum, à brachio tractū, inclinatur. Satius autem est, caulatim potius quam scandulatim, seu harūdinatim clauiculam frangi, plurimorum opinione. Nam quod transversim fractum est, facile extensione & digitorum compressione in naturalem sedem reuertitur, reliqua semper quid eminentiæ habet, quod ægre coaptari potest. Si igitur per totam crassitudinem quocunq;

Kk 3 modo

modo fracta sit, duo famuli, alter ad humerū, qui fracta clavicula adiacet, utrisq; manibus apprehensum, in exteriori simul & superiorem partem attrahat: alter oppositum humerum, uel certe collum reducat, ut extensionem molliatur: tum medicus suis digitis fracturam cōponat, prominentiora propellendo, ima foras attrahēdo. Quod si maiori opus retractiōne fuerit, orbiculo prægrandi ex panniculo aut lana præparato, uel eiusmodi aliquam turgidam molem alij subiciēs, cubitus aduerso lateri adigendus, reliquaq; ueluti relictum est exequenda. Si id fieri non possit, extremum iuguli iuxta humerum in imo situm ad summum, resupinato homine educemus dorso eius mediocri quodam puluillo subiecto, utrosque humeros deorsum ministro deprimente, quo in alto existens iugulos sursum reuocetur: deinde digitis conformanda fractura est. Si partem iuguli aliquam abruptam, loco suo dimotam ac pungentem percipiamus, scalpello contra incidi debet fragmenta que inde eximenda sunt, reliqua scalpris, si membrana custode lamina, aut alio scalpro quo firmari etus queat, ossi subiecto, complananda sunt. Si inflammatus defuerit, futuris: sin minus, linamentis utendum est. Et spinis diuersimode præparatis, maiora ex eis & crassiora a prominentis ossis inclinationem superaccommodabuntur. Si inflammatio urgeat, oleo madentia: sin aliter, sicca. Tum conueniente ex lana globo confecto propter alam subdite congrua deligatio facienda est, fascia per axillas, affectui iugulum, scapulasq; commodè circumducta. Si quidem par clauicula humero proxima, ad inferiora tetenderit, latior habenula medi ex parte cubiti gibbero subiecta, totum brachium ex ceruice suspendendum est. Altero uinculi dimidio manu etiam suspensa, quemadmodum in his fieri consuevit quibus sanguis à summa cubito detrahatur. Si superius tetenderit, quod rarum est, ommissa brachij suspensione, ager supinus collocandus est, tenui que uictu nutriendus. Aliquando etiam si opus

si opus est, asperginibus adiuuabitur, sed cum modo, usq; dum callum contrahat: uiginti namq; diebus ad summum clauicula ferruminatur.

De scapula.

Cap. 95.

Capula lata pars, qua mensæ figuram sortita est, minime frangitur. Iuxta spinam uero fracturam interdum admittit, nunc expressa, nunc simpliciter rupta, aliàs etiã abrupta. Expressionem igitur tactuprehendimus, cum sinus ea in parte occurrat, torporem uicino brachio & pūgentem dolorem inducit. Ruptio, ex loci asperitate si attrectetur, ex dolore cognoscitur. Vtrisq; autem curatione inflammationibus dicta subueniendū est: abruptio etiam ipsa tactu deprehenditur. Osse enim immoto suo loco quiescente, conueniēti fascia per se committitur: commoto autem eo, & carnem pūgente, per sectionem extrahitur: & sutura, ut dictum est prius, adhibetur. Vincula autem, hic etiam sicut in iugulo, inijcienda sunt, decubitus uero in oppositum latus congruit.

De pectore.

Cap. 96.

Media pectoris pars diuiditur & exprimitur, summumque ipsius etiam refringitur. Ruptione igitur distortam, dolor loci, inæqualitas & strepitus ad digitorum innixum, comitatur. Expressionem uero arguunt, dolor uehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana succingente dispuncta, interdum etiam sanguinis eductio, fracti ossis cavitates & conuexitates. Hic quoque curationem eandem, quam in scapula fracta tradidimus, adhibere conuenit. In expressione tamen modus reponendi iuguli, quod foras processerit, in interiorem partem, ab Hippocrate proditus, adhibendus est: per decubitus resupinatum, dorsoq; cervicali subiecto, scapulisq; depressis, ita, ut costæ manibus utrinque compressæ simul cogantur. Iam uero lana lateribus obiectis deligationem orbicularem adhibeto, subditis prius in rectum binis habenulis, quarum postea capita inuicem ad humeros fascijs excipiuntur.

kk 4 tur,

tur, quæ ne circularis illa fasciatio delabi possit, prohibeant.

De costis. Cap. 97.

EX costis quæ spathæ etiam nuncupantur, ossæ quidem una
diquaq; fracturam sustinent. Nothæ uerò in ea solum quæ
spinæ adiacet parte, quod ibi ossæ tantum; in exteriori parte
quæ in cartilaginem degenerant, colliduntur, nullam uerò ru-
pturam experiuntur. Notio ipsarum admodum expedita est.
inæqualitas etenim loci, strepitusq;, & ad partem fractam
peruersio, digitis explorantibus succurrit. Quod si interius
declinauerint, dolor acris pungitius urget, grauior sanè,
quàm qui in costis sentitur. quoniam hic aculei modò subcin-
gens membrana conuulnerratur, difficilisq; spiratio, tussis, sæ-
pe eruptio etiam sanguinis comitatur. Reliquas igitur oma-
nes costarum declinationes digitis componere licet, præter
eam quæ interius spectauerit, cū nulla intendi detur facultas.
Vnde uberioribus & flatulentis cibis quidam utendum præ-
cipiunt, quo ex uentris inflatione ac tensione fractura foras
propellatur, quod necessarium non est. Nihil enim commune
est, quantum ad hoc attinet, thoraci cum uisceribus nutritato-
rys: ut taceam interim, quod inflatio ex repletionem augetur.
Sunt qui cucurbitulam applicant: quod à ratione alienū non
esset, nisi corpora ex contractione humorū collecta, fractum
os interius magis propellerent. Quocirca Soranus sic tradit:
lanis oleo calido imbutis partes operiantur, deinde intercosta-
le linteolis implicitis impleatur, ut plana per orbicularem cir-
cūductum ueluti in pectore fiat fasciatio. Cuncta autem
perinde atq; in lateris dolore, pro amplitudinis ratione fieri
debent. Quod si necessitas aliqua compellat, ex nimia mem-
brana costis succingentis punctura, diuidenda eo in loco cu-
tis est, fractaq; costæ pars detegenda: deinde subiecta custode
tunica, ne ea feriatur, costam accuratè excindere, pungētiaq;
fragmenta educere expedit. Post hæc, si inflammatio desit,
coniungere, & cruentorū modo curare competit. Si inflam-
matio

matio adsit, linamentis oleo madentibus conteges, alimenta
& medicamenta quæ inflammationem arcent, exhibebis.
Decumbant ægri modo quem leuius perferunt.

De coxendicibus, pubis ossibus. Cap. 98.

Oxarum aut ilium ossa rarius quidem rumpuntur, sed
easdem quas scapulæ fracturarum differentias subeunt.
franguntur enim iuxta fines, & per longitudinem abruptun-
tur, & in medio finduntur, seu exprimuntur. comites ipsorum
sunt, dolor loci, punctiōis pulsusq; sensus cruris repentinus,
facta expressiōe stupor, adaptationem eadem cum scapulis
requirunt præterquam quod in abruptionem, incisionem, fra-
gmentorumq; exemptionem ob exteriorum corporum perie-
culū auersantur, ut quæ si opus sit, digitis coaptari possit. De-
inceps autem etiam aliam curationem moliri consentaneum
est, asperginibus utendo, & illorum cavitates linamentis du-
plicibus replendo, quo fasciatio orbiculariter æquabilis effi-
ciatur. Eadem de pubis ossibus dicenda sunt, cum nihil pecu-
liare habeant quod memoretur.

De uertebriis, spina dorsii & osse sacro. Cap. 99.

VertebRARUM noduli contusionem aliquando, raro fractu-
ram sustinent. Spinalis medullæ igitur membranulis com-
pressis, uel ipsa etiam medulla, nerui per consensum afficiun-
tur, & pernix obitus subsequitur, præcipue si iuxta ceruicis
uertebriis acciderit fractio. quare medici officium est, pericu-
lum prædicere. siquidem fieri potest, audere etiam: factaq; se-
ctiōe ossiculū, quod comprimebat, auferre: sin minus, aliqua
altem ratione qua arceatur inflammatio, malum lenire. At si
aliquis uertebRARUM processus, unde extuberatio ea quæ spina
propriè nuncupatur, constat, abruptus fuerit, quod digitis
tentantibus intelligetur, ossis fragmento promptius huc illuc
sublabante, motu ac transpc. situ. Oportet autē hoc quod fra-
ctū est, incisa foris cute eximere, suturisq; adhibitis, præsidio
vulneribus dicato adesse. Si uerò os sacrum fracturam expe-
riatur,

Kk 5

riatur, indice sinistrae manus digito in anum demisso, dextera manu fractura, quatenus licet in naturalem figuram componenda est. Si quid abruptum sentiatur, hoc quoque similiter per sectionem diuisum auferendum est; apposita fasciatio, cura ratioque adhibenda est.

De brachio. Cap. 100.

IN brachio fracto Hippocrates quidem intentionem ita instituit. Oportet, inquit, lignum praelongum columella instar, summis capitibus fune excoptum de trabe aliqua transversum suspendere: deinde collocato in alto aliquo sedili laborate erectius, uel ea saltē figura, quæ recta ceruice dormiendi occasionem prabet, quam orthocatheuton dicunt, manum ipsius unā cum brachio supra id lignum traducere, quoad medium ligni alae eius per transversum inseratur: manuum autem cubito ad rectum angulum inflexo, famulum procumbens sustineat: deinde pondere aliquo graui, uerbi causa, lapide, uel plumbo, uel istiusmodi aliquo, ex cubito suspensio, ita, ut sublimē depēdeat, sic fracturam conformare conandum est: uel famulus in poderis uicem brachium deorsum trahat. quidam etiam loco columellæ scalarum gradu usi sunt. Soranus uerō ita scribit: homine in sedili collocato, uel, quod præstat, resupinato, ne molestia afficiatur aliqua, manuque ipsius iuxta articulum quo cum brachio connectitur, fune deligata, & ex ceruice suspensa, ita ut angulosa figura seruetur, famulis duobus præcipimus, huic ut supra fracturam, illi infra, manibus correptum brachium in diuersa contendant. Quod si ualētiore opus sit extensione, duos æquales funes, unum supra, alterum infra fracturam brachio circumligabimus: eosque famulis alteri ad caput, alteri ad pedes ægrotantis consistenti præbentes, in diuersa distendere iubebimus. Quod si summus humerus fractionem patiat, mediam habenam, quæ ciria uocatur, alae subiectam minister à capite stans contineat, alter in oppositum trahat: atque ita, quemadmodum prædictum est, extensionem

extensionem in diuersa, quam antitofin dicunt, perficiemus. Quemadmodum si gibberus cubiti fracturam senserit, tum ipsi uel brachiali, quem carpum uocant, funis inijciendus est. Osibus iam prope compositis, distentio remittetur, sed iuxta legem Hippocraticam deligabitur. Si fractura inflammatione caret, & recens sit, nudis fasciis oblongis utendum est, trium aut quatuor digitorum latitudine, aqua aut posca irriguis. Si inflammatio urget, lanis tenuibus & mollibus oleo madesactis. Et si quidem in medio brachio fuerit latio, prior fasciatio supra fracturam inijciatur: ubi bis aut ter ligaueris, fascia sursum uersum uoluta, ut (quemadmodum tradit) sanguinis influxiones excipiantur ac desinant. Secunda porro fasciatio adhibenda est, quæ similiter supra fracturam orsa, per omnia eodem modo ut prior fiat, præterquam quod supernè deorsum tendere, atque iterum sursum debet, inibi que terminari: utraque tamen constrictio moderata, & ad nostrum sensum, & ad ægri iudicium esto. At si iuxta summum humerum fractio contigerit, prior fascia cum ipse humerus, tum scapulæ & pectus comprehendantur, ut deligatura gruuarum appellata fiat. Secunda ad cubitum usq; ducta, atq; inde item ad supraposita reducta, tam humero, quam scapulis & pectori, primæ fasciolarum similiter inijcienda est. Quod si cubitus fracturam acceperit, idem erit, ita ut anguli figura conseruetur, deligandus. Pari etiam in alijs quoque artubus modò, cubitis inquam, femoribus & tibys. nam cum fractura in parte uel iuxta etiam articulos, & non in medio membri deuenit, post articulum fasciatur. Recentiores igitur à fasciatione statim feculas superinijciunt, ita ut figura aptationis contineatur, asstringuntq; ipsas cum ad sensum, tum ad inflammationis tumorem. Prisci uerò post diem septimum serulas accommodarunt: intra enim hoc spacium inflammatione remittente, membrum tenuius efficitur. Quinctiam Hippocrates tertio quoque die ligamentis

ta res

ta resolui præcipit, ne si præter solitū diutius opertæ sinantur
particulæ, intendantur, uel dimoueantur: uel eius quod iam in-
fixum fracturæ sit, difflatio prohibeatur. Vnde non noxia si-
lum prurigo quibusdam obuenit, sed saniei etiam acrimonia
erosa, interdum in cute ulcus concitatur. Quocirca locus tan-
tum aqua temperata foueri debet, quantum ad saniem discu-
tiendam abunde uidetur. A septimo uero die ex maiore inter-
uallo resolucendum, tanquam particulæ saniem amplius ex-
cernere non gestiant, quin & in callum obduratio hoc pacto
melius prouenit. Ferulæ autem ad hunc modum injicienda
sunt: panniculos triplices oleo madentes fascijs circumdamus:
siquidem membrum crassitudine fuerit æquale, æqualiter:
si inæquale, ita, ut cauis partibus magis panniculis repletis,
membrum æquale undiq; ad suscipiendas ferulas reddatur.
Deinde lana aut stuppa ferulis mediocriter inuolutas fractu-
ræ orbiculariter circumdamus, nō minori quā unius digiti
spacio inter se distantes, leniterq; astringemus: cura diligen-
ter, quatenus fieri potest, adhibita, ne articulus aliquis, præ-
sertim iuxta interiorem flexus partem, attingatur. hulcera
enim in ipsis nonnunquam & neruorum inflammationes,
procreant. Sed laxiores illic esse conuenit, quemadmodum
& ualentiores in quam partem fractura inclinat. Sati-
us autem fuerit, ad thoracem brachium leniter deligare, ne mo-
tum de figura recedit: si quando inflammatio urget (quæ
ex ambiente tumore ac rubore, tū ex eo quod membrū nunc
multo magis quā prius coarctatur, colligitur) uel si confrac-
tum membrum distortum sit, & nihil horum cōpareat, sed
fasciatio tantū laxior, uel e contrario strictior, quā debeat,
inueniatur, resolutis his deligatio instauranda est. Supinus
itaq; laborans reclinandus est, manu supra stomachum posi-
ta, molli aluta brachio subiecta, ut infusiones excipiat. Inster-
gatur autem quotidie oleum calidum, præsertim si intesti-
nalis inflammatio. quo etiam tempore cibus tenuis exhibendus,
postea

postea plenior, ad calli generationem. Quiescendumq; donec
membrum confractum, callum obduxerit. occallescit autem
in brachium, quam tibia, intra quadraginta dies. Post quos
resolvendum est, & lauacro utendum, emplastrisq; ad fractu-
is accommodatis, reliqua curatio prosequenda. Hæc utique
administrationis ratio omnibus alijs ferme cōfractis artibus
p̄tine congruit.

De cubito & radio.

Cap. 101.

Ubitus & radius nunc quidem uterq; simul, nunc alter so-
lummodo frangitur, idq; uel in medio, uel in parte qua fle-
um spectat brachij, uel iuxta brachiale. Omnium potissimum
t, cum simul franguntur. Post hoc, si cubitus solus. Curatio
in facilius omnium admittit fractus radius. nam quamuis
aior cubito sit, habet tamen ipsum suppositum, in quo uelu
subsideat. At si alter ipsorum duntaxat comminutus fuerit,
in parte ualentioris intensionem moliemur. Si uterq; æ-
uali modo intendemus, inflexa manu ad angulum rectum,
ut pollex omnium digitorum altissimus, minimus contra-
gitus omnium infimus habeatur: sic enim cubitus quoq; radio
byciatur. Quod si potentiore intentione opus sit, utrisq; præ-
tim ossibus fractis, non manibus tantum, sed habenis etiam
tendere, ut de brachio relatum est, adgrediemur. Cæterum
mis deligatio, & reliqua præsidia uera, cum ferularum
iectione, usque dum ossa callus obfirmarit, adhiberi de-
nt. Firmantur autem cubiti ossa maxima ex parte triginta
rum spacio. Restauratioq; & collocatio eadem erit cum
quam brachium confractum uendicat, exceptis ijs quæ
i subiiciuntur.

De summa manu, ipsiusq; digitis. Cap. 102.

Alma & aduersa eius partis, digitorumq; internodiorum
ossa, quum rara fistulosaq; natura sint, collisionem quidem
plurimum, fractionem uero rarenter experiuntur. Labo-
re igitur in altiore sedili collocato, in aduersa quapiam al-
tera

tera sede æquali sedens, imperatoris munere, priusquam manum disponat, fungere: particulisq; con fractis per famulum extentis duobus digitis pollice nimirum & indice, pertractare prius ipsas atq; conformare, mox fasciationem adhibere eo potissimum tempore quo urget inflammatio. Nam propter raritatem facile in ipsis nimius callus superincrescit. Si inter nodium aut digitus simpliciter fracturam senserit, siquidem magnum, & qui pollex nuncupatur, fuerit, post convenientem deligaturam ad imam uolam, ut quiescat, scite deuinciendus est. Si uero quispiam ex alyis, siue index siue paruus, cum uicino deligabitur: si quispiam ex medys, cum yis qui utrinque existunt: uel etiam omnes deinceps, una deuinciendi sunt melius enim ita con quiescunt, non secus quam si ferulis fractionem experti fuissent colligati.

De femore. Cap. 103.

A nunc de femore, quæ de brachio superius, dicta sunt. **E** proprie autem magis femur fractum in anteriorem exterioremq; partem inclinatur, in quas naturaliter partes dilatatur, propendet: reponitur autem manibus uinculis & ante omnis æqualiter intentis, altera supra fracturam, altera infra constitutis. Si altrinsecus fractura obuenerit, idq; ad caput femoris dimidium habentæ lana inuolutum, ne corpus incidat, sub interfaminio disponitur, initia que eius ad caput reducta, ministro ut partem contineat, porriguntur. Deinde infra ipsam fracturam laqueo circumposito, initia alteri famulo ad intentionem traduntur. Si ad genu fractio contingerit, laqueum sane simili modo ad intendendum supra fracturam inycimus, geniculum uero ipsum quodam fune in nexo continendum est. Atque agro ita decumbente, crure que extento, partem componimus & restitimus: e medio semper, eo quod aculeis quasi quibusdam ossa p̄git, ut so pius dictum est, sublato. Reliquam curationem in capite de brachio explicauimus. Caterum femur quinquaginta circa diebus occallescit

LIBER SEXTVS.

327

occalescit: quo autem pacto instaurari debeat, post absolutam totius cruris disciplinam traditum est.

De genuum patella. Cap. 104.

Patella os rarum est, & laxum, carne ac nervis superio-
re, & ima parte acriter comprehensum: contusionem sæ-
pius quidem, fractionem uero rarius experitur. Sustinet au-
tem ruptionem per crassitudinem, & minutim finditur, nunc
um uulnere, nunc citra uulnus. Buidēs autem indicium (mo-
io enim sublabitur) continuitatis, cum cavitās, tum crepi-
us. Reficitur uero pars cruris extensa, si in duas partes dissi-
uerit, digitis coniungitur, quoad fracti ossis ora supra sese
contingant, & inuicem committantur. Quæ in minuta fra-
menta rupta est, manu fingitur. Callo etenim non genera-
tur, propterea quod utraq; pars à femore & tibia super mu-
culos & nervos connexos, non retrahatur. Longè tamen à
naturalī distantia cōtrahetur, functionisq; difficultatem affe-
rit inducet, neq; enim si diutius quis fatigetur, sustinere genu
potest: & in deambulando impediuntur, præsertim quum a-
scendendū est. nam dum in planicie incedunt ac mouētur, sur-
tionis difficultas facile latet. Dum ascendunt autem, eo quod
inu in sublatione & depositione non flectatur, arguitur.
t si hic etiam osiculum aliquod pungens eleuatum infestet,
trahendum est: cæteraq; curatio deinceps adhibenda est.

De tibia. Cap. 105.

Tibiæ cum cubito consona planè ratio est, curatioq; respon-
dens. siquidē hæc quoq; duob. ossibus constat, altero cras-
sore & cognomini; altero tenuiore, quod sura nuncupatur,
similitudine, perone à Græcis. Eadem fracturarum disci-
na recipit. in omnes enim partes inclinatur: cum utraque
infracta fuerint ossa, in treis: cum alterum os fracturam ac-
cipit, intra & extra, tibia quidem retro, sura antè. Quo-
ca tibia etiam ipsa eodem modo quo cubitus, manibus uel
iucis superioribus, quàm fracturæ sunt, iniectis ipsi tibiæ
modò,

modò, modò femori circumdati. Nam cum genu ualētius si articulus per tensionem integer permanet: similiter & in l. bena inferiore quàm fractura, ueluti de cubito cōprehensum est. Cetera eodem modo ut in brachio docuimus, agēda sunt.

De pede summo. Cap. 106.

T Aliis fracturam nullo modo experitur, propterea quod undiquaque à tibia & sura, et osse quadrato calcis cybides appellata, muniatur. Scaphoides uerò à scaphæ figuræ appellatum os, latine nauiculare, & plantæ ossa, digitorum item pedis, ipsumque quadratum etiam similiter hys quæ in prima parte palmæ, & ipsa palma, opposita uel eius parte, manusque digitis continentur, frangi consueuerunt. Quamobrem ne eadem cogamus identidem repetere, illinc, quæ diximus huc transferenda sunt.

De instauratione cruris: Cap. 107.

F Emori fracto, aut tibiæ instaurandæ nō minor cura, quam reliquis omnibus adhiberi debet. Siquidem fractarum patium probe facta repositio, æqualitatem potissimum conseruat. Idcirco nonnulli in canalem, alij quidem ligneum, alij uerò testaceum, membrum confractum, uel totum etiam crurē deposuerunt. Alij uerò sola ea quæ cum uulnere fracta existunt, propterea quod nequeant, ut ipsi dicunt, ferulis constringi. Vsum uerò canalium posteriores in totum respuerunt, pluribus sanè de causis: in primis uerò, quod duritie sua, attendo partibus offensis negotium facerent. Neque enim indecorum usque adeo est, artus cum uulnere fractos ferulis cingere, ceu ostendimus postea. Resupinato igitur laborante, crurē eius, & præsertim qua parte fractura exiit, stragulum ali- quod crassum subijcitur, crus in longum referens, quod utrobique colligi & conuolui ita debet, ut canali in medio concavitatem perquam similem efficiat: deinde aluta super ipsam molliuscula ad liquores qui inspergentur excipiendos explicabitur, crus postea in longum cōcavitati huic canali respondent

genti accommodabitur, à lateribus utrinque alijs uestimentis
uel lana iniectis, ne membrum in alterutram partem declinet.
Post hæc pedis uestigium, tabellam panniculo circumdatam,
quo mollior sit, erectam assumet, & maioris securitatis ergo,
duorum aut trium uinculorum medijs partibus stragulo canalem
referenti inuolutis, crus ipsum refractum leuiter deuinciemus.
Si autem agrotus impatiens conetur totum pedem contra he-
re, oportet ipsum in superiore parte pedis fasciola media blan-
de ad tabellam deligare, ne inuitus inter dormiendum, ut so-
let, pedem contrahat. Non desunt, qui lecti etiam culcitram
medio pertundunt, ut prorsus immobiles sint, & per id forra-
men, quousque fractura occallescat, lotiū & oletulū reddatu

De fracturis, quæ cum uulnere accidunt. Cap. 108.

Fractura cum uulnere illata, siquidem sanguinis profluiū
esset, hoc prius coercendum est: si inflammatio, auxilijs ei mu-
neri dicatis occurrendum est. Si carnes cōtuse, pars eadem
quo gangrenæ periculum auferatur, scarificanda est: sin ea
quoque accesserit, uel aliqua alia serpens putredo, conuenien-
tibus similiter remedijs succurrendum est. Habes autem ho-
rum singulorum medicationem uolumine quarto à nobis tra-
ctatam. At si nihil horum adsit, neque magna ossis pars denuda-
ta sit, hamulis & suturis adhibitis præsidijs, medicaminibus
quæ cruentis uulneribus accommodantur, medebimur: ita, ut
ossium fragmenta quæ uel pungunt, uel ut solet, innatent, ex-
trahantur. Si uero amplum aliquod os emineat, in extensione
propter amplitudinem non commissum, huic prospiciendum
est. Hippocrates namque femore & brachio fracturam exper-
tis, ossa eminentia uniuersum eicere prohibet, periculum in-
flammationis ex intensione, uel conuulsione musculorum ner-
uorumque, ut uerisimile est, prædicens. Tempus tamen admini-
strationem nonnunquam haud inutilem reperit. Quodcunque
igitur os elapsum tractare aggredimur, unice cauendum ne
id inflammationis tempore moliamur, sed primo statim die
L l priusquam

priusquam inflammatio ingruat, uel nono, finita iam inflammatione. Restauramus autem ipsa uediculo, quod mochliscon Graeci appellant (est uero id instrumentum ferreum, septem, octo uel digitorum longitudine, mediocriter crassum, ne in impulsione flectatur, in summo acutum et latum, leuiterque incuruum) huius acuta extremitate sub ossis eminentiam subiecta in aduersum impellimus, et mediocri membri diuulsione facta, capita fracturae inuicem committimus, si hoc quidem facere integrum sit, scalpris excisorijs, obuersis, quicquid eminet auferemus, uel serra excindemus, ueluti superius capite de fistulis explicauimus: osiumque scabritie postea leuigata, et membro directis, linteolis conceptis medendi rationem persequemur. Summa autem coniunctis et hyugis nuncupatis partibus diligentia adhibenda est, ut in ipsis ossibus particulatim defecto, membrum incontractum persistat. ubi exquisita etiam opus erit intensione. Deligatura uero sic est faciunda: Orbiculares fasciarum inuolutiones ab utraque bulceris parte inijci debent, obliquae uero supra bulceris longitudinem, ut per decussationem ex omnibus hiatus nullus locus pateat. Quod si bulcus etiam dum sordidum appareat, quae expurgandi uim habent: si purum, quae carnem producunt linamentis illita, aliaque ex usu probata materia adhibeatur. Hippocrates uero pissera emplastro per linamenta utitur, quod tetrapharmacum basilicum esse ferunt. Carne autem inducta et instaurata, ferulae inijciendae sunt: quanquam nonnulli per initia etiam ipsas, bulceris loco euitato, accommodant, et pro necessitate urgente, ipsas nunc constringunt, nunc rursus relaxant: in quibus autem squamula ex osse soluta repletura est, inde colligemus, quod copiosior, tenuiorque humor excernitur, caro uero circa bulcus laxa, mollisque et uacua effecta, intumescit: quo in casu deligatura ad curationem laxiore utemur. hamulo autem uel tali quopiam instrumento squamulae eicientes, rursus potentiore deligatura utendum. Per unum uersum

uersum porro exulcerationis tēpus, motophylax, quod est linteoli custos, ex medicamēto aliquo quod inflammationem cōpescit, uulneri est superaccommodandum, deligatioq; simplex adhibenda, quæ singulis subinde curationib. resoluatur, prædictis alijs permanentibus, ut de brachio explicatum est.

De immodici fracturarum calli superexcrecentia. Cap. 109.

Fracturarum calli superexcrecentie indecoram prorsus speciem inuehunt, quandoq; functionis etiam impedimentum, si iuxta articulum coaluerint. Quapropter si recens aducallus fuerit, præsidys plurimum astringentibus oppugnemus, compressa fascinatione fingemus: lamina quandoq; lumbica superaccommodata, id quod res poscit, efficimus. Quod si lapidosus ac solidus fuerit callus, diuisa inibi cute deidendum est: id quod eminet, scalpris, et terebris etiam, si res exigat, adhibitis, excidendum.

De distortorum membrorum concretione calli. Cap. 110.

In distortionem callus coerit, functionis impedimēto haud leui comitante, maximè si in pedibus contigerit, osium in eam sedem restituendorū modus, quoniam extrema adferre ericula, admittendus non est. At si callus etiamdū tenellus, recens radices non egerit, laxantes adspargines, cataplasmataq; ex ficis pinguib. & fimo columbino, aliaq; callum discutientia, porolitica appellata, adhibenda sunt remedia, et manus ad hæc frictione & confractione hic dissoluetur. Si uerò lapideus euaserit, summa cute scalpello incisa, osium consortium scalpris dissoluemus: deinde fracturam, ueluti superius expositum est, curabimus.

De fracturis quæ non occalescunt. Cap. 111.

Fracturæ quædam sine callo perseverant, ultra definitū naturæ limitē, uel ob assiduas resolutiones, uel ob immoderas fomētationes, uel ob motum importunum, uel fasciarum ultitudinem, uel quod totum corpus alimentū non sentit: quocasu membrū gracilius fieri contingit. Conuenit itaq; eum

ll 2 alijs

alias occasiones, tum præcipuè famem hanc tabificam certatim abscindere. Quod partim calidioribus alimentis materiam membro distribuentes, partim cibum largiorem, balnea item, & reliquam animi hilaritatem subministrantes, efficiamus. Cæterum eorum qui iam callo firmantur, indicio sunt, cum alia quidem, tum præcipuè, quod fasciola, quamvis uulnere nõ oborto, cruenta appareat: id quod fortasse hinc accidit, quod calli substantia, cum coalescit, in osium fistulas, hoc est caeteruosos meatus in spersas sanguinis stillas extundit.

De luxatis. Cap. 112.

Quoniam luxationes fracturas comitantur, sermonem super his texere adgrediemur. Est itaque luxatio, ut in uniuersum dicam, articuli è proprio sinu in alienos exitus, quo motio arbitraria præpeditur. Huius differentias alias dicere non habemus, nisi quatenus secundum maius uel minus accidit. Quum enim ex toto articulus exciderit, communi generis appellatione luxatio: quum autem aliquatenus modò è sede sua dimotus fuerit, uel usq; ad superciliorum cavitatem superficiem uel prolapsus, subluxatio dicitur.

De inferiore maxilla. Cap. 113.

Rursus igitur à superioribus auspicantes, de inferiore maxilla uerba faciemus. Nam superior, cum sit immobilis, luxationem non experitur. Inferior autem, etsi toto sinu non dimoueat, eo quod capita superiori maxillæ firmiter cardinis instar insinuata habet, subinde tamen subiaxatur, quod muscoli per ipsam continenter assidua mandendi & loquendi exercitatione in mollitiem elanguescentes, qualibet de causa facillè relaxantur. Schata enim, hoc est deprimatur, apud Hippocratem idem sonat quod cbalata, hoc est relaxatur: in quibus citra ullam difficultatem articulus sponte in propriam sedem reuertitur. Cæterum de perfecta maxillæ luxatione satis erit illius uerba apposuisse, compendiosa sine ullo defectu, et perspicua. Ad hunc enim modum inquit: Ma-

xilla

xilla rarenter quidem excidit, sæpius uero numero oris hia-
 tib; laxatur, id quod aliæ etiā plures musculorum & neruo-
 rum mutationes aut declinationes efficiunt. Perspicuum igitur
 his potissimum notis fit, quandocunq; exciderit: promi-
 net enim inferior maxilla in anteriora, & in contraria la-
 psus promota cernitur, osiq; processus iuxta superiorem ma-
 xillam tumidior conspicitur, affectiq; maxillas ægrè como-
 mittunt. Talem autem repositionem ipsis congruere liquet.
 Debet enim quispiam caput continere, alius inferiorem ma-
 xillam hiantem hominem quāmodō moderatē potest, ad mentum ab-
 interiore & exteriorē parte, digitis apprehensam, primū
 quidem agitare, interposito uero tempore propellere, ægro-
 tantiq; iubere, ut laxam maxillam teneat, simulq; ipse pro-
 pellat & obsequatur. Summa adhibita cura, ut præcipuè tri-
 bus figuris simul extemplō moueatur & laxetur. Nam ex in-
 uersione in naturalem situm reducenda, & simul in postero-
 ra propellenda inferior maxilla est: idq; admodō moderatē, quo-
 utraq; simul cōmittantur, et nō hiēt. repositio igitur hæc est,
 quæ in alijs etiam figuris fieri non potuerit. Medicina uero
 pauca postmodum sufficiet, splenium ceratum impositum, la-
 cione deligatura adhibere: tutius autē est, hominē supinū re-
 linare, caputq; eius coriaceis puluinis subiectis quāmodō infar-
 cissimis, ut minimē cedat, subfulcire. Est autem quod uulnera
 i quispiam caput contineat. Quod si utraq; luxata fuerit ma-
 xilla, curatio est eadem. Cōcludere autem os minus istiusmo-
 di possunt, prominentiores quippe ipsis sunt. reclinatū autē
 em ex dentium superiorum & inferiorum terminis præcis-
 sionē deprehendes, quos in ordinē suum quācelerrimē confert
 restituere. Restituēdi autem modus expositus est, nisi aliquod
 uitæ periculū ex febrib; continentibus. & torpido sopore in-
 siderit. soporem enim ij, quum præter naturam alterantur, uel
 intenduntur, inducūt musculi. Alius solet biliosa, uel mera exi-
 sta, deiecere. meri itidem, si euomunt, uomitus existunt: atq;

ij sanè pariunt. Et nos quoq; hoc potissimū insertionis mo-
subinde usi fuimus, maxillā luxatam spongia prius ex hya-
lao calido fouentes, praesertim si dura ad introitū cōtuma-
ter cedat: tunc humi collocato agrotāte, à tergo nos cōsistē-
tes, eo qui ab Hippocrate traditus est modo, opus exequimur.

De iugulo & summo humero. Cap. 114.

Claucula interiore quidem parte nunquam excidit. pe-
ctori nanque ita inhaeret, ut ne moueri quidem in ipso po-
sit. at si ex uiolento quopiam extrinsecus ictu factū auella-
tur, fracturarum modo restitui debet. Sed neque altero fini-
quo humero inseritur, admodū excidit, à bicipite musculo, &
summo humero prohibita: imò neq; uiolenta aliqua motio-
clauicula per se agitur, dilatandi thoracis gratia, qua re-
lus homo inter animalia clauiculam sortitus est: quā si in l-
a, ut par est, subluxetur, manuum conformatione, & sple-
norum multiplicium applicatione unā cum decentibus deli-
gaturis dirigi debet. Eadem curatione summus humerus sub-
luxatus, in proprium locum restituitur. Est autē cartilagine-
sum quoddam ossiculum, quod clauiculā scapulae colligat, in
exiccatis et cadauerosis corporibus latens: quod si loco dimo-
ueatur, capitis brachij luxati imperitis imaginē praebet. nam
in hoc summus humerus acutior apparet, et sinus unde exci-
dit. Sed signis quae deinceps subiūgā, ipsa discernere cōuenit.

De humero luxato. Cap. 115.

Brachij caput scapularum cavitati insinuatū, subinde
quidem prolabitur, sed neque in superiorem partem, ob an-
chorarium, hoc est anchorae similem scapulae processum: ne-
que in posteriorem, propter ipsam scapulam: neque etiam an-
terius, ob bicipitis musculi tendonem, et summum humerum.
Introrsum uerò & extrorsum rarenter excidit: frequenter
uerò, & praesertim gracilentioribus, non multa carne praedi-
tis, ad imas partes, quibus sanè procliuiter prolabitur. &
iterum restituitur: plurima autem carne praeditis, è contra-

rio,

LIBER SEXTVS.

513

rio, varius quidem luxatur, sed ægrius in sedem propriam
 rursum inferitur. Nonnullis igitur ex iñu ualida inflamma-
 tione oborta, humero minimè luxato, luxationis tamen suspici-
 o oritur. Quib. in inferiorem partem humerus luxatus est,
 his notis deprehendes: humerus offensus, si cum sano compa-
 retur, multum diuersus apparet. Exterior enim pars eius un-
 de elapsus est subsidit, & concava apparet, summusq; hume-
 rus ceu de eo subluxato diximus, acutior quàm naturaliter es-
 se debeat, cernitur, & brachij caput prolapsum, manifesto
 in alam decubuisse cõparet. Et brachij huius cubitus à costis
 magis recessu: quibus si uim attuleris, cum dolore admoue-
 ur, neque uni a gri manum ad aurem extenso cubito porri-
 gere, neque aliam motionem multiplicem eadem exercere.
 In pueris igitur, uel quibus recens nec ampla est luxatio, hũc
 in modũ, ut Hippocrates tradit, subinde prominenti nodo ma-
 dy digiti flexi, medici manus, uel ægri etiam sanæ, nisi puer
 sit, restituitur. Valētiore aũt luxationes. hoc modo reponun-
 ur. Oportet hominẽ ad sperginibus luxandi uirtute præditis
 otũ humi resupinare, et pilã mediocris amplitudinis, uel co-
 ceam, uel alterius generis nõ aded mollẽ, alæ accommoda-
 re. tum sedens medicus aduersus ad læsum latus, siquidem de-
 xter humerus luxatus sit, dextri: si sinister, sinistri pedis cal-
 cem supra pilam alæ subiectam constituat. postea manum af-
 fectũ hominis apprehensam, pedes uersus trahet. simulq; ma-
 ior calce alã in diuersum repellet, ita ut aliquis post caput
 acētis hominis alterũ humerum urgeat ac resistat, ne corpus
 medici distẽtione circũduellatur. Est & alius reponendi mo-
 dus, qui per humeri suppositionem efficitur. adolescentulus,
 uel ægro longior, uel altius, ad latus quo luxatũ est brachiũ,
 consistens, humerũ suum alæ luxati subyciet. & manum eius
 leuatã ad uentrẽ suum deorsum trahet, ut reliquũ ægri cor-
 pus post tergũ sublimius impendeat. Quod si affectus leuior
 existat, leuis quispil alius puer ex ipso suspendendus est, ma-

nu quippe & reliquo corpore æquiuallenter deorsum tractis
 alæ subiectus humerus facile elapsus articulum in sedē suā
 reponit: atq; hoc idem hypero appellato efficiamus. Est id au-
 tem lignum oblongum, rectum, quod in pavimento supra a-
 liud quoddam solidum constituitur. Cuius summa extremitas
 rotunda, quæ nec admodum crassa, neque tenuis adeo existit
 sub alam ægri stantis, uel sedentis, pro hyperi longitudine
 subijciatur: manuq; hypero extenta, & deorsum tracta, reli-
 quo autem corpore deorsum uergente, uel sua sponte, uel alte-
 ro aliquo trahente, repositio efficiatur. Idem etiam scalæ gra-
 du faciendum est, quemadmodum de fracti brachij intensione
 fieri supra docuimus. Hic autem rotundum aliquod corpus
 gradui alligetur, quod ægrotantis alæ inferi, & brachij ca-
 put propellere possit. At si ob luxationis uetustatem, aut cor-
 poris duritiem restitutio negotium faceffat, uia & ratione,
 quæ per spathulam amben nuncupatam, fieri consuevit, ute-
 mur. Est autem ambe lignum, quod longitudine duos circi-
 ter cubitos, latitudine quatuor digitos, crassitudine digitum
 æquat: cuius alterum extremum est rotundum, quod etiam in
 alæ sinum promptius sese insinuat, perinde atque summum hy-
 peri caput. Hoc igitur capitulum panniculo inuolutum, quo
 lenius sit, capitulo brachij sub alam iniectum accommodabis
 mus: totam uero manum ad lignum intensam deligabimus,
 iuxta brachium & cubitum, & summum eius. Deinde ligno
 obliquo in duas columnas rectas adaptato, uel rursus supra
 scalæ gradum manu traiecta cum ligno, sic ut alia transuer-
 sa gradui inseratur, manum uero deorsum trahentes, corpus
 in alteram partem suspensum, in sublimi permittemus: tunc eo-
 nim articulus in sedem suam reuertetur. Vbi fuerit reposi-
 tus, lanea fila mediocris amplitudinis: si inflammationē non
 sentiat, sicca: si sentiat, oleo imbuta alæ subijcienda est, atque
 deuinciendum. Per hanc autem alam, & humerum, & alte-
 ram alam fascia circundata, sic, ut inuolutiones decussarum
 iuxta

iuxta hiatum appareant, quo hiatus supra humerum laesum, brachium deinde costis & cubitus alligatur, manusq; summa ceruici fascijs deuincitur, ne rursus de integro articulus prolabatur. A septimo die, & serius etiam, ubi resoluerimus, modiocri frictione utemur, quo solidiori reddito corpore, articulus ineptior ad prolapsum efficiatur. Si uerò frequenter articulus prolabatur, uel ob humiditatis uitium, uel ex longa quapiam alia exeundi uia, ad uersionem ueniendum est, quemadmodum expositum est superius. Sed quum in utero foetus, uel educti in lucem, dum etiam dum crescunt, particula aliqua luxationem experiuntur, neque restituitur amplius, in humero quidem carnes nihil noxae à naturali constitutione deficientes contrahunt: neque enim manus, quo minus functionem suam obire possit, impeditur. Sed brachyos, non augefcens, breuius remanet, & appellantur eiusmodi galiancones. In femore autem prolapsio, os etiam absq; incremento permanet, & totum crus corrumpit. nam cum corporis pondus sustinere nequeat, non exercetur: & reliquis in particulis luxatis manentibus, subiectæ omnes offensioni obnoxia sunt.

De cubito. Cap. 116.

Quanto gibber cubiti artificiosius quam humerus articulo sinuatus est, tanto, cum excidit, plus negotij facit, tardiusq; prolabitur quidem: sed prolapsus difficilius reponitur, propter eminentiarum ac sinuum frequentiam: sustinet igitur interdum subluxationem tantummodo, sæpe uerò ex tota tiam in omnes partes, sed præcipue in priorem & posteriorem luxatur. Dinoscitur id tum uisui, tum tactu, citra negotium. nam quod excidit, prominens: & unde prolapsum est, siue apparet. Atq; hoc sani cubiti affectio potissimum arguit. Ist autem priusquam inflammatione tentetur membrum, citissime restituendum. nam si inflammatione occupetur, curari difficulter potest. Non raro etiam, nullo remedio eliditur, resertim si in posteriora recesserit. Omnium quippe luxa-

L l 5 tionum

tionum cubiti, hæc quæ in posteriora fit, dolorifica magis
 & periculosior existit. Mediocres igitur articuli peruersio-
 nes, moderata quoque intensione restituantur: sic, ut ministri
 manum ad brachium cubitumque porrectam apprehendant, &
 in diuersa extendant: medicus autem manus suæ palma, quæ
 prolapsa est, in naturalem sedem compellat. Hippocrate
 uerò luxationem in priorem partem, repentinò cubiti flexi
 instaurabat, ita ut palma a gri in humerum rectum pulsaret.
 Si in posteriorem luxatus est, subita rursus & diuina exten-
 sione curabat. Nam luxatio in anteriorem partem, ex uiol-
 lenta potissimum intensione: in posteriorem, ex uiolenta
 simulueri flexione cuenit. Quod si perseverat luxatio, ua-
 lentiore intentione utendum est, ad eamque ueniendum in primis
 quæ Hippocrates de brachio fracto exposuit, ubi columella
 lam adhibebat. Cæterum recentiores nonnulli hunc in mo-
 dum reponunt: duobus ministris, altero sursum ad alam, ma-
 num, ut diximus, continente, altero deorsum ad brachiale, ex-
 tendentibus, medicus è regione arotantis consistens, utrisque
 palmis brachium iuxta articulum comprehendit, iubeique ue-
 stimento contracto in oblongo, uel fascia manus ipse parti-
 tur & a gri brachium inuoluere, & in exteriorem, imamque
 partem ad summam manum retrahere, ipse sequens cum in-
 tentione, constrictus ipsius trahit, usque dum cubiti articulum
 transgrediantur. Manus uerò prius oleo oblinienda est, quo
 lubrica fiat, & medici palmis faciliè obediat. Ita enim prola-
 psa, trahentium manuum uiolentia impulsæ, in suum locum
 reuertuntur. Post repositionem, angulum rectum figuratam
 manum, splenys & apposita deligatura curabimus.

De brachialis & digitorum luxationibus. Cap. 117.

Brachialis & digitorum luxatio, nisi cum hylcere accidat, ni-
 hil negotij exhibet. De hac igitur in capite de luxationib.
 cum hylcere factis dicitur. Atque uerò hylcere luxatis, medio-
 cri intensione, et remedijs inflammationem arcentibus succurremus.

De

Si uertebrae spinæ exactam luxationem experiuntur, perniciosissimam mortem inferunt: nequit enim ullam quamlibet leuem spinæ medulla, compressionem sustinere, quādo uel solus neruorum, qui ex ipsa manant, processus, si comprimatur, hominem in discrimen abijcere abunde potest: subluxationibus subinde affliguntur, nunc in anteriorem partem, nunc in posteriorem, interim in latera etiam torquētur. Quorum prius uitium lordosim, alterum cyphosim, tertium scoliosin Græci nuncupant. Quum igitur plures simul uertebrae paululum peruersae fuerint, plurium simul peruersio iuxta orbicularem flexus rotunditatem apparet: quem specie quidam decepti, ex unius tantum uertebrae ingenti prolapsu, fieri opinantur. Magnus quippe prolapsus non circulare, sed angulatum spinæ flexum efficit, multoq; periculosior existit. Spinæ igitur introrsum peruersio, restitui nullo modo potest, eo quod per uentrem in priorem partem repellendi facultas nulla datur. nam qui in scala eos qui sic afficiuntur, extendunt, uel cucurbitulas applicant, uel sternutamenta, uel usum, uel inflationes excitant, quid remedi inuenisse crediti sint, satis ab Hippocrate redarguti sunt. Siquidē subinde accidit, ut spinæ osiculi cuiusdā refractio facta, cauum locū efficiat, ueluti de fracturis expositū est. Sūt qui uitium hoc lordosim esse opinati sunt. deinde celerius hoc malo curato (propterea enim occallefcit) facile sanari posse lordosim affirmarunt: tamen nullo remedio id malū elidi, uel certē difficulter admodum queat. Suppressio namq; urinae aliuq; his accidit, corpusq; frigescit, postea uerò inuoluntaria etiā excrementorum corruptio, quæ sane ex neruorum musculorūq; consortio eueiunt, et breui intereunt, præsertim si summæ et cœui is uertebra luxationē senserint. Si gibbus aut uertebrae iam inde à ueritia factus sit, uitium diuturnū esse, neq; præ maturā morbi consciscere, sed morbum accersire, et irremediabile esse, Hippocratis

pocrates testatur. Sed quibus recens gibber ex casu prouenerit, omnes alie machine quas isti per scalas, & rectam corporis suspensionem, utriq; inflammationem moliantur, ridiculae sunt, solaq; Hippocratis ratio sufficiet. Oportet, inquit ingens aliquod lignum tantae longitudo latitudinisq; ut prostratum hominem excipere queat, uel scamnum huic æquale, prope parietem apponere: ita quidem, ut per longitudinem pedes ab eo non amplius distet, & stragula aliqua super ipsum explicare, ne hominis corpus contundatur. Conuenit autem hominem prius lotum, supra ipsum prouum constituere: deinde corrigia pedibus ipsius gemina inuolutione circumdatæ, per alas supra deorsum uincire, capitibus corrigiae ad prælongum fustem pistillarem deligare, in soloq; iuxta ligni aut scamni extremum erectum statuere, & ministro à capite ægrotantis consistenti in superiore parte continendum tradere, ut in parte solo innixa, superiore supra caput tracto, obseruata occasione corpus opportunè extendat. Altera adhuc corrigia pedibus utriq; supra malleolos inicitur, & rursum alia supra lumbos & coxas innexa, iunctura firmatur, tum corrigiarum capita inter se iuncta alteri fusti pistillari prædicto deligantur. Simili modo ad pedes in extremo ligni seu scamni pistillum priori æquale rectum constituitur, postea ligna hæc ministris in diuersa intendere iubebimus. Nonnulli autem asellis appellatis hoc efficiunt. Sunt autem aselli, axes, qui ad rectum lignum infixi conuertuntur. His utrinq; magni ligni aut scamni ad pedes caputq; corrigiarum extrema inuoluunt. Facta in hunc modum intensione, manuumstrarum palma gibbum constringemus: siq; usus postulat, etiam super ipsum insidebimus, nullo prohibente timore. Quod si ne hac quidem ratione spina instauretur, & æger compressionem sustineat, oportet appositum parietem canaliculatim in longum à regione gibbi excauare, ut neq; longitudinem cubiti excedat, neq; alior, neq; multo humilior ægrotantis spina sit, imò
sculptura

culptura prius præparanda est. huius enim causa, lignum iuxta parietem ab initio collocandum ordinauimus. Deinde assis iustæ magnitudinis, alterum terminum ad ima comprimemus, donec spinæ directio sensu etiam percipiatur. Sed uemadmodum Hippocrates tradit. sola extensio absque assere, uel per asserem rursum sola curatio ad restituendum gibbum abunde sufficit. Quod si uerum est, haud ab re fuerit etiam rudi et scoliosi, à principio statim supradictum intensionis modum, citra compressionem tamen, moliri. Post repositionem assula lignea, quæ latitudine tres digitos æquet, longitudine gibbo respondeat, et aliquas sanas uertebras contegat, nea fascia, uel stappa, propter duritiem inuoluta, uertebris imponi, et commodè deligari, uideusque; tenuis adhiberi debet. Quod si his actis aliqua gibberi reliquia supersint, laxantibus; remedijs, cum assula ualētiori impressione, diutius utendū est. Nonnulli uerò plumbeā assulam adhibuerūt.

De coxæ luxatione. Cap. 119.

¶ Vm alia mortalium ossa interdum subluxationem, interdum exactam luxationem experiantur, coxæ et humeri articulus solus consummata luxationis peruersioni obnoxius est: atque adeo magis coxæ articulus, quoniam profundam ac rotundam concauitatē obtinet, et altioribus aggeribus, quas iræci ophrioſeis dicunt, circumunitus sit. Si quando autem articulus uiolenta quadam ui impulsus, sinu suo exciderit, multas pro maioris minorisque; ratione luxationū differentias facit. in quatuor enim modos, imò locos coxæ luxatio efficitur. Vel nim in interiorē, uel exteriorē, uel anteriorē, uel posteriorem partē promouetur: sed intrò quidē et extra frequētius, frequētissime tamen intrò, in priora et posteriora rarius. Quibus igitur coxa intro promota est, is offensum crus. si cum sano comparatur, longius, et genu uastius cernitur, et ad inguen crus inflecti minimè potest: iuxtaque; inter femineum euidentis tumor occurrit, tanquam illi capite femoris impactio ac desidente.

Quibus

Quibus in exteriorem partem prolapsa est, ijs contraria indicia cōtingunt. siquidem crus breuius cōspicitur, et sub inter-
 fœmineo sinus dehiscit, nates intumescunt, & genu interin-
 demergitur, crus flecti potest. Si in anteriorem partem exci-
 dit, crus sine genu dolore extendunt: sed implicare id, interi-
 usq; reclinare, dum incedere nituntur, non possunt: urina in
 hoc casu supprimitur, inguē inturgescit, clunis rugosa et ex-
 carnis spectatur, et calce tantū inter ambulandum terram cō-
 tingūt. Si in posteriora, breuius itidē crus est, poples, genuq;
 neq; extendi, neq; inflecti potest, priusquā inguina fuerint in-
 flexa, quæ sanè laxiora sunt, femorūq; caput per nates pro-
 tuberat. Quibuscunq; igitur iā inde à puero, uel longiore de-
 niq; temporis spacio, articulus prolapsus neglectus fuerit, re-
 mediaq; nihil profecerint, membro iam in orbē coactō, nullā
 amplius curationē recipit. Quibus uerò recens excidit, ij Hip-
 pocratis curatione adiuuādi sunt. Protinus igitur adgrediens
 da est repositio: quoniā coxæ luxatio inueterata, incurabilis
 omnino efficitur. Cōmuniter igitur in quatuor luxationū ge-
 neribus concinna reaptatio quadrabit. cuius gemini sunt mo-
 du alter, qui conuersione articuli & inflexione seu circumduc-
 tu: alter, qui extensione confit. Nam si recens affectus sit, &
 ægrotus iuuenis, femur nonnunquam apprehensum & huc
 illuc circumagitatū, articulum in sedem suam restituimus.
 Si uerò luxatio intro declinauerit, crus etiam solum repente
 et ualenter ad inguinis intimā partem flectentes, ut res postu-
 labat, repositum. Sin autem his non proficitur, extensione
 utendum, quæ primū manibus molienda est, alijs crus ab in-
 ferioe parte trabentibus, circa femur ac tibiam constri-
 ngant, alijs ex superiore parte sub alis comprehensum corpus
 circundantibus. Quod uehementior desideretur intensio, uin-
 culis textilibus, aut tortilibus, aut habenis deligabimus, om-
 nino quidē supra talos, & supra genu etiam, ne id aliquā ob-
 lationem experiatur. Pectoris uerò regionē, uinculis excipe-
 re opus

re opus non est: sed manibus tantū, ut dictum est, sub alius da-
tis comprehendatur: corrigia deinde mollis, & ualida media
sua parte, iuxta penem, aut interfœmineum subiecta, anterius
per inguen & iugulum, posterius per dorsum ad humeros re-
ducenda est, ministroq; duobus capuibus tradenda. Postea
omnes simul eodem tempore in diuersa coniectant, sicut ægro
tantis corpus à terra subleuetur. Atq; hæc quidem intendens
di ratio omnibus quatuor luxationū generibus communis est:
priuatim uerò ossa in sinū suum restituendi modus in singulis
uariat. Intenso namq; ita homine, si intro articulus promotus
est, corrigia iuxta interfœmineum sita mediū, inter femoris
caput ipsumq; interfœmineum dispensatur, sursumq; per in-
guina ac iugulum corrigia remittitur. Deinde robustus ali-
quis iuuenis utrisq; suis cubitis affectum femur, qua crassius
est, comprehendens, in exteriora fortiter trahet. Hic quidem
instaurandi modus alys expeditior est. Cui si articulus non
obtemperauerit, alys utendum, qui sicut maiorem uarietate,
ita & plus efficaciam habent. Extendendus quidē supra gran-
luis lignum, seu scamnum affectus est, in quo etiam spina gib-
berum habentes, intendendo componimus. In sculpentur autē
prius per totum ferè oblonga quædam ueluti fossula, altitu-
dine et latitudine non amplius trium digitorum, inuicem qua-
tuor ad summum digitorum spacio distantes, ut in uitram
partem conueniat restituatur, uelut iuxta extremum ipsis ob-
iecto. In medio autem ligni siue scamni, alterum lignum im-
pingatur pedis longitudinē, columnula crassitudinē æquas,
ut sub hoc extenso homine, inter caput femoris, & interfœ-
mineum porrigatur. Simul & impediatur, ne dum trahitur ad
pedes, sequatur. Quocirca nec usu utiq; frequenter uenit, in con-
traria ex superiore parte retractio. simul autē intenso etiā cor-
pore ipsum lignū femoris caput ad dexteriores partē proa-
pellit. Extensio uerò iuxta superius traditum modum admi-
nistrabitur, præcipuè pedis. Quod si neque ita quidem os in

restitutum

naturalem locum redierit, impactum lignum rectum eximen-
dum est, ex latere autē huius situs utrinque duo alia ligna, qu-
si limina, pedali longitudine infigenda sunt, quibus aliud li-
gnum gradus scalæ modo inferendum est, sic ut trium ligno-
rum figura H literam repræsentet: quod fiet, si paululum in-
ferius summis capitibus medium hoc lignū accommodabitur.
Deinde in sanum latus homine collocato, sanum quidem crus
inter hæc limina infra gradum ducemus, affectum uerò crus
supra ipsum gradum ex superiore parte ponemus, ut ipsi fe-
moris capiti adaptetur. Substrato tamen prius ei multiplici
quopiā panno, ne femur duritie lædat: aliud autem lignum
mediocris latitudinis, cuius longitudo à femoris capite ad
malleolum subiectum usque pertineat, interiori cruri parte a-
ligabitur. Facta hac intensione, uel pistillis, ut in gibbero spi-
na dictum est, crus unā cum alligato ligno ad ima tractum, ui-
lenta hac impulsione, femoris caput in propriam sedem co-
gat. Est uerò adhuc alia reponendi ratio, citra extensionem
supra lignum ab Hippocrate commendata. Oportet, inquit,
ægotantis manus ad costas leniter deligare, cruraq; ambi-
uiliore loco ac molli ad malleolos, & supra genua fascia-
re, sic ut quatuor circiter digitorum spacio inuicem distent.
crure uidelicet læso, supra alterum duobus ferè digitis exten-
so, hominem in caput suspendere, duos cubitos à terra subla-
tum. Adolescens uerò aliquis rei peritus, suis cubitis affectum
femur, quā breuissimum est, comprehendens, ubi et caput fe-
moris, subito appendere sese illi conetur: facili enim ita artis
culum in locum suum compellet. Atque hæc quidem inferen-
di ratio cæteris simplicior est, utpote quæ non multo appa-
tu peragatur: pleriq; tamen ipsum tanquam miserabilem, mi-
nus abdominantur. At si in exteriora coxa prolapsa sit, exten-
datur homo, ueluti superius: habena autem interfemineo
subiecta, per oppositas partes, inguina uidelicet & clauicu-
lam, ferri debet, tum medicus ab exteriori parte introrsum
propellit,

propellit, iuxta conuenientem foueam ex ijs quæ insculptæ
sunt, funulo ueste obiecto in sanam natem, ne cedat obniten-
e. Sin autem in priora facta sit luxatio, homine intenso, ro-
bustus aliquis uir dextræ manus palmam supra affectum in-
ueni imponens, altera manu comprimet, simulq; deorsum,
idq; genu constrictione faciat. At si in posteriorem partem
promotus est articulus, non opus est hominem in sublime us-
que à terra extendere, sed supra solidum aliquod iacere, per-
inde ac si extra articulamentum luxatum sit. Quemadmodum
autem in gibbo expositum est, homo superq; lignum aut scam-
um pronus extendatur, uinculis non lumbo, sed cruri, ut nu-
per dicebamus, iniectis. Post hæc uero affere quoque utendum
est, ad clunium regionem, ubi articulus excidit, comprimen-
dam. Ac de ijs quibus ex euidente causa coxendix prolapsus
est, hætenus. Quandoquidem autem ob redundantem quoque
humiditatem, quemadmodum humerus, sic etiam coxendix
de sede sua prolabitur, uestione utendum est, ueluti de ipsa suo
loco explicauimus.

De genu luxatione. Cap. 120.

Genu in tres partes luxatur ac prolabitur, interiorē ui-
delicet, exteriorē, & in poplitem. Nam in priorē pro-
noueri, opposita patella prohibetur. Easdem igitur intensio-
nis neruorum rationes usurpantes, solis interdum manibus,
funiculis etiam interdum adhibitis, conuenienter deuincimus,
& reliquam curandi rationem admouebimus: cura studiose
adhibita, ut membrum diutius immotum custodiatur.

De malleoli luxatione, inibi q; etiā de pedū digitis. Cap. 121.

Malleoli articulamentum si modicè prolabitur, modica co-
tiam intensione curatur. Si integrè luxatum est, poten-
tiore indiget presidio. Conandum igitur etiam hic est per ma-
nus uehementiorem intensiōem adhibere. Quod si non fiat
repositio, hu ni resupinatus homo est, interq; duo eius femo-
ra iuxta interfemineum, longus aliquis ac ualidus palus al-

M m tms

tius in terram rectus defigendus est, quo ei corpus renitens ad pedis intensionem non cedat. sed priusquam ita homo collocetur, defigendus est. Quod si magnum illud lignum ad manum est, in cuius medio pedale, uti diximus, lignum infixum fuerat, hoc super intensionem moliemur, famulo uno femur continente ac trabente, aliter manibus, uel habena pedem trahet. Medicus autem luxatum articulum reponat, alterumque pedem alius deorsum continebit. Post repositionem tunc deligandum est, fascijs ad plantam et ad malleolos distributis, cautione adhibita, ne posterior calcis tendo constringatur. Præcipiendumque homini, ut in quiete perseverans, intra quadraginta dies non ingrediatur. nam si ante absolutam curationem incedere quispiam tentet, inutilem particulam ad sua munia obeunda reddit. Si cui uerò ex saltu, ut solet, calcis os è loco suo promotum, uel aliquam aliam ad inflammationis naturam tendentem dispositionem expertum fuerit, leni quadam intensione, cōformatione, fotu, inflammationi arcenda dicato, deligationeque firma id restituentum est, indeque homini similiter in quiete, donec consanuerit, perseverandum. Digitorum autem pedis luxatio, sicut de manus digitis dicebamus, mediocri intensione haud difficulter emendatur. In omnibus autem luxationibus subluxationibusque, facta iam restitutione, elapsisque, præscriptis ad quiescendum diebus, si qua, ut credibile est, inflammatio in articulis perseverat, seu tumor, unde à functionibus diutulè impediuntur, his mollientibus remedijs subueniamus, quorum materia neminem qui hanc artem exercet, fugere potest.

De luxationibus cum hūcere. Cap. 122.

In luxationibus cum exulceratione, plurima opus solertia est. Nam cum hæc reponuntur, extrema pericula, et mortem quandoque inferunt. Quum enim adiacentes nervi ac muscoli ex intensione inflatione tentantur, cruciatus intensi, convulsiones, et febres acutæ superueniunt, præcipue in cubitis

bitis ac genibus, superioribusq; particulis: quanto enim principibus propinquiores sunt, tanto maius periculum adferunt. Quocirca Hippocrates horum repositionem & ualidiorem deligationem penitus respuit, solisq; ijs quæ inflammationem arcent, placantq; auxilijs uti inter initia mandat: sic enim ip sis forsan euadere datur. Id quod ipse in solis digitis fieri suadet, id nos in cæteris etiam articulis facere conabimur, ac in principio statim cum nondum infestat inflammatio, luxatum articulum moderata interensione reponemus. Si ex animi sententia successerit, in sola ratione quæ inflammationem abigit, lenitq; persistemus. Si inflammatio quæpiam, uel conuulsio, uel ex iam pridem memoratis quippiam urgeat, rursum ipsos, siquidem citra uim potest, sede sua propellere necessitas est. Quod si hoc quoque periculum ueremur (haud enim inflammata fortassis facile cedent) præstat inter principia in maioribus articulis repositionem protelare. Simulatque uerò inflammatio cessauerit (quod septem aut nouem dierum spacio contingit) tunc præfati, quod ex repositione secuturum sit periculum: & si non reponatur, hominem ea parte claudum ac mutilum omnino reliquum uitæ tempus futurum, manuum operam clementer adgrediamur, uediculo etiam, propter commoditatem, adhibito. Huiusmodi postea curationem, quemadmodum in fracturis cum hulcere traditum est, tractabimus.

De luxatione cum fractura. Cap. 123.

Quod si luxatio cum fractione citra hulcus acciderit, communis intendendi ratio, & per manus conformis instauratio, adhibenda est, ueluti in capite de simplicibus fracturis expositum est. Si uerò cum hulcere, rursus ex his quæ de fracturis cum exulceratione & luxationib. priuatim explicauimus, conueniens repetenda est administratio.

FINIS LIBRI SEXTI.

Mm 2 HYPO.

HYPOTHESIS LIBRI SEPTIMI.

In hoc volumine uniuersi operis septimo & ultimo, de medicamentorum, cum simplicium, tum compositorum omnium, quorum potissima superioribus sex libris facta est mentio facultatibus agitur. Est autem eius series in hunc modum digesta.

CAPITA LIBRI SEPTIMI.

De temperaturis, quæ a saporis qualitatibus reperiuntur.	13	Arida & smegmata	13
Cap.		Vnctiones quæ ori inserviunt.	
De temperamentorum ordine	14	Suaues & utiles potiones	15
atq; a media temperie excessu	2	Collyria & conglutinamenta	16
De simplicium medicamentorum uiribus particulatim	3	Emplastra, modi coctionis eorum, & de iusta ceræ ad olei proportionem.	17
De purgandis non habentibus medicinis simplicibus	4	Malagmata & epithemata	18
De compositis medicinis purgantibus	5	Acopa, & synchrismata, & dro- pices, & sinapi mi	19
De obseruatione eorum qui pur- gantur, & quomodo adesse o- porteat his qui sumpto phar- maco non purgantur	6	O.eorum & unguentorum præ- parationes diuersæ	20
De his qui plus æquo purgan- tur	7	De nanthariorum præparati- one	21
De sacris antidotis	8	Thymiamata & cyphi	22
Vnctiones sedis & umbilicali purgantia	9	Præparatio masuchæ, quod ma- suaphion quidam appellant	23
Medicamina uomitoria, modi helleborisimi	10	De pestis ex Antyllo	24
De differentia antidotorum	11	De succedaneis, ex Galeno	25
De pastillis	12	De ponderibus & mensuris	26

FINIS.

LIBER SEPTIMVS. 349
PAVLI AEGINETAE

LIBER SEPTIMVS, ALBANO

Torino interprete.

De temperaturis quæ ex saporis qualitatibus deprehenduntur. Cap. 1.



N Q V E odoratu cōiici tutò satis de sensibilibus corporum temperamēto potest. nam quæ odoris ne minimum quidē, de se præbēt, crassarum quidem partium sunt, sed quantā caloris aut frigiditatis habeāt uim, intelligi non est. Quæ uerò fragrantem odoris fluxum emittunt, etsi natura nō paucam quodammodo habeant substantiam in se tenuem & calidam, tamen propter inæqualem eorum essentiam certū uel tenuitatis, uel caliditatis suæ modum nullum ostendunt. Magis adhuc lubricum ex colore iudicium est, quādo calida, frigida, humida, sicca in unoquoque deprehenduntur. Gustu autē, quia æqualiter gustabilium omnium partes linguae incidunt, & sensum cum pariter mouent in tantum, ut manifestè ex hoc temperatura eorum uis deprehendi queat. Astringens igitur, cogere, constringere, desiccare, repercutere, incrassare, atq; ad hæc omnia tum refrigerare, tum exiccare sua natura aptitudine solet. Acutum uerò incidendi, diuidendi, attenuandi, aperiendi, & expurgandi citra calorem uires obtinet. Acre autem, communem cum acuto sortitum est facultatem, attenuando nempe & purgando: hoc uerò dissident, quod acutum frigefacere, acre calfacere natum est. præterea quod illud ad exciendum, hoc ad extrahendum, distrahendum, rumpendum, penetrandumq; & crustam inducendum natura comparatum est. Eodem quoq; pacto amarum, expurgat meatus, abstergit, extenuat, lentos crassosq; humores secat absq; caliditate insigni. Aqueum ue

M m 3 rō frīo

ro frigidū, sistit, cogit, obturat, roborat, ac stupefacit. Salsum autem contrahit, stringit, condit, siccāt, sine euidenti uel calore uel frigore. Dulce laxat, digerit, mollit, ac rarefacit. Oleosum humectat, emollit, & relaxat.

De temperamentorum ordine, atque excessu. Cap. 2.

Medium inter extrema pharmacum, symmetron à Graecis appellatum, ita ut aqualis cum eo cui admoetur, temperaturæ existat, eo quod neque exiccandi, neque humectandi, neque refrigerandi, aut calfaciendi uim obtineat, neque aridum, neque humidum, neque frigidum, nec calidū nuncupari par est. Siccius uerò, humidius, calidius uel frigidius, à potentia et qualitate prædominante appellationē sortitur. Abunde aut fuerit in unaquaq; præpollēte facultate, quatuor ordines pro usus necessitate constituisse. Calidum quidem in primo ordine uocatur, quod nos tam obscure calfaciat, ut eius rationalem quandā demonstrationē requirat. Pari etiam modo gelidum, aridū, et uidū, quod indicatione indiget, nondū ualidā efficaciam ac euidentiū obtinens. Certè quæcunq; manifestò iam arefacere, aut humectare, aut calfacere, aut refrigerare possunt, secūdi excessus esse dicenda sunt. Sed quæ manifestè quidem, non tamē ad extremū, tertiū. Quæ usq; adeo, ut crustam inducēdi uim habeāt, calfaciunt, ad quartū ordinem referuntur. Sic quæ tantā refrigerādi uirtutem sortita sunt, ut in stuporē concilient ac mortificēt, hæc itidē in quarto à temperatis abscessu censentur. Exiccatorium uerò nullū quarti ordinis inueniri potest, sine exustione. nā quicquid extremē siccāt, id omnino exurat necessū est. Ex eo grege sunt, chalcis, mysis, calx. Tertiæ aut arefaciētiū distillatæ aliquid esse potest, nec exurens interim: cuiusmodi sunt, quæ uehementer astringunt omnia: e quorum albo omphaciū, rhus, atq; alumen habetur.

De simplicium medicamentorum uiribus, particulatim. Cap. 3.

A Brotono, uis est calfaciēdi & exiccandi in tertio à mediis temperie recessu habetq; distrabentē, et nō insstrenuē secūte potentiā: minima nūq; acerbitalis particeps est, quod cum oleo

oleo toti corpori infricatum, rigorib. qui per circuitum ingruunt, succurrit: cæterū infesta est stomacho. Crematū uolēti us arefacit, quā igne intactū. De fluxu capillorū ex alopecia medetur, cum oleo quopiam rararum partium illitum.

Agallochum, lignum est indicū thuyæ ligno non dissimile, odore bene fragrati. Quod dū mādatur, oris et animæ suauitatem cōciliat. Odoris gratia uaporatur, et ad suffimēta incensatur. Cuius radix in potu unius denarij pōdo sumpta, flaccidū ex humiditate stomachū resolutūq; corroborat. Remedio insuper est iocinorosis, intestinorū torminib. oppressis, pleuriticisq;. Agaricū, radix est, quæ arboris trūco adnascitur, laxi corporis & friabilis, ex acra & terrestri essentia coalita. Distrabēdi, crassitudinem secandi, infardusq; ex obturationibus maximè uiscerum repurgandi potentiam obtinens. Ageraton naturā habet discutiendi, & præter id clementer quadantenus inflammationes arcendi.

Agnus, uel lygus, qui latinis uitex dicitur, calidæ et siccæ potestatis est, in tertio ordine. Cōstat ex partib. tenuib. Flatus peditusq; discutit: qua ratione non tantū comestus potusq;, uerū substratus etiā castitatem tueri creditur. Haustū plantæ huius semen, obturatis iocinoribus, lienibusq; succurrit: frius minus inflat, digestuq; longe facilius est.

Agrostis, grame Parnasi, maximæ utilitatis est, siccificæ, mediocriterq; frigoricæ facultatis, & tenuis essentia, leue quoddam acrimētum gustu præferens, & proinde cruenta hucera conglutinat: calculos decoctum eius atterit.

Anchusæ species quatuor, non eiusdem facultatis omnes sunt. nam cui onocleæ nomen est inditum, astringentem pariter & subamaram radicem continet: cuius ergo lienis renūq; dolores adiuuat. Cum polenta illita, ignibus sacris, quæ erysipelata dicuntur, opitulatur. folia herbæ imbecilliorē radice refrigerandi arefaciendiq; uim possidēt: quare contra alui fluores in potu sumitur. At quæ lycopfos appellationem habet, pari modo erysipelatis subuenit, ma-

iore quodammodo quàm onoclea astringendi potentia, & onochilos & alcibiadios medicamentosior, à uisera demorsis eximie conducit, illita, pro amuleto appensa, & in cibis deuorata. Quarta anchusæ species reliquis est exilior, & tantum non anonymos, alcibiadio uehementiorem habet amaritudinem, tencis alui necandis acetabuli mensura pota magis est accommoda.

Adarce spumam quandam falsilaginis, in harundinetis stercoraq; ac cremis concretam præfert, summam habens acrimoniam, tantamq; in calfaciendo uim, ut parum absit quin forinsecus corpori cum alys applicatum adurat. Eoq; intra corpus ipsam assumere minimè conuenit.

Adiantum exiccandi, attenuandi, modiceq; dysciendi potestate præditum est: medium quodammodo locum calore & frigidityte sortitum. quamobrem caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, tumores discutit, uescicæ renumq; calculos comminuit, si potetur, excreationes pulmonis desiccet, et uentris compefcit profluuium.

Aizoon, semperuiuum, maius & minus est, utrunq; in terra refrigerat distantia. Exiccat uerò & astringit aliquantulum: ignitis igitur cum inflammatione rubedinibus, huius item, quæ à serpendo herpetas nuncupant, & inflammationibus quæ ex destillatione oriuntur, succurrit.

Aetonychi inter lapides preciosos mentionem facere instituimus.

Athara, uel athera, pulicula sorbilis est, ex zea triticois mollitis confecta, puerulis idonea: eadem cataplasmatibus accommodatur.

Aegilops auena, dysciendi potestate prædita est. Ea propter inflammationes induratas, & sui nominis qui in maiore oculi hircu oriuntur abscessus, medetur.

Aegyros, populus nigra calide est potentia in primo temper atorum ordine, arefacit moderatè, & raris est partibus.

Cuius

huius folia cataplasmati more cum aceto impasta, dolores
ui miseram pedum ualeitudinem sequuntur, amouent. Quæ
erò ex ipsa destillat resina, maiorem calfaciendi uim ha-
ens, acopis inseritur, malagmati q; inditur. Fructus cum ace-
to in potu sumptus, morbo comitiali opitulatur.

Aedæon, hoc est pudendum maris cerui arefactum, uino
coctum, si potetur, moribus uiperinis subuenit. Compos-
itis præterea facultatibus confunditur.

Aethales, hoc est fuliginis & lignos historia, in litera
pertrahitur.

Aethiopidis herbae folia uerbasco sunt similia: radicis des-
ectum potu sumptum, coxendicis doloribus, laterali doli,
& cruentum sputum eicientibus succurrit. Arterias & fau-
um scabredines cum melle leuat.

Hæma, sanguis frigidus nullus est: suillus quidem humi-
ior, minusq; calidus cæteris est, tēperatura ab hominis san-
guine nihil discrepans. Colūbinus, palumbinus, & turturis,
pedy fermè temperamēti: oculorum uitis, quæ Græci hypo-
bhamata dicunt, opitulatur, si calidus instilletur. Crassiori
erebri membranula infusus, in his quorum calua perforata
st, inflammationes profligat. Aduersus spiritus angustias, ma-
na cum utilitate sanguis nocturnus non tam è uino, quàm ex as-
ua potatur. Vesperilionum sanguis uirginum mammas tue-
ur. Ferunt illitum hunc, incrementa pilorum prohibere. Eius-
dem facultatis esse affirmant sanguinem ranarum, chamae-
eontis, et ricinorū qui canibus usq; adhaerent. Galenus uerò
nō daciū hoc esse asserit, factō rei periculo. Caprillus cum
melle potus, ob ariditatem aquis inter cutem medetur, & res-
um calculos comminuit. Aluilium gallinarum sanguis, eru-
tiones sanguinis ex cerebri membranulis supprimit. Agnia-
us comitiali morbo auxiliatur. Hædinus recens concretus,
olus minus dimidiata hemina mensura, cum tantundem acce-
i bausus, cruentū è pectore sputum reicientibus opitulatur.

M m 5 Vrsinus

Vrsinus, caprearum, bircinus, atque taurinus, si abscessibus imponatur, maturationis munia probè exequi perhibent.

Sanguis crocodili terrestris oculorum speciem exacuit.

Sanguis equorum admissariorum medicamentis exedentibus commiscetur. Cæterum antidotus ex sanguinibus contra letalia uenena exhibetur. suscipit hæc autem, sanguinem anatinum, hædinum, & anserinum.

Aera, lolium calfaciens & desiccans in tertio fermè à temperatis recessu, iridi æqualis in medendo uires obtinet.

Acalis fructus est plantulæ in Aegypto prouenientis. Cuius dilutum collyrijs, quæ claritati oculorum officientia discutiunt, commiscetur.

Acacia, siccificæ uirtutis est in ordine tertio, frigorificæ uerò in primo: ubi lota fuerit, secundo. Est porro peracerba & terrestris.

Acalyphe, urtica, nō tā semina q̄ folia tenuiū sunt partiū, citraq; erosionē desiccant. Quæ tumores præter naturā omne genus distrabūt, abstergūt, deyciūtq; per aluū, inflādī etiā potentiā mediocrē obtinēt, eoq; in uenerē tāto pere proritat.

Achanthus, à quibusdam melamphilon, à nonnullis pæde rota nuncupatur. Est autem ex eorum albo, quæ digerendi & refaciendiq; potentiam habent.

Achantium subtiliorum est partium, excalfactoriam facultatem obtinens, proinde his qui conuelluntur remedio est.

Acanthes, spinæ candidæ radix, exiccatoriae et modicè adstringentis est potentia: quapropter nō cōtinentib. cibū, quos Græci stomachicos appellāt, et cruētis eiectionib. auxilio est. Dēiū cruciatus sopit. Semē huius tenuis essētiæ, calorificaq; potestatis est. quāobrem ijs qui cōuulsionib. infestātur, cōuenit.

Acantham, arabicā spinam Aegyptiam quidam nuncupant, quæ ualidam astringendi & arefaciendi uim possidet: quare sanguinis & alias quoq; fluxiones cobibet.

Ocimum, quædam ocimo similis, mediocres astringendi uires

uires continet, eoq; pota aluum mensesq; comprimit. Pars, sacrisq; ignibus, illita medetur.

Aconitū, quod pardalianches appellatur, exedendi & de uutoriam seu uirulentam facultatem obtinet, quam ob causam intro in corpus assumendum non est. Foris tamen carnis is quas exedi oportet, adbibetur.

Quod uerò lycoctonum nuncupatur, similis propemodum priori facultatis est: sed peculiariter lupos interficit, ceuroximum illud pantheras.

Acorum, calfacit & exiccat in tertia distantia. Probar radice eius usus ad proritādum lotium, & ad lienis scirrum. Extenuat membranæ ceratoidis crassitiem.

Acrides, locustæ, suffitæ meiendi difficultatem, præcipue uulierum, sanant: sed alis destituta, scorpionum morsibus uniuino pota succurrit.

Adæ, cum magna, tum humilis (ebulum hanc, illā sambucum Romani uocant) utraq; exiccandi, et temperatè discutiendi, conglutinandiq; facultatem obtinent, & non tam bibitæ uiam comestæ aquas per uentrem inferiorem pellunt.

Sales in uniuersum omnes magnopere desiccāt atq; stipant. leoq; quicquid humoris in corporib. cōtinetur, id totum uel epascēdo cōsumūt, uel subducūt. Proinde salsamēta cōdiunt, a putredine uindicāt. Sed cremati, ualentius dissipant.

Alibæa, uel ebiscus, maluæ syluestris genus est: cui uis dissipandi, laxandi, inflammationes arcendi, placandi, & phlegmata panos maturandi inest. Radix porro & semen cætera uidem ex intensione maiore possident, sed uirilignes deterunt, & semen calculos confringit.

Halimō, dissimularis est essentiæ, sapore salsugineoso, atque abstringēs. Plurima eius pars temperate calida, cum uiditate sfreni existit: lac pariter & genituram procreat.

Alcæa, agrestis maluæ species est, q̄ cū uino pota intestino uel torminib. ac morсионib. medetur, præsertim ipsius radix.

Alcyonio.

Alcyoniorum omnia genera detergunt ac distrabunt, quatenus habentia acris: sed M. lesium, quod uermiculosum ac purpureum, bonitate post se cetera relinquit: quod combustum induitur alopecijs, lichenis & uuliginibus exterit. Sed quod ex ma superficie laui, uehementer acris existit, non modo cutem extergit, sed excoriat etiam. Quod lanis succidis est simile non parum reliquis omnibus habetur imbecillius.

Alme, muria salsugine expers alterius essentiae, consimiles sali facultates, non tam ualidas uero, aqua temperata perfidetur. Muria autem salforum piscium, oliuarumque sale condurum, quae colymbadas dicunt, in extergendo maiorem uim continet, atque ob id quidem contra coxendicum dolores, & intestinorum tormina, clystere infunditur.

Aloe primi ex calfacientium ordinis est, exiccantum uero tertij. Et stomacho gratissima, abstergendi, distrabendi, & aluo oletulum eiciendi uires continet: elota imbecilliores extergendi uim possidet: atque magis amica uentriculo est & inflammatione leuat, huiusmodi cicatrices conciliat, potissimum his quae ani & genitalium loca torquent.

Halos anthos, hoc est salis flos, liquidum medicamentum est, subtilioris essentiae quam sales cremati, acris qualuatis, & admodum distrabentis potentiae.

Halosachne, stumosa salis efflorescentia, salis spuma est, subtiliorum illo partium, uehementius quidem digerens, sed ad contrahendum minus efficax.

Alfine, quam nonnulli auriculam muris appellant, comparabilem belxinae potestatem sortita est, frigoris scilicet, & humectantem: quamobrem feruentibus inflammationibus congruit.

Alypi herbae semen per inferna atram bilem expurgat, sumptum cum pari ephymii pondere, adiectis salibus & acetis, laui tamen exulceratione intestina afficit.

Alysson frutex inde quidem nomen claturum sortitus est, quod rabidorum

bidorum canum moribus succurrit. Habet uerò facultatē cificam, distrahentem, & absterforiam potestatem obicit, infarctos renum meatus obstructione liberat: et ephelin, c est asperitudinem, et decoloratam tanquam à solis ardo cutem, extemit.

Alopex, uulpes: oleū in quo tota uulpes uiuens uel extincta est, tāta discussoria facultate præditi est, ut qui in imo reni humores, in summam cutem extrahat. Quæ ratione triculorum doloribus laborantes in solium huius olei descendere iubeamus, in longum tempus, si morbus quidem incens, finitur: si inueterat, moderatior redditur.

Amaracum, maiorana, terty calfacientium ordinis est, arecientium uerò secundi.

Amarantum extenuantis & incidentis est naturæ. cum no itaq; potum menstrua agit, sanguinem in minima frustu conglobatum liquat: cum ænomelie haustum, omnes fluxus desiccet, stomacho interim infestum.

Ambrosia potentiam habet conspantem & repellentem, ita plasmati modo illita.

Ammi calfaciendi & exiccandi uim habet, in tertio grau. tenuioris consistentiæ, discutientiis & urinam proliciens naturæ: cuius semen utilissimum est.

Amiantum nascitur in Cypri insula, scissilis præferens luminis faciem, inflammatur quidem ab igne, non tamen omburitur. Viuntur nonnulli ad siccifica depilatoria.

Ammos. sabulum in littoribus maris potentioris, est potestatis exiccatoris: feruens igitur sole succensum, aquosa are acit corpora, si eo aggeris modo obruantur & sepeliantur. correfactum uerò, sumentum siccum, milij salis que loco, præstat.

Ammoniacum thymiana, gutta ammoniaca, quæ ad odorem uaporatur, liquor est ferulæ, intensam emolliendi facultatem obtinens, addò ut duritias non sensiles, quas scirrhus uocet,

uocant, & articulorum topbos dissoluat.

Amurca è secunda classe est potenter calfacientium, siccantium intense: quo nomine corporum siccioris temperamenti hulceribus medetur, reliqua omnia contēdit et irritat.

Ampeloprasum, seu syluestre porrum, acerrimū existit lidissimūq; facultatis in extremo à temperatis recessu. Quod circa exhulcerat, & uiscidos humores incēdit, organa obstrata obstrictione liberat, & stomacho perniciosum est.

Ampelos agrias, hoc est, uitis syluestris, cum racemi, tui uirgulta, abstergentis sunt potentiae, nonnihil tamen stipitatis obtinent.

Ampelos hemeron, uitis satiuā, eandem fermē quam uitis syluestris facultatem habet, nisi quod imbecillior est.

Bryonia, quam Græci ampeloleucen quoque, id est uitis candidam, & philotron à depilandis corijs, quem usum habet, nominant, ramuli ueluti stomacho accommodati, manducantur, & lotium proliciunt. Radix extergendi uim habet, & subtilium est partium, ac temperate calida: qua ratione splenes induratos, si bibatur, liquat. Cum caricis eadem foris illita, scabies, leprasq; medicatur.

Ampelos melæna, uitis nigra, quæ et ipsa bryonia nomen habet, per omnia prædicta refert, nisi quod inefficacior est.

Amygdala amara extenuant, & ab obturatione tenaciorumq; humorū qui in alto corporis hærent, uindictam cutem extergendi potentiā obtinent. Eiusdem etiā facultati ipsa arbor est. Sed dulcia moderatam caliditatē sortita sunt.

Amylum, expurgato tritico ad hunc modum conficitur triticum aqua ut madescat, sub Sirij stellæ ardoribus irrigatur, aqua transfusa & commutata per diem quinquies. Vbi autem teneritudinem contraxerit, colata aqua, denuoq; infusa, furfures supernatantes cribro excepti separantur, & quamprimum sub sole priusquam acescat siccantur. Hoc moderatè refrigerat, siccant, & acria lenit.

Amomum

Amomū uiribus acoro cōpar est: praterquā quod acorus
maiorē siccandi, amomum uerō coquēdi potestatem obtinet.

Anagallis utraq; admodum extergentis est potētia, caloris
iam nonnihil, & nonnullas attrahendi uires continet, adeo
t surculos, spicula euellat. Succus ipsarum caput per nares
iucum exugendo purgat.

Anagyrus teterrimi odoris frutex est, acris, calfaciens &
attrahens, semen ualde tenuium est partium, & cicendæ uo-
citioni dicatum.

Andrachne, portulaca ex tertia classe refrigeratiū est, hu-
edantiū uerō secūda: qua de causa febre æstuantib. aluo im-
posita opitulatur. fluxus expellit. Dēiū stuporē, qui ab acido
i cō:actu cōtrahitur, suo lēto planat atq; emēdat. Ob stip-
citatē uerō opē dysenterijs & sanguinis eruptionib. cōfert.

Androsæmon duplex est: alterum quidem ascyrrhon, siue
cyrrhoides uocatur, & est species hyperici: alterum uerō
ionysius. Vtriusq; semen expurgandi uim continet, sed for-
a potentius desiccant.

Androsarces, herba, amarorem & acrementum habet,
aturamq; diattrahendi & arefaciendi. Potest non tam ipsa
iām semen eius, potu urinam ducere.

Anemonæ, omnes acris, absterforiæ, euellentisq; & ora-
isorum aperientis naturæ sunt. Pituitam itaque euocant, &
præ detrahunt appositæ, lacq; suppeditant.

Anethum, calfaciēdi extensam habet facultatem in recessu
temperatis secundo, arefaciendi uerō remissius: oleo elixa-
um discutit, dolores sedat, somnū conciliat, crudos et matu-
ationi rebelles tumores concoquit. Crematū tertiam calfaci-
endi siccandiq; distantiam induit, qua de re h ulceribus humo-
flaccescētibus impaetum subuenit: humidius, minusq; calis-
um, eoq; maturatiuum magis est uiride.

Anthyllidis duo sunt genera, sed utraq; hulcera desiccant.
æ camæpityi non absimilis est, tenuioribus constat partis
bus,

bus, aded ut comitali morbo obnoxios iuuet. Postremo in tergendo maiorem efficaciam exerit, quàm altera.

Anisi semen acrius existens, calidū & siccum in tertiana stantia est, eoq; lotium elicit, & flatus discutit.

Antirrhinum, uel anarrhinon, bubonio, hoc est inguinis herbae similem sortita est potentiam, sed imbecilliolem: ex lo igitur etiam huius coniecturam facito.

Anonis, ononis' uel excalearia uirtutis est, praesertim dixerit cuius succus cum uino potus, non lotium modò proritat, sed lapides etiā dissipat, crustas frāgit, ac dentium cruciatus lenit.

Aparine sunt qui phlambropon, qui omphacocarpon uocant, moderatam habet abstergendi & exiccandi potentiam & subtilioris substantiae quippiam.

Apios, pirus, disparis temperaturae est, partim terrae, partim aquae naturae compos. Quapropter esu stomachum adiuuat, suum sedat, cataplasmatibus modo inducta exiccata, & moderate refrigerat.

Apocynum, uel cynocrambe, hoc est canina brassica. Vocatur autem et cynomorum (id est canum mors) quod canes enecet ocysimè: sed & homini letale uenenum est, satis tenuem odorem spirans, citra ariditatem calida. Quocirca illi tumore pacta, destrahit.

Apochyma, resina xopissa, uetus à nauigijs derasa pix est diffundendi et desiccandi uirtute donatum, tumores discutit.

Araneus animal, autore Dioscoride, in emplastrum entolitur, fronti q; & temporibus impositum, tertianarum febrium circuitus persanat. Tela eius adbibita, sanguinis eruptionem compescit. Et hucera in extrema cute ab inflammationibus uindicat.

Argemones herbae potestas in abstergendo et dissipando sita est.

Arisarium multo minus quàm aron est, & acrius, radicis oliuae instar obtinens.

Artislochia (id est, mali terra) omnes species calidae sunt, petens

potentia, & subtiliorum partium, in astringendo efficaces, marulenta, subacres, atq; ad medicationes utilissima. Vetusum rotunda tenuitatis longè plus, & ad omnia vires efficaciores continet. Sed quæ clematidis (hoc est sarmentacea) appellatur, fragrantior quidem, sed imbecillior. Longa intertramque medium facultatis locum obtinet, nisi quod caliditate sua rotundæ nihil concedit.

Arceuthos, iuniperus calfacioria siccificaq; in tertio ordine facultatis est. Fructus eius pari quidem modo calfacit, sed prima distantia siccatur.

Arcion herba, quam et prosopiten cognominant, folia cynibidis similia continet, ampliora uerò & duriora. Naturæ distrabentis, exiccantis, & astringentis est. Quæ ratione omnia uetustis h ulceribus succurrunt.

Arctium uerbasco respondet: radicem uerò teneram, candidam, & dulcem possidet. Attenuantis, siccatoria, mediocriterq; extergentis potentia est.

Armeniacum abstergeredi uirtute cum leuiuscula acredine, & exigua stipticitate præditum est: quæ de re ocularibus inditur medijs. Prodest itidem ad pilorum in palpebris incrementum.

Arnabo in odoramentorum cõsu est, cuius rei gratia unguentis subinde inseritur, tertij calfacientium & arefacientium ordinis, castia carpesioq; simile. Quamobrem in eius penuria, Polonium cinnamomum in locum ipsius substituendum censuit.

Arnoglossum, plantago frigorigica pariter et siccifica facultatis est, secunda à temperatis distantia, mixtoq; temperamento, partim quidè terrena, partim uerò aquosa substantia constans: obtinet austerum quiddam, atq; astringens. Eam ob causam uersus malefica h ulceria, fluxiones ac putredines idonea, symmetria temperiei, & hæmorrhagias cõpescit, & multo usque usus est, et plurimis cõferens: siccitatis etenim absq; errore particeps est, frigiditatem torporis expertem obtinet.

Arum ex prima calfacientium & desiccantium classe est.

Nn

terrestre

terrestrem & ipsum consistentiam calidam atque extergentem sortitum. Radices eius maiorem calfaciendi uim, sed dracunculo inferiorem possident.

Arsenicum, auripigmentum urentem habet potentiam, quo ad denudandam pilis quamuis corporis partem utuntur. Quod nisi maturè detrahatur, ne cui quidē ipsi parcat. Ceterum uisione subtilioris redditur essentia.

Artemisia, utraque species artemisia calfaciendi uim habet in secundo à medys recessu, exiccandi uerò in primo. Cōstat ex partib. raris, subtilib. q̃. Qua ratioe renū lapides cōfringūt, et ad muliebrū locellorum fomētationes accommodatæ sunt.

Artos, panis cataplasmatibus modo illitus, potentiores habet in distrabendo facultatem quàm triticum, id quod ad salis & fermenti naturam referendum est. Præditum enim extrahendi facultate ex alto fermentum existit.

Afarū, acoro asimilis est potētia, sed paulo magis intēsa.

Absole, fuligo qua pictores utuntur, ex utriusq; officinis colligitur, distrabētis & acris est potētia. proinde nō tā adurit, q̃ exedit. Vulnerib. cicatricē cū cerato rosaceo cōciliat.

Ascalobotes, stellio animal ad alia quidem nihil adfert momenti, à scorpij tamen iclu compunctos iuuare perhibent, si plagæ imponatur. Commiscetur etiam intendendi facultatem habentibus medicamentis.

Aselepias calida et arida facultatis, subtiliūq; partiū, torminib. cum uino sumpta succurrit, illita uenenatorum iclus, utriq; & mammarum maligna bulicra medetur.

Ascyrrhi, in androsæmo facta est mentio.

Aspalathi facultas ex dissimilaribus constat partibus, acri pariter & astringente. Ex utriusq; ratione siccificæ est potētia, atq; ob id quidem medendis putredinibus & defluxionibus est utilis.

Asparagus petreus siue myacanthinus, abstergendi uim possidet, media inter caliditatem & frigiditatem temperie.

Renum

Renum & hepatis meatus ab infarctu & obturatione uindictat, præsertim radices ipsius ac semen: quinetiam dentium cruciatibus medetur.

Asplenū, facultatis quidē attenuantis est, non tamen calida, quo utiq; nomine calculos atterit, & renes comminuit.

Astaphis, uua passa, satius quidem concoquit pariter & astringit, moderateq; dyscit. Sylvestris uerò tantæ acrimoniæ est, ut pituitā capitis per os deducat, et ualēter abstergat.

Atticus asier herba, quā alij bubonū, id est inguinariā ob hoc ipsum appellāt, quod nō solū cataplasmatīs more impaēda, uerū adalligata etiam bubonib. prodesse creditur. Mixtam facultatem, discutientem et refrigerantem sortitus est.

Astragalus, pusillus est fruticulus, radice astringente, arefaciens non instrenuē. H ulceribus itaq; diuturnis cicatricem inducit, alui fluores cohibet radix in uino elixa & pota. In Phæneo Arcadiæ, plurimo prouentu nascitur.

Asphaltus, bitumen secundi ordinis arefacientium & calfacientium est, qua de causa uulnera cruenta glutinat.

Asphodeli, hastulæ regiæ, radix cū abstersione, discutiēdi facultatē obtinet. Deustæ aut cinis calidior, siccior, et tenuioris substantiæ redditur. Qua de re capillorū defluujs medetur.

Atractylis, colus rustica, uel cnicus sylvestris, ex spinarū exitu genere, persiccatoriæ et mediocriter calorificæ potētiae.

Atriplex humida quidem in secundo excessu, gelida uerò in primo, ideoq; uentrem ocysimè permeat. Semen huius abstergit, quamobrem contra morbū regium ex iocinoris præfarctu, utilis est.

Aphace, modo lentis astringit: comesta concoctioni quā lenticula contumacius renititur. Potentius cum moderato calore desiccatur.

Aphronitrū, tantæ digerentis et abstergetis est potētiae, ut non sordida quæq; tantum detergere, sed prurigini etiam opitulari possit. Ledit autem, si potetur, stomachum.

N n 2 Spuma

Spuma nitri eiusdem cum nitro facultatis est, nisi quodd subtilioris est essentia, ac proinde contritum triticeæ farinae specie exhibet.

Achras, pirum sylvestre, æqualis cum piro potentia est, sed magis quam reliqua pirorum genera intensa: cuius rei gratia ampliora committit hulcera.

Absinthium, ex prima calfacientium classe, exiccantium uero tertia astringente, amarulenta, & acri simul qualitate pollet, qua biliosos uentris humores cum per aluum, tum per lotium exhaurit. Quibus uero pituita in uentre retenta redundat, his ob uim adstringentiam nihil opis præstiterit. Succo eius longe in cal faciendo præstantior uirtus est.

Balani myrepisicæ, hoc est glandis unguentariæ internum seu carnosum, abstergentis & incidentis cum astringente facultatis est. Ob hæc sanè non uomitiones modo cõcit, sed per egestionem alui excrementa largiter deiecit, cum mulsæ drachmæ unius pondere sumptum. Cæterum cum posca contra uiscerum obstructionem remedium est. Quia & foris cutis etiam uitia cum aceto illitum exterit. Cortex eius uehementem adstringendi facultatem possidet.

Bacharis, fragrantior est herba, cinnamomum referens, coronaria, acrimoniam gustu relinquens. Cuius radix elixa, obstructiones recludit, lotia ducit, & menstruas purgationes promouet. Folia eius quoniam adstringendi facultate pollent, cohibendis fluxionibus accommodata sunt.

Balaustium, sylvestris mali punici flos est, ualenter adstringens, sicca & gelida facultatis. Hulcera igitur quæ summam occupant cutem, cicatrice obducit, & fluxiones cohibet.

Balsamum, quod instar ligni existit, calfaciendi et arefaciendi uim habet, secunda à medijs distantia, & attenuantis est substantia. Opobalsamum, hoc est liquor balsami, longè subtiliorum est partium. Carpobalsanum, quod est fructus balsami, eiusdem quidem facultatis, sed partium subtilitate inferior est.

Baloten

Baloten alij marrubium nigrum uocant, acrem & detergentem habet potentiam. Cataplasmatibus modo cum sale impadum, i&ibus rabidi canis opitulatur.

Bati rubi fruticosum, potentē adstringendi siccandiq; uirtutē obtinet, quo nomine uulnera conglutinat, et destillationes fluoresq; cōpescit. Radix eius præterquā quod constipat impensius, non exiguam habet consistentiæ subtilitatem, qua lapides renum confringit. Fructus, siquidem maturus sit, cū moderata quadā astringitione calidior, et ob hoc etiā uescus est: immaturus uerò cōstringit, & potenter exiccat, præsertim desiccatus. Congeneres etiam facultates flos obtinet.

Batrachi, ranunculi quatuor sunt speciatim discrimina, omnium iusto calidior et siccior est potentia, acris uidelicet & urens, adeò ut non sine dolore exulcerationē excitent. Quibus si intra modū utare, cutis tantū uitia abstergūt. Radix autē eius arefacta medicamentum sternutationi ciendæ præstabit.

Batrachi, ranæ in iure esculento elixæ, à uirulentis morfib; percussis utiliter eduntur: combustarum uerò cinis quoniam deustione siccissimus euadit, sanguinis eruptiones sistit, admixtaq; liquida pice alopecias sanat.

Bdelliū tā Scythicū quā Arabicū, ad indurata emolliendū quodāmodo natū est, præsertim uerò recētia. Arabicū uerinā quoq; proritat, lapides cōminuit, & cruda concoquit.

Betonica persubtilibus admodum ramulis herba est, frondes pulegio similes sortita, sed graciliores, & tantum non qualitatibus expers gustantibus. prouenit frequenter locis saxosis, qua et in renū medicaminibus utuntur. Est uerò apud Romanos adhuc alia quædā betonica cognominata, quæ à Dioscoride cestrō uocatur, ab alijs uerò psychrotrophon, quod gelidissimis gaudeat locis, excepta efficacia, nihil possidens affine superiori. ad prouocandum lotium, & alia bene multa egregie prodest. Porro radix ipsius uomitiones irritat, si cum hydromelite bibatur: folia autem aluum deiciunt.

Bechiū, tuſſilago, ſunt qui bechicō nūcupent, inde adeo quod bichas, hoc eſt tuſſes, & non niſi recta ceruice ſpirandi anguſtias perſanandi prærogatiuā quādam habere uideatur ſuffitum. Conſtat uerò ex calida & aquea ſubſtantia.

Blitum eſui idoneum olus, humidum & frigidum eſt in ſecundo à temperamento reſeſſu.

Bulbus, qui edendo eſt, leuem quādam amaritudinem, pariterq; adſtriſionis puſillum continet: deſiccāt, abſtergit, & conglutinat uulnera. Bulbus autem uomitorius eſt, cuius lento longè calidioris eſt potentia.

Botrys, quam ambroſiam nonnulli, quidam artemiſiam nūcupant, planta eſt inſigniter odorata, quæ cum uino ſumpta, orthopnoicis opitulatur.

Buboniū, aſter Atticus nūcupatū, in aſteris hiſtoria traditū.

Bugloſſum, lingua bubula, calefacit & humectat. quam obrem in uinum deieſtam, animi uoluptates lætitiāq; conciliare perhibent.

Bunium, quod aliqui arſion dicunt, calidum eſt, urinam menſesq; promouet. Falſo uerò banium, quod pseudobuneon nominant, illi eſt aſimile.

Bupreſtis, beſtiola eſt, cantharidi non abſimilis, eamq; ob cauſam haud aliter quā illa reconditur.

Butyrum, maturat, & mediocriter diſtrahit, in tenellis corporibus. Bubonibus itaque & abſceſſibus circa aurem præſenti eſt remedio, gingiuis extenuat, præſertim puerorū dentientium. humores pectori impactos, linſum concoquit.

Buphthalmon, florem gerit chamæmelo ſimilimū, uerū multo grandiore & acriore, qua de re diſcutiendi etiam uim obtinet, ita ut duritias quoq; cerato mixtum curret.

Brathry, ſabina cupreſſo ſimilis eſt, calefacit & ſiccāt in tertio à temperatis exceſſu, & tenuiſſimis eſſentiæ partibus conſtat. extenuat itaq; & digerit pota. Puitredinibus cupreſſi more accommodatur.

Bretanica

Bretanica astringit pariter & conglutinat, syluestri ru-
mici facie & figura similis. Expressus ex bretanica succus,
oris putredinibus subsidio est.

Bromus, auena legumen uirib. hordeo respondet. Arefacit
aut, & moderata citra uellicationem distrahit, stipticitatisq;
nonnihil obtinet, ac proinde uentris fluoribus remedio est.

Bryon thalassion, muscus marinus refrigerantis & astring-
entis est potentie, feruentibus itaque inflammationibus il-
litum subuenit.

Bryon, quod splanchnon à quibusdam nuncupatur, in
quercubus albisq; populis pariter & piceis repertum, dige-
rentis simul & emollientis mediocriter potentie est, præser-
tim quod in cedris inuenitur.

Bryonia, in uitis candida historia explicata est.

Gala, lac omne è trib. conflatum est essentys, caseosa, sero-
sa ac pingui, qua comprimis abundat bubulū, unde & bu-
tyrus efficitur. Serum ipsius abstersoria præditum est poten-
tia, qua de causa aluum quoque subducit, si ipsum decoctio-
ne secernas: caseosum uerò lac, crassum que magis obstru-
it, atque ob id quidem acridinem retundit. Lac cum litorali-
bus lapillis candentibus, alias' ue decoctum, inculpatius fit, &
præstantissimum intestinorum torminibus, & acris uentris
fluxionibus remedium. In totum uerò lac, contra acria oculo-
rum rheumata, & alias quascunq; acrimonias competit. Tem-
peratissimum autem omnium lac est humanum, mox capri-
lum, deinde asininum pariter & ouinum, postremò bubulum.

Gales, mustelæ crematæ cinis abunde distrahit: cñ aceto itaq;
illitus, misera pedū ualitudine arthritideq; oppressos medica-
tur: torrefacta aut et inueterata magno etiā morbo opitulatur.

Galium, appellationem ab eo quod lac coagulet, obtinuit
a parina non absimile, uires desiccandi cum acrimonia qua-
dā leni sortitum est. Flos eius contra sanguinis eruptiones &
combusta est præsidio.

N n 4

Galipfis

Galipsis, alij galibidolon nuncupant, urticae neutiquam
absimilis est herbula, leuorem tamē maiorem, uirosūq; &
graucolentum emittit odorem, discutit, & scirrhosos tumo-
res emollit. opem hulceribus quæ depascendo serpunt, cata-
plasmatis modo illiis confert.

Garum excellenter calefacit & exiccat, qua de causa
medendis putrescentibus hulceribus foris quidam adhibent.
Infunditur item utiliter his, qui intestinorum torminibus, &
dolore coxendicis tentantur.

Gentiana radix, magna satis efficacia expurgare, atte-
nuare, detergere, & ab infarctu deniq; uindicare potest.

Geranii una quidem species, folijs est anemone similibus
prædita, radice esculenta, quæ in uino drachmæ unius pon-
dere sumpta, inflationes uteri discutit. Altera uerò huius ber-
bæ species, ad medicinas inutilis est.

Ge, terra quælibet exiccandi uim habet: quæ uerò nulli
alteri mixta essentia est, id etiam sine corrosione præstat.
Quod si ignea quædam illi qualitas admisceatur, hanc etiam
lotione exuit. Terræ cultæ quælibet pinguitudo, ad cuiusuis
membri exiccatione opus habentis medelam, utilis est. Luti
Aegyptij ad aquaticas & lienosas afflictiones in medicina
usus est, tum ad laxos quoq; tumores haud obscurè proficit.
Ex terra medicaminosa, Lemnia rubrica, quæ sphragis, hoc
est sigillum appellatur, desiccatur, & astringit moderatè, uiru-
lentis medicaminibus præsentaneum amuletum existit. Me-
detur itidē maleficis hulceribus, admixto aceto, seu uino. San-
guinis eruptiones quascunq; sistit, & intestinorum tormina,
depascentium quoq; hulcerum naturam imitantia, intesti-
no mulsa prius, mox salsilagine etiam cloto sedat. Mi-
nium, rubrica Sinopica, maiorem habet uim quàm Lemnia:
emplasticis inseritur remedys, tæniarūq; uentris in potu sum-
pta interficit. Samia terra mitior quàm Lemnia est, ceu
glutinans & uiscosa. Utendum itaq; ea est, quotiens mitiga-
tionem

tionem res ipsa postulat: quibusuis sanguinis, quacunq; parte erumpat, reiectionibus auxiliatur. Selusina terra, Chiaq; uim absterforiam multo potentiores obtinent: qua de causa mulierculæ quædam ea ad lenocinium faciei inducendum, cutim læuigandam & erugandam utuntur. hucera carnis expleat, & ad cicatricem perducunt, præsertim ambusta. Creta cimolia mixtam facultatem obtinet, frigoricam & diaphoreticam illota. Abluta uerò refrigerat uehementius, & ambustis ex posca subuenit. Ampelitis à uincis nomen sortita est, quod illita innascentes uitibus uoluoces uermiculos enecet. Habet insuper arefaciendi & discutiendi strenuas non sine erosionem uires. Cretica terra aërosa est, et citra moradicationem absterforia. Bretria terra euidentem adstringendi uim possidet. Cremata uerò arefacit sine morsu. Probatur magis cinerulenta. Pnigitis terra, eadem potest quæ cimolia, sed est non paulò nigrior. Armenia, quam bolum dicunt, summè persiccata: proinde intestinorum torminibus, alui profluuijs, reiectionibus sanguinis, tabi, difficultati anhelitus ex humiditate, humectibus hucerbis, & pestiferis deniq; affecibus egregiè subuenit. Interdum cum uino tenui diluto: si febris infestat, cum aqua potatur. Alana uerò gleba æqualem habet Armenia effectum. Ochra, distrabentis & exedentis est potentia. Quapropter carnes lasciuientes, & huceri supercrefcentes compescit, & uacua explet, si cum cerato mixta adhibeatur.

Geras, senecta, exuuiæ anguis summè desiccata: quare cum aceto decoctæ, dentium cruciatus adiuuat. Aspidi, senectus oculorum aciem plus alijs exacuit, si trita cum melle oculis illiniatur.

Ges entera, intestina terræ (uermes terrenos quidam uocant) læuigata, & neruis saucijs impacta, maturrimè ad miraculum usq; succurrent.

Gigarta, nuclei acinorum uuae exiccant ordine secundo, refrigerant uerò primo, gustuq; abundè acerbi sunt: affatim

Nn 5 fluxibus

fluxibus idcirco quibusq; conueniunt.

Gingidium non admodum euidentis calfactoriae facultatis est. Exiccatur autem in tertio à temperatis excessu, atq; astringit: proinde gratum est stomacho.

Glaucium astringit cum insuauitate quadam, refrigerat non obscure, sacrosq; ignes non adeò ualidos sanat.

Glaux herba, temperaturae calidae est atq; humida, & proinde nutritibus lactis ubertatem generat.

Glechon, pulegium excalfacit & attenuat potèter, quapropter emplastri modo impositum, rubrificationem inducit: ex pectore & pulmone, humidos, crassos, atq; tenaces humores, excreta faciles & ductiles reddit.

Glaeos, hoc est, strigmentum sordesq; balneorum modicè calfaciendi, emolliendi, discutiendiq; uim habet, rhagadibus & condylomatis confert.

Glycyrrhiza tepida & humida est temperamento, cum leuiuscula quadam uis adstrictoria. Qua de causa asperitates lenire solet, neque tantum in arteria, sed etiam in uesica scabra. Siti extinguendae habilis.

Glycyfiden quidam pentomoron, nonnulli pæoniam uocant, cuius radix acrimoniam habet, & leuem amaritatem cum ariditate coniunctam, nonnihil astringionis quoque obtinens. Mouet itaque menses, renes, iccurq; emundat, amygdali quantitate è uino sumpta. Si uerò uinum, in quo potatur pæonia, fuerit austerum, alui profluvia sistit. Alligata, pusio num comitialibus medetur.

Gnaphalium, centuncularis herba, inde à Græcis nomen sortita est gnaphalion, quòd folijs eius subtilibus, & ob molliem sequacibus, tomenti loco utantur. Sunt autem candida, & leuiter astringentia. Qua ratione cum uino astringente contra intestinorum tormina bibuntur.

Gorgilidis, rapi non tam radix, quàm semē inflandi uim retinent semen genitale procreant, ueneremq; excitant.

Gorgyo

Gorgylum, sunt qui scfeli appellant, calidum est, urinam
et menstrua ciens: radix eius cum melle linctā, uitiosos pe-
toris humores educit.

Gyris pollen farinaceus, uires habet amylo congeneres,
sed calidior quadantenus.

Gypsum præterquàm quod exiccat, opplendi facultatem
obtinet. Quo fit, ut sanguinis eruptionibus opituletur, dilua-
um cum polline et oui albore. Crematum non tantam op-
plendi uim obtinet, sed exiccandi maiorem, retunditq̃, potis-
imè cum posca.

DAdes, tedæ nonnihil acredinis habet, et uim concoquen-
di, et detergendi. Proinde in aceto elixā, iureq̃ eius, ore
dentibusq̃ collutis, cruciatus dentium placant. Quod si cum
nelle sumantur, caput pituita per palatū exonerant. Lincti-
bus permixtæ, quæ in pectore hærent, ductilia, excreta tuq̃
facilia efficiunt.

Damascenorum uberior fiet in Prunis mentio.

Damassonium abstergentis est potentia, ac proinde cal-
culos cōfringit, et quæ per aluū diffluūt, ad urinas deriuat.

Dauci (quem et staphylinum nuncupant) duæ sunt spe-
cies. Satiui radix flatuosa est, eoq̃; ad uenerem excitat. Syl-
uestris uerò dauci semē, nihil flatuosi habet, sed lotij et men-
sium proritandi uim continet. Eiusdem facultatis ipsa exis-
tit etiam herba.

Daphnes, lauri arboris folia siccant, et excellenter cal-
faciunt, sed bacca magis quàm folia. At radice cortici ama-
ritudinis et acerbitatis nonnihil inest, lapillosq̃; comminuit.
Si potetur ex uino fragrante, triobolari pondere, iocinorosis
est præsidio.

Daphnes herba, quæ et Alexandria uocatur, tempera-
mentum est calidum, gustus acris pariter et subamarus.

Quamobrem menses et lotia proritat. Cæterum daphnoi-
des, hoc est, laureola, potentia persimilis Alexandriæ est,
quem

quemadmodum sanè & quæ Chamædaphne nomē claturæ obtinuit, quæ utiq; etiam ipsa esculenta est.

Derma, pellicula ouis recens detracta, & etiamdum calida, his qui quocunq; modo uapulauerunt circumposita, mirificè succurrit.

Hippopotami, hoc est, fluuiatilis equi pellis combusta, atq; cum aqua trita, & superinducta, panos discutit. Pellis uiperina leuigata, & impacta, in alopecie glabretis, pilos cum admiratione reuocat.

Solearum ueterum coria, igne cremata, cinerem ualde exiccatorium reddunt. Quamobrem ex calciamentis, pedum attritibus nōdum inflammatis et ambustis, intertriginibus, carniūq; excrecentiis medetur.

Dictamnus subtiliore potentia constat quā pulegiū, cætera similis. Verū quæ pseudodictamnus, id est falsa dictamnus appellatur, imbecillior est.

Dionysius, in dictione Androsæmon explicata est.

Diphryges mixtam sortita potestatem est. Complectitur enim in se acerbi nonnihil, & acremēti aliquantulum. Quo nomine hulceribus malignis præsens est remedium.

Dipsaci spinæ radix exiccatoria est, in secundo abscessu cæterum abstergentis nonnihil potentia habet.

Dorycnium frutex papaueri & mandragoræ, æquipollentem habet temperaturam, extremæ frigiditatis. Cuius sanè si modicum sumatur, stuporem conciliat: si paulo largius, interficit.

Dracunculus aro æquale quiddā possidet, sed illo acrior, amarior, calidior, subtiliorisq; substantiæ est, & leuiusculam quandam adstrictionem permixtam habet. Radix ipsius uiscera, si in potu fuerit hausta, expurgat. Saluberrimū per uisceribus & maleficis hulceribus est præsidium. Folia similem facultatem sortita sunt. Fructus efficacior est.

Dryopteris, quærna filix, gustantib. mixtam exhibet qualitatem,

itatem, dulcem & subamarulentam. Radix acerbata est, & im habet exedendi, qua glabreta inducit.

Drys, quercus non tam folia quàm glandes exiccatoria et epida facultate participant. Ob hoc uulnera nō uetusta ceu glutino compingunt, inflammationes iam primū inchoantes sanant. Porro mēbranosum quod sub corio glandis latet, & carnem fructus conuestit, quoniam astringionis multo plus continet, supprimendis fœminarum fluxibus, & alijs quibus unq; profluuiosis & gritudinibus exhibetur.

Benus lignum, uim habet excalfaciendi & extergendi, tenuioribusq; partibus cōstat. Quo nomine quæ tenebras puillis offundunt, extergere & stimatur. Inscritur item alijs medicamentis ocularibus.

Encephalos, cerebrum leporis elixum & lauigatum, si stur, pueris dentientibus prodesse dicitur. Nec desunt, qui id ome sum tremoribus succurrere memoriæ tradiderunt. Cerebrum gallinacei in uino bibendum, contra serpentium idus exhibetur, autore Dioscoride. Sanguinis eruptiones à cerebri membrana profluentes compescit. Cerebrum cameli, ut radit Galenus, aridum cum aceto potum, comitialibus meletur. Idem præstat mustelæ cerebrum. Hirundinis cerebelum melle temperatū, oculorum suffusionibus suffragatur. Quinum cerebrum similiter præparatum, infantium dentitionibus exquisitissimè subuenit.

Elea, germinationes oleæ tantum refrigerant, quantum stringunt. Oliuitas uerò siquidem ex ædè maturuit, temperatè calfacit. Immatura acerbior & frigidior est. Lachryna oliuæ Aethiopica, subtile ammoniacum præferens, naturam habet absterforiam. Hinc cicatricibus medendis, albuginibus, obtusæ item oculorum aciei succurrēdæ adhibetur.

Quin & dentium cruciatus arcet, si cauis ipsorum inferatur. Nonnulli uerò hanc oleastrū, id est oleū syluestre autumanta

Bleon, oleum quod ex oliuīs drupis conficitur, dulce, calidumq;

dumq; moderatè, magis uerò humectans. Oleum, quod e crudis & nondum inchoatè maturitatis oliuis expressum est, à Græcis omotribes & omphacinum nuncupatum, quantum in se habet adstrictionis, tantè etiam frigiditatis particeps est. Oleum uerò elotum, rosionis exors minimè mordicat. Oleo ueteri quantum diuturnitatis, tantum etiam caliditatis accedit, & potentiores ad discutiendum uires acquirit, potissimè si initid ex tenuioribus partibus constiterit: eo autem censu habetur purum atq; pellucidum, & cuius uemomentum, magnam corporis partem inungit, promptissimèq; penetrando à cute imbibitur. Huiusmodi autem præcipuè Sabinum existit. Quod ex oleastro funditur, astringit simul & abstergit. In omni oleorum genere id omnium planissimalidissimum est. Veteri oleo uiribus omnino a quipollentibus, Reliqua olea, sesaminum uidelicet & raphaninum, & quæ id genus sunt alia, pro cuiusque unde constantiessentia, uaria etiam uirium discrimina sortiuntur.

Elæomeli in Syria, oleomel ex quodam arboris caudice sua sponte manat, melle crassius, sopore dulci, quod crudos humores & biliosos per aluū detrabit, duorum cyathorum mēsuracum aquæ hemina potū. Veruntamen qui hauserunt, in ueternum torporē deficientibus uiribus incidunt: quod tamen expauescendū non est, uerū à sopore excitandi sunt crebrius.

Elaterium, succus syluestris cucumeris fructus appellatur, quod è secundo calfacientium ordine existens, menses prolucit, & fœtus in utero appositu, extrema qua pollet amaritudine necat. Expurgat præterea nares cum lacte illitum.

Deducit ipsam quoq; pituitam per inferna factus ex eo clyster, non rarò etiam sanguinem.

Blate, abies arbor, ut nigra populus, calfacit & exiiccatur. Resinæ ipsius inter cæteras resinas fiet mentio. Blatine herba est belxinae similis, mediocriter refrigerās et astringens.

Elaphaboscus, ceruiocellus, calfacientis & siccificæ facultatis

cultatis est, in secundo à temperie excessu, & tenui substantia subastringit.

Eleliphacis, salvia insigniter calfacit, & leuiter adstringit. Helenium, inula campana calfaciendi arefaciendiq; potestatem cum humiditate recrementitia obtinet, eam ob causam linib. permixta lētos humores, qui in peāore hærent, educit. Membra quoc; rubrificat, cuteq; incisa exasperat.

Eleoselinum, hoc est, apium palustre, nascitur locis humidis & aquis, satiuo grandius, atq; ad eadem efficax.

Elephantis unguū scobes cataplasmatīs modo impaēt, reduuys remedio sunt. Ossium uerò ac dentium ramēta, excandī & extergendi facultate donata, in id genus medicamentis frequenter usurpantur.

Helcosmata, argenti recrementa appellantur, ea plumbagini consimiles habēt uires. emplastris fuscis, quæ phæas nuncupant, & ijs quæ cicatricem conciliant, inseritur, quoniam astringunt & euellunt.

Helleborus, ueratrum tam candidum quàm atrum, iuxta calfaciendi siccandiq; uim in tertio excessuum ordine possidet. Est præterea acris & abstergens ui præditum. Quo fit, ut ad leprosa cutis uitia emendanda conueniat. Nigrum per triduum fistulis infusum, callum detrahīt.

Helichryson à quibusdam chrysantho, à nonnullis etiam amaranton nūcupatur, planta coronaria est, comam auræ lucis præferens: quæ in uino pota, angustis urinæ, cōtra serpentium morsus, coxendicum dolores, ruptaq; remedio est. Ciet eadē menses, grumosq; sanguinis hausta ex mulso dissoluit, & à capite in subiectas partes destillationib. opitulatur.

Helxine, parietaria, sunt qui per ditiū, sunt itē qui parthe nō, nec desunt qui sideritim, et qui heracleā uocēt. uirtus eius est abstergere, & cum humore subgelido leniter astringere.

Helxine alia est, quæ cissampelos appellatur, ea discutienti uim possidet.

Blymus

Elymus, panicum, sunt qui melinen nūcupent, milio simili legumentum est, siccatorium & frigoricum, foris impositum etiam uentris fluores exiccat.

Empetrum etiam prassoides uocatur, medicamentum ad purgationes pituitæ pariter ac bilis est, gustantibus salsum, et propter abstergendi quoque uim habere creditur.

Epithymum, thymo efficacius, ex tertio arefacientium & calfacientium ordine atros purgat humores.

Epimedio cum aqueo humore facultas est mediocriter frigorifica: quod illitum, mammas reatas turgentes conseruat, fertur etiam sumentibus potu sterilitatem inducere.

Epimelis, quæ unedon etiam à colonis Italicis nominatur, syluestris pomus est, cuius fructus acerbitate linguam tentat, stomacho officit, capitisque dolores infert.

Epipadis, ab alijs helleborina uocatur, quæ in potu sumpta, iocinoris affectibus & contra uenena utilis est.

Erebinthus, cicer, legumentum familiare & flatuosi spiritus est, copiosi alimenti, aluo ut ile, lotio mouendo idoneum, ad genituræ lactisque creaturam habile, muliebriaque promouens. Porro quod crium appellatur, hoc est arietinum, ceteris efficacius urinam prolicit. Decoctum eius lapillos in renibus comminuit, præcipue nigri. Reliqua uero cicerum species, quæ orobea uocatur, his calidior est, & amaritatis particeps. Syluestria omnibus numeris satius sunt efficaciora.

Eria, fomentis accommodata sunt lane recens ab ouibus detonsæ, necdum à sordibus repurgatæ. pinguetudo nanque earum, quæ æsypon dicitur, in coquendo butyro similis est. Mundata uera lana, nihil præterquam materia, excipiens uidelicet liquoribus, idonea est. Cremata uero acris est, calorifica, exiccatoria, cum partium subtilitate. Ex uligine itaque flaccescentes bulcerum carnes maturrimè eliquat.

Erice, disciendi uiribus sine erosione pollet, in quem uisum florem eius potissimum ac folia usurpant.

Erinos

Erinos, aquatica herba est, cuius seminis drachmæ duæ, cum mellis drachmis quatuor illitæ, oculorum destillationes istunt. Finit aurium dolores instillatus eius liquor.

Hermodyli radix facta ad purgationes per se, & decoctum ipsius est. Priuatim aut articuloꝝ doloribus in ipso fluxus tēpore dedicata, uerū stomacho nimium incōmoda.

Serpillum, usq; ad cō calfactorium est, ut cū menstrua, uum lotia proritet.

Erythrodanum tindorum rubia, radix est acerba & guttū amara, cū lienem, tum iccur, tum renes ita expurgans, ut interdum urinas etiam sanguinolentas proliciat, mensesq; cieat, cutis rugas sordesq; exterat.

Erysimi, irionis semen, nasturtio similiter facultate igneū & flagrans est, qua de re in fermento tostum, pectus in eclegmatis expurgat, duritias emollit, & latentibus denique cancris illitu auxiliatur.

Eusomon, eruca quoq; eiusdem temperamenti, inflationes facit, quamobrem in uenere stimulat. Semen lotium proliciat, syluestri is tamen multo quā satiuā efficacior est.

Bupatorium cum partium tenuitate incidentis est potentia, citra feruorem manifestum: proinde iocinoris infarctus expurgat, & adstrictoria uirtutis particeps est.

Buphorbium exurendi & attenuandi cæteris liquoribus similem uim obtinet.

Ephemerum non letiferum illud, sed cui iris syluestris nomen est, compositum temperaturæ facultatem habet repellentem, & halitu euaporantem.

Echidnæ, uiperinæ carnes temperamento sunt calido & sicco conspicuè, per cutem uniuersam corporis molem repurgantes: quapropter aliquot multi elephantiasi correpti, cū in cibo, tum in potu sumentes, sanitati restituti sunt. At quæ circa mare, alysq; locis aridis degunt, sitim magis inducunt.

Echinus, herba est acerba, repereutiendi atque exiccandi

uim obtinēs. Brinacei terrestris fel, defluentes capillos g
tinat. Caro eius exiccata, uehemēter discutit, et exiccata. Q
nomine elephantia si correptis, maloq; habitu præditis, cæ
risq; pluribus malis succurrit. cutis eius deusta, multo ualen
tius arefacit, acriusq; discutit. Alopecys cum pice liquida il
ta auxiliatur. Quicquid in marino echino edendo est, urina
trahit, & bonum aluum efficit. Testa cremata, æqualem te
restri facultatem induit.

Echion alij doriada, alij alcibiadion appellant: ea spino
sa est herba, quæ non tantum serpentium morsus epota cum
uino curat, sed præpota etiam ab eorum morsibus tuetur.

Hepsema, mustum decoctum, quod à quibusdam siræon
nuncupatur, moderatam calfaciendi & concoquendi uirtu
tem, atq; emplasticum absq; erosionem obtinet.

Zea eiusdem est cum tritico potentia, medium quodammodo
inter calfaciendum & refrigerandum locum possi
dens, leuiter exiccata, & opplendi uim obtinet.

Zingiberis radix potenter quidem excalfacit, neq; primo
tamen statim occursum, in euictæ cuiuspiam humiditatis, et cra
sioris essentia particeps est, ideoq; teredinibus facile tenta
tur, sed constantem seruat caliditatem.

Zyibus, mixtae consistentia est, acrimoniam quandam gu
stu præferens, utpote ex putredine constans, & frigidus ra
tione acidæ qualitatis: proinde succi etiam prauus.

Zyme, fermentum etiam ipsum ex contrarijs facultatibus
est. aciditatis nanque gelidæ, calorisq; ex putredine profici
scens, præterea eius quæ salis atque farinae natura constat.
Est igitur haud mediocriter calidum, discutiendiq; potestate
præditum.

Zomos, piscium recetium ius uentrem subducit, cum per
se, tum uino admixto epotum: peculiariter uero ex phycidib.
scorpionibus, iulidibus, percis, alijsq; saxatilibus molliusculis
simpliciter cum aqua, oleo, & anetho, & sale elixis. Eorum
itidem

itiidem quibus testa pro cute est, tellinarum, hiatularum, conchularum, & gallinacei antiqui cum sale diutissimè elixi, uisculum, uentrem subducit. Et diuerso, gallinæ ius cohibet.

Hedysmum, menta, calidum, subtile, acre, ex tertia diuaricantium à temperie classe, cum humiditate semicoctum, qua in Venerem stimulat. Præditum item amaritudine quadam, ideoq; lumbricos interimit. Acerbitatis uerò ratione, non inueteratas sanguinis reiectiones sistit.

Hedysarum, quæ & pelecynus uocatur, gustu amarum, et subacribum: unde si potetur, accommodatum est stomacho, et uiscerum infarctus expurgat.

Heliotropium maius, quod & scorpiuron appellant, calida, sicca, & detergentis facultatis existit. Cuius decoctum pituitam expellit, atq; bilem, semen eius instar emplastri superinductum, formicas, & id genus alias uerrucas exiccat. Minus & hæc abolet, & lumbricos latos interficit, cum semine suo nitro, hyssopo, & cardamomo potum.

Blectrum, succinū populi albæ lachrymā perhibent, quæ prope flumē Bridanum destillans congelascit, aurum colore præferens: cuius uis est, si potetur tritum, stomachi, uentrisq; fluores & sanguinem coercere.

Hemerocalles, radicem habet lilio æmulam, & uiribus æqualem: neque aliter quàm id, ambustis succurrit.

Hemionitis cum stipticitate amaritatem obtinet: quo nomine cum aceto pota, lienosis subuenit.

Hepar, canis rabie agitati, tostum, & in cibo sumptum, morsibus quos idem rabiens canis intulit, opitulari creditur. Capræ, assati iocinoris deciduus aquosus sanguis, lusciosos, si oculis instilletur, iuuare. Prodest præterea, dum id coquitur & torretur, lusciosorum oculos eius fumo uaporari. Confert idem iecur assum. Quod comestum, comitiales arguit. Iecur bircinum eadem præstare dicitur.

Tradunt lacertæ iecur exesorum dentium canis inditum, dolorem

dolorem sedare. Lupinum hepar medicamento iocinoroso quod eupatorio constat, admiscetur. Prodest comitialibus iecur asininum tostum, à ieiuno sumptum. Aprugnum, aut si mauis dicere clininum, recens exiccatum, si tritum cum uine bibatur, serpentium moribus succurrit. Calculos postremo mergi iecur aridum, potumq; expellit.

Brigeron, senecio mixtis constat uiribus, frigoriga nempe, & mediocriter discutiente.

Eryngium calfacit quidem, non euidenter: siccitatis autem neq; clandestinae, neq; exiguae particeps est.

Thalattion hydor, aqua marina, acre, calidum moderate, exiccatorium: stomacho, potum, infestum. Aluum turbat, & pituitam trahit. Quo calido quae extrahenda distrahendaeque sunt, consperguntur.

Thaliotrum herba, uires siccandi absq; erosione habet, diutina igitur hulcera ad cicatricem perducit.

Thapsia, acris est, & uehementer cum humore calfacit. quare è profundo uiolenter euellit: quodq; extrahit, discutit.

Thcio, sulphuri quoq; euellendi uis est, cum essentia tenui usque adeo, ut aduersus non pauca animalia uirus ciaculantia resistat, praesertim turturem marinum, atq; draconem, siue aridum idui inspergatur, siue cum salua mixtum, seu pueri urina maceratum, uel cum oleo, uel melle. Quin & psoris potentio se succurrit.

Thermus, lupinus qui edendo est, opplendi uim habet. Inest illi amaritas, cum extergendi, disciendi, & exiccandi uiribus absq; erosione. Lumbricos tum illitu, tum potu interficit. Viscera cum ruta & pipere potus expurgat: quinetiam cutis uitia extergit, tumores ac tubera cum aceto mulso emplastri more impositus, dissipat. Lupinus syluestris amarior est, atq; ad omnia efficacior hortensi.

Thelypteris, quam aliqui nymphæam, aut pterin cognominant, filici non tam forma quam uiribus aequalis est: quae cum

cum uino sumpta, latos & teretes lumbricos interficit. Conceptum uiuum necat, mortuum eijcit, folia ipsius esa aluum molliunt.

Thlapsi semē tam acrem facultatem obtinet, ut internos abscessus potum confringat, mensesq; pellat. Per anum infusum, coxendicis doloribus auxilio est, & sanguinolenta exhaurit: atq; alioqui non tam per superna, quā per inferna, biliosos humores acetabuli mensura epota euacuat.

Thridax, laſuca, holus est non extremē frigidum & humidū, sed pro aquæ fontanæ temperatura: quare inflammatio nibus calidis confert. Sitim restinguit, genituræ profluuium compeſcit, & uenereas in somno imaginationes coercet. Agrestis laſuca minorem habet quā satia cum refrigerandi, tum humedandi potentiam, uerū succulentior est.

Thymus, calefacit & exiccat, in tertio à temperatis excessu, tenaces ac uiscidos humores incēdit.

Thymbra, satureia syluestris, æmula uiribus thymi est: contubernalis uerò, ad omnia quidem infirmior, sed ad edendum potior.

Ex thymelæa granum cnidium, quod semen eius est, colligitur, cui uiribus respondet.

IDea radix gustu & uiribus acerbæ, ad sanguinis eruptiones, & quasunque rheumaticas affectiones idonea est, siue potetur, siue extrinsecus applicetur.

Hidron, sudorem per se quidem colligere arduum est, miscetur autem in palæstris exercitatorum sordibus cæromati confusis, acquiritq; multum facultatis digerentis. Proinde inflammationibus uberum conflatis, efficaciori sunt auxilio, & ad extinguendum quod flagrat in ipsis conducit. Facit etiā medendis bubonibus. Quod si aridior uidebitur, subiugendus est cum cyprino aut rosaceo.

Ixos, uiscum ex eorū classe est, quæ cū acrimonia quadā calfaciūt, eā ob causam uiolēter ex alto euellit, eosq; dissipat

ad instar thapsiae, præterquam quod illa inefficacius est.
 Ion, uiola: uiolæ folia aquea & subgelida substantia pul-
 culum pollent:

Ios, ærugo gustu acredinem præfert, discutientis, repu-
 gantis, et secantis naturæ: non teneræ tantum carnis, uerum d-
 riusculæ etiā. Quod si quis copiosiori cerato pusillum ærug-
 nis cōfundat, medicamentum absq; erosione absterforium efficiet.

Hippocampus, animal marinum, perpusillum est, cuius
 combusti cinis cum liquida pice, capillorum defluuia instaurat.

Hippolapathon, grandis rumex, in palustribus nascitur
 locis, rumici uiribus proxima.

Hippomarathrum, grande fœniculum canchryi non absimile
 ualentius quam fœniculum desiccatur. Quo quidem fit, ut alium lu-
 bricū sistat, lapillos comminuat, & menses proliciat. Semen
 coriandro simile, sed illo imbecillius existit.

Hippopotami, hoc est fluuiatilis equi testiculus, aridus po-
 tus, serpentium moribus subuenit.

Hipposelinum, apio satiuo facultate respondet, nisi quod
 illo est ignauius.

Hippuridi, equiseti cum amaritate qualitas est stiptica,
 ualenter simul & absq; erosione exiccans, ac proinde gran-
 dia quoque uulnera committit, intestinorum ramices iuuat: &
 affectibus fluidis, uino pota, medetur.

Hippophaes, lappago, uel ut alij appellant hippophaeos,
 frutex surculosus est, quo uestimenta expoliunt: è cuius radice
 thapsiæ modo liquor colligitur, qui per se, et cum eruacea fari-
 na oboli instar exhibitus, tum bilem, tum pituitam expurgat. Quin
 uniuersa quanta est planta exiccata, purgandi uim obtinet.

Iris, abunde calefacit, attenuat, abstergit, & concoquit.
 Quamobrem tussi subuenit. Cōtumaces pectoris humores du-
 ciles reddit, torminibus circa umbilicum medetur: hulcera
 sordida expurgat, aluum cum uino sumpta euacuat.

Isatis satina, qua infectiores utuntur, desiccatur pariter, &
 astringit.

astringit. Spaciosa itaq; solidorū corporum uulnera cōglutinat, & sanguinis eruptionib. prodest, tumores aquosos dissipat. Contumacibus ex uitiosa cōsuetudine hūlceribus omnibus obstitit. Agrestis uerò, gustu plus euidentis acrimoniæ præfert, ideoq; quo magis exiccet, humidis putredinibus efficaciter resistit, ad cætera deterior. Sed et spleneticis propter uehementem potentiam utilis est.

Isopyron, uel ut alij uocant, phastolon, semen gerit amarum atque subacerbum. Crassos igitur & glutinosos humores abstergit & incidit, sic ut corpus contrahat & constringat: quo nomine etiam quæ altius hærent, repurgat. Neque hæmoptoicis noxium est.

Itæa, arefaciendi citra morsum potestati salicis folia floresq; obtinent: leuem adhuc constrictionē. Verum his siccior paulo cortex est, cuius cremati cinis ex eorum censu est, quæ potenter exiccant. Clauos & formicas cum aceto extirpat.

Ichthyocolle, glutinum piscosum opplendi & exiccandi uim obtinet. Inditur magna commoditate emplastris conglutinatorijs, & his quæ lepræ curandæ, & quæ ad faciei erugationem lenociniumq; faciunt.

Ancani radix moderatam exiccandi uim obtinet, interdo Crium meatus infarciendi citra mordicationem natū. Eoq; arteriæ asperitates linctæ cum uino sanat, pariter si quis eam modo tragacanthæ atq; glycyrrhizæ mandet.

Cancamum, Arabici ligni lachryma est, myrrhæ similis fragrans, quam ad odorem incendunt & uaporant. Virtutem habet obesos extenuandi, detergendi, & ab infarctu meatuumq; obstructione uindicandi.

Cadmia utraq; species siccant, sed crassioribus constat partibus, quæ botryitis, quasi acinosa, racemosa' ue appellatur. Subtilioribus uerò, quæ placitis, quasi glebosa, est nuncupata. Cremata exiccandi facultatem, mordacitatis experte, non sine absterfione retinet. Hūlcera caua carne replet, tã ea

quæ oculos, quàm quæ reliquum corpus occupant, uerùm præcipuè humidiora in corporibus tenerioribus. nam in duriusculis efficacium magis opus est.

Cacalia eandem habet cum cæcano potestatem, æmulamq̃ in omnibus utilitatem.

Calamagrostis, gramē arundinaceū persiccat, quamobrem succus decoctūq̃; radicū ipsius, ocularib. medicamentis inseritur. Semen lotium prolicit, & stomacho accommodatum est.

Calamintha, nepita calida & sicca tēperie est, in tertia diastantia, subtiliū non sine acredine partiū, urib. lōge præstantioribus quàm mentha; nam instar sylvestris mēthæ censetur. Facile itaq; in alto hærentia, in summam cutē euellit. Qua de causa sudores mouet, totum corpus digerit. In febriū accessibus, quæ circuitu fiunt, cū tremore algores sedat. foris cum oleo strenuè infricata, coxendicis doloribus subsidio in clystere est, & prauos cutis humores exterit.

Calamus odoratus ex secundo calfacientium & arefacientium à temperatis excessu, subtilioris nonnihil & astringentis est potentie, urinam ergo proritat. Medicaminibus stomachicis, & quæ iocinori muliebrib. q̃; locellis dedicata sunt, miscetur. Calamus autem pbragmites, abstergit: folia eius uiridia moderatè infrigidant. Cortex combustus, calfacit & exiccat, in tertio propemodum ordine. Sunt qui affirmant radicem eius adiectis bulbis illitā, spicula et aculeos euellere.

Campæ, bruchi, hoc est oleribus innascentes erucæ cum oleo illitæ, à morsu animalium, quæ idu morsu' ue uirus relinquunt, tueri dicuntur.

Cantharides quæ in tritico deprehenduntur, luteis oblique zonis insignes, aceti feruentis uapore suffocatæ, multiplicem usum habent. Nam ungues scabiosos cum cerato eiciunt, clauos & uitia leprosa curant. Exedunt item & deurant: nonnulli autem in medicamenta diuretica momentum ex ipsis adiectum exhibuerunt.

Cannabis

Cannabis semen flatuoso caret spiritu, & exiccatorius sit usque adeo, ut semen genitale arefaciat: succus eius uirens, ad aurium dolores ex infarctu & obstructione natos conducit.

Canopum sambuci flos est, de quo in Aële memoratum est.

Capnion, siue capnos, fumaria, hinc sortita nomen est, quod eius herbae succus non parum lachrymas cit, speciem oculorum exacuit, acris & amara est. Vrinā quoq; biliosam streuē promouet. Iocinoris obstructions & infirmitates mediatur. Stomachoq; robur inducit, & aluum emollit.

Capparidis radix, detergendi, repurgandi, incidendi, dissipandiq; facultatem cum quadam amaritate & acredine possidet. Contrahit uerò, stringit, & densat acerbitate: ac proinde liues induratos sanat cum pota, tum foris imposita. Menses ducit, & noxios capitis humores per os detrahit. H ulceribus malignis plurimum prodest, & dentium cruciatibus succurrit. Tubera dissipat, & uutiligines. Vermes qui in auribus nascuntur, interimit. Caterum folia fructusq; similem quidem, sed infirmiore obtinent potentiam.

Cardami, nasturtij semen, deurentis facultatis particeps est, modo sinapi, quo nomine cataplasmati instar impositum cum rubificatione exulcerat, crassos humores admixtis quibusdam alijs incidit. Herba arida semini uiribus similis est, sed humida moderatior, eoq; cruda nonnunquam editur.

Cardamomum acris quoq; naturæ est, nasturtio tamen non parum imbecillius: neq; illi deest amaritas, qua sanè uermes interficit. Et scabiem cum aceto exterit.

Caris cōtrita, cum bryoniae radice epota, uermes enecat.

Cancrorum fluuiatilium crematorum cinis, pari erinaeorum echinorum, & cochlearum modo exiccat. Proprietate uerò totius substantiæ, admirando remedio rabidi canis moribus potu succurrit. Marinorū uerò cinis uehementiore arefaciendi ui pollens, nihil his quidem conducit, sed magis

00 5 siccari

siccari contendentibus prodest. Ceterum qui in perennib
uitam agunt fluminibus cancri, laugati & cataplasmat
impacti, spicula & aculeos euellunt.

Cari semen calidum est & siccum, secundū tertium quo
dammodo à temperatis excessum. Flatus discutit, & urina
prolicat: neq; id semen modò, uerū tota etiam planta.

Carpesium cum tenuitate partium odoratum est. Hinc
uiscerum obturationes aperit, lotia promouet, renes purga
tione à lapillis uindicat.

Carya, nux arbor, in germinibus quidem acerbitalis ali
quid continet, plurimū uerò in nucum putamine. Quare suc
cus eorum in melle elixus, medicamentum fit, quod ori inser
uit. Cortex eius interior crematus, tenuis redditur essentia,
& exiccatorius absq; mordicatione. Besculentū porrò ipsius
oleaginum promptissimè in bilem cōuertitur. Quod inde fit
oleum, subtilibus constat partibus, & tumores putredinesq;
dissipandi uirtutē obtinet. Quæ liquore aliquo condita, pro
pter antiquitatem, flaccescunt, extergēdi habent ea quæ in
cute oriuntur uitia, potentiam. Nux uerò Pontica, leptoca
ryon Græcè, Latine auellana nuncupata, frigidior est atq;
austera, cætera magnæ nucis æmula.

Caryophyllon, quasi dicas nucifolium, neq; re, neq; essen
tia nomini respōdet, uerū ex India arboris cuiuspiā flores
stipulæ faciem præferētes, nigri coloris, longitudine ferme
digitali sunt, fragrātes, acres, subamari, calorifici et exicca
tori in tertio quadātenus excessu ordine: quorū multiplex
usus est cū in obsonijs, tū in cæteris quibuscūq; medicamētis.

Cassamon quidam fructū esse balsami autumant, de quo
superius egimus.

Cassia calefacit et siccāt, in tertio ferme ordine partium
impense subtilium, acrimoniæ & astringentis modicæ paro
ticeps. Quapropter simul & incidit & discutit, et robur in
strumentis indit: ducit suppressos deniq; menses.

Cassia.

Castorium, testiculus castoris, cum præpollente & eximia partiū tenuitate calfacit et exiccat. Qua de causa præter alias operationes etiam neruorum ex plenitudine humorum prognatis affectionibus cōgruit, perfrigerata facillimè recalfacit. Foris adhibitum atq; epotum, sic, ut nullam partem cuiuspiam noxam inferat, etiamsi tepidam homo perpetiatur febrem, qualis accidit in ueterno maximè, & alijs inexpugnabilis somni soporibus. Mouet præterea menses, & secundus à partu morantes expellit. In cerebri & pulmonis affectionibus, si quis suffitum eius inspiratu hauriat, magnificè iuuat.

Caucalis, sunt qui daucum syluestrem dicunt: calfacit enim modo daucis, & exiccat, urinam trahit, saleq; ad repositionem conditur.

Cenchros, miliū, refrigerat in distantia prima, siccatur in secūda, & subtilitatis possidet perexiguū. extrinsecus in sacculis excalfactū & cataplasmatibus modo impositū, exiccat.

Cedrus alia quidē fruticosa, iunipero similis: alia arbor est. Vtræq; calfaciunt & siccant in tertio ordine. Quæ inde emanat cedria (quo nomine cedri gaudet oleum) quartum quoq; ordinē uidetur attingere, subtilium abunde partium, quo nomine mollem utiq; carnem promptè et absq; omni dolore liquat, et putrefacit: durā uerò, atq; cadauerū arefacit, et à corruptionibus asserit. Pediculos, lēdes, tineas, ascarades, & in auribus natos uermes interficit, aliaq; infinita designat.

Centaury grandioris radix, gustantibus acris, calida, et restrictionis terreæ particeps est: hinc menstruas mulierum purgationes prouocat, foetum uiuum corrumpit, mortuum extrudit, uulnera glutinat, sanguinē excreantibus et alijs thoracis affectionibus opitulatur. Cētaury minoris radix inutilis est, surculi citra mordacitatē potēter desiccant: quapropter ad singula quæ maius cētaury iuuat, accommodatæ sunt. Decoctū in super eius in coxēdicū uitæ infusum, biliosum humorē expurgat. Nonnunquā et sanguinolenta, quā feliciter iuuat.

Cornu

Cornu capræ & cornu cerui crematum, dentibus nitem adfert, gingiuas humore flaccidas contrahit. Cerui uino uino læuigatum, deinde illitum, dentes uacillantes stabil. Post uerò uſtionem ablutum, dysenteriam, uentrales sanguinis ſputationes, & morbo regio oppreſſos curat, ſi cichliariorum duorum pondere ſumatur. Ocularibus inducollirys. Taurinum cornu cum aqua hauſtū, ſanguinis erptiones cohibet.

Ceraſia dulcia quidem citius ſecedunt, auſtera ſtomachi magis conferunt. Acida, quoniam incidunt, excremento et pituitosis ſtomachis cōferūt. Gūmi ceraſi arboris arteria exaſperatas lenit, calculis uexatos cum uino pota adiuuat.

Ceratonia, & fructus eius, ceratia appellata, ſiccandi & refrigerandi uiribus pollēt, et dulcedinis nonnihil obtinent.

Capita menidum ſale conditarum cremata, ſiccificæ facultatis, neq; ualentis acrimoniæ ſunt. Rhagadibus itaq; ſedis, & columellæ longo tempore ſcyrrho induratæ ſuccurrunt. Smaridis totum caput combuſtum, capillorū deſluuij cum adipe urſina adhibutum bene facit. Eadem caput muri crematum cum melle præſtat. Caput milui aridū, deplume quantum tribus digitis cōprehendi poteſt, cum aqua potum dolore pedum uexatis ſubuenit. Tradunt caput lacertæ, paxillos & ſpicula euellere, formicas ſeſiles, & uerrucas anguſtiore baſi penſiles clauosq; profligere.

Cecis, galla adhuc immatura, omphacitis adpellata, medicamentum eſt excellenter astringens, eoq; exiccat, fluxiones repellit & contrahit, laxas & imbecillas partes conſtringit, omnibusq; fluxionum aſſeſibus reſiſtit. Ponitur in tertio ſiccantium, ſecundo refrigerantium ordine. Altera uerò, flaua illa, & laxa, grandisq;, ſiccatur quidem & ipſa, ſed tanto minus, quantum & adſtrictione cedit. Coſta ſedis inflammationibus & procidēijs ſubuenit. Crematæ autem utraq; & aceto reſtinatæ, ſiſtendo ſanguini accommodatæ ſunt.

Cepæ,

Cepœa, portulacæ similis est. Sumpta in uino folia eius, abiei uesicæ succurrunt. Radix uerò eius cum asparago, nem myacanibinum, id est corrudam appellant, pota, stilli dijs uesicæ, quæ ex obstructione eueniunt, remedio est.

Cera temperata existit, eoq; ad reliqua medicamenta ueti subiacens materies adhibetur: ipsa uerò per se ex eorum usu est, quæ imbecilliter detergant. Habet insuper discutiens paululum, & calidæ potentiæ.

Buccinorum testa cremata, potenter admodum desiccata morsum, ideoq; huiusmodi contumacibus & malignis ingruit: contra putrescentia uerò huiusmodi, cum aceto, uel no, uel oxymelite, eisdem utendum. Oleum in quo carnes forum etiamdum uiuentium elixatæ sunt, aurium doloris instillatum opitulatur.

Ut ricini fructus expurgandi, abstergerendi, ac distrabens facultatem obtinet, sic etiam ipsius folium: uerum imbecilis, cæterum de oleo ipsius expositum iam est.

Cinnabaris acres moderatè uires, & astringentiæ nonnullæ obtinet.

Cinnamomum perquam subtilissimis constat essentia parua, non extremi caloris, sed ex tertio ordine neque sanè quicquam omnium quæ in calfaciendo eiusdem classis sunt, tanto re desiccatur, ob extremam partium tenuitatem. Est præterea in cinnamomorum genere quodpiam ueluti debilius, quod pseudocinnamomum uocant aliqui.

Circeæ radix calidæ temperaturæ est, & fragrantis odoris: quæ si cum uino potetur, scæminarum locos expurgat. Men in sorbitione sumptum, lac procreat.

Cissaris, pumex, non solum potentia, sed scabrie etiam tergentis facultatis existit, atq; in primis denium. Inijcitur uerò medicaminibus, quæ carne huiusmodi implent, & cutis uitia abstergunt. Quod si cremetur, essentia quidem subtilioris, sed mordax magis efficitur. Si abluatur, mordicatione exiit.

Cisthos

Cisthos, uel cissaros, fruticulus est, stipticus, & leuiuscu frigiditatis. Folia eius fruticis & germina adeo desiccant, & uulnera conglutinent. Flores, utpote in secundo quodam modo gradu, sicciores, intestinorum tormina & alias fluones humidas compescunt. Extrinsecus impacti, putridis laceribus auxiliantur.

Cissos, hedera, ex contrariis facultatibus constat: adstringentis enim, refrigerantis item, & acris naturæ cum calore est. Aquæ substantiæ, & tepidæ, cum uiridis est compocuius folia uino elixata, uulnera conglutinant, ambustis & lienosis cōducūt. Liquor eius narib. infusus caput pituita euacuat, diurnis auriū destillationib. resistit. Acrimonie plerumque habet ipsius lachryma, pediculos interficit atq; deglabrat.

Citry mali, quod & Medicum appellant, medulla acidis sapore, uel sine qualitate est, cuius semē in tertio abscessu refrigerat & desiccatur. Cortex in exiccando secundum ordinem attingit, non tamen ita refrigerat, acrimonia præditus. Caro ipsius crassum humorem generat, & pituitam adauget refrigerat. Semen discutit & exiccatur ordine secundo, folia arboris siccam & discutientem præferunt potentiam.

Cichorium, uel picris, ueluti syluestris seris est, ex primis refrigerantium & exiccantium ordine. Habet præterea stipticitatem quandam, qua de causa iocinorosis confert dysenterijs.

Clematitis, quæ ab aliquibus daphnoides, à quibusdam myrsinoides, ab alijs polygonoïdes, palmites habet prolixa ad olochaeni crassitudinem, folium lauro figura & colore simile, arefacientis potentia. Fluores alui, quos diarrhoeas uocant, & intestinorū tormina, & dentium cruciatus mitigat. Contra uenenatorū morsus magna cum utilitate imponitur.

Clematitis altera, arboribus, quemadmodum smilax hedera circumfunditur, acrem atq; adurentem habens facultatem. Fructus huius cum aqua potus, per inferiore aluū pituita bilis

ilio sumq; humorē deducit. Folia eius illita, lepras discutiūt.

Clinopodium excalfaciendi & arefaciendi uim obtinet, & nondum adurendi, uerū in tertio fermè ordine.

Cnici seminis non nisi ad purgationes usus est: si quis excinsecus adhibere uolet, tertij fuerit excalfacientij ordinis.

Conchilia, buccinis consimilem facultatem obtinent.

Cœlia, uentrem mergi recens coctū, siue inueteratum & refectum iuxta prodesse stomacho, si estur, asserunt: quemadmodum etiam de interiore uentris gallinarū tunicula sic ita & pota perhibent. utrunq; tamen hoc mendacium esse, alenus facto periculo deprehendit. Tradit uerò Dioscorius, uentrem palumbi alitis modicè potum, per urinam calculus expellere. Mustela uenter in potu sumptus, adiuuans amictum contra bestias uenenatas esse putatur.

Coccos, granum gnidium semen est, non chamelæa, ut idam autumauerunt. sed thymelæa, acris adurentisq; facultatis. Purgat aquam per inferna, si potetur. Granum inatorium, quoniam citra erosionem desiccatur, amplius & neruo uulnerib. cōpetit, cū aceto et oxymelite in leuorē cōtritū.

Coccymelea, pruni fructus, aluum recens quidē uehementer, minus uerò arefactus subducit. Prunorū decoctio inflammationes gutturis & tonsillarum utiliter colluuntur. Gummi arboris incidendi & extenuandi potentia constat: quod in uino potum, nonnulli calculos confringere, cum aceto uerò puerorū impetigines exterere perhibent. Syluestria uel pruna acerbiora, et ad cohibendā aluū aptiora sunt. Appellatur autē hæc plāta in Asia prumnū. Pruna uerò satiuā asilatur his, quæ nūc damascena dicūtur, ut Galenus asserit.

Colla, gluten similagineum, siue ex polline factum meas opplet, & maturandi uim possidet.

Colocyntha, cucurbita, humidior & frigidi in secundo ad operatis abscessu, temperamenti est. Eoq; tota ritu catarrismatis illita, feruida refrigerat inflammationes.

Colo

Colocynthis purgatoriam facultatem oppidoquàm uadam possidet. Viridis ipsius liquor infricatus, coxendicum dolores adiuuat.

Comaro, *arbutus*, arbor pariter & fructus, qualitatem acerbam obtinet. *Memycœlum* autē hunc ipsum nominant. Non solum stomacho nocet, sed capitis etiā dolores inducit.

Gummi exiccatoriam habet naturam, & emplasticam atq; nimirum asperitates medicatur.

Conia, *lixium*, ueluti cineris ablutio nominatur, abstergendo & exiccando reliquis omnibus antecellit, quod ex ficulneorum lignorum, & quod ex *tithymalli* cinere conficitur, ut tantum non iam exedentis sit potentia. Quod si calidum etiam cineri adijciatur, deurens reddetur *lixium*, quod pro *stacton* nuncupant. *Bluentibus* id frequenter commiscetur pharmacis. Omnium uerō maximè uehementissimum est quod ex sola calce constituitur.

Conyz 1 & grandior & exilior, siccificæ & excalfactrix sunt temperaturæ in tertio ordine. Proinde oleum in quod elixæ fuerint, febrium rigores per circuitum remeantes sedant. Flores similem effectum possident, quorum decoctum menses prouocat, & fœtum eicit. Quæ uerō in locis humidioribus nascitur, tetriciorem de se emittit odoris fluxum, & uires continet debiliores.

Copros, stercus omne, calidæ & siccissimæ, atq; summe discutientis est potentia. Variat autem unumquodq; pro excernentis animalis cum temperatura, tum uictus quoque ratione. Canum, qui ossibus pasti fuerint stercus, desiccatum, & cum lacte fœbili potum, dysenteria laborantibus succurrit. Salubriter medicaminibus contra hulcera inueterata effuscibus miscetur. Idem melle exceptum, anginae, tonsillarum & glandularum inflammationibus illinitur. Bisdem malis præsentiore remedio succurrit *pusionum oletulum*, qui non excrementosa uictus ratione utuntur. *Lupinum albidius*, & quod

Et quod non humi, sed in quibusdam uerbis fruticibusque reperitur, colicis praesentaneo est remedio: non solum epotum, sed etiam pro amuleto alligatum. Alligetur autem uinculo lana ouis à lupo laxiata confecta, uel pelle ceruina. Caprius finis maiorem acrimoniam, uehementioremque dissipans, si facultatem continet, adeo ut tumores scirrhi instar induratos, illitu discutiat, potissimum in duriore carne. Baccae carinae combustae uehementius abstergunt, et extenuant. Stercori bubulo uis quaedam attrahendi inest. Morsibus igitur ueharum ac apium medetur. Hydropicorum corpus uniuersum stercore bubulo sub sole delibutum, praesentanea opem intiet. Ouillum uero cum aceto, uerrucis, quas formicas diuunt, et acrochordonibus, furunculis, et clauis medetur. Tercus palumbinum plus acredinis quam reliqua habens excrementa, cum nasturtij semine corpori applicatum, cutem exulceratione rubificat. Finis gallinarum, cum oxymeli, uel aceto, uel oxomelite potum, suffocantes fungos uomitu eicit, primumque auxilij remedium existit, nonnulli colicis ponendum ministrabant. Sunt qui ciconarum excrementum non nisi recta ceruice spirantibus opitulari potu assueuerant. Auscerda abstergendi maiorem uim obtinens, alopecys subuenit: et puerorum ano applicatum, ad excretionem prouocant. Sturnorum, qui orizam comederint, absterforia facultas tantae efficitur, ut contraeas uelut ex sole maculas, quas oheleis nominant, exterat. Finis crocodilorum terrestrium in petigines, quos alphas Graeci cognominant, exterit. Quemadmodum niliacorum, albugines oculorum extenuare creditur. Corallium ueluti arborea planta est, quae in lapidis duritiem duratur: crescit non in continente, sed in alto maris, colore rufo, lapidi simile, ualenter siccandi, et mediocriter consipandi uim obtinens. Quo nomine sanguinem cicclantibus, et intestinorum torminibus pulchre conuenit.

Cimices animalcula acris sunt potentiae. Sunt qui haec bis

pp

rudis

rudines eijcere, si cum aceto potentur, literis prodiderunt.

Coris herba, quam alij hypericon uocāt, acris est, boni odoris. Semē eius potus, mēses urinasq; prolicit, pbalangicorum morsibus opitulatur. Opisthotonicis, cum oleo illinitur.

Corianum, siue corion, coriandriū, ex contrarijs constitur facultatibus, subtilioris essentiae cum terrestri quadā maritate existit, et aquei humoris tepidi, habet etiā astris nīs pauculum. Quamobrem inflammationibus, et ignitis cum phlegmone ruboribus non admodum feruentibus succurrit. Teneriusculos quoq; tumores disycit, adiecto quopiam humuxeri accommodato. Seminis coriandri uel momentū cum passō arcēdis lumbricis, præsenti cum remedio bibitur. Languis tamen sumptum, mentem commouet.

Corydon, uel corydalōn, alauda auis, elixa cum simpliciu iure, colicis cruciatibus subuenit. Profuerit autem identidem ipso cum iure uesci.

Coronopidis quoq; radice coli dolores comesta sanare creditur.

Costus paucula quidē amaritudinis, plurima uerō acrimonia, et calidae qualitatis particeps est. Quapropter in quibus aliquā corporis partē calfacere, uel ex profundo in summā cutē humorē extrahere instituimus, ad costū cōfugiendū est. Urinā itaq; ciet, et mēstrua ducit, et lūbricos perimit. Habet uerō et flatuosi spiritus nonnihil, quā de causa uencrem cum cœnomelite potus stimulat. Coxendicū dolorib. et resolutione, et circularib. cū tremore algoribus ex oleo infricatus cōgruit.

Cotyledon, umbilicus ueneris refrigerat, repellit, abstergit, et discutit. Folia eius cum radice comesta, lapillos auerere, et lotium mouere creduntur.

Cochlia cremata strenuam arefaciendi uim, calfaciendi mediocrē obtinent. Contra dysenteria in qua ulcera nondum putrescūt, plusculū opis cōferunt, si ad quatuor cochlearum partes miscueris, piperis albi partē unam, et galliarū partes duas.

ias. Sed quæ exustionis expertes sunt, totæ in puluisculum uigatæ, et uetri impactæ, in aqua subter cutē, et articularū uciatibus, donec ultro deciderint, plurimum expediunt. Et inditus, uno uerbo, humorem quēcūq; ualenter exiccant.

Corni arboris fructus acerbus & uesculentus, aluum potenter compescit. Folia & surculi sua acerbitate impensius rificcant, ita quidem, ut grandia etiam uulnera duriorum rporum conglutinent.

Crambe, brassica quæ edēdo est, exiccat, non solum comedenda, sed etiam extrinsecus imposita, non tamen acris manifestat. Vulnere ob id et hucera extremè malefica conglutinat, mores ad digerendum contumaces curat. Habet uerò abstersionis nonnihil, qua lepræ medetur. Semen eius in potu nptum, lumbricos interficit, & potissimū Aegyptiæ. Cui crematorum cinis deurentis est potentia, cum adipe diu nis laterum doloribus remedio est. Brassica autem syluestris ad omnia quàm hortēsis potentior est. Hinc intro in corpus impune nō sumitur. Marina, subsalsa, & leuiter amara, utri laxando efficax est.

Cratogeomori herba fructus gustantibus acrimoniam præstat, estq; temperatura frigidus, milio consimilis.

Chreibmon, cū exiguo amarore salsum quodāmodo est, utiq; uires abstergerendi & desiccandi possidet.

Crithe, hordeum calidum et siccū habetur in ordine prius. Habet etiā quiddam abstersionis: lomento fabuli ad exiccandū aliquantulū efficacius, flatuosum uerò minus existit. Plenta autē multo quàm hordeū impensius exiccat. Ptisana potius quod liberalius humectat, magis etiā absterforia est. Quod in tritici et zææ farina crassū & crassiorū partium crimnon appellari cōsuevit. Nutrit ualidius quàm polenta renititur uerò concoctioni magis crimnon pullicula.

Crini, lily flos temperamentū habet cōpositū ex subtili partem terreāq; essentia, & aquosa temperata. Quocirca oleum

quod ex eo conficitur, discutiente & emolliente ui pollet, muliebriumq; locorum inflammationibus est idoneum. Radix et folia siccant, et detergunt, atq; discutiunt mediocriter, ideoq; ambustis proficiunt. Vulnerationi nervorum opitulatur cum oxymelite sumptus eorundem succus.

Crocodylij semen et liquor facultatem caloricā, exiccatoriam, & digerentem possidet. Lotium itaq; pariter et menses proritant. Radix thoracis excreationibus egregie subuenit. Et per nares sanguinem trahit.

Crocus in calfaciēdo secundum, in exiccando aut primū sortitus ordinem, astringendi & concoquendi uirtute pollet.

Crōmyon, cappa ad quartū calfacientiū ordinē refertur, crassioris estētiæ. Quapropter hæmorrhoidas applicata aperit. Habet autem etiam uim abstersoriā: uutiligines quos alphas nominant, cū aceto emēdat, et extergit, ex alopecijs glabret a pilis alcyonio citius instaurat. Succus suffusione laborantes, uel ob humorū crassitudinē oculorū speciē hebetatā adiuuat.

Cyamus, faba in refrigerando et exiccādo nō procul à media tēperie recedit: caro eius abstersionis modicæ particeps est. Idcirco excreationes pectoris et pulmonis adiuuat. Quoniam autem fabuli cortex astrictionis quippiam habet, integrum ipsum in posca elixum cœliacis et dysentericis peridoneum est, inflammationibus præterea & tumoribus illitū auxiliatur. Lac quoq; in uberibus ab eo linimento extinguitur.

Cyano, uis et natura acrior est, detrahēdi et disciendi ualentior quā cinnabari. Astrictionis quoq; particeps est.

Cyclaminus, rapum terræ uariā potestātē obtinet: abstergēdi nimietū, incidendi, aperiendi, attrahēdi, et discutiēdi. Ac proinde succus ipse hæmorrhoidas interrūpit, si oris ipsarū adglutinetur, durities cū alijs quæ ad eandē rē faciūt, appositus discit. Suffusis, cū melle illitus succurrit, et per nares caput expurgat: tātāq; est potētia, ut eo abdomine uncto alui subducat, et conceptū interficiat. Virib. aut radix q̄ succus inferior

inferior est. tametsi ipsa quoque adeo uehemens sit, ut cum aqua nalsa triū drachmarū pōdere sumpta, corporis uiscera exurget, cutisq; uitia detergat. Est et alterū terræ rapū, quod si bāthemō uocāt, cuius utiq; radix admodū inutilis est. Semē uerò efficax, ut in potu sumptum, superiori similia designet.

Cyminum calfacit secundum tertium quadantenus a temeratis excessum. Lotium prouocat, & flatum discutit.

Cynos batus, rubi canini fructus haud segniter astringit, folia uerò moderatē astringentia sunt. Atqui uitandum est illud, quod in meditullio fructus eius lanæ præfert faciem, tanquam malo arteriam afficiens.

Cupressi, arboris pilulæ & turiones exiccatoriam uim obtinent, citra euidētem tamen calorem. Ac proinde granalia admodū conglutināt in duriorib. corporibus uulnera, & putrescentiū hulcerū humiditates, in profundo latentes, sine uoxa depascuntur, intestinalibusq; ramicibus succurrunt.

Cyperus, iūcus odoratus angulosus, calidus pariter et siccus ēperamēto est, absq; erosione. Quæ de re hulceribus quæ præ nimia humiditate ægrè coalescūt, cicatricē mirabiliter inducit. Ad oris hulcera, prodest. Inest præterea cypero secandi quædā facultas, qua lapillos atterit, et lotia mēsesq; prolicit.

Cypri folia atq; uirgulta mixtam facultatem possident, discutientem & stipticam, innoxie & citra erosionem exiccatoriam. Quapropter decocto ipsorum ambusta conspersa fotaq; sanantur. aduersus igneas etiā inflammationes, et oris hulcera cōmansa prodest. Lienosis ad hæc remedijs cōmiscetur.

Cytisi folia leuiusculam discutiendi & tepidam facultatem obtinent, sicuti etiam malua.

Cicutam extremē refrigerantem habere potentiam, omnibus perspicuum est.

Coni quidem cum cortex tum folia uiribus pino sunt similia, acrimoniæ uerò plus efficacisq; possident. Fructus autem quem strobilon quidam nominant, si uiridis quidem sit, ha-

bet cum humiditate amarorē quēpiā & acredinem, ideoq; affectionibus peccoris purulentis, ad screatus pulmonis facile euocandos congruit. Esculentus in aqua maceratus tantisper dum omnem acrimoniā exuerit, temperatus minus mordax, & emplasticus magis efficitur, & medicamentum denique asperitati leniendæ accommodatissimum.

Lagopus desiccātis est potētia, quæ alui fluxiōes exiccat. Ladanū ex cistho ladano appellata, prouenit. Capræ nāq; ipsū depascētes, pinguetudinē atq; succulētū ipsius herbæ, barbis et femorib. suis auferūt. Collēctū uerē ladanū medicamentū est calidū, secūdū à tēperatis excessū attingēs, esētia subtili, moderatē emolliēs, pariterq; discutiēs et maturās. Proinde locellorū afflictionib. peculiariter dedicatur. Præter hæc stiptic itatis paululū continet, quocirca fluētēs capillos retinet.

Lathyris tithymalli species est. sunt qui succum eius pariter cum tithymalli lacte purgare affirmant. Semen uerō summa facultate purgatoria pollet.

Lapsina comesta uitiosum humorem generat, illita abstergit aliquantulum, ac discit.

Lapathon, rumex moderatē discutit. Rumex acidus, qui oxylapathū uocatur, præter id repercussoriā quādam facultatē sortitus est. Semē rumicis, sed potissimū acidi, astringēs, diarrheis et dysenterijs medetur. Contrario autē modo, diuersisq; uiribus quādamtenus folia et semē inter se constāt. Folia nāq; manducata aluum commouent, semen potū lubricā cohibet.

Limonū fructum utpote austerum, celiacis & dysentericis, & sanguinem spūto eiectantibus, hæmoptoicisq; cum uino exhibent, ad fluxum item muliebrem acetabuli mensura.

Lichen herba ueluti muscus est, petris adnascēs, quæ abstergit, moderatē refrigerat et exiccat. Impetigines curat, et inflammationes arcet, & ut Dioscorides tradit, sanguinis eruptiones comprimit.

Lichenes equorū lenigatos cum aceto, comitialē morbū

&

omnium uenenatarum bestiarum morsum sanare perhibent.

Leontopetali radix ordine tertio desiccatur, & calfacit, ha-
ituque digerit.

Lepidium, quam & hiberida nuncupant, ex quarta calfa-
cientium à temperatis distantia est, nasturtio uiribus, præter
quam quod minus eo desiccatur, proximum.

Lepi squama omnis potenter exiccat, astringit, et strenue
nordet. Sed æris squama non paulò maiorem arefaciendi uim
obtinet, et subtiliorum magis est partium, habens nonnihil etiam
ubiginis, præsertim ea quæ ex Cypriorum decutitur clauis,
quæ propter hoc Heletim tanquam clauarem uocitant. Squa-
ma aut ferri largius astringit, et hac etiam magis stomomatis:
qua de causa ad extremè maligna ulcera præstantior est.
Carnem quoque ualidius purgat, & liquefacit.

Leucacanthum, nonnulli polygonum, neque desunt qui
chiada nuncupant. Bius radix incidendi & arefaciendi fa-
cultatem habet in tertio ordine, ex calfaciendi uerò in primo.

Leucas, ex tertia quidem ex calfacientium et exiccantium
lasse censetur, sed acriore qualitate præcellit.

Leucoion, uile alba frutex uniuersus extergit, et tenui es-
sentia constat, plus tamè flores, atque inter hos sicciores. Idcirco
menses proritat, fetum perimunt, et eiciunt. Verum si quis eius
uehementiam aquæ admixtione hebetauerit, ad inflammationes
etiam conferet, præcipue uteri. Radices æqualis facultatis sunt,
nisi quatenus crassiore, & magis terrestri substantia. Cum
aceto inflammationibus scirrhis induratis illitæ succurrunt.

Leuce, populus alba, ex aquosa, tepida, & terrestri sub-
stantia constat, absterforiæ facultatis particeps est.

Libanotides tres sunt, sterilis una, ferentes fructum duæ:
omnes extergendi, incidendi, distrabendi, emolliendi que uires ob-
tinent. Quarum succus melle mixtus, hebetibus ex humorum
crassitudine oculis auxiliatur. Coronamentaria uerò libano-
tidis decoctam suffusus felle, potu adiuvat.

P p 4 Libanotus,

Libanotus, thus ordine secundo calfacit, primo deficcit. Habet aut minimū quiddā astringēdis. Cortex eius euidentim astringit, siccātq; in secūdo à tēperatis excessu exadē, crassioris substantiæ q̄ thus, & minimē acrimonie cōpos. Vnde hæmoptoicis, dysentericis, celiacis, et stomachicis non modò foris applicatus, sed intra corpus etiā sumptus, remedio est. Surculus eius calfacit & exiccat tertia distantia. Extergit item aliquid, proinde oculorum hulcera expurgat & implet.

Lignys, fuligo combustarum quarundā specierū, puta thuris, myrrhæ, terebinthi, styracis, picis liquidæ, et cedri, uel unicinis est ac puluisculus cū fumo ascendens. Siccifica, terrena ac tenax essentia. Cæterum quæ speciatim ipsius sunt differentia, pro cremata fiunt materia. Vsus uerò eius cum primis cōmendatur in remedijs ocularibus, & honestandis palpebris inferuentibus. Fuligo autem thuris cōmoditate cateteris omnibus præstat, utpote mitior. Vehementior contrā pini, coni, & picæ. Quapropter ad palpebras glabras, humentes & erosos oculorū hircuos, lachrymantēsq; salutaris est.

Ligustici cū radix tum semen aded calfaciunt, ut mensstrua prouocent, flatusq; strenuē dissipent.

Argenti spuma medium inter metallica tenet ordinem, hinc eo ceu materia alijs remedijs mixta subinde utimur. Obtinet autem facultatem siccantem leniter, detergentem et cōstipantem, ideoq; femorum intertriginibus expedit.

Lithi, lapides omnes, perinde atq; terræ, exiccandi vim continent. Cæterū hæmatites astringit, & potenter exiccat. Cuius gratia asperitatibus quoq; oculorū competit, his qui nullā inflammationē sentiūt, admixta aqua; qui inflammatione infestantur, cū ouo. Prodest sanguinē sputo reijcientib; potatus, hulcerum immodicas excrescētiās reprimut. Schistus uerò lapis consimilem huic habet potentiam, cæterum ad omnia imbecilliore. Hunc Galactites, id est lactarius comitatur. Melitites cuiusdam etiam caliditatis particeps est.

Myro

Myroxus, seu morochthus, à quibusdā leucographis appellatus, quanto superioribus omnibus mollior est (expers enim omnium qualitatū est efficacium) tanto temperatior, magisq; indolorius est. Quocirca in corporibus teneris cum cerato ad hulcerum sanationem utuntur. Iaspis subuiridis, quum potentio rem habeat facultatem, cicatrices & pterygia attenuat. Virens autem iaspis stomacho prodest, non solum pro amuleto suspensus, uel in annulo gestatus. Iudaicus appellatur, renum calculos comminuit, qua de re tecolihon recentiores nuncupant. Pyrites ex eorum censu est, qui streuē tumores, & sanguinem in minimos globulos concretum dissoluit. Qui si fortē in procinctu non sit, molarem eius loco usurpant. Phrygius cum ualida qua præditus est siccandi facultate, stipiticitatis quippiā et mordicationis obtinet: quod idem nomine repellit ac discutit, eoq; ocularijs miscetur medicaminibus. Ageratus astringentem & diaphoreticam sortitus potentiam, gutturis inflammationibus opitulatur. Sic petra flos adeo subtilium est partium, ut flaccescentes uadore carnes citra erosionem eliquet. Gagates lapis admodum exiccatorius existens, inflationibus diuturnis cum prius commodus est. Magnes, qui & Herculeus nuncupatur, apud, consimilem hæmatiti potentiam obtinet. Arabius lapis bori assimilis, arefacientem uim & repurgantem possidet. Alabastritæ cinerem nonnulli stomachicis, id est, cibum in stomacho non continentibus propinant. Smyris abstergentis est potentia, qua dentes exurit. Lapides qui in spongijs reperuntur, renum lapillos confringunt. Viribus hisce rebondent lapides, qui in Argæo Cappadociæ monte proueniunt. Pari modo etiam ophites nomen obtinēs, adalligatus, contra uiperæ morsus utilis est. Ostracites, quod est, crusta eius: et geodes, à terrestri qua constat materia, nuncupatus, asinam admodum siccandi uirtutem habere feruntur, eoq; humoribus inflammationem resipiscentibus mederi. Naxiæ

cotis scobem frigorigica ui pollere asserunt, quapropter uirginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, contrahit. Oleare autem cotis detrimentum, absterforium quum sit, capillorum defluuium ex alopecia confert. Lapis hieractes & indicus alligati, sanguinem ex hæmorrhoidibus destillantem compescunt. Prodest contra scorpionum ictus saphyrus in potu sumptus. Aphroselinus comitalem morbum arceri creditur. Armeniacus per inferna quidæ aluum expurgat, sed perinfestus est stomacho.

Liho spermon, alij liosphoron, alij uerò heraclion, Latini milium solis nuncupant: herba Aëtonychi (ab aquilarum ungibus appellationem sortita) semen est lapideum & candidum, quod cum uino albi coloris epotum, renū & uesicæ lapides conterit, & lotium prolicit.

Lini semen, caliditatis primum sortitū est ordinem, humiditatis et siccitatis medium. Comestum flatus generat, etiam si frigatur in sartagine.

Sciendum est, quod experimēto comprobatum est semen mercurialis infricatum, corporis præter naturā excrecentias (quæ naphia uulgi ineruditū cognominat) demoliri. Semen autem uiride sit necessum est, quo per sæpe tubercula confricentur. Mercuriali herba præcipua in deicienda alui uis est, sed illita discutit.

Litrum, nitrū, in medio apbronitri et salis uires obtinet. Crematum magis attenuat, ac discutit. Intro in corpus si fuerit sumptū, crassos & tenaces humores incidit, & attenuat. Porro acrimonia & siccitatis plus alijs habet chalastreon, à Chalestra uico Thessalonice, ubi prouenit, id appellationis sortitum. Quamobrem ad capitis destillationes, & ad articularum cruciatus eo utuntur.

Lonchitidis, semen triquetrum, lanceæ cuspidi simile est, radix syluestri pastinacæ, quam daucum nominant, æqualis, urinam mouet. Eius uerò quæ scolopendrio respondet, uiridia

ridia folia, glutināt uulnera. Sicca uerò cum aceto pota, induratis lienibus medentur.

Lycopsidis, lycapsi' uel radicē astringentis qualitatis esse, & illitam cum polēta, sacris ignib. subuenire, tritamq; cum oleo inunctam, sudores prolicere, tradit Dioscorides.

Lycium ex oppositis genere substantijs consistit, alia quidem calida, tenui & discutiente: alia uerò terrestri, gelida, et mediocriter astringente, adeò ut in secundo excessu desiccet. In calore uerò & frigidityate medijs adscribitur. Ideoq; ratio ne abstergendi ad discutiendas quæ oculis offunduntur tenebras, utuntur. Ratione uerò astringentis potentia, cōtra maum celiacum, dysenterias, hulcera maligna; ad inflammationes deniq; propter uim discutientem adhibent. Primas uerò tenet Indicum.

Lysimachium præpollentem habet astringēdi uirtutem, cuius ratione hulcera conglutinat, & sanguinem, tum ipsa, tum succus ipsius reprimat. Pota subinde uel clystere immissa, dysenteria laborantibus succurrit.

Lychnidis, cuius usus corollis est accommodus, semen, secundum excalfacientium ordinem ad unguem absoluit.

Lotus, herba fatiua, quam aliqui triphyllon, hoc est trifolium nuncupant, detergendi ui pollet, moderatè exiccat, caliditate temperata est. Loti agrestis semē calidū est, ordine secundo: ceterum nonnihil interim habet absterforium. Aegyptiac semē præter hæc ad panificium assumitur.

Lotus arbor ex subtilibus cōstat partibus, exiccat, & modicè astringit. Quapropter cum uino uel aqua epota, seu etiam aluo iniecta, ad mulierum fluxiones, affectuq; celiacos accommodatur, capillosq; defluentes corroborat.

Macer cortex est, qui ex India importatur. Arefacit quidem secundū siccatiū ordinē tertiū, in caliditate uerò et frigidityate temperatus. Bñ insuper cum tenuitate partium astringens, Celiacis itaq; ac dysentericis salutaris est.

Mala-

Malabathri folium, spicae nardi uiribus est proximum.

Malua syluestris quidem, paululum discutit, & emolli domestica uerò, ceu humidior, etiam uiribus inferior est. Semen eius in tantum habetur ualentius, in quantum fuerit etiam ficius.

Mamiras, ueluti cuiuspiam herbae radícula est, geniculi frequentibus nodosis, quae oculorum cicatrices & albugine attenuare creditur, detergendi nimirum donata uiribus.

Mandragora frigida est temperamento in tertio ordine Pomis uerò eius caloris quiddam et humiditatis inest, qua ratione soporem possunt accersere. Cortex uerò radicis quoniam sit ualentissimus, non tantum refrigerat, sed etiam desiccatur medulla autem ipsa debilior est.

Manna thuris, æqualem thuri facultatem possidet, inefficacior tamen, & paulatim astringentem.

Marathrum, feniculum calfacit in tertio gradu, siccatur uerò in primo. Ideoque lac generat, & suffusos adiuuat.

Mastiche, Chia, calfacit & exiccat in prima à medijs distantia, ex partibus natura diuersis constans, astringente inquam pariter & emolliente. Quocirca stomachi, uentris, intestinorum, & iocinoris inflammationibus opitulatur. Aegyptia nigrior quodammodo desiccatur, & discutit magis, sed minus astringit. qua ratione furunculos discutit.

Melan, atramentum Indicum, autore Dioscoride, ex clementer refrigerantium & astringentium censu est, et inflammationes oedemataque, rumpentium, hucera item sordida expurgantium.

Melanteria, atramentum metallicum, creta sutoria, cum tenuitate partium astrictionis plurimae particeps est.

Atramentum quoque scriptorium ualide persiccatur, in posca contritum, ambustis illitum succurrit celerrime.

Melanchium, nigella, calfacit & exiccat tertio à temperatis excessu, & est tenui essentia. Hac ratione destillationibus à

us à capite in subiectas partes succurrit. Intra corpus assum-
tum flatus alijs acrius discutit. Habet præterea amaritudi-
nem quandam, qua lumbricos latos enecat, extergit, & inci-
lit. Idcirco non nisi recta ceruice spiritum trahentibus com-
petit, lepras extergit, formicas exterit, & menses cit.

Mel calfacit, & siccatur abscessu secundo, summaq; abster-
endi ui pollet. Coctum non adeò acre, abster soriumq; effici-
tur, aluum ad excernendum proritat, sed aliàs plurimum ali-
menti suggerit. Mel uerò amarum, quemadmodum Sardoum,
mixta facultatis est, terreæ nempe & calfaatoria. Mel etiam
ichar, quod ex felice Arabia inuehitur, non tam dulce quam
nostris est: sed æqualeis uireis possidet, præter quod nec uen-
riculum lædit, nec sitim conciliat, ueluti nostrum.

Melia, fraxinus, nobilis arbor, cuius folia pota, uiperarum
morsibus medentur. Cortex huius crematus, atq; cum
qua inundus, lepras eximit. Ligni uerò ramenta potu sum-
pta, exitiosa feruntur.

Melilotum, fertula campana, mixta facultatis est, astrin-
git enim, discuit, & maturat.

Melissophyllon, citrargo, apiastrum, in omnibus marru-
io consimilem facultatem obtinet.

Memacylus arbuti fructus, supra in C expositus est.

Mespila, quæ & tricocca dicuntur, acerbis admodum
fructus est, & uix esculentus, uentrem compefcens. Germi-
na & folia acerbissima sunt.

Medij radix diuersam à semine facultatem sortita est. Il-
la enim uerò austera est, & fluxus reprimat, ita ut scemina-
um ex locorum destillatione fluxionem sistat. Semen men-
ses concitat, subtili nimirum essentia, & incidendi facultate
præditum.

Mecon, papauer multiplex est hortensis, cui etiam thyla-
itis nomen inditum, semine cibo idoneum: si cum panibus estur,
moderate somniferum est. Rheas uerò papauer, eo quod semine
ipsius

ipsius celeriter defluat, cognominatum, ualētius quā don-
sticum est: neutiquam igitur impunē priuatim manducatur
sed momētum largiori melle temperatum. Quod uerō caly-
ce suo ueluti depresso & concauo, atrum semē completitur
admodum medicamentosum & exquisitē frigoricum est
Quod uerō proceriore & squalidiore calice præditum, om-
nium facile medicatissimum est, usq; adē ut stuporem usq; &
mortificationem inducat. Nam & ipsum, et liquor eius, qui
per hyperbolen & nimiam excellentiam opium cognomi-
nant, extremi infrigidantium ordinis est. Corniculatum, uin-
habet absterforiam: qua de causa radicis eius decoctum, po-
tu præsentaneo iocinorosis est remedio. Folia iidem floresq;
sordida hucera expurgant, & crustas detrahunt.

Heracleum, cui & aphrodes, hoc est spumosum nomē est
inditum, semen habet et puuita purganda natum.

Malis omne genus humor excrementitius ac gelidus inest:
caterum mollia & exoluta, & aquosa, frigidiora & humi-
diora sunt cæteris. Dulcia, aquosa quidem, sed obscurius fri-
gida. Austera, dulcibus quidem frigidiora, sed minus humi-
da. Acida & ipsa quidem natura frigifica, sed impac-
tos uentri humores incidunt. Acerba, ueluti cydonia, & mala
struthia, gelidam & terrestrem temperiem sortiti, aluum co-
hibent, uulnera glutināt. Pari quoq; modo folia, succi, corti-
cesq; arborum inter se discrepant.

Mali Persicæ ramuli, germina & folia uincentem ha-
bent qualitatem amarā: lumbricos idcirco leuigata, umbi-
licoq; impacta, perimunt. Fructus porro ipsius, nempe hoc
quod edendo est Persicum, humidius & frigidius secundo
gradu existit.

Mali Armeniacæ fructus, quem hac ætate prococcia in-
digitant, eandē cum pomis Persicis facultatē repræsentat.

Mei radices calidæ sunt tertio ordine, sicca uerō secun-
do. Quocirca lotium menses que proritant. At si plusculum
sumpsit

impferis, caput tentant.

Milax non modò leuis, uerumetiam aspera, arboribus sue deque circumuoluta, calida et acrioris est potentia.

Misy ex eorum medicaminum censu est, quæ cum ualida strictione crustâ inducunt, atq; deurunt: minus tamen quàm balcitis, subtilitatis beneficio erodit. Porro chalcitim & so y Galenus tradit uetustate in misy permutari, à superficie atim inchoante mutatione.

Molybdena, plumbago, spuma argenti uiribus respondet, media temperie ad frigidius pauxillum declinans.

Molybdos, plumbum algentis est potentia, multam uerò abet substantiam humidam à frigore congelatam. Quocirca si triueris in pila plumbum uel cum uino, uel cum oleo ex immaturis oleis expresso, aut quopiam alio succo frigorifico, ad huceras pudendorum sedisq; inflammationes, præstantissimum erit remediū. Lamina adhuc plumbacea lumina gestata, ueneris insomnia arcet. Quin & glandulas neruorum, quas ganglia appellant, tenuis plumbi bractea imposita dissipat. Plumbum crematum siccus est, & habet nonnihil acrimonia. Vbi lotū fuerit, citra morsum exiccatorium & hucerb. extremè malignis, præsentaneū est remediū.

Mori fructus maturus quidem, alui deiectionem molitur. Ad medicamenta quæ ab ore stomatica dicuntur, & ad alia ac mediocri astringione egent, accommodus est. Immaturus uerò quum aruerit, medicamentum præstat admodum astringorium. Radicis arboris cortex, quadantenus amarescens, urgandi uiribus exuperat, ac proinde latos etiam lumbricos enecat. Folia ac germina mediam quodammodo subducentium & retinentium facultatem obtinent.

Myagri semen pingue est: quod uerò in se complectitur leaginum, opplendi præfert potentiam.

Myaces, mituli cremati, buccinis præstant eadem. Pecuarii uerò eloti, scabriciem palpebrarum, oculorumq; albugines

bugines cum melle exterunt..Caro ipsorum canum morsibus imposita, auxiliariis est.

Myaron, quam aliqui melampycnon uocitant, herba sculacea est, & pinguis, cuius pinguetudine scabries corporis leuigari creduntur.

Myelos, medulla, indurata & scirrhusa corpora emolli. Prima bonitatis prerogatiuam habet ceruina, proxima uitulina: taurorum namq; atq; hircorum plus acrimoniae & ariditatis inest. Quae ex artuum ossibus elicatur, pinguior & mollior est: spinalis autem durior, ac squalidior.

Mycetes, fungi, frigidi admodum ac udi temperatura sunt & sanè inter eos sunt, qui comesti enecant, potissimum qui ex natura putredinis compote consistunt.

Myosote, auricula muris, explicata in Alsine.

Myza arboris fructus est, exilior quidem prunis, uiribus uerò proximus.

Myrice, tamarix, secantem & detergentem potestatem, citra perspicuam desiccationem sortitur, accedit illi nonnulla quoq; stipticitas. Eamq; sanè ob causam, decoctum ipsum lienosis subuenit potum, medeturq; dentium doloribus. & rursus eius & cortex, gallae uiribus respondent. Cinis arboris multo exuccior est.

Millefolium tanta pollet siccandi potentia, ut uulnera conglutinet.

Myrrha, quae myrrhis quoq; dicitur, secundi est calfacientium ordinis, partium quadam subtilitate annexa. Radix eius iucundo naribus odore, gustui dulcore blanditur, menses prolicit, pectus atq; pulmonem expurgat.

Myrtus ex contrariis constat substantiae partibus, exuperat tamen in ea frigidum terrestre: cuius ergo arefacit impensius. Cæterum myrtula adnascens ramis ac trunco turgida (quam myrtida appellant) magis exiccat & astringit. Folia item arida ualidius quam uiridia desiccant. Fructus atq; suc-

CUC

us eandem habent facultatem, quum exterius illitus, tum in
rò assumptus.

Moly, quod rutam agrestem uocant aliqui, nonnulli uerò
armalam, Syri besafan, calfaciendo in tertio censetur ab-
cessu, cum subtilitate essentia. Quare crassos, uiscidosq; hu-
mores incidit, ac discuit, lotiaq; prolicit.

N Ascapthou, alijs nacapthou uocant, odoramentum est in-
dicum, aduersus constrictiones muliebrium locorum, ad
effluus uaporatur.

Napy, sinapi calfaciendo & arefaciendo in quartum us-
que recessum peruenit.

Nardi spica radix calfacit excessu primo, desiccatur secun-
do. habet autem et astringentis quiddam substantia, cum acrimo-
nia et amaritudine leuiuscula. Eamq; ob causam iocinori &
stomacho conuenit. Foris adhibita, uel intra corpus sumpta,
lotium proritat, uentris & intestinorum fluxiones compescit.
Efficacior autem est Indica, quam Syriaca, et nigrior. Nar-
dis Gallica, uires praedictae cögeneres sortita est: ad cuncta ta-
men, praeterquam ad ciendum lotium, debiliores. Calore enim
potentiore, inualida uerò astringitione donata est. Nardus, quae
in montibus prouenit, thylacitis & pyritis nuncupata, uiri-
bus commemoratis est inferior.

Naribex, ferulae semine, attenuandi calfaciendiq; uim obti-
net. Medulla ipsius uiridis adhuc, astringentis qualitatibus parti-
cipat. Ideoq; sanguinem excreantibus et coeliacis remedio est.

Narce, torpedo marina uiuens, dolentibus capite adhibita, do-
lor ipsius sopit, eodem illo uidelicet torpore, quo membra ho-
minis solo contactu torpescunt. Oleum in quo uiua elixata est,
acriores articulorum cruciatus illitum lenit. Sedem praeter-
ea procidentem coercere hanc torpedinem appositum asserunt.

Narcissi radix tantum exiccat, ut uulnera etiam grandia
conglutinet, uel ad praecisiones usque tendinum utilis. Habet et
abstergerendi & euocandi uim quampiam.

Qq

Neuras,

Neuras, aliqui poterium nuncupant, citra erosionem desiccatur, ut præcis nervis glutinâdis sufficiat. Radices eadē potissimum efficacia regnât, cum impositæ, tum in potu sumptæ.

Nerium, uel rhododaphne foris illitum, dissipat, intra ro corpus sumi letale est.

Nymphæa, desiccantis est potentia absq; morsu. Ventrem reprimat, semenq; desiccet. Verum candida radice prædita ualentior est, adeo ut muliebri quoq; medeatur profluvio, cœuino nigro et austero potata. Cui uerò atrii coloris radix est, ea quiddam abstersorium habet: ac proinde uirilignes, quod alphas Græci uocant, aqua admixta exterit. Capillorum defluuia, illita cum pice liquida, refarcit.

Xanthion, uel phasganion, semen gerit dissipandi facultate præditum.

Xiris, siue xyris, cū tenuitate partiū dissipandi euellēdiq; et nimirū exiccandi facultatē obtinet, præsertim semen: quod ex lotiū ciere, et lienē in scyrrhum induratum sanare potis est.

Xiphij, gladioli radix, attrahendi, dissyciendi, et exiccandi uiribus donata est.

Oe, sorbus arbor, cuius fructus oa, à quibusdam ua, hoc est sorba nuncupantur, astrictoria quidem facultate, sed imbecilliore mespilo est prædita.

Oithonnam, alij herba cuiuspiam succum esse affirmant, nasciq; in Arabia ad Aegyptum: alij lapidem Aegyptium esse credunt. Habet uirtutem abstergendi et erodendi: cuncta quæ oculis tenebras offundunt, et aciei efficiunt, exterens.

Oenantes, labruscæ floris multiplex usus est, siquidem potenter astringit, uentri comprimis robur indit. Caterum Dioscorides aliam huic potestate contrariam describit oenanthem, eoq; secundas ejcere, et urinæ stillicidio, morboq; regio mederi asserit.

Oenos, uinum calidum est et siccum, in secundo ordine, sed ualde antiquum in tertio, mustum uerò in primo.

Oesypus.

LIBER SEPTIMVS. 612

Oesyphus: de lana succida in sermone de lanis explicatū est.

Olynthi, grossi acrem habent & discutientem potentiā, ratione succi quem in se continent. Qua de re elixi, duos tumores dissipant, crudi uerò formicas & thymos expungūt.

Olostium cum astrictione exiccat, quo nomine medendis ruptis eo utuntur.

Omphacion, succus est ex immaturis uuis expressus, insigniter astringens, & in tertio excessu desiccans. Quamobrem affectibus cum fluxione coniunctis, praesertim stomacho cibum non continenti, succurrit.

Onagrā, sunt qui onotherā, et onothurin appellāt, fruticosa arborosus, cuius radix illiā immania hucera mitigat.

Onoma, uel onomis, uel phlomitis, uel ononis, acris & amara est. Quare folia eius ē uino pota, foetus in utero interficiunt & expellunt.

Onobrychis, opaca rarificat et discussoria facultatis est. panos itaq; dissicit, stillicidijs urinæ medetur, et sudores elicit.

Oni, millipeda q̄ in humetis et sub aquarijs uasis degūt, et in gyru se cōuoluunt, dissipāt et exiccāt. Quocirca cū uino pota, mictionis angustia et morbo regio opitulatur. Angina uexatis cum melle illinuntur. Cum rosaceo trita, et calfacta in cortice mali punici, contra aurium dolores instillantur.

Onyches, testae sunt conchularū Indicarū, quæ sufflu adhibita, praefocatione uteri concidentes faeminas excitāt, pariter et morbo comitali oppressos. Potae uerò uentrē turbāt.

Ononis, radix in calfaciendo tertij quodammodo ordinis est. Cortex eius extergit & desiccāt: quo nomine calculos comminuit.

Oxos, acetum mixta refrigerandi pariter et calfaciendi potestate praeditum, utrinq; tenuibus constat paribus. Vincit autem caliditatem frigiditas, tanta arfaciendi facultate, ut tertium ordinem absoluat.

Oxyambus arbor, agresti piro figura & facultate respondet,

spondet, cuiusdam etiam tenuitatis particeps. Fructus uer
ipsum baccis myrti æqualis est.

Opos, succus, tum Cyrenaicus, tum medicus, tum Syri
cus per excellentiam uocantur, naturæ calidioris, & per l
litum digerentis haud ignauiter. Reliquos calore et partiu
subtilitate exuperat Cyrenaicus.

Origani omnes species incidendi, extenuandi, desicc
di, calfaciendiq; potentiam ad tertium usq; gradū referun

Oreoselinum, apium montanum, consimile satiuo est, se
ualentius interim.

Orobanche, siccam & gelidam habet temperiem, in or
dine primo.

Orobis, cruum in calfaciendo ordinē sortitur primum
in desiccando uerò secundum: & est gustatibus amarum. atq
ob id quidem dissecat & abstergit, & ab obstructione libe
rat. Vberius uerò assumptum, sanguinem per lotium agit.

Orminō, geminalis, forma et colore marrubio æquale est,
modicè desiccatur atq; detergit; in Venerē igitur incitat: oculor
um crassitudines cum melle illitū expurgat, ædemata dis
iicit, aculeosq; euellit. Syluestre satiuo non parum est ad om
nia potentius.

Oryza, astringentis alicuius est particeps, qua uentrem le
niter astringit.

Orchis herba (appellatur etiam cynos orchis, hoc est tes
ticulus canis) bulbosam & geminam radicem obtinet. Ma
ioris quidem facultas, humida & calida, ideoq; in uenerem
stimulat: minoris uerò, calida est & sicca. è diuerso igitur ue
nerem extinguit.

Orchis (quæ et serapiada cognominat, aliqui uerò trior
chim) uehemētius quàm superior desiccatur. Quapropter laxos
humores discutit, huceraq; sordida et putrescētia expurgat,
herpetib. medetur. Torrefacta multo impēsius desiccatur. Quia
uerò leuiter astringit, uentrem quoq; cū uino pota cōpescit.

Osyris

Osyris herba, ex qua scopæ nascuntur, quæ cremata dicuntur, amara, obstructions iocinoris expediens.

Ossa cremata uehementiorē habēt dissipādi exiccādiq; potentia: in primis uerò quorundā sentētia, humana. Talū quippe suillū combustū, inflationibus & strophis mederi asserūt. Si quis ossa deusta propinat, comitali morbo & articularū dolorib; medetur. Sunt qui talū bubulū crematū labefactos dētes cōstabilire affirmēt. Cū melle uerò sumptus, rotundos lūbricos profligit. Adiecto oxymelite, lienē induratū liquat, in uenere excitat. Femora bouis cremata, inq; potu assumpta, sanguinis eruptiones, et alui profluvia reprimunt.

Testæ ex fornacibus leuigatæ, siccificam & absterfōriam uim obtinent. Quocirca dentes exterunt: illitæ cum aceto, pruriginibus, & pustulis, quæ Græcè exanthemata dicuntur, & misera pedum ualitudine laborantibus opitulatur. Cum cerato, strumas abolet.

Ostreorū testa cremata cōgenerē habet cū buccinorū testis effectū, subtilioris tamē est essentia. fœdas itaq; faciei lituras exterit, dētes dealbat. Badē si lauatur, mordacitatē amittit: humida hulcera carne implet, atq; ad cicatricē perducit.

Vrina quælibet temperamēto calida est, et acris. Atqui humana omnium cæterorū animalium, præterquā maialiū, imbecillior existit, ualētius uerò abstergit: cuius potu in peste quidā usi mortē euaserūt. Lepris præterea et putredini obnoxius fœtidisq; capitis hulcerib; q̄ achoras dicūt, furfuribusq; medetur. Pedū attritib; nōdū inflāmatib; opitulatur. Cæterū urina uenerē non experti puelli, omnium primas efficacia tenet, ex qua etiā chrysocolle cōficitur. Urina mulorū morbo articulari cōuenit. Lotiū caprinū, atq; chamelorum uentrē subducit. Qua ratione aqua inter cutē laborantib; potui prabetur.

PAncratiū, scyllæ imaginem refert ac uires, sed imbecillioris est affectus.

Paliuri cū folia tū radix astringūt, proinde alui fluores
Q q 3 sistunt,

sistunt, & panos non admodum calentes discutiunt. Fructus insuper tantam habet diffecandi uim, ut lapillos atterat, & pectoris excreationibus subueniat.

Panax Herculeus, unde liquor opopanax appellatus cōfiscitur, tertij calfacientiū excessus, exiccantiū secundi, emolliendi dissipandiq; facultatē obtinet. Radicis uerò cortex succo uiribus inferior est: habet absterforium quiddam, & carnem procreat. Fructus mensibus proritandis idoneus est.

Panaces Asclepium, atq; Chironium, prædicto calidiora sunt: quapropter floribus eius & semine medendis hulceribus malignis, & ad panos utuntur.

Papyrus non combusta materia quædam est, cremata arefaciendi uim habet, quemadmodum et charta deusta: sed papyri cinis uiribus inferior est.

Paronychia, ab effectu nomē sortita est, quod reduuijs quæ ad unguis radices coeūt, et paronychiæ dicuntur, remedio sit. Extenuat, exiccat, & mordere nescit.

Quinquefolium in tertio excessu desiccat, minimè acre, eoq; multiplicis est usus.

Peplon, alij papauer spumosum appellant, & hic fruticulus succum obtinet, & tithymallorum modo expurgat.

Peplion quoq; succum possidet, prouenitq; magna ex parte maritimis locis. Cætera quidem superuacua, semen uerò eius feruens, haud aliter atq; peplum expurgat.

Piperis radix uiribus costo assimilatur: cæterum fructus nuper germinantis, piper longum dicitur, quod humidum est & calidum. Qui uerò acerbus adhuc est, piper dicitur album, quod atro acrius. nam illud iam quasi superassatum uires quodammodo nimia torrefactione exhaustas habet, ambo autem excalfaciendi uim obtinent.

Pepō abstergendi ui pollet, quāobrē eius ueluti caro discolorēs ceu à sole contractas maculas, atq; cōsimiles cutis labes exterit, semen renes obturatos obstructione uindicat.

Periclyo

Periclymeni, syluæ matris semen et folia, incidētis pariter calfacientis sunt potentia, tãtæ quidē, ut senis diebus pota, otium cruentum proliciāt, semen desiccet, lienosis et agrē hirantibus quadragenis diebus pota salutaris est.

Verbenaca, hætenus desiccet et astringit, ut uulnera conglutinet, & sanguinis eruptiones sistat.

Persæa, arbor est Aegyptia, cuius folia desiccandi & constipandi uim obtinent, ideoque sanguinis eruptiones ompeſcunt.

Petaſites tertij in arefaciendo ordinis est, quo fit ut aduerſus cacoëthe, et hulcera phagedanica usus eius commēdetur.

Petroſelinu semen calfaciendo & exiccando in tertio cenſetur ordine, unā cum incidendi effectu: inde mēſtrua & lotia copioſe promouet, & flatus discutit.

Peucedani succum & liquorē impendio calorificum, diſſipantiē at attenuantiē uſurpamus. Odorata nanq; & in potione interius ſumpta, iuxta affectibus pulmonū ac peſtoris, ex craſſitudine & tenacitate humorū prouenientibus, prodeſſe credūtur: Lienes induratos ſoluunt: dentiū perforatorū cruciatus, cavitati exeſæ impoſitus liquor extemplō ſopit, affectibus neruorū cōgruit. Radix cum ad hæc, tum ad ſquamulas oſſium abſcindendis utilis eſt. Hulceribus doſoſis et malignis opitulatur, excalfaciens & deſiccans gradu tertio.

Picea, cum pino ſimilem quidem, ſed moderatiorem faſcultatem ſortitur.

Peganū, ruta ſylueſtris quarto ordine calfacit & exiccat, hortēſis tertio. Craſſos tenacesq; humores diſſecat et diſcutit, lotia ducit, & flatus extrudit: hinc ueneris impetum cohibet.

Pix arida diſtātia à tēperatis ſecūda deſiccet, minus calfacit. In liquida cōtrario calor ſiccitati præſtat. habet & non nullā abſtergendi, maturandi, diſſipandi potentiam, et in guſtu acrimoniam: quibus ſcabros ungues, impetigines exterrit, tumoresq; maturat duriores. Ad hæc omnia liquida po-

tentior est: ut suspiriosos etiam, et peioris suppuraciones,
ita adiuuet. sicca uerò, ad uulnera conglutinanda efficacia

Pisselæon, liquidæ picis proles est, quæ natura subtili-
rum est partium.

Pistaciorum fructus manducatus, stomacho moderatè u-
lis est, iocinoris obstruções expedit, atq; in primis summe-
rum, beneq; fragrantium eorundem operimentorum in uino de-
coctum: ad serpentium etiam morsus accommodatus est.

Pityides, fructus sunt picearum mixtæ uirtutis, ueluti aci-
monie et acerbitalis participes. Quare promanantibus e-
peiore spuitionibus conferunt.

Pityocampe, picearum crucæ, iisdem sanè uiribus, quibu-
cantharides et buprestes præditæ sunt.

Piceæ cortex ita astringendi facultate præpollet, ut in-
tertriginibus et ambustis illitus, efficacissimè succurrat, et
alui fluorem bibitus cohibeat. Folijs inest uis quædam hulce-
rum conglutinatoria.

Pityusan, nonnulli tithymalli speciem esse autumant, eo
quod lac perinde atq; ille habeat, et similiter illi repurget.

Platanus non multo humidiores et frigidiores faculta-
tem possidet, hinc et folia eius uiridia inflammationibus na-
scentibus auxilio sunt. Cortex autem et galbuli siccoris sunt
potentie, ut in aceto elixi, dentium cruciatus leniant, adustio-
nes uerò ignis cum adipe persanent. Cortex porro crema-
tus, desiccatorius magis et abstergeñtor euadit, hædenus qui-
dem, ut lepras exterat, bulceribusq; perhumidis medeatur.

Pulmo agninus et porcinus, in pedibus calciamentorum
attritus sanare creditur. Vulpinus sale inueteratus si potu su-
matur, anhelos restituit. Marinus recens in leuorem contri-
tus, podagris et pernionibus proficit.

Polemoniū, quidā philetæron nomināt, tenuis est essentie
et exiccatorie. potui igitur nonnulli in coxendicū dolorib.
dysenterijs et indurato lieni radicem eius cū uino exhibent.

Poliū

poliū minus, quo utimur ad antidota, in tertio est calfaciens et arefacientiū cōsu. Laxat igitur obstructa intestina omnia, lotiū et menstrua trahit, grandia conglutinat uulnera uis. aridum uerò rebellibus impersum hūlcerib. subuenit.

Polygalō modicè austera habet folia: potiū, lac procreare letur. Tēperamentū itaq; in eo imperat calidū et humidū.

Polygonatum, fraxinella, multiplici facultate à natura natum est, astringione, acrimento, amaritudine, & insuauitate gustus fastidiosa, explicatu difficili. unde non admodum multa est usui, præterquàm quòd radicem eius nonnulli lūeribus inducunt, & faciei næuos eadem detergant.

Polygonon, sanguinalis, habet quiddam astringens, sed incit in eo aquea frigiditas, in excessu secūdo. Quamobrem frigantes effreni æstu stomachos, gelida foris inspersa adiuuat, quemadmodum & sacros ignes & feruentes inflammationes lenit. quumq; eiusmodi existat, profluua retundit, eoq; siccifica esse uidetur. Antecellit autem in omnibus fœminam mas efficacia.

Polycnemum calfacit & desiccāt secundo gradu, proin ipsum quoq; uulnera conglutinat.

Polypodium, filicula, citra mordacitatem impensius desiccāt, potu haustum purgat per inferna.

Pompholix arefacit absq; erosionē, itaq; carnositas atque alijs omnibus malignis hūlceribus succurrit. Inditur etiam illiyrjs ocularibus.

Purpuræ crematæ æqualem habent ostracis potentiam: utrum testæ ipsarū in oleo decoctæ, capillos fluentes conseruant: cum aceto sumptæ, lienes turgentes sanant. Eadem affitæ, mulieres ex uteri strangulatione concidentes exciunt, secundasq; expellunt.

Potamogiton, fontinalis herba refrigerat & adstringit proxime sanguinali, cui uiribus respondet.

Poterij, quod phœnion quidam uocant, fruticis radices

Qq 5 concisæ

concisæ, neruorum præcisiones & uulnera conglutinat. Quinetiam potum herbae eius decoctum, neruorum affectiones adiuuat.

Prasion, marrubium, calefacit ordine secundo, sed exsiccat amplius, iocinoris & lienis obstructions aperit, thoracem & pulmonem expurgat, mensesq; prouocat. Illud astringit ac digerit. Alioqui primaria detergendi & dissecandi facultate præditum.

Porrum, prauum succum generat, et acrimoniam possidet, ut autor est Dioscorides: grauiam parit insomnia, alio commodatur, urinam ciet, & attenuat. Habet præterea nonnihil abstersorium, quo pectoris uitia per excreationes emendat. Semen eius ptisana decoctum, renum inditur remedium. Folia quadam sunt astringione donata. Quare ratione expressus eorum liquor, sanguinem erumpentem suppressit.

Prinns, ilex, congeneres quercui uires obtinet, multo tamen est ualentior.

Propolis efficaciter calfaciendo secundum sortita est: cessus ordinem, abstersgit leniter, & substantiam in se habet tenuem, & meatus obturatione asserentem.

Ptarmicæ folia sternutamenta proritant. Vniuersus uero fruticulus uirens, sugillata, liuoresq; alios disscit. Est etenim caloris & exiccatoris facultatis. Viridis quidem in secunda, sicca in tertia distantia.

Ptelea, ulmus, exiccantem & abstersoriam uim obtinet, qua uulnera conglutinet. Multo uero amplius cortex, si recens fascicula modo uulneribus circumligetur. Leporam cum aceto extertit. Radices eadem potestate regnant: quarum decocto fracturae, quæ tophacia egent substantia, fouendæ sunt.

Pteris, filix, exiccatoriam uim & amarâ præfert. Propterea fœtus in utero interficit, & latos lumbricos enecat, quatuor drachmarum pondere in mulsâ sumpta. quoniam autem paululum habet astringentis, hucera sine erosione exiccat.

Pycno-

Pycnocomum discutientis & acris est potentia, proinde
lia ipsius panos & furunculos discutiunt. Semen ad hæc
rpori infixæ extrahit, radix flauam bilem exhaurit.

Pyrethri radix deurentem uim sortita est, qua dentium
frigeratorum cruciatus lenit, & in febrium cum tremo-
algoribus sub accessionis circuitum cum oleo infricatur,
pidos etiam ac resolutos iuuat.

Pyros, triticum, primi est excalfacientium ordinis, nulla
iccandi aut humedandi insigni potestate, glutinosi etiam
loris & obstructionis nonnihil sortitum est.

Pytia, coagulum quoduis, acrem, attenuantem, disci-
ens & exiccatoriam facultatem habet. *Leporinum* uero,
initialibus succurrere, si cum aceto potetur, traditum est
moræ, & sceminarum fluxioni medetur. Lac in uentre
umosum soluit, consimiliter & sanguinolentia pectore ex-
tationes compescere affirmant. *Equinum* uero tradunt,
liacis, intestinorumq; torminibus succurrere: *Phoca* pa-
castorio uires obtinere.

Eycula quælibet (aut attritarum uestium fragmenta)
combusta, pares lanæ crematæ, ex qua texitur, uires possi-
t. Linteum uero dum crematur, tenuem ex se fumum ex-
halat, ut destillationes à capite in subiectas partes dissipet, et
febrium locorum recursui ad superna auxilietur. iam pan-
culus combustus proximam lanæ facultatem obtinet.

Rhamnus arefacit distantia secunda, refrigerat in pri-
ma. Qua ratione herpes cum ignibus sacris non admodum
uenientes curat. Cæterum tenerorum eius foliorum usus com-
mendatur.

Rhaphanus tertio gradu calefacit, secundo exiccatur: syle-
tris autem in utroq; efficacior est. Amborum semen ualen-
tius est: sugillata igitur, & cæteros liuores discutit.

Rheum nonnulli rha nuncupant, constat terrena, frigida
subtiliumq; partium essentia, acra item calida, & leuiter
acri.

acri. Quamobrem conuulsionibus, fracturis, & orthopne auxiliatur, liuores, quod disyciendi uim habet, exterit. Quasi stringendi, sanguinem expuentibus, celiacis, intestinorum torminibus prodest. Vtriusque ratione iocinorosos adiuuat.

Resinae omnes calorificam habent & exiccatoriam facultatem. Ceterum primas tenet terebinthina. non enim dicit modò, sed emollit etiam, & tenuem habens insuper essentiam, catenus abstergit, quatenus scabiè exterit, & lanx huiusmodi. Acrior quodammodo est resina tedacea, & haec quoque magis strobolina, neque tamquam terebinthina magis distrahunt aut extrahunt. Medium inter has locum tenent cedrea & abietina.

Rosarum uis atque natura conflata ex aquea substantia, lida, adstringente atque amara. Flos adhuc ualidius adstringens atque ob causam exiccando pollet.

Rhodia radix calfacit ordine secundo, tenuium partium & dissipantis naturae.

Rhœa, mala granata, dulcia omnia, adstringentem qualitatem obtinent prædominantem, quapropter refrigerant & desiccant. Ceterum dulcia minus; austera autem magis refrigerant, & sicciora sunt, & stomacho minus noxia. Acida refrigerant, & ampliorem quandam incidendi facultatem obtinent. Acini ipsius succo adstringentiores & exiccantiores sunt. Iam uero & malicoria his multo amplius adstringunt & arefaciunt. Proximam his naturam habent Cytini, qui mali punici flores sunt.

Rhoos, qua coriarij utuntur, fructus & succus medicis in usu potissimum sunt, ualde adstringentis quidem & siccificae qualitatibus in excessu tertio, abstergentis autem secundo.

Rhypos, strigmenta sordescit ex ære statuarum & uasorum in palastris, in quibus largum oleum inhaeret, continens aliquid æruginis, disyciendi & moderatè arefaciendi, emolliendi quoque uim obtinent, atque ob id immaturos panos disyciunt.

Ceterum

erum de strigmentis ex palaestra cum puluere & decimas
ceromate collectis, quæ pati à quibusdam uocantur, iam
lem de sudore traditum est. Sordecularum uero aurium re
ijs, optimum remedium esse perhibent.

Agapenum seu liquor est ferulæ, calidus & subtilis. Ha
et aliquid abstersorium, quo oculorum cicatrices extertit,
isionibusq; eorum accommodatur.

Salamandræ combustæ cinerem nonnulli medicaminibus
dentibus. & quibus lepræ ac scabiei succurritur, admiscet.
Samsychon, maiorana, calfaciendi & arefaciendi uini
et in tertio excessu. Constat ex tenuitate partium, & disti
te potentia.

Sandaracha deurentem, perinde atq; auripigmentum, fa
tatem obtinet.

Sandix, uel Siricum tenuium est partium, & temperate
exiccatoria, nondum tamen excalfaciens.

Saprotes, caries lignorum, potissimè ulmi, humida expur
hulcera, & carne implet,

Sapon abstersoria facultate prædita est.

Sarcocolla, arboris in Perside nascentis lachryma est,
uini & naturam habet opplendi, et citra erosionem de
andi, eoque uulnera conglutinare potis est.

Saxifraga urinam prolicit, & calculos comminuit.

Satyrium, uel ut alij nuncupant, trifoliū, temperaturam
et humidam & calidā, & spirituosum est. Quamobrem
uenerem incitat. Tradunt aliqui, id ipsum cum uino astrin
te haustum, non nisi recta ceruice spirantibus succurrere.

lenus libro de Theriaca: Triphyllū, inquit, hyacintho si
e est, aere intumescens, semē habet syluestri cnico simile.

hæ huius decoctum, phalangij aut uiperæ morsui, si eo fo
tur, opitulari. Sano autem eadem potio exhibita, consimi
affectum his qui ab aliquo horum demorfi sunt, inducit.

Sauræ, lacertæ iocinoris ac capitæ, suo loco mentio fa
ctæ est.

est.

Haec est. uniuersa autem dissoluta & imposita, scorpionis idibus remedio est.

Apium tanto calore praeditum est, ut lotia mensesque prioret, flatulentos spiritus extinguat, & semen eius potissimum

Seris, intybum, holus subamarum est, frigidi admodum ac humidi temperamenti, sed astringentioris quoque qualitatis et particeps.

Seriphum calfaciendi in secundo excessu, siccandi in primo, facultate praeditum est, absinthio respondens, praeterquam quod non aequè ut illud astringit, impensius calfacit & lumbricos interficit. Stomacho nonnihil infesta.

Seselis radix, magisque semen, tanta cum partium, quibus conflata est, subtilitate, ut calfacientiora pollet, ut urinam cito aduersum comitalem morbum & orthopnoeam opem confert.

Sepiæ testa consimili quidem ostreo praedita est potentia, sed tenuioribus constans partibus, abstergens. Qua de re cremetur, cum sale fossili, oculorum ungues extenuat. Insuper & infricata, ficosim exierit, & cutis uitia detergit.

Sesamoidis candidi semen calfacit, abstergit, & rumpit Sesamum pinguedinis plusculum, uiscosiusque lentoris non parum continet. Eam ob rem opplendi, emollicendi, & calfaciendi non in summo uirtutem obtinet.

Seps, quam aliqui lacertam Chalcidicam appellauerunt, in uino bibita, a se illatis mordicibus succurrit.

Salua hominis ieiunii potenter dissipat & abstergit. Quoniam circa infantium impetigines illita exierit, furunculos concoquit, cum tritico nimirum ore praemanso imposita, sugillata abolet: homicidisque feris omnium aduersissimum est.

Sideritis Heraclea, quae & helxine dicitur, explicata est. Sed Achillea sideritis superiori uiribus est non dissimilibus, nisi quod astringentione exuperat. Idcirco fluidis affectionibus competit.

Sideros.

Sideros, ferrum aqua sæpenuerò extinctum, insignem
 am uim siccificam in ea deponit, pota idcirco lienosis ex-
 edit. Vinum uerò in quo candens ferrum extinctum est, coe-
 acos, & intestinorum tormina, cholera laborantes, stomas-
 ho dissolutos persanat.

Sicyos, cucumis qui edendo est, uiridē colorem præfert,
 frigerandiq; & humedandi facultatē in secundo excessu.
 Caro eius feruidas mitigat inflammationes. Semini abster-
 gendi & incidendi facultas inest. Quocirca urinas cit, & cora-
 ori uenustatem & nitorem conciliat. Siccus arefacit in ora-
 ine primo, sed maior abstergerendi uis cum semini, tum radia-
 i inest. Cucumeris syluestris liquor, Elaterium dictus est. Ra-
 dicis uerò foliorumq; succus, haud disparem quidem elaterio
 acuitatem, sed debiliorem sortitus est. Radix abstergit, discu-
 it, atq; emollit: succus exiccat.

Sillybum plantula spinosa est, chamaeleonem candidum
 eferens, esculenta interim. Radicis liquor drachmæ pondus
 e cum mulsa potus, uomitiones prolicit.

Silurus sale conditus, atq; deglutitus, fauces humiditas ex-
 urgat, ad modum cataplasmatīs impositus, aculeos euellit.

Silphæ, blattæ, quæ circa molas & in pistrinis repe-
 ritur, interanea elixa & contrita, aurium doloribus me-
 lentur.

Silphium, laserpitii, insigniter calfacit, & flatu creat,
 & concoctioni renititur. Exterius corpori applicatum, effi-
 caciùs agit, præcipuè laser: attrahendi, expurgandi, & ex-
 crescentias amolendi uiribus pollens.

Sison calidum, lotia ciet, concoctionem iuuat, menstrua
 concitat, & interaneorum oppilationes recludit.

Sium, lauer, exalfacientis est potentia, urinas mouet, di-
 scutit, calculos in renibus confringit, & menses propellit.

Sisari radix elixa, stomacho salutaris est, uires eliciendi
 urinas, secundoq; excessu calfaciendi obtinet. Semē tenuium
 partium

partium est, & discussorium, & præpotens. Quamobrem singultientibus, torsionibus circa umbilicum laborantibus, cum uino propinatur.

Sisymbrium, quod & cardaminem nuncupant, eo quod cardamo præferat quippiam simile, aridum quidē calfacit & desiccatur, ordine primo: uinum uerò secundo.

Scammonia calfacit, discutit, & biliosos humores abstergit, sed potissimum eius liquor, qui & panos discit, conceptum appositum interficit, lepras abolet. Diuturno capitis dolori cum oxyrhodino magna cum utilitate inspergitur. Radix ipsa per se pota, tum eius etiam decoctum repurgat. Cum admixtione uerò aceti polenta & hordeacea decocta, coxendicum doloribus cataplasmatibus superinducitur.

Scandix est syluestrium holerum censu est, calida & sicca facultatis secundo excessu. Urinam ducit, & uiscerum obstructions aperit.

Scingi carnes renibus proxima, potu sumpta, metulam arrigere, & uenerem accendere creduntur. Contrariam affectionem lactuca semen cum aqua potum inducit: hoc est, ueneris cupiditates extinguit. Idem præstat lentium elixatum cum melle.

Scilla incidit, calfacit, et desiccatur ordine secundo. Satius autem fuerit eam assam aut elixam sumere.

Scolopendra, centipes marina, oleo elixa & illita, glabreta inducit. Combusta uerò pruriginem quoque excitat.

Scolopendrium asplenon est.

Scolymon, carduus, calfacit & exiccat classe secunda. Radix in uino elixa, potaque, graueolentem urinam copiose excutit. hircumque, alarum, uniuersique corporis uirosos odores emendat.

Scordium multiformes potentias sortita est, quoniam simul amarum, acerbum, & acre est. Expurgat itaque pariter, & calfacit uiscera, urinam & menses promouet, omnia perfrigerata calore instaurat, uulnera conglutinat, sordidaque

expur-

expurgat. Aridum ad cicatricem perducit inspersum.

Scorodon, allium calfacit & siccat quarta distantia. Sylvestre quod ophioscordon, tanquam anguinum alliū nuncupant, efficacius quā satium est.

Scorodoprasum porri & alliū gustu mixtas refert qualitates, pariter atq; uires.

Scorpioides calfaciendo tertium, desiccādo secundum ordinem fortitur.

Scorpius terrenus, crudus impositus uel tostus in cibo sumptus, contra proprios idūs praesenti est remedio. Marini uero fel, suffusionibus oculorum subuenit.

Scoria (hoc est, metalli cuiusuis recrementum) qualibet impense desiccatur, cum primis ferri, quod excoctum atq; cum aceto laeuigatum, auribus suppurantibus prodigiosum est remedium: ijs etiam qui aconitum hauserunt, cum aceto mulso potum, succurrit. Stercus plumbariū plumbi uiribus respondet, uehementius tamen astringit.

Smilax, uel cañus, taxus, uenenosae facultatis arbor est.

Smyrna, myrrha, calfaciendo & desiccando, in secundo censetur excessu. Capitis igitur uulnera, iraspera glutinat. Nest etiam quidam amaror, quo lumbricos, scæturq; occidit, abstergit praeterea: quo nomine ocularibus collyrijs inferitur, et humores pectori impios expurgat sic, ut fauces non exasperet. Bæotica uires calfaciendi, emollicendi & dissoluendi obtinet.

Smyrnum, sunt qui hipposelinum, quasi equapium, quicquid apium sylvestre nuncupant, calfacit & exiccat, tertio ordine. Apio duntaxat ualentius, petroselino debilius: urinas igitur mensesq; agit.

Sonchus, astringit pariter et manifestè refrigerat, quum uel estur, uel corpori inducitur. Arefactus, mediocrem calfaciendi uim induit.

Sparganio quoq; uis & natura desiccandi est.

Rr

Sparti

Sparti genistæ quo uites uinciunt, seminis cū floribus oboli quinq; in aqua mulsa epoti, purgant per superna, ueratri candidi modò sine periculo. Semen seorsim deiectionem molitur, uirgultula eius coxendicis doloribus opitulatur.

Specularium (lapis specularis) aliqui per ph, spheclarion scribunt, quod eo utri uice in fenestris nonnulli utantur: quade causa diaphanes quoq; id est pellucidum à claritate appellatur, substantia gypsofum: habet crematis testis, siue ostris similem potentiam.

Spongia noua, maris etiamdum odorem spirans, cum aqua uel uino uel posca superinducta, uulnera cōglutinat. Cremata acris est, ac dissipat. Cum bitumine liquidæue pice composita & applicata, exigue sanguinis eruptiones cohibet.

Spodium, cinerula congenerem habet cum pompholyge potentiam.

Staphilinus, pastinaca urinam agit, menses sollicitat, præcipue radix & semen. Folia autem abstergerendi ui prædita, affectionibus phagedænicis uiridia cum melle salutaria sunt. Pastinaca autem syluestris, ad omnia satua est potentior.

Stachys frutex spicatus, marrubio æqualis, calfacientium tertij ordinis est, ea propter menstrua ducit, fetus occidit, & secundas à partu morantes expellit.

Steata, adipēs omnes hominis corpus humectant, & calfaciunt: pro diuersa uero animantium temperatura, earundem facultas uariatur. Suillus igitur nulli est in humectando secundus, uicinamq; oleo sortitur potestatem: quare etiā rosiones obtundit. Caprillus siccior est, ocysq; congelasse: quaratione ad mitigandū recti intestini morsum, ipsum per sedē inuicimus. Anserinus calidior, subtiliorumq; partium est: in medio horū adeps gallinaceorū atq; gallinarū existit. Leonū adeps omnium facile calidissimus est, tenuissimisq; essentiæ partib. cōstat, ac proinde præ cæteris discutit. Bubulus mediā inter suillū et leoninū tēperaturā sortitus est. Ursinus capillorum

pillorū ex alopecia defluuijs medetur. Vulpinus aurīū dolo-
ribus, quemadmodū uiperarū pilos abolere et oculorū suffu-
siones prohibere prodiū est. Porro in omnibus calidior sem-
per ac sicciior est mariū, atq; horū magis testicularū & uia-
gentiū atate, quā reliquorum. Sauium quoruncunq; pecu-
dum temporis diuturnitate, seipso redditur calidius.

Stimmi præterquam quod desiccat, astrictionis etiā par-
ticeps est, quapropter ocularibus confunditur collyrijs.

Stæbes semen, & folia astrictoria facultate donata, desic-
cant in tertio excessu. Qua ratione ulcera peringentia con-
glutinant, eorumq; decedum intestinorum torminibus, san-
guinis eruptionibus, & auribus purulentis auxiliatur. Ocu-
los ex idu sanguine suffusos illita iuuant.

Stæchas obstructions recludit, crassa attenuat, extergit,
& uiscera omnia, totumq; animalis habitum correborat.

Stratiotes, qui in humidis nascitur locis, frigorificam uim
obinet. Terrestris uerò nonnihil astrictionis habet, qua bul-
cera conglutinat. Nonnulli eo ad sanguinis eruptiones com-
pescendis, atq; ad fistulas utuntur.

Solanum hortense esculentum, astringit & refrigerat ex-
cessu secundo: cui nomen est Alicacabum, facultate hortensī
simile, fructum gerit ciendæ urinæ idoneum, uuarum acinis
neutiquam absimilem. Solani uerò soporiferi radicis cortex,
in uino drachmæ instar sumptus, somnū acersit. Semen uini
proritandi urinam obinet, ex tertio frigorificorum ordine.
Proinde si plus duodecim corym bis hauriatur, furorem ada-
sciscet. Quarta solani species (furiosi nomine gaudens) ad
medicinas quæ intra corpus sumuntur, inuile est, exterius au-
tem illitum, ulcera depascendo serpentia curat, excessu se-
cundo desiccans & refrigerans.

Stypteria, alumē omne uehementē astringit, crassū est, et at-
tenuat, reliquis tamē subtilius existit, quod appellatur scisile:
proximū est rotundū & stragelotes. Crasserū atundē par-

tium est liquidum, placitis, & plinthis nuncupatum.

Styrax, calfacit, emollit & maturat: quocirca tuſſibus deſtillationibus à capite in ſubiectas partes, & coryzis ſuc- currit. Fœminarum purgationes ducit bibitus et applicatus.

Syca, ficus aride, caliditate ſua ſecundū ordinē attingūt. pinguioreſ, duros tumores ualidē ad maturationē ſollicitāt. acrioreſ abſtergunt, ac diſſipant. Decoctum ipſarum mell. æquale, quod ſireon pleriq; nominant, uiribus melli reſpon- det. Virideſ imbecillioris ſunt potentie: utrūq; tamē aluum ſubducunt. Ficus autem capriſfici acri & diſcuſſoria poteſta- te donati, perinde atq; ex ſatiuiſ groſſuli ſunt.

Syce, ficus arbor calidam & tenuem temperaturam ſor- titā eſt, aded ut liquor eiꝯ. & foliorum ſuccuſ non mordicet modō, uel excellenter abſtergat, ſed exulceret etiam, ora uasorum aperiat, & myrmeciuſ diſſipet. Quin & purgandi uis ineſt. Sylueſtris autem ficuſ, quam capriſficum indigitāt, ad omnem uſum efficacior eſt domeſtica.

Sycomori fructuſ nihil alimēti præſtat, ſtomachoq; noxiuſ eſt. Liquor uerō ſycomori emollit, uulnera cōmittit, et tumo- reſ diſtrahit. Bibitur illiniturq; contra ſerpentium iectꝯ, due- ritie infeſtatoſ lieneſ, ſtomachi doloreſ, febriumq; horroreſ.

Symphyton, petreū ex diuerſis uiribus conſtatū eſt. par- tim enim incidit, ut puſ in pectore & pulmonibuſ contentū, reneſq; expurgat: partim contrahit, ut ſanguiniſ excreatio- nibuſ, conuulſiſ, ruptiſ, fluxionibuſ fœminarum ruſiſ, inteſ- tinorum que ramiciſ medeatur. Obtinet ad hæc calidam humiditatem, qua ſitim arcet, & arterie lenit aſperitateſ. Symphytum alterum, nempe grandiuſ, uiſcidum quendam lentorem & mordicationem obtinet, ſcyllæ ſimile. Utan- tur eo ut petræo.

Sphondiliꝯ uerticilli, fructuſ atq; radix, acrimoniā habēt, & incidendi facultatē. ſuſpirioſiſ itaq; et comitialib. regioq; morbo ſuccurrunt. Radix eiꝯ circumraſa, fiſtuliſ impoſita, cala

callos illarum tollit. Floris succus in aures contra diuturniora hucera instillatur.

Schinos, lentiscus secundū omnes suas partes desiccat secundaria distantia completa, in caliditatis uerò frigiditatisque qualitate medium quadantenus locum obtinet, eò usque astringens, ut astringione succo hypocyssidis propè admodum accedat.

Iunci odorati flos calfaciendi mediocrē, astringendi minorem facultatē obtinet, tenuibus essētiæ partibus. Quibus urina nam prolicit, menses proritat, et ab oppilationibus liberat, tum in suffitibus, tum potionibus, tum in cataplasmatibus adhibitus. Flore magis astringit radix, hac uerò ille calidior est.

Rotūdi odorati iunci læuis geminæ sunt species. Sed oxy schæni appellatæ semē somnum cōciliat, mirus uerò oligoschæno caput aggrauat. Ambo fricta si cum uino potentur, uentris fluores exiccant, & muliebri profluumum cohibent.

Sory, misyi efficacia respondet, multo crassioribus tamen illo constat partibus.

Thymorum sale maceratorum caro acris est, & exiccatoria, quam ob causam à prestere uipera demorsis perquā plurimum eius esui præbetur, uinumq; insuper largius ingurgitatur, & citatur uomitus. Ad drimyphagias, qui acrium esus est, congruit. In modum cataplasmatibus aduersus canum & aliorum serpentium morsus utiliter illinitur. Taurocolla (quasi taurinū glutinū dicas) sunt qui xylocollā, id est ligni glutinū uocāt, ex boū corijs cōfecta, impēse abstergit. Quocirca aceto diluta, impetigines et summæ cutis lepras exterit: neq; sinit ambusta inflāmari, cum calida aqua eliquata. Est præterea medēdis uulnerib. oxymelite macerata utilis.

Tellinæ, sale conditæ, crematæ, deurentem reddunt cinerem. Qui cum cedrio liquore confusus, euulsos radicitus palpebrarum pilos nasci iterum alios, si instilletur, prohibet.

Terebinthus, excalfacit in excessu secundo. Desiccat ue-

Rr 3 rō. si

ro, si quidē uiridis sit, primo: sin aridus, secundo. Eructus por-
ro aridus tertia est arefacientium distantia, propter hanc u-
tiq; urinam prouocat, & lienes adiuuat.

Tettigas, cicadas quidam crudas exiccant, colicisq; po-
tui treis aut quatuor, aut quinq; aut septem, cum paribus nu-
mero piperis granis exhibent; aliqui assas edendas offerunt,
quibus affecta est uesica.

Teutlon, beta nitrosæ potestatis particeps est, per quam
abstergit, discutit, caputq; per nares expurgat, potentius au-
tem candida. Blixata ad leniendum feruores, & inflamma-
tiones arcendum, leniterq; discutiendum redditur efficax.

Teucrium calfacit ordine secundo, desiccatur tertio, disse-
candi & attenuandi facultate præsidio lienibus existit.

Tephra, cinis nō quilibet eandē ad amūssim temperaturā
obtinet, sed pro cōbustæ materie diuersitate uariatur. Acer-
barum namq; arborum cinis, utpote quercuum & ilicis, astri-
ctione non modica præditus est: qua sanguinis eruptiones sup-
primit, quum aliud ad manum non est. Acrium uerò, puta fi-
cus et tithymalli cinis, a criore ui et abstersione magis pollet.

Telephium in primo calfacientium, secundo autem are-
facientium ordine collocatur, & abstergit. Quare ad putri-
da exedentiaq; hūlcera accommodatum est. Leucas & uiti-
ligines cum aceto exterit.

Telis, fœnogræcum in calfaciendo ex secundi ordinis cen-
su, in desiccando primi habetur. Quamobrem feruentes phle-
gmonis irritat, cæterum non aded calidas, & scirrhum a-
mulantes, dissipando sanat.

Tithymalli omnes quarto ordine, cum acrimonia et ama-
ritate intensa calfaciunt. Sed radix quum inefficacior quo-
dammodo sit, aceto elixa, erosorum dentium cruciatus sopit.
Liquores ualentiore potestate præditi, cauis dentium inserun-
tur: uerū ubi aliam corporis partem contigerint, eandē ex-
emplō adurunt, ideoq; pilos paululum delibutos abolent. for-
micas,

micæ, acrochordonas item, & id genus uitia auferunt, liche-
nasq; & quæcunq; cutis uitia exterunt, hucera uitiosa con-
suetudine et phagedænica sanant. Septenario autem numero
comprehensi, uehementissimi sunt: characias, quasi uallaris;
& myrsinites, à myrti foliorum figura; & dendrodes, quasi
arborescens, à ramorum copia, qui prouenit inter saxa: dein
de uerbasci imaginem præferens, mox à cupressi forma cy-
parissus. Ab hoc paralius, hoc est maritimus: postremò he-
lioscopios, id est solisequus.

Titanos, calx aqua nõ resincta hædenus urit, ut crustas in-
ducat. Extincta uerò crusta quidē protinus molitur, sed post
liem non amplius, calfacit tamē, carnesq; liquat. Quod si la-
uetur aqua marina, summam dissipandi facultatem induit.

Tragacitha similib. admodū gummi uiribus prædita est.

Tragium planta est, quæ in Creta prouenit, lentisco con-
formis, tertij calfacientiũ ordinis, attractoriæ, discutientiũq;
faculatis, et tenuis essentia. surculos euellit, lapillos commi-
uit, menstrua trahit drachmæ instar bibitũ. Sed alterũ tra-
gium, quod à Romanis cornulaca uocatur, proximo amaru-
lentius, scolopēdrio simile, gignitur multis in locis, tãta astri-
ctoria uirtute donatũ, ut fluidis affectionib. accommodatũ sit.

Tragoriganus similes origano uires habet, & astriccionis
plusculum.

Tribulus modicè refrigerat, sed terrestris siccando uehe-
mentior est, aquaticus etiam leuiter humectat. Vtriq; contra
inflammationum generationes, cunctasq; fluxiones accom-
modati sunt. Terrestris fructus, quum ex subtilibus partibus
constet, renem calculos confringit.

Tragositodes, tragus frumentaceus zeæ similis est, con-
coctioni uerò magis resistit, & alium emollit.

Trigle, mulorum piscium assiduis esus aciem oculorum
bebetat. idem marini draconis, scorpionisq; & aranæ mor-
tibus subuenit, si crudus concisusq; adhibeatur.

Rr

4

Tripoliæ

Tropoliū, radicē habet calidā in tertio gradu, et acrem. Triches, pili cremati consimilem sortiuntur lanis combustis facultatem.

Triga, pastinacæ marinæ radius, denti affecto impactus, confringit ipsum & excutit.

Tryx, fex uini nondum cremata, uarijs conflata est uirtutibus: uis enim illi ualidiſimè desiccandi & dissipandi. Cæterum astrictionem, ex uini, cuius sedimentum est, specie adipiscitur. Utendum igitur est ea in affectionibus humidioribus, & fluidis. Phygella disycit, rigentes lacte mammas extinguit. Cæterum quæ priuatim sphecle, hoc est fex cremata appellatur, deurendi uini induit, atque ob id deurentibus etiam medicaminibus inditur. Scabros ungues cum resina excutit, & ex oleo lentiscino totam noctem illita, capillos flauo colore inficit. Lota abstergentibus oculorum medicamentis commiscetur. Aceti fex per omnia ualētior & astringentior quā uini est.

Troglodytes, passer est, omnium auium, dempto regulo, minima, degens frequenter in sepibus. Is quū assus, tum crudus, sale conditus atq; comestus, calculos renum confringit. Cinis ipsius deusti potus, eadem designat.

Tyros, caseus recens & mollis, repercussoriam habet facultatem, refrigerans leniter: quocirca & uulnera committit impositus. Qui autem oxygaladinus nuncupatur, præter hæc discutiendi etiam lenem quandam uim sortitus est, uulneraq; ualidius conglutinat. Inueteratus autem, atq; in primis pinguis, distrabendi uim repræsentat: qua ad arthriticorum tophos salubre est remedium, potissimum cum decocto carnis suillæ cum salsæ, tum pinguis.

Yacinthi radix bulbosa primo ordine exiccat, secūdo refrigerat. Atq; ob id quidē pueros diutiſimè impubes custodire, cū uino pubi illita, creditur. Semen eius leuiter extergit et astringit. Vnde aurugine laborantibus offertur in uino, arefaciens

refaciens impensius, quàm refrigerans.

Hyalos, uitrum in pollinem friatum, cum uino tenui candidoq; sumptum, calculos uesicæ comminuere perhibetur.

Hydnon, tuber terræ, essentia terrestriore, cum exigua quadam subtilitate constat.

Hydrargyros, argentum uiuum, haud ita multum momenti in re medica præstat, quum sit letale uenenū: sunt quidam comburentes ueluti in cinerem redigunt, quem alyis speciebus permixtum, colicis & ileosis potandum exhibuerunt.

Hydropiper herbula est calida, non aded tamen ut piper uirens cum semine superinductum, non sugillata solum, sed induratos etiam tumores discutit.

Hydor, aqua saluberrima, & impermixta consistentiæ, propria sua natura frigida est & humida: quæ uerò acquirat caliditatem assumit, tantisper dum eam seruat, calefacit: simulatq; aduentitium calorem amiserit, refrigerat. Quæ porro commercium habet cum aliquo, quemadmodum uicæ niri uel bituminis particeps est, admixta sortitur essentia facultatem. Calestis uerò etiam astrictionis quippiam continet, ea propter collyrijs oculorū temperatur. Cæterum uisusmodi aquam inculpatam esse oporteat, primo uolumine explicatum est.

Hyoscyamos, altercum, non modo cui atrum, sed & cui lauum inest semen, uenenosum est. Ad medicationes, quod ore ac semine candido præditū est, expedit quammaximè, tertio refrigerantium ordine exsistens.

Hyperici duo sunt genera: Alterum, quod andrasemon & astyrrhon appellatur, superius comprehensum est. Alterum uerò calfacit & siccatur ob subtilitatem suæ consistentiæ: quæ totius herbe fructus urinis & menstrua prolicit. cum foetida uerò uirens illitum, uulnera ad cicatricem perducit. Arietum uerò applicata, bulceribus medetur. Exhibentur in superexendice laborantibus in potu.

R r 5 Hypocoon

Hypecoon refrigerat in tertio gradu, proximū papaueri.

Hypoglossum fruticulus est, cuius cū radix tum liquori emolliendi facultatem obtinent.

Hypocisthis succus est eorum, quæ ad cisthi citbariꝫ; uocati radices subnascuntur, puta cytinorum: admodum efficax contra omnes fluidas affectiones remedium, eximie desiccando, roburꝫ; particulis indendo, existit.

Hypophæstum, fulloniæ spinæ species est, quæ admodum & hypophæses. Huius capitis, & foliorum, aridarumꝫ; radicum trioboli pondus cum aqua mulsæ sumptum, aquam & pituitam euacuat, orihopnceis, comitialibus, & neruorum affectionibus maximè proficit.

Hyssopum calfacit & exiccat ordine tertio, cum tenuitate substantiæ.

Phaci, lentes, desiccant ordine secundo, inter calorem ac frigus mediæ. Habent præterea nonnihil astringentis quo fit, ut corpus totum exiccet, & uentrem compeſcat. iuuuero irritat, proinde prior aqua defunditur, quando retentionis gratia adhibentur.

Lenticula lacustris, udi ac gelidi temperamenti est, excessu secundo.

Phalaridis succus folia & semen pota, uesicæ languoribus opitulantur, & in se tenuitatis & caloris quippiam continent.

Phalangites (id nominis sortita est, quod à phalāgiarum idu petitis opituletur) numeratur inter ea quæ tenuium sunt partium. Eoꝫ; circa umbilicum torsionibus subuenire creditur.

Phelli, subera, præsertim quæ ex uasis uinarijs colliguntur cremata, siccificissimum cinerem efficiunt, qui dysentericis maximè permiscetur remedijs.

Philyra, tilie arboris folia, facultate astringentis agrestem clinam referunt, præcipueꝫ; oris huiusmodi remedio sunt,

unt, si commanducantur, & decocto corū colluuntur. Quod
tiam potum, lotium ac menstrua prouocat.

Phlomi, uerbasci plura sunt genera, inter quæ numeratur
& thryallis. Omnium uerò folia siccandi & mediocriter
abstergendi ui prædita sunt, & potissimum eius quod au
ci coloris est, & acerbi. Fluidis itaq; affectionibus compe
unt. Colluunt quidam isdem quoq; in dolore dentes.

Phœnix, quam aliqui rhun appellāt, herba lolio non ab
milis, potestatem habet astringendi. Quare cum uino hau
a austero, omnes fluxionum affectus compescit.

Phœnix, palma arbor, cuius fructus si probè immaturuit,
moderate calefacit, robur indit, & stomacho confert, tam
urā assumptus, quā extrā adhibitus. Quod reliquū est pal
mæ, astringentis plurimum obtinet: qua de causa stomachicis
hepaticis facultatib. cōfunditur. At quod fructus enascen
s ueluti inuolucrum existit, impensius astringit.

Phormium cum partium tenuitate abstergendi & attra
hendi facultate pollet. Albugines igitur semē ipsius cum mel
attenuat, & surculos euellit.

Valeriana, phu, radix nardo similis est, sed tamen ad ple
iq; ignauior: uerūm urinas propellit quā ea ualētius, per
de atq; nardus Celtica.

Phycos refrigerandi & arefaciendi uim habet in secun
ordine, acerbitate item leuiscula præditus est.

Phyllites, quum acerba quadam qualitate donata sit, non
bre alui profluuijs pota succurrit.

Halbano tantum non terij excalfacientium ordinis est.

In desiccando autem attingit secundum, cum facultate
colliendi & discutendi.

Chalcitis, cum acrimonia qua prædita est, astringendi,
lurendi, & crustas generandi facultatem obtinet. Partium
item subtilitate media inter misy & sory consistit. Combu
tenuioris redditur substantia.

Chalcan.

Chalcanthon, aqua est in metallis Cypri coalescens, et calore quodam insigni, uehementissimam habens astringendi potetiam, quod omnium maxime humiditas carnes condensat, atque desiccatur. Caterum longo temporis progressu chalcitidem transit.

Chalcos, et crematum, habet acrimoniam quandam, et astringentis compos est. Inducendis itaque cicatricibus optimus est, potissimum in aridior corpore. Si ablatur, in molli carne salubrius est.

Chalcanthus, flos aris, subtiliorum est partium, quam crustum, uel squama eius. Temperatus in collyria, aspredinatus et ficosas palpebras exurit.

Chamae drys, trixago, in tertio gradu calfacientium et arefacientium est: qua ratione lienes absunt, lotium ac menses trahit, uiscerumque obstructions expurgat.

Chamaecissi, hederæ terrestris flos, quum uehementer amarus sit, iocinoris obstructions referat. Exhibetur item et coxendice laborantibus.

Chamaeleuca uis est calfacere ordine tertio, exiccare secundo.

Chamaeleontis nigri radix calfacit et desiccatur tertio ferme abscessu. Absterforia quoque facultatis compos est, qua cutis labes exurit, duros tumores discutit et emollit. Quin et phagedænica hulcera oblita medicatur. Intro in corpus sumpta, uirosa est. Chamaeleonis candidi radix uiribus atro respondet, sed amarior est: quæ cum uini austeri mensura acetabuli pota, latos uiridis lumbricos interficit. Conducit etiam aqua intercutem laborantibus.

Chamaemelum, uel anthemis, primo abscessuum limite calefacit et exiccat, tenuisque particeps est substantiæ, ui discutiendi, laxandi, et redolendi imperat.

Chamaepitys, aiuga, abscessu secundo calfacit, tertio exiccat. Idcirco uiscera expurgat et abstergit, potissimum iecur,

r. Vrinæ præterea agit, ac menses, uulnera ampla con-
ittit, hūlcera putrescentia sanat, duritias discutit: decoctum
suis, coxendicum morbo confluantibus auxiliare est.

Chamaedrops, sunt qui chamædryn, qui teucrion appelli-
nt, trixagini consimilis est potentia.

Chamaeſyce, hoc est humilis ficus, detergente pariter &
ri donata est potentia. Proinde tumores ipsius & liquor,
rrucas quas myrmecias dicunt, & acrochordonas aufe-
nt. Crassas oculorum cicatrices cum melle exterunt, aciei
ulorum hebetudinem, suffusionumq; principia adiuuant.

Chamaela, oleago, abstersoria facultate prædita, hūlcæ
sordida & crustas cum melle exterit.

Chelidonium, hirundinaria, ordine tertio calfacit, & effe-
citer abstergit. Succus grandioris ad oculorum speciem ex-
uendam accommodus est. Radix autē auruginosos obstru-
one liberat, cum uino & aniso pota: commansa, dentium
aciatus mitigat. Chelidonium uerò minus ex quarta calfa-
ntium classe, maiore acrius est, ut illiū cutim exhulceret,
guesq; scabros excutiat, succus eius per nares expurgat.

Chelidonium, hirundinum crematarum cinis cum melle
tus, anginarū inflammationibus succurrit, & oculorum
ritatem adiuuat.

Chole, fel, in animalium humoribus omniū calidissimum
, sed colore inter se dissident. Siquidem quod flauum, palli
calidius est: & flauo, quod colore præfert æruginē. Diffe-
nt præterea, pro animalium quæ id continent ratione. qua
us suillum omnibus alijs imbecillimum est: quamobrem au-
um hūlcera absq; mordicatione curat. Ouium non paulò
iorem habet quàm suillum acrimoniam, & ouillo capril-
n ad omnia efficacius est. Ursinum pariter & bubulum
ibus caprino respondent. Taurinum his potentius, ab hie-
rum tamen felle superatur: hoc rursum à felle piscis cala-
nymi appellati uincitur, & scorpionis pariter marini,
quod

quod suffusionibus oculorum, hebetudinibus, albuginibus congruit, & testudinis marinae. Sed fel capreae, his qui non acutius quam interdum prospiciunt, quos nuscitiosos uocant conferre perhibetur. At omnium uolucrum fel acutius, & arfaciendo potentius, quam quadrupedum est. Inter has uerò ias gallinaceorum atque perdicum alijs est praestantius. Accipitrum & aquilarum maiore quodammodo acrimonia, & exedendi uiribus pollet, uiridi quandoque & atro colore.

Chondrilla, seris species quum sit, subamarum quiddam in se complectitur, quocirca uiribus est quadantenus siccantioribus quam illa praedita.

Chondrus non discrepat à tritico, praeterquam quod illi plus uisosi lentoris quam huic inest.

Chrysocolla in metallis reperitur, & in pila ex aere rubro praeparatur, pistillo aereo è lotio pueruli uenerem non experti, sub ardentissimo caniculae aestu contrita. Haec itaque abstergit, discussoria & exiccatoria facultate alijs metallicis uehementiore donata haecenus, ut carnem citra morsum colliquet: quamobrem malignis h ulceribus commodissimum est remedium. Combustione omnem planè mordicationem deponit.

Chrysocoma, quae & chrysites appellatur, radix, acrior re pariter & astringente uirtute praedita est, quapropter haud ita multiplici in medicina usus est, nisi quod in peripneumonijs & iocinorosis affectibus in mulsis elixata propinatur, menses insuper promouet.

Pseudobunium bunio specie respondet, calfacit, discutit, et detergit: idcirco à torminibus circa umbilicum, urinae stillicidio, laterumque doloribus, asserit: distrabit & scrophulas, cum sale uinoque superinducta.

Pseudodiadammum, debilis diadammis uiribus donatum est.

Psimythion, cerussa, refrigerandi opplendi que illitu facultatem sortita est.

Pulicaris herbae semen refrigerat ordine secundo, arefaciendo

endo & humectando medium obtinet.

Psoricum præparatur, calcitidis binis partibus, argenti-
spumæ uni permixtis, utrisq; tamē antea aceto dilutis, dea-
de in ollam recentem coniectis, quæ fimo quadraginta die-
bus obruta tegatur. Ea quippe ratione confectura desiccato-
rum magis subtilior, minusq; chalcite mordax efficitur.

Vi albumen ac tenue, mordere nescium, moderatè refri-
gerat. Utendum igitur eo ad oculos, ad pudendorum bul-
ras, aliq; omnia cōtumacia, & uitiosa cōsuetudinis. Tem-
peratur ad hæc medicamentis profluvium sanguinis suppri-
mentibus, emplasticisq;. Oui autem vitellus assimilis poietia,
medys inflammationē extinguētib; commiscetur. Assum-
ptum porro maiorem desiccandi vim, mitigandi minorem acquirit.
Potum porro ouum aceto decoctum, si edatur, ventris fluxio
desiccatur. Quod si acerbi quippiam adiunxeris, puta gala-
nam, aut rhum, uel sylvestris puniceæ florem, & sartagine fric-
tis, redditur multo efficacius. Ignem autem nō expertum,
affusionibus inductum opitulatur. Sorbile assumptum, leni-
ter pectoris humores concoquit atq; solatur, & asperitates
viscerum laeuigat. Præferendum autem recēs ueteri, & gal-
linarum, reliquorum animalium ouis.

Ocimum calfacit ordine secundo: habet & recrementi-
um quandam humiditatem. Quare non proficit interius as-
sumptum. Exterius autem illitum disiecit & concoquit.

Ocimoides à plerisq; philetarion nūcupatæ, nullius pla-
ntæ frugis radix est. Semen tamen eius attenuat, & citra ero-
sionem desiccatur.

De pharınacis simplicibus, flauam bilem pur-
gantibus. Cap. 4.

Loes drachma cum mulsâ manē exhibetur, qui uesper-
eam propinant, uel à cibo, lædunt, quoniam alimētum in
umbra distrahunt. Flauam bilem minus extrahit, trium obo-
rum pondus, aluum ab excrementis duntaxat strenuè exo-
nat.

nerat. Quum uerò medicamina quæ corpus purgant, omnia stomacho noxia sint, sola uentriculo amica est aloë: qui amaritatem ipsius sustinere nequeunt, ijs conformata inde catapotia deglutienda præbeantur. Sciendum autem, quòd pharmacum purgandi facultate prædita, non simplici quadam temperatura, uerbi causa, caliditate euacuant (oporteret alioquin cuncta calidi temperamenti, ueluti pipere, euacuandi uim obtinere) sed insita quadam totius essentiæ proprietate, quem admodum Magnes lapis ferrum ad se, ceu demonstratū est, trahit. Porro expurgantium medicaminum albo, quæ emolliendi solum facultatem sortita sunt, primo uolumine commemorata habentur. Efficacioribus uerò, uel ad materiam transferendam, uel ad affectionē induratum mouendam, uel ad instaurandum corpus, temperamentumq; ipsius alterandum, aut humorem deniq; officium facientē educendum, utimur. Nonnulli uerò modi ex prædictis mixti inter sese inuicem implicati sunt. Iam uerò in uniuersum medicamentis expurgandi sunt, quibus ualidum robur, ac sumendi eas promptitudo expedita inest, & qui primas ætates egressi, nōdum ad extremū ætatis peruenerūt, & qui stomacho minimè imbecilli sunt, quiq; multam in corpore inutilem accumularunt materiam, neq; adeò sanguinolenti existunt. Tēpus uerò purgationis est, nisi materia turgente res urgeat, uernum maxime, & autumnale.

De his quæ bilem proliciunt, & euacuant.

Cholagogis quouis anni tempore, excepta hyeme, utendum: ætate uerò uigente, & iam declinante, constitutionibus siccis, & musculosis, & atrii coloris, uel rufi: maribus potius quàm mulierculis, quibus alimenta continuo corrumpuntur, uentrem habent aspidum, amara item bile præditis, iracundis, nec urinæ multum excernentibus, et ijs qui alimēta usurparūt arida & calida. In affectis morbo regio, iocinoris debilitate, laterū doloribus, phrenitide, angina, insania, cephalæa.

leae, ophthalmia, igne sacro, lepra, febrib. & ijs quibus bilio-
sus humor redundat. Porrigitur adhuc aloë his quib. caput
grauedine perturbatur, lippientibus simulandis, et qui imagina-
tionib. in somno uexantur absq; febre. His qui horroris in cor-
pore discursum sentiunt, peditus acres excernunt, intestina
nordicantur, & stomachi effreni astu laborantibus, & quib.
lyster ob excrementorum copiam nequit inuicti: abunde nan-
que euacuat (nec uniuersum commouet corpus, nisi multo
plus quam par sit, offeratur) inhaerentem intestinis uentre
stomacho bilem educit. Veratrum. accommodatum est
egritudinibus acutis, & diutinis, quæ bilis euacuationem
flagitant: uerbi causa, insania, & heterocrania, oculorum
teffusionibus, & thoracis quibuscunque affectionibus, cæ-
terum uisceribus, locellis item foeminarum, uesicaq; phar-
naco bilem proliciente opus habentibus, appositissimum est.
Vtile item diutinis asperæ arteriæ affectionibus felle suffusis,
etque his pariter qui exanthematibus, impetiginibus, aut her-
petibus, uel igne sacro, uel lepra confluantur. Veratrum
nigrum bilem, maxime flauam, à corpore uniuerso absque
difficultate elicit. Quapropter non grauiter febrientibus, &
febre uacantibus magis, instar drachmæ, radicibus nempe
amulsa & aqua læuigatis, his qui antè ieiunauerint: uel cum
melle forma pilularum, præbetur. Sunt qui ei pulegium ad-
misceant, aut saturciam, aut eorum quippiam quæ ocysimè
transseunt, & stomachum adiuuant.

Scammonia ueratri instar purgat, & flauâ bilem potissi-
mè. Sed omnium quæ purgatoriam uim habent, stomacho infe-
lissima est. Quocirca febre carentibus stomacho nō imbecillis
exhibeatur instar obolorū quatuor cum sale, aut pipere, aut
gingibere, aut aliquo stomachum iuuante et celeriter transse-
nte, uel cum melle. Conficiunt etiam cū gummi catapotias

Colocynthis meditullum, hoc est interius farctum, bilem
potissimè euacuat, et muscosa non à sanguine dūtaxat ueratri

Et scammonia modò ducit, sed costas et nervosa purgat corpe-
 ra, drach. unius pondere, in melicrati cyathis duobus, quibus
 rata elixata sit. Teratur aut, et subigatur exquisitissimè, quæ
 mæ asperitates ipsius, interancorū anfractib. inhaerescētes, in
 testina exulcerāt, et nervales inducūt per cōsensum affectio-
 nes. Datur rectè dolentib. caput, ubi cerebri uidelicet tunica,
 aut per icranios membrana affecta fuerit, ueluti uertiginosis,
 heterocranicis, cephalata cōfluantib. sacro morbo et sidera-
 tione infestatis, cynice cōuulsis, diuturnis oculorū destillatio-
 nibus, non nisi recta ceruice spirantib. anhelosis, longo tempo-
 re tussi uexatis: præterea arthriticis, renū item et uescicæ affe-
 ctibus. Elateriū cōsimiliter scammonia euacuat: deligendum
 aut, quod colore uirescit, et leuitatē habet, nec anno est anti-
 quius. Modus est triobolaris tritus cum ladis hemina. Tithy-
 mallus, nō secus atq; elateriū et scammonia bilem prolicat: ex-
 hibentur autē liquoris guttæ quatuor, aut quinque, cum polen-
 ta macerata, quæ raptim deglutientur: quoniam in ore con-
 tentæ, linguā et loca uicina quā plurimū exulcerāt. Lathyri-
 des bilem purgant, nō aliter quā ueratrum, aut scammonia:
 dentur itaq; septem aut octo, et usq; ad quindecim. Quæ robu-
 stis et maiorem poscentib. euacuationē, manducanda: imbe-
 cillioribus aut et malo stomacho prædiis, integræ degluti-
 endæ sunt. Peplii fruticis germina arida, octo obolorū pon-
 dere in mulsæ exhibita, bilem belleborei instar expellunt, flatu
 lentosq; spiritus dissipant. Agaricū in euacuando cōpares co-
 locynthidi uires obtinet, lētē efficaciam suam excrens, neq; sto-
 macho admodum hostile. Propinentur denarij duo triti in me-
 licrato. Esto autem agaricum candidissimum, ualde friabile,
 non admodum lignosum, et teredinibus minimè corrosus.

Iris Illyrica similem purgandi facultatem habet, octo ob-
 bolorum quantitate in aqua mulsæ propinata: potior est mi-
 nimè antiqua, et teredinibus expers. Centaurium minus quo-
 niam bilem mucumq; expurgat, coxendice laborantibus pe-
 culia

culiariter succurrit. Bibetur autē iuris cētaurij ſesquidrach.
in aquæ cotyla uſque ad medias decocti. Tragorigani flores
cū fructu duarū drach. pondo in aqua mulſa potui dātur, qui
bus & ueratrum nigrum: cæterum utiliores ſunt ſtomacho
quàm belleborus, minus uerò expurgant. Chamæleæ drach.
quatuor in melicrati heminis duabus ad quartam uſq; partem
elixæ, ſimilē belleboro purgandi uim obtinent. Sunt qui cha
mæleæ & abſinthij duplum in pilulas redigunt, et glutiedas
exhibēt. Ariſtolochiæ ſurculoſæ fructus inſtar denarij in mul
ſa propinatus, modo colocynthidis repurgat. Polypodij ari
ſtola radix læuigata, cū melicrato illita, uel cū eo infricata, ea
dem omnino quæ colocynthidis perpetrare conſueuit.

Quæ atram bilem proliciunt.

Medicamentis atrā bilē expellentibus potiſſimè utendū in
melancholicis, facilē indignantibus, iracundis, homines odio
proſequentibus, reſeſſū queritantibus. et hiſ qui inter cōualeſcē
dū opus habēt purgatione, autūno calidiore, cōſtitutionib. ſic
cis, parūq; muſculoſis. Epithymum præſtantiſſimū eſt reme
diū, eorū quæ atrā bilē prolicere ſolēt. Dādæ aut ſunt drach.
quinq; cū lætis hemina cōtritæ. Epithymbrum, quod ſupra
thymbrā naſcitur, haud ſecus quàm epithymum euacuat, niſi
quod imbecillius eſt. Pulegiū acetabuli meſura in melicrato
epotū, atram bilē educit. Tragorigani heracleotici tandun
dem, conſimiliter pulegio euacuat, utraq; autem deſiccant.

Alipi ſemen per inferna atram bilem purgare, pari epia
thymo pondere, cum ſale & aceto, traditum eſt: cæterum in
teranea leuiter (ut autor Dioſcorides eſt) exulcerat. Eſt au
tē, ut ego quidem arbitror, hodie atypias appellata. Offe
rendum in mulſa. Parthenium conſimiliter aridum in potu
ſumptum, eadem exhaurit. Alyſſon cum ſale hauſtum, non a
liar quàm ſuperiora expurgat.

Quæ pituitam educunt.

Utendum eſt pituitam ducentibus in complexionibus frigē

S s 2 dis

dis, senio confectis, hyeme, in resolutis, attonitis, in ijs qui inturgescunt, & inflata oedemata patiuntur, quiq; multa pituita in uentre, uel pectore, uel stomacho exuberant, & mulieribus defluxionibus, his qui copiosa emungunt, & crassa excreant, cibumq; horrent, & coxendicibus ob mucum incumbentem laborant, uel elephantiasi infectis, & his qui aqua inter cutem, quam anasarca appellant, infestantur, maxime congruunt. Styracis candidi drach. cum aequali resinae rebinthinae pōdere deuorata, pituitam euacuat. Olea radice corticis drach. cum uino seu aqua. Pyrethri oboli nouem cum aqua. Lychnidis seminis drach. duae. Cyclamini radice drach. cum hydromelite. Scordij drach. duae cum melle. Chamapitys laeuigata, & in globulis deuoranda exhibita. Squamae Cypriae drach. dimidia, cum resinae tantundem in catapotys deglutita, ualētius pituitam exhaurit. Lauri foliorum uiridum drach. una cum dimidia. Corticis radice syluestris cucumeris oboli duo. Ricini grana quadraginta. Crotones appellati putaminibus, per pugarti eduntur, atq; pariformiter agunt. Apij dimidium, quod circa radicem est, comestum, quod quidam chamara phanō nuncupant. Bdellij drach. duae cum hydromelite. Gummi autē de stillationibus oculorum peculiariter accommodatum est.

Quae aquam proliciunt.

Eorum quae aquam educunt usus est in aqua inter cutem, ascite scilicet, laborantibus, in mulieribus quae albo uexantur profluuiio, in his qui ulceribus infestantur fluidis. Squamae Cypriae drach. cum mulsā pota, aquam prolicit: aceti uero momentū superforbeatur, ne uomitū eiciatur. Granum cnidii repurgatum & laeuigatum, cum melle decocto epotum, ne ingluuiem adurat, aquam educit. Praebeantur autē grana uiginti, uel uiginti quinque, uel triginta, robustioribus quadraginta. Euphorbij drach. cum melle decocto pota, pituita quidem, impensius uero aquam educit. Lōchitidis seminis oboli octo cum melicrato aquam emoluntur. Cneorō similiter aquam expurgat, cum polenta potum.

potū. Cnici seminis drach. quinq; simul leuigata, coquuntur
cū ptisana et sale modico, atq; sorbentur. Guttæ ammoniacæ
thymiamatis drach. ex melicrato epota, aquā trahit. Quidā
uero idē medicamentum cum posca, lienosis propinauerunt:
quin et sambuci radicis corticis succus duarum unciarum
mensura potus cum uino, aquam ducit.

De compositis medicaminibus, purgandi facultate
præditis. Cap. 5.

Carapotia ex aloë.

Anterioris colocynthis farcti, succi absinthij, aloes, singulo
rum partem unam, scammoniae partes duas, redige cum a-
qua in pilulis quæ ciceris quantitatem æquent, quarum ex-
hibendæ sunt undecim.

Oxymel Iuliani.

Oxymel quod ad Iulianum refertur, accipit rutæ, origa-
ni, uniuscuiusq; uncias treis, comæ thymi uncias quatuor, ane-
bi sesquiunciam, iridis unciam, mædragoræ radicis sescunciam,
garici uncias duas, tedarū pinguium uncias duodecim, coc-
ci cnidij uncias quatuor, lathyridum uncias treis, alypiadis
tantundem, polypodij uncias duas, folij costi, spicæ nardi, sin-
gulorum unciam: rhei pontici unciam et semissem, scillæ,
urionū sambuci, canopi (qui est sambuci cortex) cuiusq; un-
cias treis, asari unciam, pulegij uncias treis, epithymi, ueratри,
cori, cuiuslibet uncias duas, sy, ammonij, hyperici, cymini,
uniuscuiusq; unciam, anisi uncias duas, aceti sextarios decem,
nellis sextarios quinq;. Herbas in aceto per triduum maccra-
to: deinde amplius q̄ ad medias decedat, mel inijce, et proie-
lis herbis, lathyridis, costū, granū cnidiū, et spicā nardi in-
uorē contritū adycita: et si uidetur, post exactā concoctio-
nē oxymel. Absoluta datio uncia est, uel pro cuiusq; uiribus.
Offert autē podagricis, et epilepticis, et ijs quos crassos humo-
res euacuare, et ab obturatione eorum liberare oportet.

Purgatorium aquagium ex caryophyllo.

Aloes, epithymi, caryophylli, grani cnidij, petroselini,
rhei pontici, singulorum uncia dimidia, euphorbij diobo-
li quas

85 3 li quas

li quatuor, mellis quantum satis est. Modus est cochliarium.
Purgatorium ex rhodomelite, Alexandrii.

Succi rosarum sextarij duo, mellis sextarius, scammoniae triens. Datio summa, cochliaria quinque: minor, cochliaria duo; media, cochliaria tria. Aliter, mellis, rosarū succi, uniuscuiusq; libra, piperis drach. duae, scammoniae octo, mastiches quatuor, zingiberis drach. duae. Aliud, quo ipse utor: Spicae nardi, asari, epithymi, singulorū uncia semis, irrigato in aqua hemina per triduū, et moderatē ubi decoxeris, aquae, succi rosarū, mellis, utrobique sextariū dimidiatū cōfunde. ubi decoxerint ad crassitudinē, sesquiunciā scammoniae admisceto.

Purgatorium e malis cotoneis.

Malorum cotoneorum decoctorū triens, piperis selibra, scammoniae drach. mellis quincunx: quibus contritis, exhibe cochliario quantitatem unciae, uel pro uirium ratione.

Medicamentum e malo citrio, salubre stomacho.

Corticis pomi medici, et carnis libram, in aqua sextario uno et dimidio usq; ad tertias decoquito, deinde mellis sextarium dimidiatum immittito. postquam adusq; mellis crassitudinem incocta fuerint, laeuigati longi piperis unciam, scammoniae in fermento assatae tantundem inspergito.

Buccellatus catharticus.

Scammoniae tostae unciam, piperis et apij seminis, singulorum diobolum, fœniculi, anisi, uniuscuiusq; unciam, mellis libram: quum moderatē assaueris, dato in condito unciam.

Oliuae catharticae.

Constant scammoniae uncia, piperis uncia, epithymi, cymini fricti, petroselini, rutae foliorum, mentae uiridis, singulorum drachmis quatuor, laeerpitij drach. palmularū, mellis, cuiuslibet quincunce, aceti heminis duabus, oliuarum salसारum sextario, fissilium uidelicet. quidam gari etiam symmetrum adiiciunt. Exhibentur quinque, aut septem, aut nouem.

Pastilus purgandi ut praeditus.

Scammoniae, euphorbij, singulorum drach. quatuor, folij duae, piperis totidem, mellis libra. Modus est uncia.

Pbusca

Phusca purgans, & stomacho grata.

Habet cumini, forniculi, singulorum unciam: pulegij, apij, anisi, uniuscuiusque unciam dimidiam: epithymi, scammonia, cuiuslibet unciam, salis sextantem. Datio summa, sunt scrupuli duo in posca. Nonnulli etiam euphorbij scrupulos quatuor adijciunt.

Vinum purgans in laborantibus hydrope.

Scilla quadrans, apij seminis scilicet libra, piperis drach. radices capparis drach. quatuor, grani cnidij cortice exuti drachma, folij malobathri pilulae duae, uini heminae duodecim, mellis sextarii tres. Scillam contusam uino irrigato, reliqua laeuigata admisceto.

Halatia ad purgandum, id est e sale purgatio.

Salis communis assati denarii sex, seminis apij, zingiberis, panis aridi, singulorum dioboli sex, anisi, piperis, uniuscuiusque semuncia, scammoniae, epithymi, cuiuslibet uncia. Datio cochliarium unum.

Podagrica ex hermodactylis.

Hermodactyli quadrans, anisi, cymini Aethiopici, ameyos, thymi corymborum, piperis candidi, zingiberis, uniuscuiusque dioboli tres, epithymi uncia dimidia. Dantur oboli octo mane cum condito, siue melicrato, uel aqua feruidiore. Aliiter idem purgatorium: Hermodactyli uncia, cymini Aethiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum dioboli sex, mastiches duo, spicae nardi tantumdem, moschi siliqua, cnici dioboli duo. Dosis, dioboli quatuor cum hydromelo. Scammoniam eo quod stomacho noxia est, damnamus. Quod si copiosior euacuatio fuerit necessaria, admisce dationi scammoniae siliquas tres. Exhibebis autem loto.

Cataportia ex Harmenico lapide, in morbo articularum principaliter exhibenda.

Aloes triens, scammoniae unciae sex, agarici uncia, epithymi tantumdem, lapidis harmenici dioboli duodecim, cassiae uncia, spicae nardi uncia, scillae assatae sextans, croci grana uata duodecim, rhodomelite excipiantur. Datio dioboli duo.

Confectura ex coronopodio conduens ad eadē ad quæ
ex hermodactylis præparata, & stomacho salubris.

Zingiberis dioboli duo, piperis diobolus, agarici decem,
cnici interanei dioboli quatuor, coronopij radicis dioboli sex.
Datio denarius, si difficilior est alius, siliquæ uiginti tres,
quæ faciunt omnino obolos septem, aut octo fermè, uentre
euacuata lauabis, ouis & pane alito.

Medicamentum ex succo Cyrenæico ad quartanam.

Sumito succi cyrenæici, piperis, zinziberis, rutæ foliorum,
cuiuslibet drach. exhibetur nucis penticæ magnitudo.

Puls cathartica cedemate turgidis, elephantiasis laborantibus
eximie conduens, & quibus crassum & uiscidum hu-
morem extirpare animus est.

Colocynthidibus binis circumputatis, semen eximito, me-
dulla uerò reliqua ipsius oleo dulci impleto, & operculatus
proprijs operculis, per diē ac noctem finito. Deinde aut oleo
euacuato, colocynthidis in aqua tantisper dum liquecant eli-
xato. Postea abiectis eisdem, oleo aquæ permixto ueratri ni-
gri triobolū adijce, scammonicæ drach. Vbi uerò cum his pul-
ticulā ex similagine, uel panē aridum contritum elixaueris,
post hæc laboranti frugali ac tenui antea uictus ratione uso,
instar nucum auellanarū octo aut decem, uel ad summū qua-
tuordecim propinato. Et potui aquam calidam præbeto.

De obseruatione eorum qui purgātur, & quomodo adesse oportet
his qui sumpto pharmaco non purgantur. Cap 6.

IN omni summatim strenua & efficaci purgatione homini
præscripta prius uictus ratione, ieiuno, cōcoctione probè obi-
ta pharmacū præbeto, somnumq; usq; ad consummatā pur-
gationem prohibeto: motionem uerò moderatam si fieri possit
subire, & ab omni cibo potuq; abstinere, quoad purgatio
suo munere in totum perfundā fuerit mandato.

Ex monumentis Philagrii.

At si quis in ediam eiusmodi non sustineat, uel quod os
uentriculi

ventriculi bilem facile, ob longam quæ præcessit inedia, contrahat, uel propter aliam istiusmodi causam, dandus est psi ex aqueo uino panis, uel ptisanæ succus, seu chōdri, non lum inchoata purgatione, quo cibus minus corrūpatur, sed protinus à sumpto medicamento potus: sic enim ad celeriores interdum pharmaci motū sua grauitate auxiliatur. Si quis etiam quacunq; sumpta ad aluum emolliendum potione non purgatur, neq; euacuetur, nulla ingruente molestia, satagen lum non est. Sin autem æger morbi uehementia urgeatur, ut dilanietur, distendatur, & fissus crepat, clysterem conestim inijcere necesse est. Si ne sic quidē obtemperet aluus, corpore quidem uellicato, & tanquam euerso, lauare largio e oleo illito conuenit. Quod si corpus infartum atq; grauatum fuerit, sanguinem detrahito, potissimum si homo sanguinolentus existat, oculosq; rubeo colore infectos, & emissititios non secundum naturam, sed ex aduentitio propter epotum medicamentum habeat. Si horū nihil affligit, morsus autem & laniatio infestat, à balneo quamprimū nutrito, & uinum prelixius propinato: atq; inter hæc clysteribus utere, nisi do res placati sint, denuoq; lauato. Esto autē oleum clysmatis utaceū, uel ex alio quocunq; flatu discutiente præparatū.

De his qui plus æquo purgantur. Cap. 7.

I purgatio modum excedat, cutis perfricanda est, lauandaq; calida, uinum ante balneum tenue, uermiculum, & lauuum exhibendum. ex templo nanque huiusmodi in corpus ingeritur, panē item eo maceratum, & mala Punica. Quod subduclio perseueret, uincire mēbra fasciis à summo deorū distributis expedit, quæ constringāt, & aliquid sanguinis ac spiritus recipiant. Propinato præterea ex carnibus uererarum theriacis modicum. deducit enim in cutem, & ceteriter reuellit in uentriculum humorū colluuiem, bebetatq; id quod in purgatorio tanquam uenenosum & medicamentum existit. Si huius non sit copia, theriacis pastillis, præ-

terea confectioe diaspermaton, & ea cui cognomentum est Philonium, quin & cucurbitulis supra stomachū. Cataplas-
matis item ex farina hordeacea & ænomelite utendū. Post
quæ astringentia adhibeantur epithemata. potissimum uerò
totius corporis fridionibus, & pharmacorū potionibus adiu-
uantur. Aer ad hæc frigidus, & impendiū calidus, in exube-
ranti purgatione uitandus est. Siquidem materiā ille ab exte-
rioribus ad interna propellit, fluxumq; adauget: hic uerò di-
strahit, uires soluit & prosternit. Quod si ex intestinorum,
quæ medicamento irritantur, uellicatione augeatur euacua-
tio, obliniri præfatis debent. Immittantur per aluum quæ de
crimoniam retundendi uim obtinent, adeps anserinus, uinum
dulce, nardus, & id genus alia.

De sacris antidotis, quas Græce hieras dicunt. Cap. 6.

Hiera Antiochi.

Trixaginis, agarici, cucurbitæ syluestris interioris farti,
stæchados, singulorum drach. decem, succi panacis, sa-
gapeni, petroselini, aristolochiæ surculosæ, piperis candidi,
uniuscuiusq; drach. quinq; cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ
troglodytidis, croci foliorum, cuiuslibet drach. quatuor, mel-
lis quantum satis est. Alia: Medullæ cucurbitæ syluestris
drach. uiginti, scillæ tostæ, agarici, guttæ ammoniaci thy-
miamatis, corticis ueratri nigri, scammonia, hyperici, singu-
lorum drach. tres, epithymi, polypody sicci, bdelly, aloes, tri-
xaginis, marrubij, cassiæ, cuiuslibet drach. octo, myrrhæ tro-
glodytidis, opopanax, sagapeni, piperis cōmunis, & longi
& candidi, petroselini, cinnamomi, croci, castorij, aristolo-
chiæ longæ, uniuscuiusque drach. quatuor, mellis quantum
res postulat.

Hiera Iusti.

Constat ex epithymi drach. duodecim, marrubij, stæcha-
dos, trixaginis, hellebori atrij, scammonia, agarici, piperis
longi, scillæ assatæ, singulorum drach. sedecim, euphorbij,
pulpa

LIBER SEPTIMVS. 651

Spica colocynthis, aloes, croci, gentianæ, petroselini, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, uniuscuiusque drach. octo, opopanax, poly, cinnamomi, cassia, myrrha, spica nardi, aristolochia odorati iunci, pulegii, cuiuslibet drach. quatuor, aristolochia cum longa, tum rotunda, singulorum drach. duabus, mellis quod satis est. Dantur grāmata duo, aut tria, aut quatuor, cum melicrato & sale.

Hiera Galeni.

Habet trixaginis, piperis longi, piperis albi, stæchadis, ratri nigrioris, scammonia, spica nardi, scillæ affata, & quibusdā placet epithymi, uniuscuiusque drach. sex (aliās decim) myrrha, croci, ammoniaci thymiamatis, euphorbii, cuiuslibet drach. octo; quæ cuncta melle excipiuntur.

Hiera Ruphi.

Sicyonia, seu medulla colocynthidos drach. octo, trixaginis drachmas decem, sagapeni octo, petroselini quinq;, aristolochia rotunda, piperis albi, singulorum drach. quinq;, cinnamomi quatuor; uel cassia octo, spica, croci, poly, myrrha, uniuscuiusque drach. quatuor, mellis quantum satis est.

Archigenis Hiera.

Mar rubii, agarici, trixaginis, colocynthidis medulla, stæchadis, singulorum drach. decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochia rotunda, piperis albi, uniuscuiusque drach. quinq;, cinnamomi, spica nardi, myrrha, poly, croci, cuiuslibet drach. quatuor: arida simul cōtunde, & attamina. Succus erodopanacis, atq; sagapenum, myrrhaq; confusa melicrato in pila per noctem macerato, deinde laugato, atq; in iuce arida, et assumpto melle optimo, in uitreo aut plumbeo uase recondito. Hic sanè modus omnibus hieris communis est. Exhibitio integra drach. quatuor: assumantur etiam salis drach. duabus, mellis beminæ duæ, aquæ quantum satis est. Quod si ad purgandum efficaciores, quæ scammonia carci, reddere animus sit, admiscantur & his singulis singuli ipsius oboli.

Illitiones

Illitiones sedis & umbilici purgantes. Cap. 9.

Vnguētum, quod sedi illitum pedius proritat. Ruta melle exquisitissimè teritur, ita quidem, ut unus succus efficiatur, atq; in intimum ani illinitur: efficacissimum autem fuerit, si momentum cymini & nitri, uel cyclamini succi adijciatur, floccis exceptum sedi, ad laxandam aluum inferitur. Vel glans ex melle facta inditur. flatus enim erumpunt plurimi, leuanturq; affeāi.

Illitio sedis aluum ciens, Chezanance.

Alumen cum melle laeuigatum decoquitur, donec citrinum reddatur, atq; hoc inungitur sedes: promptè nanque multa quidem, non tamen citra laborem extorquet.

Epomphalion, hoc est umbilicale, aluum subducens.

Cyclamini drach. quatuor, nitri drach. tres, hellebori nigri & candidi, uniuscuiusq; duæ, colocynthidis tres, scammoniae duæ, elaterij succi quatuor, grani cniidij totidem, caricarum pinguium uncia duæ, fellis taurini uncia.

Aliud insigne, primi meriti.

Elaterij, lathyridum, galbani, cyclamini, hellebori nigri, singulorum drach. quatuor, colocynthidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluestris recentis, scammoniae, grani cniidij, tithymalli, uniuscuiusq; drachmæ duæ, resinae terebinthinae tres. Felle taurino excipe, & perinde atq; unguento utere. Quidam uerò adieciis insuper faui drach. septem, & sicyonij quantum sufficit, ad morem emplastri imposuerunt.

Medicamenta uomitoria, & ratio exhibendi ueratri. Cap. 10.

Vomitionib. non tam secunda ualetudine fruētes, alimen-
ti humorumq; copia grauati, quàm morbis oppressi acutis, utuntur, quum à pituita, uel id genus aliquo infestantur. Ceterum neq; in sanitate, neq; in acuto morbo uomitorijs medicaminibus ui consultiū est, sed in ægriitudinibus diuturnis, præsertim induratis, quæ ualidiore opus habent commotione

ne

uerbi causa, podagra, comitialibus à stomacho prouenientibus, elephante, aqua inter cutem, melancholia, atq; id genus alijs. Cauendum uomitu sanguinem eiectionibus, malo stomacho præditi, & suffocationibus obnoxijis. Expeditissimum atq; ad uomitum ciendum cyprinum est, irrigatis in eo digitis, uel pinnis, & in gurgulionem insertis: radicem item nar Gallicæ drach. septem melicrato potæ. per superna ualentis purgant, & betonicæ drach. quinq; aut sex in mulsa potæ. & daphnoidis folia uiridia tria, trita, māducata, necnon elaterij obolus in aqua bibitus, uomitu cum pituitam, tum lem exinanire consuevit: idem præstat uuarum passarum rana quindecim cum mulsa crassiore. Ex bulbis, esculenti uidem crudi deuorati, uomitorij uero (narcissi adpellati) cœcti superius euacuant. Idem apij radicis pars aëri exposita manducata, præstat: appellant autem eam nonnulli chæneraphanum: (inferior eius portio deiectionem molitur) niuersa uero radix comesta, tam per superna, quàm per interna agit. Raphani insuper prædictis minus quidem uiolenter, sed maiore emolumento expurgant. oportet autem easdem acres admodum & recentes adhuc, in pertenuia ramenta dissectas, duabus prius uel tribus horis in oxymelite naccratas, quàm plurima fieri potest copia ingerere: tertium quater à cena, semel uero ieiuni euoment, oxymel interim iugiter sorbendo. Mox ubi horas circiter duas inambulauerint, tepida aqua epota, digitis uel pinnis gutturi immisis euoment.

Ratio exhibendi ueratrum.

Veratrum exhibendum est diutinis pariter & grauibus ægri tudinibus correptis, ubiq; aliud omne præsidiorum genus desperauerit, quum omnibus ipsis ægrimonia superior extiterit. Offerendum idcirco, siue incessanter uexauerit morbus, puta aqua inter cutem, elephāiasis, cachexia, paralysis, & id genus alijs: siue per circuitum temporis repetat, cuius

genus

generis est epilepsia, podagra. Quum autem complures sint ueratri porrigendi rationes, simplicior quidem, & præparatio potius ad helleborismum idonea hæc est. Raphanis prius arundine perforatis, hellebori albi optimi radicum præsemina infigantur, noctemque integram dimittatur: postridie proiecis præseminibus, raphanos minutissimè concisos cum oxymelite modo prædicto languenti, procliuiori uidelicet ad uomitus, exhibeto: et interpositis memoratis horis, ad uomendum cogito. Sed helleborismi peculiaris modus is est: ueratri optimi uncias duas in aquæ hemina prius diebus quinque maceratas, donec aquæ pars tertia relinquatur, decoquito expresso deinde ueratro, aquæ tantundem mellis admisceto, rursumque tantisper dum crassitudinem induat, elixatam, uomitui præexercitato laboranti, ieiuno, obita concoctione, ubi alium ultro uel clystere sollicitata responderit, ad demonstratum antea modum semel atque iterum pro ratione uirum præbeto. Efficacissimus uero omnium modus eiusmodi est: Concisis ueratri radicibus ad instar sesami (nam in pollinem contusæ uirium efficaciam suffocationes inferunt) imbecillioribus cum succo ptisanæ aut halicæ, aut id genus aliquo duas drach. ad summum, ad minimum autem drach. ueratri, elixatum potui dato. Robustioribus uero in aqua calida, siue mulsa. Incipit autem helleboro irritata purgatio, post treis aut quatuor horas. Qui lentius inchoant, melius purgatur. Cunctantibus autem nimium uomitibus, melicrato exhibito ad uomendum impelle, pinnis oleo imbutis ori immisis. Quod si nec tum quidem euomat, in balneum abducendus est. Vbi iam uomere cœperint, si quidem minutatim fiat euacuatio, nihil moliedum negocij: sin autem angantur & conuellantur, hydrelæum potui dato, pariterque per inferiorem uentrem ipsis subducendi uis quædam inditur, quod alioquin in his qui helleboro utuntur, quandoque euenit. unde medicamentum aceruationem facilius ferunt. Qui animo deficiunt, eos odoramentis & similibus refocillato: atque alijs

quæ

quæ, ut credibile est, superueniunt symptomatis, consimiliter succurrito. Facta autem exuberanti purgatione, non alere modò, uerùm somnum etiam conciliare expedit: et alia, quemadmodum de his qui nimium purgantur, explicatũ est, agenda sunt. Persistente autem uacuatione, cucurbitula præter hæc stomacho applicanda, membraq; uincienda. Si secundum rationem fiat euacuatio, melicrati symmetrum propinato, quo relicta pharmaci excrementa abluantur, paulo post cibum coctum facilis offeretur. Cæterum quibus medicamenta per os suspecta sunt, omnino autem helleborismo indigēt, Antyllus eiusdemodi quopiam usus est lauamine: Veratri candidi drach. duas in aquæ sextario per diem ac noctem irrigatis, postero die ad dimidias usq; aqua decoquito, deinde per sedem immittere, ut uomitum proliciat: superius purgat paulò hellebore positione imbecillius. Iam uerò post exactam purgationē, glandem acrem supponentes, egestionem irriteremus, quo infusum reddatur, & uomere desistant languidi. Post excretionem, mulsam semel aut bis abluendis intestinis immitteremus. Idem uerò tradit, glandem ex helleboro candido cōtuso & cribellato, deinde melle despumato excepto concinnatum, pari modo superiorem uentriculū, quemadmodum & clyster ex ueratro confectus, purgare. Verum præ omnibus hic modus cōmendatur, in quo nobis partiri in uices purgationē licet. Pondus igitur hellebore esto drach. duas. circūformetur autē glans, uel circumligetur stappa solidiore, cuius principium foris per sedem recipiatur, ut post sufficientem purgationē liceat eximere. hic sanè modus purgat quidem exactissime, sed neque strangulatum, neq; aliquid aliud periculi infert.

De differentia antidotorum. Cap. ii.

Præfatio Galeni de antidotis.

Medicinas, quibus morbis succurritur, quæ nō extrinsecus imponuntur, sed quæ intro in corpus sumuntur. prisci antidotos appellabant: quarum treis enumerant differentias.

quædam

quædam enim letalium medicamentorum gratia offeruntur, quædam propter feras ictu morsu'ue uirus iaculantes, quædam affectionibus ex praua uicinis ratione prouenientibus opitulantur: nonnullæ treis has commoditates pollicentur, è quorum albo antidotus, quæ theriaca uocatur, creditur.

Hedychroi theriacam ingredientis præparatio.

Aspalathi radicis corticis, calami odorati, costi, asari, xylobalsami, pbu, amaraci, maſiches, singulorū drach. sex, fructus balsami duas, mari sedecim, floris rotundi iunci odorati duas, cinnamomi uigintiquatuor, amomi, cassia, rhei, uniuscuiusq; octo, nardi Indica, phylli, cuiuslibet duodecim, myrrhæ uigintiquatuor, croci drach. duodecim, uino præstantissimi mo excipe, & in pastillos cum succo balsami subigēs dirige.

Pastillorum scilliticorum præparatio

Scillam luto seu fermento, & opere pistorio delibutā moderatè torrefacito. inde medulla ipsius partes duas cum euri farinæ parte una conterito, & in pastillos concinnato.

Pastillorum theriacalium præparatio.

Sumito utiperas quatuor, aut quinque, giluo colore, recēsque captas: & amputatis à capite & cauda quaternis digitis, detractaq; senectute tota, & exptis interaneis, reliqua in fideili noua cū salis & anethi momēto coquēda sient, tantisper dum spinæ à carnib. separantur, deinde his exemptis, & carnibus exactè à spinis repurgatis, admixtoq; cōpari modo panis puri, omnia pariter conerito, & orbiculos formato, manu opobalsamo imbuta, & in umbra refrigerato.

Theriaces antidoti præparatio.

Pastillorum scilliticorū drachmas quadraginta octo, pastillorum theriacalium, trochiscorū hedychroi, cinnamomi, piperis cōmunis, succi papaueris, uniuscuiusq; drachmas uigintiquatuor, rosarū aridarū quindecim, scordij, napi seminis, iridis Illyrica, agarici, glycyrrhizæ, succi balsami, singulorum drachmas duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rhei

rheu pontici, radicis quinq; folij, nepitæ, floris iunci rotundi odorati, marrubij, petroselini, stæchadis, costi, piperis candi di & longi, di flammæ flori, thuris masculi, terebinthinæ, mastiches, castiæ nigræ, spicæ nardi, flori polij, styracis, apij seminis, seseleos, thlaspis, ammeos, trixaginis, chamæpitios, succi hypocistidis, malobathri, nardi Gallicæ, nardi, mei, gentianæ, anisi, fœniculi seminis. Lemniæ sigillatæ, chalcitidis assæ, amomi, acori, fructus balsami, plbu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum drach. quatuor, seminis dauci, galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castori, cenaurij, aristolochiæ sarmætaræ, cuiuslibet drach. duas, melalis Attici libras decem, uini phalerni sextarios duos. Mittito in pilâ succû hypocistidis, myrrhâ, sagapenû, glycyrrhizâ, styracæ, acaciâ, opopanacæ, mellis pusillû, instillâs, cõtusaq; dissoluito: postea uini tantû infunde, ut id cætera superet, per tri duû macerato, mox reliquas species contusas unito, mel desuper metur. Reponitur aut in uase argenteo aut uitreo nõ admodû referto, & identidè deoperculatur. Vsus ipsius, siquidè res urget, in ferariû morsib. cõmendatur, uenenisq; sumptis, si post ætatis septennij ponticæ nucis quãtitas cû uini cyathis trib. bis in die potetur. Pari modo facit his, qui citra manifestâ occasione periclitantur corporis corruptiõe, letalis medicamẽti qualitatem imitante, ueluti in pestilentialib. plerûq; accidere cõsuevit, indies semel. In alijs uerò affectionib. usus eius, a decemio, ad annû usq; uigesimû celebratur. Cõttra tusses aut, & pectoris dolores, seu lateris, febre quidè carẽtibus cum ænomete, febricitantib. uerò cû hydromelite sub nocte fabæ Aegyptiæ magnitudo cõducit. Sanguinẽ eieciẽtib. cû alis. si recens malû, ex posca: si diurnius, ex cõsolidæ decocto, fabuli Aegyptij quãtitas, quum mane tû uespere præbetur. Inflatib. aut, et his qui circa umbilicû torminib. infestantur, aut cœliacis, mane in aqua calida eiusdè fabæ instar. Appetentiã præterea intẽsam excitat. Rigore, algere, et bilis uomitu, ante accessiones

T

cessiones

cessiones pota, liberat. Menses cit, et foetus mortuos expellit, fabæ Aegyptiæ magnitudo cū melicrato, uel passo, in quo ruta atq; didānus elixa sit, pota. Aduersus aut extremā rauces din̄ cū seorsim, tū addito dragacāthæ duplo, ex mulso aut passo sumpta, retētaq; sub lingua et colliguata, lienosis et iocinerosis ex posca, si scirrhus urgeat, cū oxymelite uel aceti scillitici sesquicyatho. Datur nephreticis cū ænomelite fabæ Aegyptiæ magnitudine, dysentericis tātundē cū decocto rhu, tā mane q̄ uesperī. Medēdis hebetudinib. uisus summē cōfert, sic tēperata: Antidoti et opobalsami sextans, mellis cyathus, mixta paulatim illinūtur, extergit porrō dēteis. Pleriq; uerō præseruandæ ualitudinis gratia, fabæ Græcæ instar, noua luna sumunt, ubi coctrix facultas probē officiū peregerit, cū mellis cochliario, et aquæ cyathis duobus. Pari quoq; modo in peregrinationibus eadem utuntur, dum iter faciendo pestilentes quaspiam auras uel aquas suspiciantur.

Sales Theriaci.

Sumito uiperas statim ē uenatione quatuor, deinde salis ammoniaci uel cōmunis modium italicum, quo cum in mortario obiter gentianæ libram et dimidiam, mali terræ rotūdi tantundē, comæ tenuis cētaurij libras duas, cardamomi, marubij, singulorum uncias sex, scordij, apij, chamedryos Cretici, cuiusq; librā, seminis rutæ domesticæ sextarios duos, melle Attico non minutim contundito, mediū ipso in ollā nouā coniecit: deinde uiperas uiuētes quatuor, mox squillas tenellas recentes quinque, minutim concisas, illis adiecit, sic aliam mixturæ partem superiecit: et ubi ollam accuratē operculaueris, tribus aut quatuor foraminibus eandem perforato, quo per ea uapor concessionis modum significet. Principio nanque fumus ingens proflire uidebitur caliginosus, et ualde turbidus, ignem iam feras contigisse significans. ubi summo studio animaduerte, ne huius fumi aerem ex serpentinum exhalatione infectum attrahas: deinde ubi uapor euasuerit,

nuerit, & tenuem quandam flammā per foramina eijci con-
 spexeris, tum sanē ipsas quā optime assatas cōjcto, ollaq;
 ita ab igne remota, perq; diem et noctē refrigerata, et aperta
 carbonēs eximito, et accuratē cōtundito, atq; cū hisce mixtio-
 nib. per cribrū trajcito: seminis ruta syluestris, hyssopi Cre-
 tici, cuiusq; unc. 9. seminis fœniculi, nardi Celticæ, stachyos
 Scythicæ, cuiuslibet uncijs sex, petrosclini Macedonici, fo-
 liorū malobathri, cuiusque unc. una, racemi amomi, ormini
 seminis torrefacti singulorum uncijs tribus, summitatum ori-
 gani, cacuminum thymi singulorum sextante, baccarum iu-
 niperi, piperis albi, fœniculi, singulorum libris octo, laserpi-
 tij radicis sextante, seminis coriandri, zingiberis non corro-
 si, satyrj seminis uel radicis, pulegij, seseleos massalcotici,
 mentæ, cuiusq; sexunce, cassiæ fistulæ sextante, cinnomomi un-
 cia. Ipse quidem bestijs non combustis præparauit, sed ipsa
 rum pastillis, ueluti in theriaca decui, reliquis quæ cum feris
 decuruntur, admixtis, quo amaritudinem, qua prædita sunt,
 per adustionem abijciant: tanta pastillorum mēsurā adiecta,
 quantam uiperas quatuor numero habere coniectura assequi
 licebat, & hoc modo primi reuera meriti euaserunt.

Antidotus Mithridatica ex scinco.

Myrrha troglodytidis, zingiberis, cinnamomi, singulo-
 rum drach. decē, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, opobalsami,
 floris iunci odorati, costi, siæchados, seseleos, galbani, resinæ
 terebinthinæ, piperis lōgi, castorij, succi hypocistidis, styra-
 cis, foliorū malobathri uniuscuiusq; drach. 4. cassiæ nigrae,
 polij, piperis cādidi, scordij, seminis dauci, fructus balsami,
 cipheos, bdelly, nardi Celtici, gummi, petrosclini, opij, car-
 damomi, seminis fœniculi, gētianæ, foliorū rosarū, cuiuslibet
 drach. octo, didamni, anisi, acori, phu, singulorū drach. tres,
 mei athamātici, acaciæ, uētris scingi, hyperici seminis, unius
 cuiusq; drachma una cū dimidia, uini melli q; quod satis est:
 præparato instar theriacæ, inquit Galenus. Ad gratiāq; illa

Ti 2 condus

conducit, ad eadē hanc quoque prodesse idem afferit, prater
quam ad uiperæ morsus: ad hos nanque theriaca efficaciores
uires obtinet.

Antidotus ex sanguinibus, ad omnia uirulenta, & ad
letalia medicamenta.

Capit piperis candidi, & longi, costi, acori, phu, anisi, di
Adni Cretici, singulorum drach. duas, amomi, liquoris balsa
mi, seminis ruta syluestris, fœniculi seminis, cymini Aethiopi
ci, anethi, sanguinis masculi anatis aridi, sanguinis bædi, san
guinis anserini, fœminæ anatis sanguinis, napi syluestris se
minis, uniuscuiusque drach. 3. gentianæ radicis, trifolij, floris
iunci odorati, thuris, rosarum aridarū, cuiuslibet drach. 4.
cinnamomi, drach. duas, scordij drach. octo, petroselinij, polij,
myrrhæ, nardi, singulorum drachmas sex, cassiæ drach.
treis, succi cyrenaiici tantū dē, stœchadis drach. 3. asari duas,
ammoniaci thymiamatis treis, mei Athamantini duas, aga
rici tantundem, carpobalsami grana uiginti, mellis despuma
ti quantum sufficit.

Oxymel simplex.

Constat ex acerrimi aceti candidi sextario, aquæ sexta
rijs duobus, mellis sextario: quæ ad mellis usque liquidioris
consistentiam decoquuntur, despumando subinde mel.

Scillæ candidæ tessellatim concisæ, in umbraq; dieb. qua
draginta exiccata, & rursus purgatæ libras sex, in aceti
boni sextarijs duodecim, dies sexaginta, operculato uase in
solato: quib. transactis, scillā manibus expressam abijce, ace
tū uerò excolatū diffundito. Quidam uerò scillæ libram mi
scent aceti sextarijs sex, alij aut uiridis scillæ idem pondus in
acetū coniungunt, sinuntq; usq; ad menses sex. Et est hoc ma
iore incidendi ui præditum. Prodest autem acetum illud ad
oris fluxiones, collutium, & ad multa interaneorum mala,
quæ exbulceratione uacant, potum. Cateris itidem complu
ribus subuenit.

Oxymel

Oxymel scilliticum.

Accipit scillæ tenerioris medullæ libras duas, aceti acrioris albi sextarios quindecim, piperis, petroselini Macedonici, singulorum sextantem, dauci Cretici, ammeos, anisi, nardi Gallicæ, lybistici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheu pontici, uniuscuiusq; semunciâ, scæniculi, seminis cymini, laserpitij, zingiberis, pyrethri, hyssopi Cretici, costi, pulegi, cuiuslibet unc. mentæ uiridis fasciculum, rutæ uiridis teneriores caules quinq; mellis Attici sextarium, sapæ sextarios duos, api uiridis fasciculum. interanea scillæ candida contusa in acetum conijce, & per dies septem sub ardentissimo canis æstu macerari finito: deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa, uiridia uerò integra aceto infere, et post septem dies rursum omnib. exemptis, mel cum sapâ, aceto immitte, quibus decoctis usque ad crassitudinē in uasculo uitreo reconde. Vtere autem eius præsidio ieiunus propinationis loco, & cum cibo, more intindus: nam multo utilissimum est.

Medicamentum Galene scilla, comitali modo in primis conducibile.

Scillam manibus in puluerem friatam, uasi in quo mel fuerit reconditum inijce, eò que strenue obturato, in locum ad meridiem uergentem sub ardentissimo caniculæ æstu reponito. Post quadraginta Sirij dies, uasis superficie soluta, corpus scillæ effluxisse offendes. Exempto itaque ipsius succo, melle præstantissimo condulcatum, comitali laborantibus singulis diebus cochliari præbeto: pueris quidem paruo, adultis uerò magno. ipsâque scillæ substantia cum melle leuigata, cochliario exhibetur. Secundum uerò locum hoc obtinet potentia.

Philonis antidotus.

Constat ex piperis albi drach. uiginti, alterci drach. octo, succi papaueris drach. decem, croci quinq; pyrethri, euphorbij, spicæ nardi, singulorum drach. mellis Attici, uel alterius primi meriti apprimè decocti, quod satis est. Datq; adultis nu

T t 3 c8

ciꝝ auellanae quantitatem, minoribus fabuli instar, pueris ciꝝ ceris magnitudinem. Medicamentum est maximè indolorū, & somnum concilians.

Athanasia dolorem sopiens, pleuritidi consecrata: Oribasii.

Cassia drach. octo, spicae nardi, amomi, croci, opij, styrae, myrrhae, costi, singulorum drach. quatuor, mellis despumati quod satis est. Exhibetur modo Philonis antidoti.

Antidotus e duobus piperib. consimilis efficaciz.

Cardamomi, castorij, opij, uniuscuiusque drach. treis, myrrhae, costi, piperis longi & cādidī, galbani, cuiuslibet drach. treis, croci totidem, melle decocto excipiuntur, quantitasq; fabae exhibetur.

Diacodium, hoc est, ex capitibus papaueris, & defructo.

Capita papaueris uiridia in aquosa octo aut decem, postri die eius dici quo decerpta sunt decoquito, et glycyrrhizae unciam. Macerata in sapie sextario simul quoad tabefiant elixato, quamprimum mediocrem induerint crassitudinem, ab igne remota adseruato. Vtere in his qui febre oppressi uigiliis infestantur, & quando ex capite tenuis in thoracem destillat fluxio.

Antidotus, ex papauerum capitibus, & melle.

Papauerum capita (quemadmodum praedictum est) & glycyrrhizae unciam, in aqua pluuia siue fontana, mensura sextarii usq; ad colliuationem decocta, ubi expresseris, in decoctam mellis sextam dimidiam conijcito, adq; crassitudinem usque elixato. Dato quibus praeter dolorum mitigationem, somni conciliationem, etiam purgatione & abstersione humorum, pectoris, pulmonis, atq; renum, opus est.

Diacodium compositum.

Aquae in qua papauerina capita decocta sunt, iuxta memoratam convenientiam sextarium, uini dulcis heminas duas, mellis libram, croci, succi hypocistidis, singulorum drachmas quatuor, coquito ad spissitudinem. Stomacho autem salubrior est

est confectio ex melle, & capitū papauerinorū decocto, & malis cotoneis temperata. Efficacior autem euadit, si cum capitibus papaueris aqua melilotum et glycyrrhizā decoquas.

Ex marrubio linctus, phthigicis in primis efficax.

Marrubij comarum libram in aqua cotylis sex, donec tertia pars relinquatur, elixato, herbam porricito, inducāque melle aquae adiecto mellis crassitudine, coctiliariū exhibeto.

Ex marrubio confectura composita.

Marrubij comæ, ireos Illyricæ, hyssopi, pulegij, glycyrrhizæ, apij, singulorū uncias duas, caricarum pinguiū uncias treis, nuclei pinei resinati quadrantem, contunde obiter in crassas partes: arida cum carycis in aqua sextarijs tribus irrigato, & ad tertias coquito. Deinde aquae colatæ, mellis libras duas infunde, & ad melleam spissitudinem decoque.

Medicamentum ex eruis.

Amygdalorum amarorum uncia duæ, farinae erui uncia quatuor, hyssopi tantundem, ireos uncia semis, nucleorum pineorum frictorum sextans, mellis sextarius, uel quantum res exigit.

Medicamentum Dodecatheon.

Iris Illyricæ uncias quatuor, eruorum tantundem, hyssopi, seminis urticæ, glycyrrhizæ, scæno-græci, uniuscuiusque uncias duas, bulborū unc. quatuor, seminis lini tosti totidē, nigellæ diobolos duodeuiginti, pulegij grāmata sex, nucleorū pineorū tostorum unc. 2. piperis scrupulos sex, mellis quod satis est.

Antidotus Sotira.

Spicæ nardi dioboli undequadraginta, myrrhæ dioboli uiginti septē, croci dioboli triginta septē, castorij dioboli undequadraginta, opij dioboli triginta sex, petroselini dioboli quadragintaquinque, anisi octo, apij septē, iunci rotundi odorati florū dioboli triginta sex, cassiæ dioboli duodecim, piperis longi tāundem, seminis sinonis grammata sex, styracis octodecim, amomi, fœselis, utriusque, duodecim, hedychroi, costi, asperi, singulorum dioboli duodeuiginti, mellis quantum satis est.

Tt 4 Exstora

Ex styrace bechicum, tussi medendo.

Amomi, cassiae, singulorum sextans, styracis, spicae nardi, uniuscuiusque sesquiuncia, croci, piperis albi, cuiuslibet uncia, mellis sextarius: detur cochliarium,

Medicamentum Philoxeni, cuius usus est in purulentis
& diutinis rheumatibus obnoxiiis.

Resinae terebinthinae drachmas uigintiocto, nardi sedecim, myrrhae stillatitiae sex, cardamomi, bulborum, uniuscuiusque drach. sex, croci duodecim, galbani sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur fabae Aegyptiae magnitudo.

Esdra, quae multis affectibus congruit, potenter enim desiccatur.

Amomi scrupulos sex, croci scrupulos duodeuiginti, seminis dauci sesquiscrupulum, seminis faeniculi scrupulos treis, cassiae scrupulum unum et dimidium, florum iunci odorati scrupulos quatuor et semis, cinnamomi scrupulos treis, succi hypocistidis scrup. quatuor et dimidium, sulphuris quincuncem, seminis papaueris scrupulos quinq, pyracanthi scrup. treis, petroselini scrupulum unum et semis, ireos Illyricae scrupulos septem et semis, herbae Apollinaris seminis scrupulos tredecim et dimidium, spicae nardi scrupulos septem et dimidium, rutae seminis scrup. unum et semis, anethi scrup. treis, cardamomi unc. treis, rosarum exiccatarum scrupulos quatuor et dimidium, nerij floris scrupulum unum cum semis: est autem ueluti lobus ac siliqua unde oritur rosa: rhododaphnes, et rosa ipsius. singulorum scrup. tres, rheu, gentianae, uniuscuiusque scrup. sex, bedychroi sesquiscrupulum, tragacanthae scrup. quindecim, licij sex, foliorum citrij tantundem, seminis ocymi scrupulum unum cum dimidio, anisi tres, costi, myrrhae, cuiuslibet scrup. sex, bdellij sedecim, succi artemisiae tredecim, rhu Syriaci uigintiquinq; et dimidium, asari, uentris mergi, lapidis iaspeos, singulorum scrup. treis, piperis quindecim, castorij sesquiscrupulum, cretae cimoliae scrup. sex, sisonis, styracis, uniuscuiusque scrupulos nouem, opobalsami duodecim: intybi herbae

herba scrupulum unum & semissem, mellis uncias uiginti octo, uini quantum sufficit.

Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.

Malorum cotoneorum purgatorum librae tres decoquuntur in uini peructusti sextarijs tribus, deinde teruntur, quibus piperis, anisi, lybistici, lauigatorum uniuscuiusque uncia inijciuntur. Sunt qui zingiberis unciam dimidiam adijciunt, nec desunt qui pro uino acetum indiderunt.

Medicamentum ex succis malorum, appetit a cibis auersionibus, & ægris concoctionibus idoneum.

Succini, malorum cotoneorum maturorum, mellis boni, singulorum sextarij duo, aceti sextarius, zingiberis quadrans, piperis albi sextans, ad crassitudinem coquuntur: hoc Galeanus frigore inhorrentibus præparabat. In quibus autem bilis, inquit, abundat, absque pipere & zingibere conficitur.

Meloplacuntii præparatio.

Pomorum cotoneorum mundatorum librae sex, in uino elixantur, donec contabescant: deinde exempta conteruntur.

Nonnulli uero affundunt mellis libras octo, et debili igne decoquunt, mouentes subinde ferula, donec impollutum quodammodo totum, ne manus inquinet, euaserit, tum adijciunt contusi piperis quadrantem, anisi tantundem, petroselini unciam. Quidam etiam zingiberis unciam, & mastiches unciam adijciunt: mox commixta finguntur ad semunciae quantitatem, & cum folijs lauri componuntur.

Cydonatum, contusum, fragmentis integris.

Malorum cydoniorum purgatorum, frustulatim concisorum librae octo, in uini sextarijs octo moderatè, ne dissoluantur, decoquuntur: deinde miscentur ipsis mellis despumati librae octo, piperis bes. petroselini, anisi, singulorum unciae tres, zingiberis unciae quinq;, spicae nardi uncia una & dimidia, cariophyllorum uncia. Omnia contusa, & mediocriter decocta ad iuris esculenti crassitudinem, remouentur, & refria-

Tt 5 gerata

gerata pariter cum iure fragmenta componuntur.

E tribus piperum generibus medicamentum.

Piperis communis candidi & longi, singulorum drach. septē, zingiberis, anisi, thymi comæ, cuiusq; drach. dua, mellis quod satis est. Aliud Oribasij: Piperis candidi sextans, piperis nigri & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, seseleos, dauci, petroselini, singulorū uncia, zingiberis drach. quatuor, mellis libræ tres. Aliud: Piperis communis quadrās. piperis albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi, uel cassiæ duplum, zingiberis, uniuscuiusq; uncia, mellis uncia una & uiginti, uel quantū satis est. Ego uerò etiam thymi corymborū unciam admiscere solitus sum.

Diospolites.

Cymini aceto macerati ac torridi unciam, piperis, zingiberis, singulorum sextantem, rutæ uiridis fescunciam, nitri drach. duas cum dimidia, melle excipito.

Ex malo medico, pro his qui ægre concoquunt.

Aceti hemina tres, carnis citriy libra, hyssopi, rutæ, origani, singulorum fasciculus, per diem ac noctem aceto macerata, quousq; euanescat pars tertia, decoquuntur, expressaq; abijciuntur, aceto affunditur mellis sextarius, denuoq; ad mellis crassitudinem decoquuntur: ubi autem constiterint, inferruntur asari, mei, piperis albi, singul. sextantes duo. Datur cochleare manè, & lectum petenti.

Picra, id est amara, Galeni.

Aloes drach. centum, ligni balsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorū drach. sex. Sunt qui etiam iunci rotundi odorati floris, & cassiæ, uniuscuiusque denarios sex admisceant. Exhibe drach. in hydromelite.

Picra ex oxymelite, ad stomachicos, locellos, & aquam inter cutem efficax.

Aloes triens, folij sextans, costli, cassiæ, amomi, ireos, singulorum drach. radicis corticis fœniculi libra, mastiches, nardi Cellicæ, zingiberis, uniuscuiusq; drach. piperis drach. ma,

ma, mei drach. aceti sesquifextarius, mellis tantundem. Fœ-
niculum decoctū prius in aceto proyicitur, deinde infunditur
mel: & ubi decoctum fuerit ad crassitudinem melleam, reli-
qua laeuigata insparguntur.

Medicamentum ex lupino iocinore optimum.

Gentianæ, chamæpityos, petroselini, marrubij succi, ar-
cij, sinapis, scolopēdrij, panacis radicis, minij, rubiæ, seminis
brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi,
seminis cruceæ, radicis cringij, polij, echij, eupatorij, bacca-
rum iuniperi, lupini hepatis, enulæ campanæ, & quas portio-
nes melle decocto excipe. Exhibitio est auellana quantitas
cum mulso discocto.

Theodoretus ex anacardiis.

Anacardiorum fescuncia, croci, cassiæ, folij, spicæ nardi,
caryophylli, mei, agarici, rotundi odorati iunci florū, rheu,
epithymi, singulorum drach. quatuor, acori, piperis, unius-
cuiusq; sesquiunciā, aloes quadrans sarxiphagæ, mastiches,
iridis Illyricæ, cuiuslibet fescuncia, myrobalanorum uncia,
mellis libræ sex, uel quod satis est.

Theodoretus aliter apparata, absq; anacardiis.

Aloes drach. sexaginta, agarici uingintiquatuor, croci,
cassiæ, rheu pontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulo-
rum drach. decem, costi, seminis rutæ, piperis albi, uniuscu-
iusq; drach. octo, spicæ nardi drach. tres, ligni balsami, asari,
trixaginis, mei, uniuscuiusq; drach. quatuor, mellis quod sa-
tis est. Quidam his etiam anacardia duo adijciunt. Dosis dra-
chmæ duæ cum mulsa.

Cyphoides iocinerofos & thoracis uitia emendans.

Vuæ passivæ carnis drach. uingintiquinq; croci drach. ca-
lami drach. duæ, bdellij drach. duæ semis, cassiæ denarius u-
nus & dimidius, cinnamomi triobolus, nardi triobolus, len-
tisci drach. duæ, myrrhæ drach. quatuor, terebinthinæ tan-
tundem, ramenti aspalathi oboli duodecim, mellis drachmæ
sedecim, uini quantum satis est.

Aliud

Aliud cyphoides Alexandri.

Habet croci, cinnamomi, bdellij, singulorum drach. quatuor, myrrhæ, calami, uniuscuiusq; drach. duas, bituminis, florum rotundi iunci odorati, cuiuslibet drach. treis, cassiæ, nardi, singulorū drach. resinæ terebinthinæ drach. sedecim, uuæ passæ carnis drach. centum sexaginta, mellis sesquibemina, uini Chij quod satis est.

Diabacanu hepaticum.

Bacani uncia, costi uncia, folij scrupuli octo, piperis albi scrupuli sex, spiciæ nardi tantundem, mellis quantum sufficit. Datur cochliarium cum temperatura conditi.

Zopyrus antidotus.

Myrrhæ drach. quinque, croci, cassiæ, singulorum drach. quatuor, cinnamomi drach. tres, spiciæ nardi drach. duæ, rotundi iunci odorati floris drachmæ duæ, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drach. mellis quod sufficit.

Pæonia antidotus, manus medicatrix.

Styracis calamitæ drach. sex, thuris, amomi, croci, singulorum sesquidrachma, spiciæ nardi drach. sex, phylli drach. duæ, piperis candidi drach. sex, & communis drach. octo, myrrhæ, costi, singulorum uncia, mellis quantum opus est.

Dosithei catapotia, iecori accommodata.

Aloes uncia, spiciæ nardi, folij, costi, singulorum graminata duo, agarici octo, mastiches tredecim, epithymi quatuor, rbeu scrupulum.

Oxymel splenicum, hoc est, ad lienem efficac.

Concinnatur ex cortice radicum capparis, scolopendrij, spiciæ nardi, asari, iridis, florum iunci odorati, florum iunci quadrati, anisi, cymini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorum uncia, foliorum myricæ, foliorum salicis, apij radices, arboris thuris, scillæ, uniuscuiusq; sextante, aceti, mellis, singulorum sextarijs tribus, ammoniaci thymiamatis. Præparabis ad modum scillitici. Offer cochliaria duo.

Oxymel

Oxymel laborantibus calculo dicatum.

Saxifragæ, betonica, graminis, adianti, spicæ nardi, carpesiæ, asari, eringij, singulorum uncia, petroselini Macedonici, seminis rutæ, uniuscuiusq; uncia semis, fœniculi uiridis, iridis, scillæ assatæ, chamædaphnes, cuiuslibet sextans, corticis radicis capparis quadrans, siorum sextans, aquæ, accoti, mellis, singulorum sextarij bini.

Phusca lapides confringens.

Pulegi, mastiches, apij seminis, mētæ aridæ, singulorū uncia, salis cōmunis torridi lib. 1. seminis coriandri, spicæ nardi, anisi, ammeos, uniuscuiusq; scrupuli sex, phylli scrupuli quatuor, piperis candidi uncia semis, uel communis uncia, lithospermatis selibra, betonica tantundē, aceti præstantis sextarij quinq; omnia cōtusa & cribellata, & in lauorem trita, per triduū aceto macerata, dies quadraginta insolato. Quum uerò usus postularit, in decoctū ciceris nigri, & radicis asparagi, apij item & adianti binas aceti heminas infunde, & in calido balnei alueolo laboranti potui dato. Quidam medicamentū ex prædictis speciebus aridi diobolos duodecim cum posca memoratarum herbarum decocto temperata exhibuerunt, nec quicquam minus proficit pharmacum.

Conditum calculos atterens.

Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonica, singulorum uncia, petroselini, phylli, uniuscuiusq; sescuncia, seminis rutæ syluestris semuncia, mellis sextarius, uini ascalonitis sextarij sedecim.

Medicamentum ex sanguine hircino.

Quādo uuæ præ maturitate nigrore suffundi cœperint, hirci ætate florentis sanguinem colligito, & in sole exiccatum, calculo laborantibus, pondo cochliarij cum passo Cretico præbeto. Sunt uerò qui amomi & phylli singulorū quadrantem cōmisceant: alij myrrhæ etiam scrupulos quatuor.

Medicamentum ex cicadis, renum doloribus expediens.

Lithospermi, raphidis piscis cremati, sefeteos, uniuscuiusq; unciam,

unciam, ameos, cucumeris satiui seminis, saxifragæ, uuarum
passarū acinis exemptis, seminis althææ, phaseoli candidi,
lyncurij, singulorū unciam dimidiam, spicæ nardi, phu, mei,
lapidum ex spongys, cuiuslibet drach. adianti, seminis pali-
uri interanci, siorum aridorum, radicis rubi, graminis, poly-
podij, uniuscuiusq; drach. treis, sanguinis hircini exiccati, ut
dictum est, diobolos sex, cicadarum aridarum, amputatis &
abieclis capite, alis, & pedibus, uncia quatuor, piperis albi
drach. sex, mellis decocti quod satis est. Datur nucis auella-
næ quātitas in condito, uel decocto tribuli, uel saxifragæ, uel
sinorū, uel radicis asparagorum, uel graminis, aut quinque-
folij, aut radicis herbæ lanariæ.

Ex milio folis.

Lithospermi, betonica, saxifragæ, petroselini, piperis albi,
pares singulorum modi cum melle excipiuntur.

Medicamentum ex semine marrubino.

Piperis albi & atri, dauci Cretici, seminis cucumeris do-
mestici, seminis sceniculi, marruby seminis, petroselini Ma-
cedonici, pyrethri, zingiberis, phylli, singulorum uncia, mel-
lis quantum sufficit.

Ex lapide Iudaico.

Spicæ nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, uniuscuiusq; scrup.
ocho, piperis scrup. duodecim, zingiberis, petroselini, costi,
saxifragæ, singulorū scrup. sex, cassiæ, seminis apij, cuiusli-
bet tres, cyperi sex, scobis eboris quatuor, ligni cardamomi
scrup. sex, seminis lini scrup. quatuor, mellis quod sufficit.

Medicamentum ex sylvestris maluæ semine.

Seminis cucumeris hortulani drach. duodecim, seminis her-
bæ Apollinaris drach. sex, seminis cicutæ drach. tres (ali-
uerò sex) opij, sceniculi, maluæ sylvestris seminis, croci, cuius-
libet drach. treis, seminis apij drach. sex, cassiæ drach. qua-
tuor, amygdala basilica decē, nucis auellanas decem, asari
drach. quatuor, passō Cretico excipe, & triobolū exhibe fe-
bre

lyccarētibus, cum defruto. sunt qui melle excipere malint.

Ex bellariis renum doloribus dicatum, & ad uescicæ renumque exulcerationem conducibile.

Vuae passæ candidæ exemptis acinis, nucleorum pinco-
rum recentium, uniuscuiusq; sextās, seminis cucumeris excor-
ticati, myrtorum exosium, amygdalorum amarorum, palmu-
larum pinguium, seminis apij, seminis papaueris, croci, sin-
gulorum drachma, myrrhæ sextans. Ieiuno denarium ex
passo propinato.

Satyriaca antidotus.

Zingiberis, satyrj superioris, singulorum drach. octo,
caudæ crocodili terrestris (quæ Græci scingū appellāt) mei,
asari, petroselini, cardamomi, seseleos, uniuscuiusq; drach.
quatuor, seminis erucæ, cinnamomi, cuiuslibet drach. tres,
ormini, piperis albi, seminis cnici, uniuscuiusq; drach. duæ.
florum rotundi odorati iunci, spicæ nardi, singulorum drach.
sanguinis hirci mystrium. Drachma imbecillioribus cum lac-
te offeratur.

Globuli ex l. gno maceris, intestinorum torminibus utiles.

Xylomace ris, opij, rhei, uniuscuiusq; scrupulos sex, gala-
læ, myrrhæ, singulorum uncia, uino spathite excipito.

Ex corallio ad podagram.

Habet rheu barbarici, prœniæ, myrrhæ troglodyticæ, spicæ
nardi, singulorum uncias duas, phylli unciam, caryophyl-
lorum grana quindecim, anagallidis florem rhusion, puni-
ceum' ue habētis, quam coralliū nuncupant, semunciam, mali
terræ longi & rotundi, cuiuslibet trientē. Dosis est diobolus
quotidie post bonā cibi concessionē. Auspicandū autē est à sol-
stitio autūnali, quod est circa uigesimūquartū diē mensis Se-
ptembris, atq; dieb. deinceps quinquaginta accipito: & un-
deuiginti intercalatis diebus, ad eandē te antidotū conuerte,
atq; ita donec dies quib. accipis, trecenti sexagintaquinq; im-
pleantur, peragito. Sub cane aut omnes dies uacuato, hoc est
à uigesimoquarto diē Iunij, usq; ad Augustum completum.

A ue-

A' uenere porro, & carnibus, maximè procinis, et falfamento, garoq; & beta, dauco, menta, lactucis crudis, & peponibus abstinendum est. Ex piscibus uerò, capitonibus, seu gomphis, commaris, molli & testacea cute præditis, atq; à leguminibus cunctis, & omnibus, ut summam perstringam, quæ crassum humorem generant. Vino itidè secundario, nigroq; & multo. Lauandū quotidie, & exercitationibus indulgendum, uel pedibus, uel equo, uel lectica, uehiculoue. Ceterum qui habitu sunt aridior, & uberiore uictus ratione utuntur, nullo incommodo afficiuntur.

Antidotus Agapeti podagrica.

Folij, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytica, costi, trixaginis, singulorum sextans, aloes hepaticæ quincunx, hyperici, pæoniæ, uniuscuiusq; quadrans, mali terræ longi, pbu, mei damasonij, anagallidis, cuiusq; triens. Modus autem utendi idem omnino est cum Diacorallio.

Antidotus Atactos podagrica.

Folij, mei damasonij, anagallidis cyaneum florem habentis, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ, aloes hepatidis, gentianæ, trixaginis, singulæ uncia, caryophyllorum, asari, piperis albi & atri, singulorum uncia semis, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, radicis pæoniæ, mali terræ longi, & rotundi, cuiuslibet uncias duas. Vsurpatio eius superioribus similis est.

Procli podagræ, coxendicis doloribus efficax compositio.

Trixaginis dodrans, cētaurij bes, aristolochiæ septunx, gentianæ scilibra, hyperici quincunx, petroselini Macedonici triens, mei quadrans, agarici sextans, pbu uncia, mellis Attici heminae duæ.

Medicamen ex septem concinnatum rebus, ad eadem.

Hyperici, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, centaury, chamæpityos, agarici, uniuscuiusq; quadrans, trixaginis uncia sex, gentianæ quincunx. Nonnulli petroselini quoque unciam inferunt, mellis denarios quinq;. Exhibetur drach.

De

Pastillos Græci ab efformationis figura trochiscos, id est orbiculos appellant. Sunt autem pastillorum genera tria. Alij nanq; potimi, hoc est potabiles: alij enitici, id est infusiles, qui per anũ immittuntur: alij catachisti, quod est inungibiles. Potabiliũ itaq; alij retētiui, eo quod alui, uel sanguinis, uel alius quascũq; fluxiones refrigerādo, uel astringēdo, uel infarciēdo, aut desiccādo cōpescant: cuius farinae sunt, pastillus ex spina Aegyptia effigiatus, et ex seminib. concinnatus, atq; id genus. Alij dolorē sedāt, uel quod sensum stupefaciēdo torporē inducāt, ueluti Crocodes: uel quod humores dissipāt, cuius generis sunt qui ex aromatis conficiuntur. Quidam ab meatuũ oppilationibus iecur, lienē, & renes uindicant: ē quorum classe sunt, qui ex amygdalis amaris formantur. Ex his aut quæ in aluum infunduntur, aliqui acrimenias obtundunt, ueluti in torminib. intestinorũ: cuiusmodi sunt ex pompholygē, amylo, et terra samia, cum cremore ptisanæ, uel eiusmodi aliquo per clysterē immiſsi. Aliqui uerò astringendi facultate præditi, uētris et sanguinis fluxiōes sistūt, ueluti qui alumine, acacia, & omphacio cōstant: uerbi causa, pastillus Philippi, uel ex acātha Aegyptia cū succo rosarũ, uel plantagine infusi. Aliqui deurēdi uim obtinent, quorũ usus in torminib. intestinorum, quæ hūlcera depascentia experta sunt, probatur, ex sandaracha, auripigmento, calce, charta cōbusta cōpositi. Cū succo uerò lentium aut oryzæ, ablutis prius muria intestinis, immittātur, ubi alimentũ antea potũq; languētes sumpserint, quo nihil uirium medicamenti ad stomachum rapiatur. Conducunt autem hi qui aluo induntur pastilli, potissimum affectionibus, quæ circa sumen sub umbilico ingruunt: superius enim uires ipsorum non perueniunt. Qui uerò illinuntur, uiribus illis, qui infunduntur, respondent. Caterũ siptici, in herpetibus, exanthematibus, intertriginibus, sanguinis eruptiōe, ac fluidis hūlceribus, conferūt: ē quorum numero est, Andro

V u nis &

nis & Polydæ. Qui uerò hebetant, carbunculis, et maleficis
hulceribus competunt, ueluti Leucus appellatus & dialota-
rion. Adurentes autem orbiculi, perinde atque prædicti (cuius-
iusmodi censentur & phauſtiani) medendis serpentibus, ue-
rendorum, sedisq; hulceribus, pterygijs item, & carnosis na-
rium uitijs expediunt.

Pastillus aster.

Croci, opij, castorij, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, Lemnij
sigilli, corticis mandragoræ, singulorum trientem, dauci, a-
pij, anisi, seseleos, seminis alterci, styracis, uniuscuiusque uno
ciam: uino læuigabis.

Pastillus Trigonus.

Seminis apij, seminis herbæ Apollinaris, uniuscuiusque
drach. duæ, anisi drach. 4. opij drach. tres, aqua diluuntur.

Pastillus ex seminibus.

Seminis anisi, ammeos, fœniculi, singulorum drach. qua-
tuor, seminis apij, opij, seminis hyoscyami, uniuscuiusque dra-
ch. duæ, aqua teruntur.

Pastillus crocoides, id est croceus.

Anisi, dauci cretici seminis, uniuscuiusq; drach. quatuor,
myrrhæ, castorij, singulorum drach. duæ, croci, opij, cuiusli-
bet drach. tres, seminis apij, styracis, uniuscuiusq; drach. qua-
tuor, seminis alterci drach. sex aqua conteruntur.

Pastillus diarhodos.

Acaciæ, cômecos, rosarum floris, balauſtiorij, hypocistidis
succij, gallarum, uniuscuiusq; drach. tres, succi rosarum uiri-
diū, seminis plantaginis, cuiuslibet drach. lxxij Indici drach.

Pastillus diacoralliu, id est ex corallio.

Seminis alterci, thuris, singulorum drach. oſto, terræ
samiæ, corallij, rubricæ sinopidis, opij, uniuscuiusque drach.
quatuor, amyli, balauſtiorum, cuiuslibet drach. duæ, succo po-
lygoni excipiuntur.

Pastillus ex electro.

Herbæ pulicaris quincunx, mastiches triens, scobis suc-
ci, iridis, croci, singulorum triens, opij sextans.

Pastillus

Pastillus ex spina Aegyptia.

Spinæ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis fissi, succi hypocistidis, gallæ. Lemnii sigilli, corallii, consolidæ, Samii asteris, aloes, ladani, singulorum partes æquales uino excipiuntur.

Pastillus alius, quem Galenus Aphrodisiasticon clidion inscripsit.

Florum punicæ satiuæ, spinæ Aegyptiæ, florum punicæ agrestis, succi hypocistidis, acaciæ, singulorum drach. sex, lycij, rhu pontici, opij, uniuscuiusque drach. quatuor, myrrhæ drach. duæ, uino ex baccis myrti, uel rosarum, aut myrtorum iure assumuntur.

Clidium Oribasii dysentericum & coeliacum.

Gallæ omphacitidis drach. octo, opij drachmæ quatuor, aqua in pilulas effingito, & deglutiendum treis aut quatuor exhibeto.

Pastillus e cornu cerui, dysenteria & sanguinis excretionem laborantibus accommodatus.

Cochlearum drach. duodecim, cornu ceruini deuisti, gallæ exiccatae, acaciæ arefactæ, uniuscuiusque drach. quinq; obo li duodecim, myrtorum nigrorum drach. quindecim, opij torrefacti, hypocistidis succi, singulorum drach. quinq; florum labruscæ drach. sex, succi radicis mandragoræ, terræ asteris, cuiuslibet drach. duodecim, rhu obsoniorum drach. quatuordecim, maliciorum exiccatorum drach. septem, thuris drachmæ octo, corticis pini arefacti drach. quatuordecim, herbæ Apollinaris tosti drach. decem, rhus coriarij sextarij duo, uini nigri quantum ad elixandum rhum, ut crassissimum reddatur uinum, satis est: quo percolato, cætera excepta, in pastillos digeruntur.

Pastillus Amazonum.

Seminis apij, anisi, uniuscuiusque drach. sex, comæ absinthij drach. quatuor, myrrhæ, piperis, opij, castorij, singulorum drachmas duas, cinnamomi drach. sex, aqua excipito.

V. 11 2

Pastillus

Pastillus ex amygdalis amaris.

Anisi, seminis apy, asari, amygdalorum amarorum, absinthij comæ, æqualia pondera cum aqua coguntur, in pastillos, drach. unius. exhibetur non febrientibus cum œnomelite, febri citantibus uerò cum hydromelite.

Pastillus ex erica, ad lienem.

Erices fructus drach. quatuor, piperis albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis. singulorum drach. duæ, guta ammoniacæ aceto dissoluitur, et aridis iniicitur. Effiguntur pastilli, qui singuli denarium pendeant. Dosis orbiculus, cum oxymelitis cyatho.

Pastillus, ex uescagine.

Seminis cucumeris satiui pelle exuti triens, seminis alteri, cicutæ, singulorum sextans, fœniculi, seminis rumicis, croci, nucleorum pineorum, amygdalorum amarorum, opij, uniuscuiusq; uncia, uescaginis sextarii tres, uini quantum opus est.

Pastillus Philippi dysentericis dicatus.

Balaustiorum, acaciæ, hypocistidis succi, opij, rhu, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes, rheu pōici, malicoriorum, myrtorum, uniuscuiusque drachmas quatuor, uino austero subigito, et orbiculos triobolares compingitio. Dato autem febre uacantibus cum uino, febrientibus cum hydromelite.

Pastillus Musæ.

Aluminis, aloes, myrrhæ, atramenti sutorij, uniuscuiusq; uncia una et semis, malicoriorum, croci, crocomagmatis, cuiusq; drach. sex uino excipiuntur.

Apparatus crocomagmatis.

Croci uncia duæ, rosarum, amyli, myrrhæ, aloes, thuris, gummi, uniuscuiusque uncia una: costi, spicæ nardi, singulorum drachma una, uino excipiuntur. De crocino oleo etiā altera crocomagmatis dicetur concinnatio.

Neri pastillus, ex collectaneis Heræ.

Myrrhæ, aloes, croci, uniuscuiusq; drach. octo, aluminis fibilis drach. centum, aqua subiguntur.

Polyide

Polyidæ Sphragis.

Aluminis fisci drach. quatuor, myrrhæ drach. octo, atramenti sutorij drach. duas, florum punice sativæ drach. duodecim, fellis taurini drach. sex, uel, ut alijs placet, drach. sedecim, aloës uncia, uino astringente excipito.

Pastillus Pasionis.

Squamæ æris denarium pondo duodecim, æris tosti, aloës, guttæ ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasilis, thuris, uniuscuiusq; denarium pondo octo, uini quantum satis est.

Pastillus Andronius.

Florum mali punici hortensis denarij decem, myrrhæ denarij quatuor, gallarum denarij octo, mali terræ rotundi denarij quatuor, atramenti sutorij, croci, aluminis fisci, crocomagmatis, mysios, thuris, cuiusque denarij duo, uino austero, acetone diluuntur.

Pastillus Phlaustini.

Auripigmenti denarij duodecim, sandaraches denarios sex, calcis aqua non extinctæ octo, chartæ crematæ denarium, succo myrtilorum uel decocto excepta digere in pastillos, et per anum cum decocto baccarum myrti, lenticularum, & rubi radicem immitte.

Pastillus e charta.

Chartæ combustæ libras duas, calcis, auripigmenti, sandaraches, uniuscuiusq; unciam succo plantaginis excipito.

Thronus Marcellius.

Chartæ crematæ denarij decem, sandaraches, auripigmenti, squamæ æris, aluminis fisci, cuiusque denarij quatuor, florum punice sylvestris denarij treis, opij duo, calcis uiuæ uiginti, omphacij denarius, succi hypocistidis treis, uino ex myrti baccis excepta in orbiculos drach. quatuor pondere æquantes rediguntur, & in uino malicorio, myrti baccis, & rosis usque ad tertias elixatis, exhibetur in uini cyathis sex pastillus unus, uel summatim quatuor.

Pastillus ex subere.

Gallarum crematarum, chartæ combustæ, fecis uini deu

V u i sta,

stæ, & panis deniq; tosti singulorum denarios decem. In alia etiam cornus ceruini usti denarios quindecim, habetur: auri-pigmenti denarios duos, sandaraches, calcis uniuscuiusq; denarios quindecim, acaciæ, cerussæ, cuiuslibet denarios quinque, spumæ argenti denarios treis, uino subigito.

Pastillus cognomento Bithynus.

Maliciorum denary decem, cadmiæ quadrans, maliteria, gallarum, panacis radices, ireos, atramenti sutorij, aluminis fisci, chalcitidis, misyos, squamæ aris, mannæ (nonnulli adijciunt etiam costi) cuiusq; fescuncia, aceto leuigantur.

Pastillus ad hulcera, nomas, & fluxiones.

Croci, aloes, thuris, singulorum uncia, cytinorum, aluminis fisci, castorij, mannæ, & ruginis rasæ, cuiusq; uncia, rubricæ sinopidis libra, uino ueteri excipiuntur.

Pastillus alius, ex febris testiculis colicis dicatus.

Myrrhæ, castorij, cuiuslibet dioboli sex, croci, opij, singulorum scrupuli nouē, anisi, seminis apij, dauci seminis, uniuscuiusq; uncia semis, alterci seminis, scrupuli duodeuiginti.

Pastillus ex uino & oleo, ano & pudendis dedicatus.

Cerussæ dextans, spumæ argenti quincunx, thuris, stercoris plumbi, aluminis fisci, singulorum sextans, uino marina exorte subiguntur. Cæterum quum usus exiget, ænorhodino, hoc est uino rosaceo, uel uino myrtino diluuntur.

Pastillus ex lapide phrygio, pro his qui genitalibus afficiuntur.

Lapidis phrygis combusti, & extincti ter, primum butyro, uel rosaceo, deinde uino, tertio melle, sextans rosarum floris triens, corticum mali granati uncia.

Pastillus ex loro syluestri, sedi atq; uerendis consecratus.

Cerussæ, amyli, glauci, croci, aluminis, & quales portiones, succo loti syluestris, uino uel diluuntur.

Pastillus leucus.

Terræ asteris uncias quatuor, bullæ (quam Græci pompholyga

pholyga dicunt) cerussæ, amyli, uniuscuiusq; unc. duas, opij diobolos quatuor, aqua conterere.

Pastillus ex uescicaria.

Spumæ argenti denarij uigintiquatuor, cerussæ duodecim uel uigintiunus, alicacabi radice denarij octo, atramenti sutory denarij quatuor, aluminis fissi tantundem, rubricæ quantum ad colorem inducendum sufficit, aqua subiguntur.

Pastillus ex utroque ueratro, & idem ex duplici acacia.

Acaciæ nigra & rubra, glutini fabrilis, aliàs ichthyo collæ, singulorum triens: ammoniaci thymiamatis, glaucij, aloes, cuiusque sextans, thuris masculi, ueratri nigri, & candidi, uniuscuiusque uncia, aceto scillitico excipiuntur. Quum utendum erit, eodem uel communi dissoluta, sub balneum, & à balneo rursum illinuntur.

Pastillus Criogenes.

Myrrha, æris cremati, aristolochiæ rotundæ, æruginis rase, squamæ stomomatis, uerbenacæ rectæ, aluminis rotundi, cuiusque uncia, aceti quantum satis est. Decerpere autem oportet uerbenacam, quum sol fuerit in ariete. Formatur autem in emplastrum etiam hoc modo. Pastilli huius, ceræ, colophonice, olei pares modi, aceti quantum ad eliquandum pastillum satis est.

Pastillus melanchlorus, hoc est niger ac uiridis.

Myrrha, aloes, squamæ æris cremati, auripigmenti, aluminis fissilis & rotundi, ireos, chalcitidis, misyos, salis fossi, chalcanti, cerussæ, nitri, spumæ argenti, panacis radice, cadmiæ, malicoriorum, gallarum, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rase, uniuscuiusque uncias, aceti quantum res postulat. Pangitur item emplastrum ad hunc modum: Pastilli sextans, colophonice, ceræ, olei, singulorum selibra, aceti quantum ad pastilli subactionem sufficit.

Pantolmios, ad chironia & maligna ulcera, et rheumata:

Cassia, æris cremati, cerussæ spumæ argenti, ferruginis rasilis, aluminis fissi, rotundi, liquidi, et plethytidos, id est laterij,

Vu 4 panacis

panacis radicis, aristolochiæ longæ et rotundæ, malicoriorū,
atramenti sutorij, portulacæ, iridis, astragalitidis, misyos,
ammoniæ thymiamatis, salis ammoniaci. squamæ æris, aloës,
diphrygis, thuris, gallarum, sarcocollæ, plumbi deusti,
foliorum oleæ, socos, myrrhæ, atramenti metallici liquidi,
balaustiorum, spinæ Aegyptiæ, sulphuris ignem non exper
ti, nitri, rhu rubei, rhu Syriaci, chrysocollæ, aluminis, rhu co
rariæ, acaciæ, salis spumæ, omphacij, auripigmenti, & quæ
portiones: sub ardentissimo Caniculæ æstu, aceto per dies tri
ginta macerantur.

Pastillus Nymphodoti.

Spumæ nitri uncia, nitri Alexandrini, saponis Gallici,
uniuscuiusq; uncia, salis Cappadocici, mastiches, gallarum,
cuiuslibet denarios quatuor, foliorum rosarum, amomi, amy
li, cuiusq; uncia, folij denarius, fissilis aluminis, costi, singu
lorum denary duo, uini ex baccis myrti quantum satis est.

Pastillus e thapsia hemicranicus.

Liquoris thapsiæ denary sedecim, myrrhæ denarij octo,
opopanacis, euphorbij, singulorū denarij sex, nitri, succi par
thenici, cuiusque denary quatuor, piperis, sagapeni, uniuscui
usque denary duo, aceti quod satis est. Quum autem usus est,
aceto illitos post horis sex abluito. uerū si uoles remissione
uti, cerato pari exceptū illinito, atq; per die ac nocte finito.

Hypothum ad dysenteriam & ani dolores.

Terræ asteris, amyli, singulorum uuncias treis, croci un
cias duas, acaciæ, tragacanthæ, uniuscuiusque unciam, ca
storij, thuris, lycij, cuiuslibet semunciam: in natura calidiori
bus etiam opij unciam dimidiatam, succo pulicariæ excipi
to, & in longum effigiato.

De pulueribus & smegmatis, Cap. 13.

Ridorum medicaminū, quæ & cataplasmata uocantur.
Alia quidē hulcerib. conueniūt, alia uerō cuti admouētur:
et quæ hulcerib. cōpetunt, quædam cavitates carne replent,
quædam

quædam uerò tumentia supprimunt, & excreſcentias car-
 nium reprimunt: quædam cicatricem inducunt: quædam de-
 urunt & exedunt, & quædam ſanguinẽ comprimunt. Quæ
 igitur cauis carnem inducunt, uel ſordida expurgando, car-
 nem generant, ueluti quæ ex cruo componuntur, & ariſtolo-
 chia, iride, panace, myrrha, thure, aloẽ: aut circumfluam hu-
 miditatem exiccando, quemadmodũ quæ ex ære, diphryge,
 ſquama, charta combuſta, cortice pinus, acantha conficiun-
 tur (eadem uerò ipſa cicatricem quoq; inducunt) aut acredi-
 nes & eroſiones hebetando: uerbi cauſa, quæ ex pompholy-
 ge, amylo, ceruſſa, fece toſta, lapide ſpeculari, oſtreis crema-
 tis, terra Samia, & id genus, & quæ ex his compoſitorũ ha-
 bent potentias. Ex his quæ ſupprimendi excreſcentias uim
 obtine nt, mitiora quidem cenſentur ex ſquama æris, miſſyos,
 chalcitide toſtis, & galla concinnata. Valentiora ſunt, quæ
 ex atramento ſutorio, ærugine, miſſyos, chalcitide, non deu-
 ſtis componuntur. Quæ autem deurendi & exedendi facul-
 tate ſunt prædita, ex calce, auripigmento, ſandaracha, ſphe-
 cle, quæ eſt ſex uini, crematis conſtant. Cæterũ hæc om-
 nia in minutiſſimum puluerem friata, hulceribus inſperſa, mi-
 nus mordacia ſunt. Craſſarum contrà partium & ſpiſſio-
 ra, acrius mordicant. Quæ ſanguinem coercent, uel aſtrine-
 gendo, uel refrigerando, uel ſiccando, obſtruendo uel, aut de-
 urendo, & cruſtam inducendo, comprimunt, quorum mate-
 riam ſermone de Paſtillis docuimus. Sed eorum quæ cuti ad-
 hibentur, aliqua ſanè detergant & exterunt: cuius farine
 ſunt, ex creta cimolia, pumice, ſiliqua fermenti, bordeo, pe-
 ponum carne, flore ſalis conſlata. Aliqua uerò attenuant &
 diſſipant, quemadmodum ea quæ ex ueratro, alcyonio, ſul-
 phure, uua paſſa ſylueſtri, ſinapi, pyrethro, ſemine roris ma-
 rini, lemnia terra, ſepiæ teſta. Quibus ſi calx adijciatur, &
 auripigmentum cum aliquo liquore, pſilotica redduntur, &
 ſmegmata ſiunt. Quædam capiti applicantur, quo fluxum

ex eo manantem arefaciant: cuiusmodi sunt è nitro, sale, gal-
lis, malicorijs, & id genus alijs contexta. Smegmata postre-
mò omnia cuti sunt non illitæ accommodanda.

Pulvis capiti conueniens.

Brui uncia quinque, iridis, mannae, aristolochiae, squamae
æris, uniuscuiusque uncia una cum dimidia. Alius: Corticis pi-
ni denarij sex, thuris denarij quatuor, pumicis tantundem, iri-
dis denarij duo, resinae aridae denarij sex, aristolochiae dena-
rij duo.

Ex aloë.

Aloes denarij sex, erui denarij octo, mannae thuris qua-
tuor, gallae treis, aluminis fissi denarij duo.

Ex fece uini cremata Manethonis.

Cadmia combusta atque elotæ uncia, terræ asteris uncia,
fecis uini cremati triens, lapidis specularis tantundem, thu-
ris triens. quidam his amyli quoque trientem adijciunt.

Melitera Oribasii.

Habet chalcitidis, squamæ æris, galbæ, balaustiorum, ce-
ræ, uniuscuiusque uncias treis, aristolochiae unciam, corti-
cum mali Punici, fissilis aluminis, singulorum unciam dimi-
diam.

Ex ostreis.

Recipit cadmia, thuris, cuiuslibet unciam, ostreorū com-
bustorum trientem.

Ex thure.

Spumæ argenti, thuris, squamæ æris, mali Punici, amy-
li, cerussæ, singulorum partes æquales.

Aphroditarium.

Accipit thuris, squamæ æris, rhoidarij, amyli, cerussæ,
æquas portiones.

Rhodia comprimens sanguinem, ad nomas, & carnis
excrecentias conducens.

Gallæ crudæ denarij sex, gallæ crematæ, & uino extin-
ctæ,

Ææ, aridæ denarij duodecim: squamæ æris atræ, sin minus, rubræ denarij octo, atramenti sutorij uigintiquatuor, aluminis fissi denarij uiginti septem, lauiantur dies quot satis est.

Flauum medicamentum.

Chalcitidis crematæ denarij quadraginta, atramenti sutorij tosti denarij octo, misyos combusti denarij decem, æris deusti denarij quinq.

A murino colore dictum medicamentum:

Misyos uncie quinq, gallarum uncie quatuor, chalcitidis uncie duæ, squamæ æris uncie duæ, chalcæthi uncia, ferruginis rasilis uncie duæ.

Medicamentum Heliocaes adurens.

Auripigmenti libram, calcis aqua non extinctæ libras duas, aqua in diebus canicularibus eliquato: deinde, ubi arefeceris, utere.

Antherum.

Sumit cyperi denarios octo, myrrhæ denarios duodecim, sandarachæ denarios treis, floris rosarum denarios duos, croci denarium, crocomagmatis, aluminis fissi, iridis Illyricæ, singulorum denarios duos.

Ad nomas oris potissimum, & naturalium hulcera.

Squamæ æris, chartæ combustæ, uniuscuiusque denarios octo, auripigmenti, sulphuris igne non experti, cuiuslibet denarios duodecim, plumbi deusti denarios sex. Quo medendis humidioribus sepe donibus arido utere. Aridis uerò curandis rosaceo macerabis, interdum etiam melle cum rosaceo.

Dia oxymyrsinis, id est ex myrto syluestri, ad eadem.

Rhus coriarij libra, myrti syluestris foliorum, sandarachæ, uniuscuiusque denarij octo, aridorum foliorum salicis, malicory, cuiuslibet denarij sex, aluminis fissi, chrysocollæ, aloes, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, salis communis, singulorum denarij quatuor.

Aridum

Aridum Massaliotæ.

Nitri, opij, chrysocolle, lapidis Asy, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissilis, diphrygis, æquis portionibus. Arido utere.

Smegma aridum, quod Asclepios appellatur.

Baccarū lauri, nitri Alexandrini, salis fricti, salis Capadocici, ammoniaci thymiamatis, spumæ nitri, pumicis, cuiuslibet libram, ueratri nigri, struthy, pyrethri, sbeccles, (quæ est uini fex) deusta, uua passæ syluestris, napyos, cypri, aluminis scissilis, floris rotundi iunci odorati, ireos, gal larum, cuiuslibet selibram, sampsuchi libram, uiticis seminis, pulegi, lomenti, & farine lupini, singulorum uncias sex. chamæleontis nigri, sulphuris, gummi, thuris, piperis, radice cucumeris agrestis, marruby, cretæ cimolia, pæonia, sepia testæ, fanogræci, folij, costi, cymini, euphorbij, spice nardi, singulorum quadrantem. Cæterum Alexander hæc insuper adhibuit: Salis nitrosi, & Tragesy, cuiusque libram, adarces unciam, aluminis liquidi, nardi Celucæ, cnicici, grani cnidij, graminis aridi, bryonia sicca, uniuscuiusque quadrantem.

Smegma Peponatum.

Thuris, mastiches, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia, tragacanthæ sesquiuncia, succi omphacis uncia nouem, recentis seminis peponis uncia tres, similaginis sextarij quinq; ouorum unius & uiginti albumina, iridis uncia quatuor. Sunt autem qui bellebore nigri uncias quoque duas inserant.

Aliter Critonis.

Lomenti modium, simila sextarios quatuor, trifolij, myrobalani, ireos illyricæ, uniuscuiusque libras quatuor, guttæ ammoniaci thymiamatis, costi, singulorū librā, ouorū tenues albores, peponum carnis sextarios duos, omphacis succi tantundem. Irrigato, & conformans pastillos arefacito, deinde contusis

contusis & attaminatis utere. Aliud: Tragacanthæ, thuris, mastiches, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum denarios decē, succi omphacis, simula, uniuscuiusq; denarios quinq; alboris ouorum unciam, carniū peponum dextantem. Præparato quemadmodum prædictum est.

Smegma caput catarrhofum exiccans.

Habet nitri Alexandrini fului quincuncem, salis communis fricti, salis Cappadocici, singulorū unciam. hæc cōtrita, & acerrimo aceto macerata, in iyce lineo sacculo, et in furno donec redigantur in carbones, comburito: deinde refrigeratis, leuigatisq; extere, cum uino instillans in balneo.

Sapo Constantini.

Rosarum aridarum, aloes, gallarum, malicoriorum, fœniculi, sarcocollæ, uniuscuiusq; quadrans, balauftiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum sextans, saponis Gallici libra: lupinorum decocto excipiuntur.

Puluis depilatorius ad podagram.

Mastiches, thuris masculi, herbæ pedicularis, ueratri albi, spumæ argenti, cuiusq; quadrans, folij, amyli, ueratri nigri, lapidis Asy floris, singulorū uncia, alcyonij, pumicis assati, cretæ cimoliæ, sampsuchi, uniuscuiusq; quadrās, spicæ nardi uncia: aliqui uerò indunt etiam aloes unciam. Aridum contusum in uase asseruatur: quum utendum erit, succus oryzæ & ptisanæ in olliam conijcitur: ubi macerata fuerint, inseritur pulueris fescuncia, saponis Gallici, auripigmenti, aluminis scissi, sandarachæ, uniuscuiusq; sesquiuncia, calcis aqua non extinctæ recentis libra. Utendū unguento ter in mense, nono uidelicet lunæ die, & undeuigesimo, & undetrichesimo usque ad annum. Post hunc semel in mense, luna uigesimumnonum diem agente.

De unctionibus quæ ori inseruiunt, & faucibus. Cap. 14.

Vanto summa oris tunicula cute rarior mollior' que est, Quanto etiam usus stomaticorum medicaminum euariat.

Circa

Circa igitur prima inflammationis rudimenta, pharmacia quæ humoris influxum reperiunt, opus est: cuiusmodi sunt arida quidem, omphacium, galla immatura, succus rhu, hypocistidis, aluminis, piniq; & thuris cortex: & flores mali Punici, & summam omnia quæ citra insuauem & uirulentam facultatem astringendi uim obtinent. Liquida uero, succus mororum batinorū, & eorum quæ sycamina appellantur, uiridiumq; nucum corticis, et malorū granatorum, præsertim acidorum, malorū cotoncorum, mustū & Amineum. Mel autem per initia solum, ut adhæreant medicamenta, admiscetur. Quum autem liquidum constiterit, quæ concoctionem adiuuant, & mediocriter dissipant, admiscenda sunt: cuius generis est crocus, myrrha, & glycyrrhizæ succus. Et uniuerso inter uigorem & decrementum tempore, rectè mixto ex ambobus reperiunt & discutiente utemur: & primò quidem reperiuntia, mox uero distrahentia præpolleant. In uigoris uero remissione solis absque astringentia discutioris utendum est: cuius farinæ sunt nitrū, & spuma eius, origanum, hyssopum, thymus, nepita, iris, besasa, & consimilia. Liquor autem illo tempore sapa esto, tum id quod à musto decocto, tum quod à ficibus aridis, & daſylis conflatur, atq; ipsum etiam mustum dulce cum melle: ubi uero inflammationis quippiam remanserit, sulphuris etiam ignem non experti aliquid admiscendum est. Coquendus autem est ante omnia succus cum melle, ad mellis usq; liquidioris consistentiam: mox arida lauiata inspergantur, deinde tantisper dum omnia in unitatem exactè coeant, moderatè elixentur, ac tum denique medicamentum id in uitrea uasa transfusum adseruetur.

Diamoron simplex.

Mororum succi sextarij tres coquuntur ad tertias, inieſtoq; mellis sextario, denuo ad mellis usq; spissitudinem decoquantur.

Diamoron

Diamoron compositum.

Coquuntur mororū succi heminae sex ad strigmeti crassitudinem, deinde admiscetur contriti croci denarius, myrrhae denarij duo, succi uuae acerbæ denarius, aluminis fissi triobolus, mellis hemina : atque donec crassitudinem induat, decoquantur.

De Batinis moris, id est ex rubis.

Ceterum ex moris quoque batinis diamoron consimiliter praeparatur, et astringentius est.

Diacaryon, id est ex nucibus, simplex.

Nucum uiridium corticis contusi succi heminae quinque, mellis hemina, ad medias decoquantur.

Diacaryon compositum.

Ab initio quidem et in uigore oris inflammationum miscere oportet croci et aluminis, uniuscuiusque denarium, myrrhae denarios duos; in declinatione autem ad dissipandum, nistri denarium, sulphuris tantundem, cum praefata nucum corticis succi et mellis mensura.

Ex sacco mali punici.

Malorum granatorū acinis exemptis dulcium succi sextarios quatuor, malorum Punicorum acidorum succi sextarios duos, mellis sextarium, myrrhae minneae denarios octo, crocomagmatis, gallae, uniuscuiusque denarios octo, aluminis fissi denarios quatuor, ireos illyricae denarios octo, succi uuae acerbæ denarios octo. Praepara quemadmodum Diamoron. Idem aliter: Succi malorum Punicorum dulcium cum testis combustorum sextarios sex, mellis boni sextarium, aluminis fissilis unciam, myrrhae unciam dimidiam.

Ex musto medicamentum.

Musti, sextarij sex, gallae, aluminis fissi, singulorum denarij duo, croci, myrrhae, uniuscuiusque denarius. si quidem mitigare uolueris, mulsum dulce esto : si uero retundere, austerrum: medium uero inter haec quodammodo existit, quod neutrum est.

Aegyptia

Aegyptiori inferuiens.

Mellis libra, olei unciæ octo, resina terebinthina unciæ
duæ, croci denarij quatuor, in cacabo eliquantur.

Ex ruta sylvestri.

Seminis anisi, apij seminis, floris rotundi iunci odorati, se-
minis ammeos, aluminis scissilis, iridis Illyricæ, besasa, quod
nonnulli bermala nuncupant (est autem ruta sylvestris) cina-
namomi, myrrhæ troglodytica, croci, gallæ singulorum un-
cia, aristolochiæ longæ, cassiæ, crocomagmatis, rosarum ari-
darum, cuiusq; uncia, costi, hirundinum cineris recentis, cu-
iuslibet quadrans, nardi Indicæ, anomi, uniuscuiusq; uncia,
mellis quantum sufficit.

Suaves & frugi potiones. Cap. 15.

Dulcium pariter & utilium potionum aliæ quidem ex ui-
no componuntur, missis in ipsam quibusdam speciebus
uerbi causa, pipere, absinthio, casamo, & alyis compluribus,
unde nomenclaturam non nunquam mutant, quandoq; melle
admixto, quandoq; non: aliæ uerò ex aqua, in aqua elixantur
mala, uel rosæ, uel similia quædam, puta, uua immatura, ma-
la granata, myrtorij baccæ. Mel itaq; optimū despumatum,
soliditatis gratia & dulcoris, & quod interdum etiam utile
cōmiscetur, præterquàm quod à Cibyria paruis uasculis im-
portatur, austerum, & uinosum hydromali, quod etiam po-
test sine melle cōficiri quemadmodū è diuerso apomeli ex solo
melle & aqua, citra aliquā alterius essentia miscellam. Quin
ex uino etiam compositaë potiones, quæ & propomata uo-
cant, mellis despumati sextarium, ad uini sextarios quatuor
assumunt, & componuntur, ignem non experta. Quæ uerò
ex aqua & liquore constant, si quidem coquatur, unam mel-
lis partem ad treis liquoris in coctura ad duas fermè partes
consumpti recipiunt. Sin minus, una mellis ad duas liquoris
decoquatur. Quæ autem non elixantur, omnino quantum sa-
tis est insolanda sunt, præsertim omphacomeli. Decoquere
autem

autem congruit potiones ex aqua, quoniam propter imbecillitatem facile alteratur. Omnes porro exiguis testaceis uasis incrustatis reponendæ sunt, accuratè et tuto operculatis in locis apricis, usq; dum decoquantur, collocatis. Attenuantibus autem, & egregiè aqua temperatis utere. Omphacomeli autem, postquam instar musti efferbuerit, & inspissatum cōstiterit, operculato. Quocirca quæ ex uino consistunt, in his qui à febre immunes sunt, maximè utimur, uel solius uoluptatis gratia, nisi ex scammonia, aut grano cnidio, aut id genus purgandi uim habentibus fiant, uel propter istiusmodi affectiones, in quibus aliquis etiam iniecit in illas medicamentis, per os uti queat. His uerò quæ ex aqua aut liquoribus quibusdam confiunt, in febriculis utendum, nunc quidem tanquam dulciarijs, quum morbus languentibus uini usum non permittit, nunc quod affectionibus conueniunt: ueluti apomeli ad sputum agendum, uel ad lotium ciendū, uel uentrem laxandum, uel humorem crassum attenuandum. Hydromalum autem & hydrosatum sitibundis, febre ardente correptis, dissolutis, & stomacho imbecillis. Omphacomeli, myrtites, & mel rosaceum, & rhætes, non celiacis solum, sed & dysentericis, euomentibus, & alijs fluxionū morbis congruunt. His deniq; lauaminibus, subinde in oris affectionibus utimur.

Hydromalum ex succo malorum cotoneorum:

Succi malorum cotoneorum mundorū, contusorum, sextarij duo, mellis sextarij tres, aquæ sextarij sex: coquuntur despumando usq; ad tertias. Aliud: Malorum cydoniorum concisorum purorum libræ quinq;, in aquæ fontis sextarijs decem, tantisper dum subiuga reddantur, decoquuntur: sublata ab igne, refrigerataq; eximuntur, & expresso cremore mala proiciuntur, aquæ mensuræ mellis quantitas dimidia admiscetur: & rursus assidue despumando, donec octaua pars euanescat, decoquuntur. Sunt uerò nonnulli, qui hydromalum ex malis dulcibus consimiliter composuerunt.

xx

Hydrosati

Hydrososati compositio.

Conficitur ex rosarum detractis unguibus libris quatuor,
aqua sextarijs quinq; mellis sextarijs duobus.

Rhodomali præparatio.

Succi pomorum cydoniorum sextarius, rosarum libræ
tres, mellis sextarij tres, aquæ sextarij quinque. Cæterum
quoniam tempore quo rosæ inueniuntur, cotonea reperiri
non possunt, necessarium fuerit easdem tempore suo melle
conditas reseruare, & quàm primum mala apparuerint, uni
uersam compositionem absolvere.

Omphacomelitis confectio.

Vuae acerbæ succi sextarios treis, mellis sextarium, mixta
per quadraginta dies in solem exponito, siue igne decoquito.

Myrteti præparatio.

Succi myrtorum sextarios treis, mellis sextarium, ad con
sumptionem usq; tertie partis decoquito.

Apomeli ex monumentis Philagrii.

Albescentium fauorum melle infartorum libram, aquæ
fontanæ libris tris, cum dimidiata, fauis minutim confræ
ctis, & in unitatem compactis, aquam cum melle decoquito,
donec spuma eius & ueluti cerosum supernatans, particula
tim relinquatur: atque tum refrigerata, summa cura trans
fundito.

Rhodostacti compositio.

Succi rosarum unguibus detractis sextarios duos, mellis
sextarium, decoquito usque despumando, donec pars quarta
coctura euanescat.

Rhoeti præparatio.

Succi mali punici sextarios treis, mellis sextarium: ad ter
tias decoquito.

De collyrijs, & agglutinatorijs: Cap. 16.

Cularium medicamentorum materia diuersi generis est,
Oliquores nanq; & succi, semina, fructus, plantarum par
tes, et metallica ipsis inijciuntur: è quorum numero quædam
acredines mitigant, & ueluti obstruunt & opplent, quem
admodum

admodum pompholyx, cinerula, amylum, plumbum, Samius
 aster, cadmia, omnia abluta, & candidum oui aquatum. Qui
 bus utiq; non nisi capite prius euacuato utendum: nam si id re
 fertum humoribus fuerit, ne distentione oculorū lunica rum
 pantur, periculum est. Quædam his contraria, acri uidelicet
 natura prædita, oppilationes diuturnas laxant, & impacta
 euacuant, ueluti liquores, Cyrenaicus, Medicus, sagapenus,
 euphorbiū, & id genus. Quædam sordida abstergunt hulce
 ra: uerbi causa, squama aris, as, chalcitis, mysi, fori, flos
 aris, et stibi, concremata. Quædam his finitima sunt, quæ ab
 stergētia ab exterendis sordibus uocantur, nepe auripigmen
 tū, sandaracha, lapidis asy flos. Alia astringētia sunt, atq; ex
 his quæ moderatè astringūt, multipliciter ophthalmiis, hul
 ceribus, & fluxionibus auxilio sunt: qualia rosarum folia,
 flores, fructus, spica nardi, foliū, crocus, glauciū, et hypoci
 stis sunt. Quæ uerò stipicitatē potentiorē obtinent, potissi
 mum medicaminibus, quibus oculorum specie acendi prouin
 cia delegata est, inseruntur: de quorum classe sunt omphaciū,
 acacia, balauſtia, cytini, gallæ. Alia uerò concoquendi &
 distrahēdi uim obtinet, ut myrrha, crocus, castorium, lachry
 ma thuris, et scenogræci succus. Ex compositis aut oculorum
 medelis, quædam delinuntur, et simpliciter appellantur alia
 arida collyria, alia liquida collyria: proinde quæ illinuntur,
 omnem prædictam materiam admittunt, & omnibus conue
 niunt affectibus. Præparentur potissimū uere, æstate etenim
 uirtus ipsorū exhalat, & euanescit: hyeme uerò, species rigi
 dæ temperari non possunt. Terantur autem ea humore non
 affatim affuso, ne metallica subsidant, odoramenta aut super
 natent, sed modicè, ut tãquam strigmentū conterantur. Aqua
 uerò cœlestis esto, tum quod tenuiū sit par tium, tum quod me
 diocriter astringat: si quidem uino, aut quopiam succo sint di
 luenda: leuigentur etiam ipsa metallica quidem tempore lon
 go, quæ succo constant breui. Post exactam denique colliqua

tionem gummi adijcito: & ubi informaueris, uasis æreis maximè & uitreis reponito. Datur autem ijs quæ liquore constant protinus uti, metallica uetustate meliora euadunt. Ex aridis porrò collyrijs alia callos, ficationes, pterygia, et scabiem eliquant & exterunt, ex chalcitide, ferrugine, & misyos composita. Alia uerò lachrymas proliciunt, oppulationibus & oculorū hebetudinibus idonea, quæ tum ex his, tum ex pipere et spica nardi conficiuntur. Alia uerò præseruant, arcentq; ab oculis humorum instillationes: qualia sunt, ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloe, cadmia, stibio, & croco: omnia in minutissimum puluisculum trita, applicantur oculis. Liquida uerò collyria quidē ex melle Attico, opobalsamo, oleo tenuium propter uetustatem partium, succo feniculi, fellibus diuersorum animalium, succo Cyrenaico, & alijs quamplurimis præparentur. Opitulantur oculorū hebetudinibus, & inchoantibus suffusionibus, extenuantia, ex calfacientia, & repurgantia præsidia. Vtere his omnibus acribus, capite iam inanito sub dio, aere puro, boreali: neq; supra modum gelido, neq; nimium caido circūfuso. Quæ aut anacolle mata, id est reglutinamenta uocantur, ex his quæ opplendi, glutinandi, constringendi, uel refrigerandi, uel constipandi, uel arefaciendi potestate sunt prædita, contextuntur: uerbi causa, polline, māna, terra Samia, myrrha, cochleis, acacia, opio, cum albore oui. Adglutinantur autem fronti, in quibus non intra caluam abdius humor, sed in aperto existit.

Monemeron ad auspicantes & inueteratas lippitudines.

Acaciæ denarios triginta sex, gummi denarios triginta duos, cadmiæ denarios uigintiquatuor, æris deusti atq; abluti denarios octo, opij denarium: uino austero dissolue, discutit & desiccat.

Chiacum collyrium.

Rubricæ Sinopicæ, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium detractis unguibus, floris quem thylaca uocamus, commeos,

commeos, singulorum quadrantem, opij unciam, uino Amis-
neo, uel Phalerno, uel Chio astringente conterito. esto autem
uinum marinæ exors.

Cynarium.

Cadmia combusta atque abluta scilicet, cerussæ lotæ
trientem, pompholygis trientem, amyli sextantem, tragac-
anthæ, opij exiccati, commeos, uniuscuiusque sextantem, a-
qua cœlesti contere.

Rubeus cygnus.

Accipit cadmia cremata elotæ uncias duas, terræ asse-
ris tantundem, cerussæ uncias quatuor, pompholygis uncias
octo, amyli, opij, cuiusque uncias duas, acaciæ, tragacanthæ,
singulorum unciam, commeos uncias quatuor, quæ omnia in
aqua pluuiali læuigantur.

Candidus cygnus.

Cadmia uncia quindecim, cerussæ uncia septendecim,
opij denarij octo, thuris septem, amyli septunx, commeos de-
narij tredecim, aqua cœlesti diluuntur.

Pellarium ad hulcera.

Cadmia, cerussæ, uniuscuiusque denarios uigintiquatuor,
acaciæ, opij, singulorum denarios octodecim, commeos, tra-
gacanthæ, amyli, cuiuslibet denarios nouem, myrrhæ dena-
rios treis, æris, croci, cuiusque denarium unum et dimidium, a-
qua dissoluito.

Phœum ad hypopios & ingentes affectus.

Cadmia tenerioris denarios uiginti quatuor, cerussæ se-
decim, æruginis rarsæ denarios duodecim, stibij octo, aluminis
fissi, chalcuidis combustæ, singulorum denarios treis, nardi
Indici denarios quatuor, omphacij denarios duos, æris dena-
rium, squamæ æris denarios octo, erices fructus denarios tre-
decim, succi papaueris denarios uiginti quatuor, croci dena-
rios quatuor, castorij denarios treis, myrrhæ denarios sex, li-
cij Indici, acaciæ, gummi, singulorum denarios quatuor, ro-
sarum recentium denarios duos & dimidium, uino Phalero

XX

3

no, aut

no, aut Surrentino, aut Amintaro, aut Chio austero laeuigato. Illinitur per triduum, aquosum fœnogræci, cum succo infusum, deinde cum ouo, & lacte, postremò aqua crassius.

Ex decoctis collyrium.

Cadmia uncia sedecim, cerussæ bes, amyli, opij, tragaantha, acacia, singulorum sextans, gummi selibra, subiunguntur decocto rosarum aridarum, meliloti, caput papaueris, glycyrrhiza, æquali singulorum portione.

Dyidras percussium.

Liquoris topbi more concreti, qui in cerealibus uasculis reperitur, librae tres, cadmia cremata et abluta libra, cerussa lota, pompholygis lota, terra asteris abluta, singulorum selibra, thuris, myrrhae, uniuscuiusque uncia, succi seminis lini, herbae pulicaris, ptisanae, fœnogræci, cuiuslibet libra, tragaantha uncia sex, gummi libra.

Ilambonis collyrium.

Cadmia uncia, pompholygis triens, cerussæ libra, tragaantha, gummi, opij, cuiusque triens, aqua pluuiali excipiuntur.

Cinereum Spodiaceum ad inflammationes & fluxiones, & chymoses.

Thuris, stibij, singulorum drachmae centum, cadmia, cerussæ, uniuscuiusque drach. uiginti quatuor, terra Samia, succi papaueris, cuiuslibet drach. tres, gummi drach. quindecim: conteruntur in succo thaliae, quod est turionum oleae. Succum autem hoc modo facito: molliora oleae folia elota in pipila aquae, iusta portione affusa laeuigantur, et per linteum exprimuntur.

Collyrium ex furentorum oleae succo.

Thuris denarios quatuor, stibij denarios quindecim, cadmia denarios duodeviginti, cerussæ denarios undequinquaginta, terra Samia denarios octodecim, opij denarios sex, gummi denarium, plumbi combusti & abluti denarios octo, excipe succo turionum thaliae.

Dia

Dia Thalias.

Aeris cremati denarios duodecim, sandicis unc. uigintiquatuor, foliorum oleæ, opij, singulorum sextantem, gummi de-
xtantem, uino sphaetite uel Amineo contere.

Diasmirnon Claudiacum.

Glaucij, sarcocollæ, singulorum drachmæ quadraginta
ocho, croci drach. uigintiquatuor, opij, myrrhæ, lapidis hæ-
matitæ, uniuscuiusque drach. sex, tragacanthæ drach. duode-
quingenta, gummi drach. sedecim, uino Italico excipiun-
tur. Vfus eius ex ouo.

Aliud Diasmirnon, ad rhyadas & ad ægilopas.

Cadmia lotæ, lapidis hæmatitis abluti, singulorū drach.
uiginti ocho, myrrhæ, cinerulæ (quod spodion Græci uocant)
cypriæ, uniuscuiusque drach. uigintiquatuor, opij drachmæ o-
cho, croci drachmæ quatuor (sunt qui accipiant ocho) piperis
candidi grana triginta, gummi drachmæ sedecim, uino Itali-
co subiguntur. Vfus eius cum ouo in recenti uitio aquosi.

Stativum Prosechti.

Cadmia, gummi, singulorum denarios uiginti, stibij, atra-
menti sutorij, cuiusque denarios ocho, opij denarios quatuor de-
cim, ferruginis rasilis drach. decē. piperis albi denarios sex,
croci denarios ocho, misyos crudi denarios ocho, opobalsami
denarios quatuor, aqua diluito.

Hygidium Ammonii.

Cadmia, æris, uniuscuiusque denarios sedecim, cerussæ,
castorij, aloes, croci cuiuslibet denarios quatuor, squamæ de-
narios quinque, florum rosarum, plumbi cremati, singulorum
denarios ocho, lycij denarios treis, lapidis schisti denarios qua-
tuor, opij denarios decem, acaciæ denarios quadraginta, gū-
mi denarios duodequingenta, aqua subigito.

Olympus, siue olympiacum.

Acaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorū denarij ocho, æris
cōbusti et abluti, stibij cremati et colluti, cerussæ tostæ et lo-
tæ, cadmia, uniuscuiusque denarij 12. myrrhæ, opij exiccati,

XX 4

cuiuslibet

cuiuslibet denarij quatuor, croci quinq; , æruginis rufæ tres, lapidis schisti, squamæ rubæ, lycij Indici, omphacij, cuiusq; denarius, castorij, florum rosarum, uniuscuiusq; denarij duo, phænicobalanorum quatuor: consimiliter etiam ossa dactylo- rum crematorum numero quinq; , gummi quincunx, aqua cœlesti irrigantur, et macerantur in ea dies naturales treis, calami odorati, alterci feminis, rosarum aridarum, cuiusli- bet denarij quatuor, folij denarius.

Nardinum.

Cadmia, croci, gummi, singulorum denarij triginta sex, æris cremati octodecim, stibij, acaciæ, singulorum triginta, nardi Syriacæ duodecim, opij, myrrhæ, uniuscuiusque dena- rij sedecim, cum aqua.

Theodotium paruum.

Stibij, acaciæ, singulorum denarij uiginti, æris tosti de- narij octo, cerussæ denarij quatuor, myrrhæ tantundem, æru- ginis denarios duos, aloes, succi papaueris, lycij, singulorum denarius, aquæ pluuiialis quantum satis est.

Rhinarium.

Lapidis hæmatitæ, lapidis schisti, uniuscuiusq; denarij se- decim, æris cremati, cadmiæ ferruginis, cuiuslibet denarij o- cto, opij quinq; , chalcitidis duo, gūmi octo, uino conteruntur.

Xylæ.

Pumicis combusti, misyos cremati, ostrij tosti, singulorum scilicet: cadmiæ, opij, chalcitidis deusti, croci, aloes hepatiti- dis, castorij, folij, cuiuslibet denarij duo, stibij, acaciæ, unius- cuiusq; uncia, æris usti triens, myrrhæ troglodytidis denarij quatuor, spicæ nardi denarius, cerussæ denarij octo, gummi semuncia, aqua pluuiatili excipiuntur. Quidam uinum quos- que admiscunt.

Hecatombe, ad cicatrices crassas.

Cadmia cremata atq; abluta, æris combusti pariter et eloti: uniuscuiusq; denarij octo, stibij deusti, acaciæ rufæ, com- meos, singulorum denarij 15. aloes, gallæ, uermicularis æru- gink,

ginis, castorij, lycij, spica nardi, croci, opij, myrrhæ, cerussæ, scobis hebeni, chalcitidis, singulorum denarius, rosarum denarij sexaginta, aqua pluuiæ laeuigantur.

Diaceratos, ex monumentis Galeni.

Plumbi combusti, cornu ceruini cremati, singulorum sextans, cerussæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ deusta, æruginis, myrrhæ, gummi, uniuscuiusq; uncia, aqua pluuiæ teruntur.

Collyrium e thure.

Thuris scilicet, cadmiæ, pompholygis, terræ asteris, amyli, gummi, singulorum quadrans, cerussæ, scilicet, squamæ æris triens, tragacanthæ quadrans, opij uncia sex, aquæ pluuiæ tilis quod satis est.

Libanium.

Cadmiæ lotæ, amyli, singulorum denarij duodecim, cerussæ tantundem, spodij, pompholygis, asteris, plumbi cremati & abluti, tragacanthæ, uniuscuiusq; denarij octo, opij denarios duodecim, gummi quatuor, aqua cœlestis, & ouorum uiginti albores adijciuntur. Quidam etiam adijciunt myrrhæ denarios quatuor.

After Magni.

Pompholygis, cadmiæ, cerussæ, singulorum denarij sedecim, plumbi denarij octo, amyli octo decim, thuris decem, terræ Samiæ duodecim, myrrhæ duo, tragacanthæ, commeos, uniuscuiusq; denarij octo, cum aqua.

Vranium.

Terræ asteris, piperis, cuiusq; quadrans, cinerulæ lotæ uncia, gummitriens, stibij cremati atq; abluti sextans, squamæ lotæ uncia, opij denarij sex, cadmiæ combustiæ & elotæ denarij duo, aqua pluuiæ additur. Quod quidem incarnat, atque repercutit.

Collyrium ex succo fœnogræci.

Cadmiæ, tragacanthæ, singulorum bes, cerussæ, amyli,
X x s unius

uniuscuiusq; unciae triginta, opij uncia, in succo scænograci conteruntur.

Collyrium Cleonis.

Pompholygis, plumbi, singulorū quincunx, croci sescuncia, squamæ stomomatis uncia, gummi sextans, aqua pluuiāli subiguntur. Aquosum illinitur.

Diarhodon collyrium e septuaginta duabus unciis.

Rosarum uiridium uncia septuagintaduæ, cadmiæ comæ bustæ & elotæ denarij uigintiquatuor, æruginis rasæ denarij duo, spicæ nardi denarius, squamæ æris lotæ denarij duo, sibi tosti atq; abluti, opij, myrrhæ, uniuscuiusque tres, croci uncia, amyli denarij duo, commeos denarij uigintiquatuor, & aqua pluuiālis additur.

Diarhodon album.

Cadmiæ densæ atq; ablutæ, cerussæ elotæ, singulorum libra, amyli, opij, tragacanthæ, uniuscuiusq; quadrans, aloes uncia una & dimidia, commeos quadrans, croci sescuncia, rosarium unguibus detractis uncia sex, & aqua.

Ex aloë collyrium.

Cadmiæ, cerussæ, aloes, singulorum dextans, rosarum uiridiū selibra, amyli quadrans, opij uncia, tragacanthæ sextans, commeos quadrans, aquæ pluuiæ quantum satis est.

Crocinum Diarhodon.

Spicæ nardi, rosarum aridarum, aloes, singulorum denarij duo, alterci albi denarius unus & dimidiū, croci denarij quatuor & semis, glaucij uncia sex, sarcocollæ uncia sex, opij denarij duo, tragacanthæ uncia, aqua pluuiāli lauiġātur.

Diarhodon Nili.

Rosarum tenellarum denarij quatuor, croci denarij duo, papaueris obolus, commeos denarij quatuor, aqua pluuiā admiscetur.

Lynceus uisum acuens.

Cadmiæ, æris cremati, ammoniaci thymiamatis, singulorum

rum denarij duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitæ, opij The-
bæi, uniuscuiusq; denarij sex, aloes hepatitidis, fellis taurini,
galbani, sagapeni, singulorum denarij quatuor, ferruginis ra-
silis, succi panacis, salis ammoniaci, cuiuslibet denarius, gum-
mi denarij sex, aqua pluuialis additur.

Proteus ad eadem, & cicatrices extenuans.

Cadmia, cerussa, chalcitidis cruda, singulorum denarij
quadraginta, piperis sesquidrachma, succi Cyrenaici dena-
rii octo, croci denarij duodecim, opij Thebani denarij decem,
sagapeni sesquiuncia, oliuæ Aethiopica tantundem, auripi-
gmenti, aluminis fissi, singulorum uncia, myrrhæ uncia una
cum dimidia, ammoniaci thymiamatis denarij uiginti, opo-
panacis denarij sedecim, opobalsami denarij decem, commeos
denarij uiginti, aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium ex succo fœniculi.

Cadmia denarij septendecim, atramenti librarij Indici
denarij sedecim, piperis longi denarij tredecim, & albi duo-
decim, succi Cyrenaici uncia, opobalsami, spicæ nardi, singu-
lorum denarij sex, sagapeni, opopanacis, cuiusque denarij
quinq; opij quatuor, euphorbij denarius, gummi denarius, læ-
uigantur succo fœniculi.

Collyrium ex succo balsami.

Cadmia, cerussa, cuiusq; uncia, omphacij semuncia, pipe-
ris albi uncia sedecim, opij semuncia, opobalsami, commeos,
singulorum sextans, aqua pluuiali subiguntur.

Thalasserus.

Cadmia bes, æruginis sextans, atramenti librarij Indici
beßis, piperis albi triens, succi Medici uncia, opobalsami sex-
tans, commeos uncia sex, admixta aqua.

Harmation.

Ammoniaci thymiamatis, æris combusti, corticis thuris,
singulorum denarij quatuor, æruginis denarius, gummi de-
narij quatuor, cum aqua cœlesti.

Malo-

Malobathrinum, quod etiam Isotheum appellatur.

Cadmia denarij sedecim, aris cremati atq; abluti denarij quatuordecim, opij, lycij Indici, malobathri, nardi Indicae, croci, aloes, singulorum denarij duo, castorij octo, myrrhae quatuor, acaciae, stibij, uniuscuiusque denarij quadraginta, aqua excipiuntur, usus ex ovo.

Crassius ex uino, dia cœnu adpellatum.

Cadmia, lapidis hematitæ & schisti, singulorum denarij quadraginta, aris cremati denarij triginta, chalcididis triginta duo, papaueris seminis tredecim. Aqua decoquitur meconium, & succus expressus inijcitur, & uino spathite, seu Aminæo diluuntur. Aliud dia cœnu: Aeris combusti, cadmia placitidis, singulorum dodrans, lapidis hematitæ lotæ selibra, croci, myrrhae, aloes, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque quadrans, lycij Indici, spicae nardi, cuiuslibet fescuncia, piperis albi grana sesquicentena, acaciae rubentis dodrans, gummi quadrans, uino Phalerno aut Aminæo conteruntur.

Collyrium ex duobus lapidibus contra asperitudinem.

Lapidis hematitæ, & schisti, cassia, singulorum denarij duodeviginti, aris, cadmia, opij, æruginis rasa, uniuscuiusque denarij nouem, gummi tantundem, chalcitidis tostæ denarij sex, aqua adijcitur.

Aridum collyrium Galeni præseruans.

Lapidis Phrygy in tenues partes cōtusi, & in aulula donec ignitæ reddantur, deusti, & butyro recente extincti, deinde denuo cōsimiliter tosti, & uino Phalerno extincti, atq; tertio combusti, melleq; extincti & exiccati libra, aris cremati, piperis albi, folij, singulorū uncia, stibij uncia unā cum dimidia, omnibus leuigatis quum tollere medicamentum uolueris, succū balsami non crassi (prohibet enim illud, ne aridum reddatur medicamentū) sed pellucidissimi unciam inijcias. Vtere aut illo ad solas palpebras, sic specillū adhibēdo,

ut

ut tunica non attingantur, uerum ut palpebris diductis, medicamentum duntaxat instilletur. Illinito autem non semel modò, uerum sæpius cum cibo nondum gustato, tum etiam ab ipso, & potissimum quum iam ophthalmia sentitur. Summa quippe admiratione dignum, quum omni alio medicamento efficacius præseruet, ac tuetur ab iniuria.

Aridum Diacroc.

Glutini carnis, quam sarcocollam dicunt, denarij octo, croci denarij quatuor, glaucij tantundem, illiniuntur sæpius in die. Nonnulli uerò aloen quoq; adiiciunt.

Aliud aridum ad siccam lippitudinem, siccationem, sepedonas, & carnis supercrescentias.

Cadmia denarij decem, chalcitidis denarij uiginti, piperis grana quindecim, nardi Gallicæ denarium. Cadmia conteritur, chalcitisq; cum uino, ubi aruerint reliqua immittuntur, & in puluerem rediguntur.

Liquidum ex caucalide, hoc est, ex pede gallinæ.

Caucalidis succi, trixaginis, coronopidis, id est pedis cornicis, interdum uerò etiam succi othonnæ æquales portiones. Est autem othonna, chelidonium maius.

Aliud ad siccationem palpebrarum, encathidas, & sarcomata.

Misyos assati denarij sex, chalcanti denarij quatuor, mellis Attici sextarius.

Erastirati multiplicis usus liquidum, admirandi effectus, cum in oculorum, tum glandularum, tum genitalium uirus, & purulentis auribus.

Acris denarios sex, misyos assati, myrrhæ, singulorum denarios tres, croci denarium cum dimidio, piperis denarium, uini Chij, & passi Cretici, cuiusq; sesquibeminam. Contere omnia in uino donec aruerint, infundito passum, & ad mellis spissitudinem decoquito.

Agglutinamenta oculorum, qui fluxione laborant.

Terræ Samiæ, manna, thuris, myrrhæ, æque portiones, qui albore exceptæ, in linteolæ impactæ fronti imponuntur.

Aliud:

Aliud: Seminis berbæ apollinaris denarius, opij tantundem, myrrhæ denarij duo, croci denarius, pollinis denarij quatuor, ouorum assatorum lutea duo, oui candido excipiuntur.

De emplastris, & iis quæ in decoctiones eorum inferuntur, ex monumentis Antyli, deq; ceræ modo ad oleum. Cap. 17.

EX medicaminibus quæ emplastris induntur, alia sunt terrea, uerbi causa, metallica, lapidumq; & terræ species, feces, cinis, & cōchylia: alia sunt oleamina, alia lachrymæ, alia liquabilia, alia liquores, alia succi: semina uerò ac herbas, radicesq; paucas accipiunt. Emplastrorum porro quædam sunt uniuersaria, quæ enæma (quod cruentis imponantur) & cōglutinatiua, & catagmatica (quæ fracturis applicentur) appellamus. Debent autē ex arefacientibus summum exiccandi gradū non attingentibus, sed secūdi gradus cōpleti, & tertiū inchoantis cōponi: cuius notæ sunt, salix, quercus, cū pressus, piccæ et tædæ cortices, myrrhæ, thus, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmentitius, cerussa, spuma argenti, & magna pars ex metallicis. Decoquātur autē usq; ad cōsistentiam, à qua nullū recrementū separetur. Quæ uerò cicadrite obducunt, & ipsa quidē ex arefacientibus concinnantur, effcaciōrib; uerò quam cōglutinatoria: cuius utiq; generis sunt as uisū, & squama cū ipsius, tum ferri, ærugo, chalcitis, flos æris crematus, alumen, galla, plūbago, cadmia, pumex, & ostreosa. Quæ uerò discutiendi uim habent, ex caloricis & mediocriter siccificis constant: exempli gratia, aristolochia, thapsia, oleo ueteri & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resina terebinthina, galbano, salibus tostis, salis flore. Quæ emolliendi uim obtinent, ex spuma argenti fiunt, adipibus, medullis, oleo ueteri, propoli, gutta ammoniacæ, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel radice altheæ, & cucumeris syluestris. Siccifica sulphure, nitro, sale, cinere, bitumineq; constant. Attractiua ex salibus & nitro, propoli, ærugine, fermento, stercorebus, sulphure, & resina terebinthina.

terebinthina conficiuntur. Concoquendi munere prædita è cera, ladano, uua passa satiuæ, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, & sypo, adipe, ferrugine præparatur. Quæ suppurationē inducunt, ex hydrelao, polline, pane triticeo, chondro, butyro, adipe porcino & uitulino, thure, pice, et resina. Quæ uerò dolores mitigāt, ex spuma argēti, cerussa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, ceraq; dealbata. Oportet autē enæma emplastra recentibus etiamdū uulnerib. & fracturis applicare, & suppetias supra emplastella, quæ Græci splenia uocant, spongys poscæ madentibus pariter illigatis, ferre, & soluere die tertio: & eadem rursus splenia, non alia injcere. Quæ autē molliunt, attrahunt, discutiunt, maturant, & suppurationem faciunt, post cataplasmatum & ceratorum usum accommodantur. Lenientia uerò, circa principia statim, summis potissimum partibus quadrant. Cæterum super decoctione eorum deinceps sermonem faciemus.

Basilicum tetrapharmacum.

Ceræ, colophonie, picis, adipis taurini pares modi.

Emplastrum e succo seminis lini, dissipans & abstergens.

Olei ueteris libræ duæ, ceræ uncie uiginti, colophonie, seui porcini, singulorum libræ una & dimidia, spuma argenti libræ, cerussa selibra, succi seminis lini tantundē, pollinis uncia, thuris triens.

Ex melle.

Spuma argenti, ceræ, olei, singulorū libræ quatuor, resina terebinthina libræ duæ, mellis, adipis suilli, uniuscuiusq; libra. Aliud: Spuma argenti libræ sex, olei libræ quinque & dimidia, colophonie libræ septem cum dimidia, ceræ libræ treis & semis, mellis libræ tres.

Emplastrum ex succo.

Spuma argēti libræ sex, olei, æstate quidem libræ septem, hyeme uerò libræ nouem, fenograci sextarius dimidiatus, seminis

seminis lini semisextarius, althææ libræ tres. Althæam ac semina in aquæ sextarijs uiginti decoquito, donec parum ex ipso relinquitur. inde succi libræ quatuor admixtis, oleo decoque, tantisper dum bullæ defierint: deinde leuissima argenti spuma insparſa, igni clemente usq; dum manus non inquinat, elixato.

Exemplum ex polline.

Pollinis, ammoniaci thymiamatis, singulorum libra, resine piceæ, ceræ, adipis porcini, uniuscuiusq; libræ duæ, succi seminis lini quantum satis est.

Emplastrum Botanicum, id est herbaceum.

Rumicis, rhepelæi, amurcæ, ue, anchusæ, chæropelethi, est autem onoclea, septinerui, plantaginis, singulorum quadrans, olei libræ sex, adipis suilli selibra. Herbe oleo codæ abijciuntur, cætera cum oleo eliquantur.

Emplastrum ex albucis.

Albuci radicis succi libra, rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum sextans, adipis porcini quadrans, ceræ triens.

Emplastrum ex fermento, rumpens abscessus.

Fermenti, axungie, uniuscuiusq; selibra, salis triens, resine pini quadrans, ceræ triens, spumæ nitri uncia, guttæ ammoniaci thymiamatis sextans, mellis uncie sex, saponis sextans.

Dothiene emplastrum.

Guttæ ammoniaci thymiamatis libra, nitri Alexandrini selibra, spumæ nitri tantundem, adipis suilli, ceræ, singulorum libræ duæ, resine terebinthinae libra, olei ueteris uncia, aceti quantum satis est.

Emplastrum diastruthiu, scrophulas discutiens.

Spumæ argenti, radicis lanariæ, mali terræ, singulorum uncias quatuor, galbani, squamæ æris, aloes, uniuscuiusque unciam, manne uncias duas, guttæ ammoniaci thymiamatis uncias sex, resine piceæ deraſæ uncias sedecim, aceti scilicet sextarios quatuor, quo pulueres diluantur, sumito.

Smilium

Smilium ad abscessus.

Olei ueteris libra una & dimidia, spuma argenti, nitri rubei, salis ammoniaci, lixiij ficulnei protofacti, resinae, cuiusque libra, galbani, guttae ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusque quadrans, atramenti sutorij triens, cerae selibra, ceruginis, opopanaeis, cuiusque uncia, aceti quantum satis est. spumam argenti & ferruginem in oleo elixato, quousque digitos nullo recremento inquinant: deinde reliqua inycito.

Ex aliis ruptorium.

Cerae selibra, colophonice triens, pityinae quadrans, adipis taurini triens, nitri rubei fescuncia, allia purgata uiginti, olei sextarius dimidius. Allia oleo decocta proijciuntur, reliqua admiscuntur.

Diapyrhanu, distrahendi uim habens.

Habet adipis anserini & phasianorum, uniuscuiusque quadrantem, olei ueteris uncias uigintisex, pulicaris herbae quadrantem, urticae seminis, radicis apyrani uiridis, utriusque libram, cerae dealbatae dextantem, emplastri diachylon sextantem, resinae terebinthinae unciam. Radicem intenuia frustula concisam in oleo cum herba pulicari, & semen urticae per noctem atque diem macerato. ubiq; elixata fuerint, ipsa quide porricito, liquabilia autem oleo admixta resoluito.

Pyrene ad duritias & scirrhomata.

Althaeae, palmularum aut dactylorum Nicolaorum, uniuscuiusque dupondo, fenograci, seminis lini, singulorum sextarium dimidium, chamamelis, meliloti, corticis palmularum, cuiuslibet uncias sex, uini Aminaei sextarium dimidium, spuma argenti libra, cerussa, colophonice, singulorum dupondo, cerae, resinae terebinthinae, cuiusque libra, olei ueteris libras quinque, aquae libras duas, panis aridi cotusi et attaminati libras quinque. Herbae in uino decoctae in succum rediguntur, & in succo panis irrigatur. postera die spuma argenti & cerussa in aqua laeuigantur, deinde oleo infuso coquitur, donec manus non

X y

inquinant,

inquinent, tum deniq; cætera inijciuntur. sublati autem ab igne immittitur panis. strenueq; rudicula agitur. Postremo æruginis rasæ, & florū salis, uniuscuiusq; uncie sex, ireos, mali terræ, singulorum selibra, resina terebinthina libra, inijciuntur.

Pelarium ex argenti recremento, ad desquamatis similia.

Cera, adipis taurini, cuiusq; quincunx, recrementi argenti uncie sex, colophonie triens, picis, olei, singulorum sextās. Recrementum argenti aridum uino dissoluitur, uel succo sœnogræci: ubi uerò ad manum argenti sterco non fuerit, plumbagine utimur.

Emplastrum ex althæa, podagricis & aliis duriciis utile.

Succi sœnogræci, & seminis lini, althææ, singulorum libris tribus, olei libris duabus, donec succus euanescat decoctas, colophonie libram, resinæ terebinthina tantundem, hederæ lachrymæ uncias treis infunde: quando resoluta fuerint, & igne ablata, ceræ libram, galbani uncias quatuor inijce, utraq; simul contusa solutaq; rudicula moueto.

Emplastrum hederaceum siue cissinum, ad neruorum uulnera, puncturas, & maxime uetera.

Squamæ rubentis uncias quatuor cum diuidia, thuris uncia, mysios fescuncia, chalcitidis denarios quatuor, aceti sex: lauigato sole æstiuo donec consumatur acetum: deinde solutis ceræ uncis octo, olei duodeuiginti admisce: si uerò diuisus neruus & nudus sit, pro galbano resinæ terebinthina sextantem inijce.

Melanchlorum ad eadem, & cruentis dicatum.

Malicoriorū, aris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ aris, aluminis scissi & liquidi (alijs pro liquido rotundū accipiūt) iridis, mysios, chalcæthi, chalcitidis, æruginis rasilis, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris, radicis panacis, spumæ argenti, cerussæ, paria singulorum pondera lauigantur sub sole æstiuo cum aceto diebus plusculis, & finguntur pastilli. Emplastrū inde fit hoc modo: Pharmaci sextantem, ceræ selibram, olei bessæ, in neruis quid ē
 faucis

ſaucijs perantiqui, in reliquis uerò communis adyçe.

Ex ſenecione emplaſtrum.

Senecionis ſucci libras duas, olei ueteris librā unā cum di-
midia, olei Cyprini trientē, axungie ueteris librā, reſinæ te-
rebinthinæ unciā, galbani unciam dimidiā, reſinæ piceæ un-
cias ſex, æruginis, thuris, hyſſopi medicamēti, unius cuiusque
unciā, ſquamæ æris diobolos octo, ceræ dextantem, picis zo-
piſſæ uncias quatuordecim. Coquito autē oleum cum adſtria-
gimenti uſq; craſſitudinem adiecta adipe ſuilla, & pulueres
cyprino dilue: galbanum uerò cum cera contūde, & cacabo
inyce. pix zopiffa ſi quidem arida fuerit, tritam cribratam
ponderato, & inſpergito. Quod ſi nequeat læuigari, cū par-
te olei diſſoluti extrahito, & tum omnia commiſceantur.

Mnaſæi emplaſtrum diſcuſſorium.

Accipit ceræ, axungie porcine ſingulorum libram, co-
lophonie ſelibram, ſpumæ argēti dupondo, uini boni libras
quatuor.

Ariobarzanium ad eaſdem affectiones.

Spumæ argenti unciam unam & dimidiam, ceruſſiæ
libram & uncias quinque, aquæ marinæ uncias uiginti quin-
que, olei ueteris libram unam & dimidiam, buccinorum ci-
neris uncias ſeptem & dimidiam, ceræ rubentis uncias no-
uē, reſinæ terebinthinæ uncias ſex, thuris quadrantem,
grammata tria cum dimidio.

Emplaſtrum ex dracunculo.

Ceræ, colophonie, picis aride, axungie, reſinæ, ſingulo-
rum libræ quatuor, guttæ ammoniaci thymiamatis libræ
duæ, dracunculi radicis libræ quinque. Radix arida læui-
gata alijs inſpergitur diſſolutis.

Plitacium.

Habet ceræ, colophonie, adipis porcini, alterci foliorum
tenellorum, uel ſucci ipſorum æquale pondus. In Alexan-
dria uerò ceræ libras binas cum media, alterci libras duas,
axungie libras duas cum dimidia, colophonie libras decem
ſumunt, & uehementius diſſipat.

xy 2

Myrſinatū.

Myrsinatium.

Spumæ argenti, cerussæ, sandicis, plumbi combusti et abluti, singulorum unciam, ceræ uncias sex, olei myrsinati libram, uini quantum res postulat.

Emplastrum ex cerussa, uel ouis.

Habet ceræ albatæ sēlibram, rosacci sesquilibram, spumæ argenti, cerussæ, singulorum sextantem, amyli trientem, albores ouorum quinq̃.

Liquidum Oribasii.

Spumæ argenti, cerussæ, singulæ fescunciā, ceræ trientē, pinguetudinis suillæ septuncem, colophonie dodrantem, succi seminis lini, olei, singulorum dextantem. Mirificè conducit ad calcaneorum rimas. In bulceribus autem (inquit) uiuant: graueolentia etenim reddit.

Emplastrum dia caduias, cicatricem inducens.

Chalcitidis crematæ sextans, caduiæ, mannae, singulorum uncia, ceræ, colophonie, olei myrtei uniuscuiusq; libra, uini quantum satis est.

Palmularum Phoenicine dicta.

Accipit axungie ueteris libras duas, olei libras treis, spumæ argenti tantundem, chalcitidis crudæ uncias sex. Ante omnia quidem chalcitis cum oleo in mortariolo pulchro læuiget, uel in sole: ubi autem strigmentosum redditur, tum spumam quoque argenti, antè contritam inijcito: deinde uerò adipem. Et ubi iam egregiè læuigata et emollita fuerint, nō acri igne decoquito, quoad nullum rec rementum per decoctionem separetur, ex uirgulto palmularum rudicula agitans.

Emplastrum ex anchusa, ad igne combusta.

Habet ceræ dealbatæ dodrantem, rosacci uncias octodecim, quibus eliquatis purpureæ anchusæ radicis aridæ læuigatissimæ trientem inserito. Aliud: Anchusæ radicis uiridis, marrubij, gummi, singulorum quadrantem, decoctis in olei dodrante abijcito, oleo ceræ dealbatæ uncias quindecim adijce, et dissolue.

Emplastrum

Emplastrum Pompholygeron.

Bullæ, quam pompholyga appellant, sextans, spuma argenti quadrans, laeuigantur cum succo seminis lini, & inijciuntur liquefacta et refrigerata, ceræ uncis sex, adipis anserini, uel gallinacei sextanti, chamæmeli uncis sex.

Philocotyche dolorem sopiens, fedi destinata.

Continet thuris uncias septendecim, myrrhæ septuaginta, opij denarios quatuor, aluminis scissi denarios duos, butyri denarios quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmiæ crematæ atque elotæ denarios quatuor, pompholygis denarios sex, ceræ tyrrhenicæ denarios octo, adipis anserini denarios sedecim, medullæ cerui denarios undecim, plumbi combusti et eloti denarios octo, lapidis hæmatitis denarium, hyssopi liquidi denarios quatuor. Pulueres cum uino Italico conterito, & liquabilia admisceto.

Amythaonis ad angulas & articulos conuulsos, est etiam ad extrahendum efficax.

Ammoniæ, ceræ, bdellij, uniuscuiusque bes, resinae terebinthinæ, ircos Illyricæ, galbani, singulorum drachmæ viginti.

Aristophanium mollificans.

Picis libræ quatuor, zopissæ libræ duæ, ceræ libra, opoponacis uncia, aceti hemina.

Emplastrum ex plumbagine, ad calidos affectus.

Plumbaginis triens, spuma argenti, cerussæ, singulorum sextans, ceræ bes, myrtei libræ duæ, arida uino dissoluitur.

Coracum ex aceto mulso, genitalium uitiiis et nomis accommodatum.

Gallæ sextantem, squamæ unciam unam & dimidiam, chalcitidis, thuris, singulorum unciam, macerato in aceto diebus pluribus: deinde mellis quincuncem admisceto. Cerato autem seorsim confectio ex myrtei uel rosacei uncis duabus, adipis taurini unc. octo, ceræ unc. quatuor, resinae terebinthinæ uncia, mixta simul laeuigato, & utere perinde atque

Yy 3 diacharto,

diacharto cum per Pyulcū, tum per linteolum concerptum.

Ex oleo & aceto.

Habet spuma argenti partem, olei, aceti, singulorum partes duas, secundum nonnullos uero tres.

Emplastrum ex achate lapide, dissipans & emolliens:

Constat ex achatis lapidis semiusti fescuncia, cere quincunce, picis frictæ quadrante, olei uncia.

His cruentis dicata, conglutinans, incarnans, & expurgans.

Squamæ æris, æris cremati, mali terræ rotundi, uniuscuiusq; denarij octo, aluminis fisci sex, salis ammoniaci denarij octo, thuristantundē, guttæ ammoniaci thymiamatis denarij octo, myrrhæ, aloes, galbani, singulorum denarij duodecim, succi radicis dracunculi uncia, ceræ libra, colophonie libræ duæ, olei ueteris quadrans, aceti quantum satis est.

Athena ad hulcera sordida, cuneationes, neruorumq; uulnera.

Malicioriorū, æris cremati, gallarum, mali terræ rotundi & longi, salis ammoniaci thymiamatis, squamæ æris, aluminis fisci atq; rotundi, iridis, misyos, chalcanti, chalcitidis, æruginis rasilis, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris, propoleos, galbani, uniuscuiusq; uncia, ceræ, picis, singulorum denarij ducenti, colophonie denarij centum, olei uncie sex, aceti quantum satis est.

Emplastrum diadistamni conglutinatum, ad morsus canum, & omne genus hulcera.

Spuma argenti libræ duæ, squamæ æris fescuncia (Gal. selibra, æris combusti bes, aloes besis, galbani pondo) olei ueteris sextarij duo, diphrygis quadrans, gentianæ sesquunciacia, aristolochiæ, æruginis rasilis, singulorum uncie duæ & semis, distamni tantundem, colophonie libra, mannae quadrans, guttæ ammoniaci thymiamatis uncie sex, propoleos sextans, ceræ uncie sex & dimidia. Oportet principio oleū cum spuma argenti, donec syncerum spissiusq; reddatur, & manum nullo recremento inficiet, decoquere: deinde cacabo ab igne sublato, æruginē & squamas inijcere, ac denuò tan-
tis per, dum nullum per decoctionem recrementum separetur,
decoquere.

decoquere, lebetēq; rursum deposito resinam, guttam ammos moniacam attaminatam immittere, et quoad feruere cesset, cōmouere, denuoq; igni imponere: Et ubi parum ferbuerint, æs atq; diphryges inferere, Et tertio dū incrassescat decoquere, mox ceram admisceri: qua, dū manus nō coinquinet, discocta, propolim injicere, Et paulo post refrigeratis admodum his, aloen, mannam, dictamnū, aristolochiam, gentianam, omnia in pollinem lauigata inspergere.

Barbara, emplastrum cruentis dicatum, fracturarum callos consolidans.

Bituminis iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, uniuscuiusque libra, terebinthinæ sextans, spumæ argenti uncia, cerussæ uncia una Et dimidia, manna, opopanacis, zingiberis, singulorum sextans, olei quadrans, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex salicibus, conglutinans, ad hæmoptoicos, empyos, thoraci impositum utile.

Misyos, chalcitidis, æruginis, cerussæ, gallæ, aluminis fissi, Et rotundi, atramenti metallici, singulorum uncias sex, ceræ, pityinæ picis, cuiusq; libras duas, malicoriorum uncias sex, bituminis libras duas, foliorum salicis tantundem, olei rosarum uncias quatuor, atramenti sutorij uncias sex, aceti quantum sufficit: quidam resinæ quoque terebinthinæ dodrantem adijciunt,

Emplastrum Nicolai ad cruenta uulnera, & lacunas conglutinans.

Squama æris triens, ferruginis rasilis, spumæ argenti, singulorum fescuncia, mali terræ longi, Et rotundi, uniuscuiusque uncia, aluminis scissilis Et rotundi, atramenti sutorij, sulphuris ignem non experti, cuiuslibet uncia, gallæ omphacitidis triens, salis ammoniaci, misyos, origani, chamæleonis, cadmiæ botryitidis, ueratri candidi, singulorum uncia, peucedani quadrans, seminis apij sextans, simphyti radices, cerussæ, singulorum sesquiuncia, succi mandragoræ uncia dimidiata, chalcitidis unciam unam cum

dimidia.

Yy 4

dimidia. Samij asteris, thuris masculi, aloes, singulorum un-
cia: bdellij, opij Thebæi, cuiusq; sextans, zingiberis troglodis-
tidis unciam dimidiam, guttæ ammoniaci thymiamatis un-
cia, fœnogræci sēlibra, succi perdicidis tantundem, ceræ fla-
uæ quadrans, colophonis dupōdo, resina picea polentæ, u-
niuscuiusque libra, mastiches sēlibra, picis atræ sextans, olei
ueteris libra, styracis uncia, opopanacis sescuncia, aceti quā-
tum satis est.

Iccios ad strumas, abscessus, lienem, articulos,
coxendicisq; affectus.

Habet spumæ argenti denarios centum & uiginti, olei
ueteris sextarios duos, aceti sextarium, æruginis sescuidena-
rium, corticis piceæ denarios octo, chamaeleontis cum radi-
ce euphorbiæ, hypocythidis succi, propoleos, zingiberis, enu-
læ campanæ, pyrethri, singulorum denarios sedecim, ceræ
libras, tres.

Emplastrum Neronis ad plagas, & omnem carnosarum
partium dolorem.

Olei ueteris sēsquilibra, spumæ argenti libra, ceræ, resi-
næ piceæ, uniuscuiusq; uncia septem cum dimidia, ammo-
niaci thymiamatis triens, cerussæ tantundem, galbani, man-
næ, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

Oxera, ad multa utilis.

Picis aridæ libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniaci thy-
miamatis uncia, resina terebinthina sēlibra, galbani, man-
næ, singulorum sextans, aceti sēsquisextarius.

Aceratus Galeni, conglutinandi, maturandi hūlcera, suppuran-
dique uim obtinent, rhicinino ueteri uel oleo tanquam me-
dicamen, quod linteolis conceptis exci-
pitur eliquatum.

Spumæ argenti libræ tres, olei rhicinini, aut peranti-
qui libræ quatuor, aceti acerrimi libræ duæ, squamæ aris, a-
træ chalcitidis, æruginis, uniuscuiusque uncia duæ. Spumam
argenti ad strigmentosam usq; balneorum crassitudinē cum
oleo decoquito, deinde metallica multis diebus cum aceto ma-
cerata inycito.

Emplastrum

Emplastrum ex metallicis.

Chalcitidis uncia, misyos sextans, squamæ aris, thuris, singulorum quadrans, colophonæ sextans, galbani sesquiuncia, ceræ libra, olei uncia quindecim, aceti quantum sufficit.

Harmenia fracturis consecrata.

Chalcitidis triens, squamæ aris uncia duæ cum dimidia, aris combusti uncia, thuris sextans, olei, aceti, singulorum libra. Coquito metallica in aceto & oleo, donec digitos intingit non coinquent, deinde thus inijcito,

Melæne Serapionis.

Spumæ argenti libra, ceræ septunx, guttæ ammoniaci uncia tres cum dimidia, galbani, ferruginis, singulorum denarij nouem, colophonæ septunx, myrrhæ denarius, olei hemina una cum dimidia. coquito spumam argenti cum oleo, tantisper dum digitos non inficiet; deinde immitte reliqua.

Anicetos glutinans, dissipans, squamas remouens, & incuruationibus articulorum succurrens.

Baccarum lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū denarios sexaginta, aris cremati uiginti, nitri salis, ammoniaci thymiamatis, uniuscuiusq; denarios uiginti, pyrethri, herbæ pedicularis, seminis roris marini, grani cnidij, sinapis, piperis, stercoris columbini, aristolochiæ, cymini, æruginis, cyperi, seminis crucæ, cuiuslibet denarios octo, aceti hemina duodecim. Contere sub ardentissimo caniculæ æstu, donec acetum euanescat. deinde infunde decocti aridarum ficuū crassissimi dodrantem, quibus confusis pangito pastillos, & arefacito. Quum usus incidit, pastillorū sextans aceto subactus, resinæ quadrans, ceræ Tyrrhenicæ, olei, singulorū sextans miscetur.

Emplastrum ex loliis.

Picis libra, resinæ piceæ dodrans, ceræ Tyrrhenicæ quintunx, olei quadrans, bituminis attaminati sextans, oleaceæ farina sextarius, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex succo sycamini.

Spumæ argenti, picis aridæ, seu taurini, singulorū bes.

Yy 5

resinæ

resinæ terebinthinæ quadrans, ceræ quincunx, æruginis ra-
filis, opopanacis, galbani, singulorū uncia, olei rbinini uel
fusini, uel admodū uetusti hemina, picis liquidæ tantundē, li-
quoris sicamini, cuius fructus sycomora appellatur, hemina.

Emplastrum dichromon, a duplici colore appellatum.

Aeris cremati, aluminis scissi, guttæ ammoniaci thymia-
matis, singulorum uncia, ceræ, Colophonice, seui porcini, u-
niuscuiusq; libra, aceti quantum sufficit.

Indica ad nomas, & hæmopticos.

Ceræ, resinæ frictæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacy-
nthiæ, singulorum libra, cerussæ, chalcitidis, misyos, atramen-
ti metallici, aluminis scissi & rotundi, gallæ omphacitidis,
malicorij, cuiuslibet uncia sex, aceti quantum satis est.

Emplastrum ex cinere aspidum, scrophulas & poda-
gras dissipans.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudæi-
ci, singulorū denarios trecentos sexaginta, ceræ, baccarum
lauri, guttæ ammoniaci thymiamatis, spumæ nitri, adipis ui-
tulini denarios trecentos quadraginta, lapidis pyritis, calcis
aqua non extinctæ, cineris aspidum, uniuscuiusq; denarij cen-
tum quadraginta, olei ueteris heminas duas, pharmaco refri-
gerato cinerem insperge. Præparatur autem & absque ci-
nere, propterea quod implacide ipsum ferunt aliqui, & nihi-
lominus lapis etiam Asius efficitur.

Lexna desiccans & discentiens.

Guttæ ammoniacæ thymiamatis, plumbaginis, singulo-
rum denarij centum, sinapi denarij octo, radicis chamaeleon-
tis sedecim, colophonice centum, squamæ æris, lanariæ radi-
cis, cuiuslibet denarij quinq; euphorbij & æruginis, uniuscu-
iusq; octo, aristolochiæ sedecim, pyrethri octo, olei ueteris he-
minam, & raphanini quantum sufficit.

Lexna in superficiem euocans, & humores euacuans.

Atramenti sutorij sextans, auripigmenti uncia, hellebori
nigri,

nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesquidenarius, sandarachæ quadrans, ceræ sesquilibra, resina frictæ libra, olei hemina duæ.

Macedonicum.

Ceræ, colophonie, picis, seu taurini, lachrymæ thuris, æquis portionibus eliquatis, & ab igne sublatis, lachryma thuris inspergitur.

Pilula ad feruores.

Cerussæ, spumæ argenti, calcis aqua non extinctæ, singulorum quadrans, ceræ sescuncia, bernicarij, rosacei, uniuscuiusq; uncia, liquefacta aridis infusa in orbiculos digeruntur. Vbi utendum est, olei uncias sex cum duabus uncis ceræ eliquato, & inijce medicamento unciam, & rudicula agitato, refrigeratum cum aquæ dodrante contundito. ego rosacei quoque trientem admisceo.

Ex rubrica pictorum, inflammationem accens, tum ultro, tum in iudicio tortis feruens.

Ochra Atticæ libræ duæ, creta libra, spumæ argenti bes, ceræ uino trita, colophonie, picis, resina picea singulorum libra, resina terebinthina besis, olei libræ duæ. Hoc modo resoluuntur: ceræ libra, olei ueteris libræ tres, medicamento libra, uino diluuntur,

Emplastrum ex liquore cedri, conglutinans, discutiens, & exterens.

Ceræ, picis aridæ, uniuscuiusq; libra, colophonie bes, liquoris cedri selibra, eliquata simul, donec à sordibus, ne manus inficiant, perpurgentur, clixabis. Aliud emolliendi uim habens: Ceræ, picis singulorum bes, colophonie denarij uiginti quinque, propoleos denarij septendecim, liquoris cedri denarij uiginti.

Emplastrum ex pumice, cicatricem inducens.

Myrtei lib. duæ, ceræ libra, pumicis cremati et uino extincti denarij sex, squamæ stomomatidis tantundem, aris combusti, cretæ

creta cimolia, singulorum denarij quinq;, supra linteolum conceptum, & spongiam ex aqua accommodantur.

Emplastrum Paula, strumis & bubonibus destinatum:

Habet cerae, colophoniae, nitri uniuscuiusq; libram.

Emplastrum ex nitro, ad carbunculos.

Nitri tostii quadrans, cerae, olei, colophoniae, singulorum sesquidenarius, succi Cyrenaeici aut Medici denarij decem, imponuntur penicillo vulnenario soluta.

Emplastrum dianemonis.

Anemone unguibus detractis sextans, cerae quincunx, olei triens, resinae uncia quinque cum dimidia, colophoniae sesquilibra.

Emplastrum Macherionis uiride, ischiadicis, articulorum obstructionibus, & abscessibus efficax.

Opopanacis, galbani, aeruginis, myrrhae, ircos, guttae ammoniaci thymiamatis, aristolochiae, uniuscuiusq; uncia, resinae terebinthinae, cerae, olei omphacini, singulorum septunx.

Aliud uiride simplex.

Resinae librae tres, cerae libra, ferruginis rasilis selibra, thuris denarij viginti quinque, aceti quantum sufficit.

Aliud uiride, ad humida, & superexcrecentias carnis.

Colophoniae uncia sex, aeruginis rasilis uncia una & dimidia, cerae sextans, salis Cappadocici uncia, rosacci sextans, aceti quod satis est.

Peganera ad pleureticos.

Rutae uiridis libra, butyri sesquilibra, terebinthinae uncia quindecim, hyssopi medicamenti tantundem, opopanacis, galbani, singulorum quadrans, aenei libra.

Emplastrum ex lixiuo, coxendice, articulariis, tumoreque laxo infestatis idoneum.

Cerae, olei ueteris, lixiui primū destillati, singulorum libra, resinae frigida, nitri Alexandrini, nitri candidi, resinae terebinthinae, uniuscuiusq; selibra. Nitri utrunq; genus in lixiuo eliquato.

Emplastrū

Emplastrum ex nitro, ad abscessus, scirrhus, & tumores.

Olei antiqui, cera, spuma, nitri, saponis, lixiuij, cuiusque libra, resina terebinthinae unciae sex, galbani, propoleos, guttae ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia. Praeparato perinde atq; proximum.

Emplastrum ex sale.

Cerae triens, olei selibra, salis communis triens, spuma nitri tantundem, cerussae bes, aceti sextans: ad lauigationem aridorum. Aliter: Salis communis, nitri, singulorum triens, cera, olei ueteris, uniuscuiusque unciae sex, aquae marinae quantum satis est.

Emplastrum ex petasone, tophis expediens.

Pernae porcinae ueteris pinguis, ammoniaci thymiamatis, casei antiqui bouilli aut caprini, adipis taurini, apochymatis, quod est, ramenti nauigij, singulorum libra, medullae cerui beasis, aescypi ceroti quadrans, cyprini unciae sex, uini Aegyptij quantum satis est.

Emplastrum ex cinnabari, ad tophos, & alios omnis generis induratos tumores. Obtinuit autem appellationem Pamphates.

Spumae argenti libra, olei ueteris sextarius, squamae aeris uncia, aeris cremati tantundem, cinnabaris scrupuli duodeviginti, magnitis uiui uncia, lapidis Phrygij denary sex, lapidis pyritidis, cadmiae, aeruginis rase, thuris, singulorum uncia, diphyrgis sextans, aloes uncia una & dimidia, galbani sesqui uncia, lapidis onitis Scythici scrupuli octodecim, lapidis hematitidis uncia, propoleos libra, & grammata uiginti octo: cera uncia septendecim, lapidis perdicitis uncia, in alio per dicitati habetur: betonicae uncia, & dioboli octo, gentianae uncia, aristolochiae longae & rotundae denarij quatuor, chamaeleonis nigri uncia, dictamni scrupuli quadraginta duo, rosinae siccae libra, adipis struthocameli libra. Lapides cum spuma argenti conterito, adiciens floris salis libras duas particulatim, quo ad totum moletur.

Emplastrum.

Emplastrum ex auellanis, ad tophos articularum
experientia comprobatur.

Lixiuū quod primū destillauerit sex, nucum Ponticarum interanei sextans, spumæ nitri uncia sex, olei uelusti libra, saponis Gallici triens, mellis bes, ouorum albuminum paria tria, ceræ dextans, resinæ terebinthina sextans, lixiuio protostacto in leuorem conteruntur.

Diaturpænes ceratum, podagræ doloribus sedandis
admirandum.

Martio mense diem quintum agente, in domo subteranea, olei communis sextarios duos in cacabū inijcito, lignisq; ex utribus coquito, & quādo ebullierit, turpænæ marini piscis libram immittito, & asphalacis animantis, quod quidā masdamudan appellant, sanguinis trientem. hæc unā usq; dum carnes piscis dissoluantur, elixato, uel donec torrefiant; dein extractis illis, olei & ceræ iustam portionem usq; ad spissitudinem infundito, ut mollißimum conficiatur cerotum, quod linteolo superinductum accommodabis.

Emplastrum ex lotio muli podagricum.

Habet lotij muli masculi sextarios quatuor, spumæ argenti libras duas, olei ueteris mystrum, trita plurimum omnia, donec strigmentosa reddantur, quoad nullum ex coctura rescrementum cera secernatur, decoquito.

Emplastrum ex lapidis Afi flore, Phylagrij,
ad scirrhus.

Radiciß peucedani, floris lapidis Afi, si is ad manum non sit, salis, ammoniaci thymiamatis, lanæ succidæ cōbustæ, cuiusq; unciam, aristolochiæ rotundæ, pumicis canini stercoreis, æruginis rase, squamæ aris, misyos, castorij, singulorum grammata octodecim, myrrhæ uncias treis, aceti acerrimi tantundem, ceræ uncias duodecim & dimidiam, resinæ piceæ, picis brutiæ, cuiusq; uncias octodecim cum dimidia, dioboli sex, olei ueteris & aceti acerrimi quantum satis est.

Bx

Ex eodem, Galeni.

Cera, resina terebinthina, uniuscuiusque libra, lapidis Asij, manna, singulorum quadrans, cyprini sextans, aquae lixiuiae quod sufficit.

Emplastrum ex flore salis, arthriticis in declinatione idoneum.

Resina terebinthina, resina fricta, picea, cera, uniuscuiusque libra, picis arida, aluminis fissi, salis floris, singulorum libram dimidiam, coquito in diplomate.

Emplastrum hulceribus carnem nutriendum:

Rosacei, resina terebinthina, mellis, singulorum sextans, cerussae, butyri, uniuscuiusque uncia, alij etiam thuris admiscunt unciam.

Italicum sordes expurgans, & incarnans.

Erinacei (caprifici inquam, hoc est ficus sylvestris fructus) tenerum corticem in oleo decoctum porrice, & eliquato in oleo, cerae rubrae quantum satis est, penicillo vulnerario utere.

Entaticum, quod est intensorium.

Satyrii, genitalis ceruini, caudae scinchi, singulorum denarii bini, seminis eruae, pyrethri, seminis roris marini, cerae, cuiuslibet denarii quatuor, resina terebinthinae denarius, oua passerum trogloditarum tria, stelliones tres, olei laurini uel irini quantum satis est. Macerantur uiuentes in aceto stelliones, diebus quadraginta uase in fimo sepulto.

Chryse, enemos.

Thuris, aluminis fissi, singulorum unciae duae, colophoniae, resinae, cuiuslibet libra, olei unciae tres, auripigmenti unciae duae, oxelaei quantum sufficit.

Catagmaticum, hoc est fracturis dicatum, Oribasii.

Picis brutiae libra cum triente, spumae argenti tantundem, thuris bes, resina terebinthinae quincunx, adipis taurini libra & triēs, galbani, opopanacis, cuiusque uncia, cera triens, olei ueteris libra, aceti quincunx.

Catagma

Catagmaticæ ad fracturas cum uulnere, & sine uulnere, ex monumentis Heracliti.

Picis aridæ mystrum, spumæ argenti tantundem, mannæ mystrum dimidiū, adipis uitulini mystrum unum, ceræ Tyr rhenicæ uncia uigintisex, opopanacis denarij octo, æruginis rasilis, Cyprj æris, singulorū minas quinque, & decima eius pars, resinæ terebinthinæ mystrum unum cum dimidio, & quinta eius portio, æris uncia, rhicinini aut ueteris olei hemina, aceti hemina dimidia.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

Meliloti triens, cardamomi sextans, lanæ admodum for didæ uncia sex, macerata in uini sextarijs duob. per triduum coquito, donec pusillum relinquatur. his exemptis, uino ad misceatur olei quadrans, & denuò usque ad maximæ partis consumptionē elixetur, uino q; etiam tunc addatur colophonia dextans, terebinthinæ tantundem. Sunt qui ceræ quoque uncias decem admisceant, & hyssopi herbe uncia alys concoquunt. Alij lanæ uino abluunt, desiccatis q; uinum cum for dibus, quas etiam Pinon appellant, adiiciunt. Vbi utendum est, ex eo uncias treis inijciunt, & reliqua quemadmodum dictum est.

De ceræ modo ad oleum.

Si ungenta, quæ eo quod laetitudinem demulcent, acopa uocantur, instruere uolueris, olei quadruplū ceræ admisceas. Si autem liquidum ceratum, quemadmodū in fracturis ad ornatus, duplum. Quod si medicamentum emplastri specie machinari constituerimus, æquis portionibus ceram & oleum confundemus, si aer ambiens moderatus extiterit. Si uerò cera uetus, aut squallida, & aer frigidus existat, oleum quantitate ceram parum excedat: quemadmodum & quando cera pinguior, et qui circumfunditur aer calidus fuerit, cera nonnihil olei quantitatem exuperet. Esto autem momentum illud, duodecima medij ad utrūq; portio, undecim enim uerò, uel tredecim olei uncias cum ceræ libra permiscebis.

Ex

Ex monumentis Antylli, de elixatione medicaminum,
quæ emplastris immittuntur.

In medicamentorum decoctionibus spuma argenti in oleo elixetur. Oportet autem lauiatam rursus cum oleo, ad sordium consistentiam conterere: deinde clementi igne continenter agitando, decoquere. Principio igitur turget, et bullis effervesceat: imminente uero iam absoluta decoctione, colorem feculentiores præfert. Mensuram autem decoctionis esse scias, quum tumor et recrementa quæ ex ebullitione separantur, cessauerint. Plumbago spumæ argenti modo elixetur. finis coquendi erit, non solum dum ex coctura recrementi nihil de cedit, sed quum ex igneo colore in uermiculum et ualde floridum commutatur. Aes crematū ad decoquendum non intra initia statim inijcitur, sed emplastro iam semidecocto. Modus autem decoctionis est, quū, si non admodū exiguum imponatur, colorem ipsius induit, atque rubrum reddit emplastrū. Sori atque diphryges, et ipsa cū decoctione immittuntur. finis uero coquendi, diphrygis quidem, quemadmodū et squamæ, dū cætera colore superat: sori autem nullum peculiarem coquendi modum habet, sed omnibus communē, dū uidelicet inspissetur, et emplastrum digitos non inquinat. Chalcitis more aris decoquitur, et moderatur eius decoctio, dū aliquantisper rubicundius et puniceum magis efficitur emplastrū. Flos aris instar aris decoquitur, et rationem decoquendi cæteris communem obtinet: Atramentum sutorium, mediæ decoctioni immittitur. Decoctum autem acriorem inducit emplastro colorem: et nisi alia resistent, acrius adhuc reddit emplastrum. Myrsi ultimo quidem et perfectæ decoctioni immittitur, proprium autem decoquendi modum non habet. Auripigmentū et sandarachia in fine decoctionis inijciuntur. Plumbum uero deustum mediæ elixationi immiscetur. Cerussa in candida emplastra postremo inditur: conseruat enim eo pacto dolorem, et uehementius albescit. In nigra uero con-

Z z

festim

festim à principio: decocta enim, multo nigrior euadit.

Aerugo in emplastra uiridia post decoctionem inseritur, in quibusdam uerò neque ab initio statim in lebetem inijcitur, sed cum aceto friatæ & manenti in pila affunduntur cætera, in melinis autem semicocta iam compositione inseritur. Iustam quidem nacta decoctionem, giluum repræsentat colorem. In his autem quæ geminam speciem & bicolorem præferunt, diprosopa & dichroma uocata, post principia statim coquimus rubiginem. postea enim per decoctionem, primum quidem melinum inducit bicipitem factum, postremo autem uermiculum colorem induit.

Alumen magna ex parte post decoctionem inditur, proprium tamen decoquendi modum nullum habet.

Rubrica, quam minium dicunt, in fine, cadmia & pompholyx initio, decoctionibus induntur.

Salia & nitrum medicæ decoctioni, sulphur extremæ tandem inferuntur. Cæterum elixatio eius nigricat emplastra.

Terra quæuis, & lapides cuncti magnâ ex parte in fine decoctionis imponuntur. Pumex item & cõchulæ crematæ.

Oleum siquidem ab initio immittatur resinæ aut pici liquidæ, non inspissetur emplastrum. Postquam igitur decocta in spissata cõstiterint, adijciendum est oleum, reliquas uerò pinguedines insulas circa mediam decoctionem immittere expedit. Unguentum trinum, decoctionem quidem admittit, cyprinum aut & rosaceum minus, cætera uerò nullam: quocirca in fine decoctionis immittenda sunt. Cera sola priuatim non decoquitur, comburitur etenim, neque cum resina liquida, aut pice liquida. haud enim inspissescit, sed superinijcitur uel oleo puro, uel cum oleoso quopiam ex metallicis decocto, uel resinæ aut pici præelixatæ, & citius alijs quæ possunt inferi, coit.

Resina arida cum cera inditur, liquida uerò ante alia omnia per se decoquitur, nisi admodum exiguum eius momentum accipiatur.

PIX

Pix præ alijs cunctis immittitur: modus autem decoctionis est, liquidæ quidem, dum spissescit: sicca uerò, maxima ex parte, dum inter coquendum nihil amplius neque in bullas at tollitur, neq; turgescit.

Apochyma læuigatum, cribroq; à suis superuacaneis sequestratum, & deniq; decoctū, emplastro inditur: quod si fuerit molle, cum oleo diluitur. Cæterum prior ratio exactior est, propterea quòd in altera pondus non obseruatur.

Bitumen quoque principio ad decoquendum immittitur, neque in leuiorem conterendum est, quoniam scabredines fieri et oliuarum acinis similes continet: sed in crassas adedò partes confringere, cumq; aceto decoquere, non commouendo interim, quousque non amplius ampullarum modo turgeat, expedit. Nos uerò, inquit Timocrates, in oleo elixantes, uoti compotes facti sumus.

Propolis quoque emollienda & elixanda est, ne utiquam enim à decoctione diffunditur. Quod si emplastrum ceram quoq; accipiat, oportet unà cum cera propolim galbani more contusam immittere.

Gutta ammoniaca circiter mediam decoctionem immittitur. Oportet aut hanc læuigatā, si fieri potest, et tenuē inspergere: sin minus, cū liquore quopiā contritā inycere: si cruentis dicatum fuerit emplastrum, cum aceto aut uino fistulis aut strumis, omnino cum aceto: si uerò molle futurum sit, ut sunt quæ sedi adaptantur, cum aqua, deinde strigmenti crassitudine inducta, alijs refrigeratis ne ebulliat infundere.

Admiscetur opopanax multo serius quàm ammoniacum, omnino autē modica decoctione eget. Est uerò etiam ille cum uino aceto ue antea læuigandus.

Galbanum nullam decoctionem sustinet, sed postquam ab emplastro nil recrementi per cocturā secesserit, ab igne sublato, quo inspissetur, subactum inichatur.

Z z z

SAGA-

Sagapenum in mortario contunditur, & ubi teneritudinem assumpserit, sublatum ab igne cum emplastro mollicatur.

Aloe emplastris post decoctionem inditur.

Succus papaveris pridie in aquæ momento irrigatur, deinde in pila conteritur, mox emplastrum superinfunditur.

Thapsia postremo inseritur, uel liquore aliquo diluitur.

Bdellium quoque laeuigatum emplastro ab igne remoto inditur. at si in pingue admodum incidat, ut laeuigari nequeat, sagapeni more contusum, & in emplastri formam redactum, cum emplastro post elixationem eliquabimus.

Thuris lachryma pariter et manna decoctioni iam absolutæ insperguntur, strigmenti instar, cum melle pauculo, acetone, aut aqua, aut uino inspissata, si humorē partici pat emplastrum.

Myrrha perfectæ decoctioni inditur.

Nulla neque seminum, neque radicum, neque herbarum decoctionem ullā sustinent: qua de causa laeuigatis, & in pila adhuc depositis, liquida infunduntur.

De malagmatis & epithematis. Cap. 18.

EX medicaminibus quæ emolliendi uim habent, & ob id malagmata dicuntur, alia quidem medijs regionibus corporis imponuntur, diuturno iam tempore inflammatis, uel induratis, uel æstu feruentibus, uel perfrictione confluantibus, uel defluxione infestatis: alia articulis oppilatis, uel nervis algore uexatis, uel alijs etiam corporis partibus scirrhopressis competunt. De his itaque capite de emplastris memoratum est, & de acopis fusius enumerabuntur. Ex his autem quæ medijs corporis partibus congruunt (proprie epithemata nuncupantur) quæ sanè stomacho & iocinori adhibentur, qualiacumque illa fuerint, roborantem potentiam ex adstringentibus requirunt. absque his enim uitæ periculum est, quoniam hæc membra uitæ communia instrumenta sint: quapropter medicamenta huiusmodi, ex aromatis potissimum componuntur. Stomacho igitur pro suo munere non coquenti, imbecillo, inflatio

inflatione ue laboranti, ea quæ ex seminibus & meliloto, aloe, absinthio, sampsucho, nardo & mastiche denique constituantur malagmata, applicanda sunt. Iocinori uerò, quæ ex glande unguentaria, gutta ammoniacæ, adipe, & chamæ melino confiunt. Lienem autem, quæ ex calce aqua non extinguitur, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine, gutta ammoniacæ, & aceto contextuntur, conueniunt. His uerò qui fluxu alui impetuntur, ex cœnanthe, alumine, melino, & alijs astringentibus conflata, quæ per abusionem etiã malagmata uulgo nuncupant, etiam si contraria his quæ emolliendi uim habent potentia constent. Quibus aut uiscera æstu flagent, quemadmodum in febribus accidit ardentibus, his malagmata et epitthemata è croco, rosaceo succo, seminis lini, aut sereos, aut herbe sanguinalis, adipe suillo et spuma argenti conducunt. Refrigeratis porrò, quæ è succo balsami, folio, cassia, pipere conficiuntur. Pectoris autem, in sanguine nempe excretionibus, astringentia et desiccantia, quæ ex alumine, salice, et bitumine contextuntur. In tabe uerò, ex bacis lauri, marrubio, cardamomo, lixiuiòq; cōflata expediunt.

Malagma ex fertula campana.

Accipit croci, nardi Gallicæ, cyperi, cardamomi, ireos, myrrhæ, singulorum sextantem, meliloti libram, ammoniaci thymiamatis libram, ceræ libras treis, resine terebinthinæ libram, olei cyprini libras tres, gleucini libras duas, bdellij uncias sex, quidam etiam cyphæos sextantem admiscent, uini quantum satis est.

Poliarchion, ex libris de compositione medicamentorum secundū locos Galeni.

Ceræ, resine terebinthinæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, singulorum mystrum, meliloti, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, ligni cinnamomi, uniuscuiusque denarij uiginti quinq; , olei cyprini hemina, uini Italici quantum sufficit. Præpara, & utere, interdum meraco, interdum cerato, oleo cyprino dissoluto.

ZZ 3

Aliud

Aliud Polyarchium.

Ligni balsami, costi, ireos, cyperi, myrrhæ, rotundi odorati iunci floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellij, anomi folij, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, ammoniaci thymiamatis uncia una cum dimidia, resinæ frictæ quadrans, terebinthinæ pondo, medullæ ceruinæ sextans, ceræ dupondo, succi balsami uncia sex, uini uncia octo.

Malagma Philagrianum.

Croci sesquuncia, aloes, ammoniaci thymiamatis, bdellij, styracis, uniuscuiusq; uncia, adipis anserini uncia duæ, hyssopi pharmaci uncia quatuor, palmularum duæ, ceræ libra, nardi selibra, amelini uncia sex, uini quantum ad aridarum specierum eliquationem satis est, macerata per triduum, palmeaq; rudicula cōmouetur ter die; deinde oleo simul decocta, secundo quidem die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus uino: sunt qui croco alium myrrhæ quincuncem adijciunt. Vbi hæc percolata fuerint, oleum synce-
rum reseruatur. sex specierum quolibet in pastillos conformata, desiccataq; id quod crocomagma appellatur, repræsentat.

Mendesium.

Diā est mendesium, quod in Aegypto, ubi pascitur mædes, inueniatur. Recipit aut olei balanini libras decem (in alio habetur, sextarios decem) myrrhæ, cassiæ fistulæ singulorum quadrantē, resinæ terebinthinæ librā (aliās sextarios decem) cinnamomi quadrantē. Illud nō decoquitur, sed iniectus aridis agitur ad dies 60. deinde terebinthina eliquata in partē olei mit-
titur, mox denuō aloes dies 7. mouetur, & ita reseruatur.

Martianum.

Mastiches, ceræ, styracis, singulorum quadrans, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami sesquuncia, nardini, gleu-
cini, olei omphacini, uniuscuiusq; quadrans, medullæ ceruinæ sesquuncia, terebinthinæ uncia.

Diomphacos

Diomphacos iniectio prima.

Aspalathi, rudiculæ palmularū, meliloti, iridis, iunci rotundi odorati floris, xylobalsami, rosarum aridarum, calami odorati, singulorum quadrans (olei omphacini libræ decem, succi uuæ acerbæ sextarij decem.

Iniectio secunda, ex caryophyllo.

Guttæ ammoniacæ, spicæ nardi, costi, caryophylli, castiæ, cassami, uniuscuiusq; quadrans (in alio legitur, arnabi quadrans) uini quantum satis est.

Iniectio tertia.

Thuris ammoniaci thymiamatis, styracis, bdellij, myrrhæ, mastiches, singulorū quadrans, uini quātū satis est, ceræ albæ quincūx, opobalsami uncia 6. quidā habēt uncias octo. Primæ iniectionis species succo uuæ acerbæ et oleo pridie maceratur: secūdæ uerò, in altera pelui, minimè capaci, in uino Amineo, aut alio ueteri & odorato, moueturq; qualibet die rudicula palmea: tertiæ ad triduū, à quo tēpore in cacabo splendido species primæ iniectionis, tātisq; dū pusillū succi uuæ acerbæ relinquatur, decoquito: deinde alterius iniectionis species confestim cū uino immitte. melius uerò, si prius alijs sublati, sic oleo puro injiciatur, et ad perexiguas uini reliquias decoquantur, ne cōburatur oleum. deposita ab igne colabis, et rursum tertiæ embolas species oleo non impuro injcito, in pila prius cum uino ueluti diximus, dilutas excepto styrace: is enim iniectus cum alijs prōpte soluitur. Coquito carbonib. haudenus dum tibi bene habere uideatur, remotaq; ab igne, refrigerari finito: postera autem die accuratè exemptis ex oleo, & calfactis abunde super ignem ceram indito, depositaq; rudicula agitato. Vbi refrige, rata fuerint, opobalsamū injcito, et uitreis uasculis reponito.

Gleucinum iniectio:

Olei sextarios decē, musti Amineo sextarios sex, aspalathi quadrantē, rudiculæ palmæ uncias sex, floris rotundi iunci odorati tantundem, meliloti trientē, rosarum uncia, myrrhæ quadrantē, foliorū lauri sextantē, arboris thuris, xylobalsa-

ZZ 4 mi,

mi, enule campanæ, singulorum uncias sex, aristolochiæ longæ, ireos, cuiusq; quadrantem, simul in musto macerabis.

Iniectio secunda.

Celticæ nardi triens, balsami fructus sextans, cyperi, cassiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum quadrans, calami odorati, caryophyllorū, folij, uniuscuiusq; uncia, cardamomi triēs. Balsamū in uino fragrante irrigatur.

Iniectio tertia.

Mastiches uncias quatuor, myrrhæ troglodytidis, bdellij, singulorum uncias duas, ladani uncias treis, styracis liquidi, thuris masculi, cuiuslibet uncias quatuor, opobalsami uncias sex, nonnulli admiscunt etiam croci uncias duas. Confice quæ admodum & diomphacos, excepta cera. Hic autem oportet diebus septem duarum iniectionum species macerari.

Nardus Cizicine, Iniectio prima.

Olei primatis sextarios decem, aspalathi, cypearum, inulæ campanæ, ireos, xylobalsami, mali terræ, cardamomi, rotundi iunci odorati floris, singulorum uncias sex, sampsuchi trientem, herbæ Sabinæ sextantem, quidam adijciunt his calami quoq; odorati sextantem: hæc in uini odorati sextarijs quatuor irrigato.

Iniectio secunda.

Cassia, cassami, arnabo, singulorum sextans, spicæ nardi quadrās, caryophyllorum uncia, costi, amomi, cuiuslibet sextans. quidam etiam nardi Gallicæ uncias duas adhibent; atq; hæc quidem uino excipiuntur.

Iniectio tertia.

Myrrhæ troglodytidis, aloes, thuris, singulorū sextās, styracis quadrans, mastiches triens, opobalsami uncia sex: sunt uero qui etiam croci uino dissoluti unciam admisceant. Preparato etiam illam, quemadmodum dictum est.

Decamyron.

Spicæ nardi, folij, euphorbij, piperis, costi, adarcæ, singulorum uncia, mastiches uncia una & dimidia, opobalsami uncia

Unciæ sex, nardini libra, ceræ tripondo.

Pentamyron.

Styracis uncia, mastiches sextans, ceræ albæ quadrans, opopanax tantundem, nardi quincunx.

Odorificum.

Croci, aloes, mastiches, absinthij, styracis, cenanthes, cassami, caryophylli, singulorum quadrantem, nardi libram, ceræ tantundem, melini uncias sex, dactylos palmarum duodecim, uini quantum opus est.

Baium malagma.

Cardamomi, cassiæ, cenanthes, nardi Gallicæ, balaustiorum, propoleos, singulorum scrupuli octo, sabinae, cassami, amomi, cuiusq; scrupuli sex, floris rotundi iunci odorati dioboli octodecim, iridis scrupuli quatuor, caryophylli sesqui scrupulus, thymiamatis crinati sextans, thuris, myrrhæ, cuiusq; uncia, ladani selibra, bdelly, mastiches, aloes, nardi, olei leniscini, cuiuslibet semuncia, resinae acernæ, piceæ, terebinthinae, cuiuslibet quadrans, opobalsami uncia, ammoniaci thymiamatis dioboli sex, ceræ uncia sex, liquida cenanthino dissoluito, & arida contusa: aliàs etiam piperis scrupulos duodeuiginti reperio. Sunt item qui moschi scrupulum unum adijciunt.

Galenium.

Croci uncia dimidia, aloes uncia, mastiches quadrans, seminis absinthij dioboli octo, cenanthes tantundem, palmulæ grandiores tres, ceræ quadrans, olei melini uncia sex.

Erythrium.

Styracis quincunx, malorum cotoncorum uncia uiginti, masuchæ uel masuaphij, croci, singulorū denarij decem, psicharum, cypheos, singulorū denarij quinq;, cenanthes uncia duæ cū dimidia, cassami, absinthij, singulorū denarij decem, caryophylli dioboli quindecim, ammoniaci thymiamatis grammata decem, opobalsami grammata sex cum dimidio,

Zz

5

nardi

nardi quincunx, colophonice, gleucini, melini, uniuscuiusq; dextans, rosacei denarij decem, propoleos quincunx, resinae terebinthinae dextans, mellis cochliaria decem, folij denarij decem, spicae nardi tantundem, cerae uncia septem & semis, uino Phalerno uel Amineo eliquabis.

Malagma Nili, spleni consecratum, & ad omnem duritiem.

Cerae libra, ammoniaci thymiamatis libra, olei cyprini tantundem, croci uncia dimidia, allij uero uncia, aceti quantum satis est.

Malagma citrinum.

Cerae, colophonice, uniuscuiusq; libra, gutta ammoniaci thymiamatis, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathi octo, arida contere aceto.

Malagma Curei.

Habet picis siccae libram, cerae, resinae piceae, ammoniaci thymiamatis, nitri, baccharum lauri aridarum, seu taurini singulorum libras duas, farinae scenograeci sextarium, pollinis tantundem, chamaeleontis nigri radicis aridae libram.

Malagma ex stercore caprino, Oribasii, lienosis, hydropicis, & iocinoris duritia affectis.

Olei cyprini, uel olei antiquissimi libras treis, cerae libras duas cum semisse, merdae caprarum, baccharum lauri decorticiatarum, ireos Illyricae singulorum sextarios decem, resinae terebinthinae libram, sinapis, nitri, cyperi, seminis radicae, corticis radicis capparis, cuiuslibet quadrantem, colocynthis interanei sextantem, scenograeci unciam. Arida nunc quidem liquidis excipiuntur, nunc aceto macerata. Atqui si uenter fluore infestetur, non adiungenda colocynthis est.

Ex stercore, caprillo, spongium hydropicis utile.

Constat ex picis brutiae libris duabus & dimidia, nitri libra, interanei colocynthis farctus, pyrethri, opopanax, grani gnidij, singulorum quadrante, corticis radicis capparis, thuris,

thuris, ireos, adipis taurini, elaterij, squamæ aris, seminis apij, lathyridum, uniuscuiusq; uncijsex, baccarum lauri sextario dimidio, fœnogræci farina semuncia, fellis taurini sextante, olei cyprini sextario dimidio, ceræ libra, resinæ frictæ libris tribus, excrementi capræ montanæ, seminis roris marini, cyperi, cardamomi, cuiuslibet uncijsex.

Ex baccis lauri.

Accipit ceræ, resinæ, picis, baccarū lauri, adipis taurini, singulorum libram, nitri, guttæ ammoniaci thymiamatis, cuiuslibet uncias sex, aceti quod satis est.

Malagma ex feminibus.

Cardamomi, cyperi, sabinae, nitri, baccarū lauri, cassiæ, meliloti, fœnogræci, nardi Gallicæ, seminis apij, sampsuchi, anisi, radicis panacis, thuris, guttæ ammoniaci thymiamatis, resinæ terebinthinæ, singulorum quadrans, mellis, ceræ, nardi, adipis tauri, uniuscuiusq; libra.

Tetri odoris pleureticum.

Resinæ picæ libra, ceræ, rutæ uiridis, cyprini, singulorum uncia sex, sulphuris ignem non experti, opopanax, sagapeni, cuiusq; denarij quatuor, quibusdam uerò placet adiungere galbani fescunciam.

Malagma ex sampsucho.

Ceræ libra, resinæ terebinthinæ libræ duæ, sampsuchi, baccarum lauri, fœnogræci, singulorum sextarius, nardi quantum satis est.

Malagma Apollophanis ad iocinerofos.

Ceræ denarij octoginta, resinæ terebinthinæ, manna, singulorū denarij quadraginta, pila fece irini oblita contunde.

Copton ad stomachi duritiem, & iocinoris.

Propoleos selibra, styracis sextans, mastiches uncia, resinæ terebinthinæ uncia dimidia, fecis nardi quantum satis est.

Malagma ex œnanthe.

œnanthes, aloes, croci, acaciæ, aluminis fissi, rosarum aridarum, absinthij succi, gallæ, omphacij, rhoos Syriaci, manna,

mannæ, cuiusq; denarius, olei myrsinati, ceræ, singulorum libra, dactyli palmæ ingentes quinq; , uini Aminæi quantum satis est.

Antylium.

Aluminis scissi uncia dimidia, aloes uncia, mastiches diobolus, cenanthes grammata sex, omphacij grammata octo, rosarum aridarum tantundem, rhus Syriaci dioboli decem, acanthes Aegyptiæ scrupuli decem, balaustiorū grammata uiginti, gallarum dioboli quindecim, ceræ quincunx, olei melini quantum satis est.

Malagma ex acinis uinaceis.

Continet croci, sandycis, cenanthes, singulorum unciam, aluminis aridi trientem, balaustiorum, omphacij, rosarum floris, myrtorum siccorum, uniuscuiusq; sextantem, ceræ dealbatæ libram, olei melini dupondo, malorum cotoneorum trientem, dactylorū qui Nicolai dicuntur, decem, uini Aminæi quantum satis, acinorum aridorum bessem. In usu autem medicaminis quadranti ceræ unciam temperabis.

Anethina.

Anethi uiridis uncia sex, meliloti sextans, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem, elixorum decocti tripondo, & olei quod satis est. Quando autem consumptum fuerit decoctum, in iuce adipis porcini recentis dupondo, laeuigatoq; seorsim scillæ assatæ interanei sextantem, & medullæ cerui tantundem, omnia misceto.

Ambrosia arcendis febribus.

Habet spumæ argenti libram, adipis porcini recentis uncias sex, succi seminis lini scilicet libram, ceræ dealbatæ dodrantem, rosacei libram, mellis quadrantem, croci unciam. Nonnulli etiam lutea ouorum decem cruda adiungunt.

De Acopis, Vnguentis, Dropacibus, & Sinapismis. Cap. 19.

Copa inde dicuntur, quod præcipuè contra copos, id est **A**lasiitudinis, uerbi gratia, intensiua, huiusmodi, & eius quæ

quæ ossa defatigat sensus adhibeantur. Tametsi alijs quoque compluribus affectionibus ex usu sint. nam alia quidem calfaciendi, alia uerò emollicendi facultate sunt prædita. Calorifica, ex pipere, pyrethro, semine roris marini, et id genus alijs contexta, nervorum doloribus, algoribus intensis, & ijs quæ agrè cal fieri possunt, benefaciunt. Emollientia, ad duritias, scirrhus, & articulos infarctos conferunt, quorū materiam in capite de Emplastris enumerauimus. Emollientibus uerò, quæ adarce, semine roris marini, euphorbio, grano cnidio, & consimilibus constāt, in malis diuturnioribus, & difficulter elidendis, quibus sinapismi etiam usus congruit, utimur. Acopa porrò cuncta mediā inter cerota & emplastra consistentiam habere conuenit. Vngēta autem etsi acopis respondeant, spissitudinem tamen liquidiorē quodammodo obtinent. Cæterum dropax duplicem præparationem admittit, hanc quidem emplastro, aliam uerò malagmati asimilem. Nonnulli uerò ipsum quoque calidū illinunt, materiā autē acopis & emplastris comparē. Vsum autē cataplasmatidis præstat, iisdem languoribus quibus & sinapismus ex usu est, cū ante sinapismum, ut corpus ad sinapi præparetur idoneum, tum post sinapismū, quod affectionis reliquæ amputentur, applicatus. Conficitur autē sinapismus ex materia quidem non uaria: sed efficacissimus est, diutinis potissimū affectionibus, post dictam aliorum præfidiorū facultatem expediens. Magna cum utilitate capiti, cum primis in cephalæa, hemicrania, morbo sacro, quem Græci epilepsian uocant, uertigine, & mania adhibetur: thoraci uerò, in difficultate anhelitus, orthopnoea, tussi diuturna. In diutino uerò catarrho, capiti, & thoraci sinapismus applicandus est. Iam uerò & stomachum ipsum, & uentrem uniuersum in diuturnis eorundem languoribus sinapi oblinimus. Accommodum porrò ischiadicis, podagricisq; & singulis corporis partibus languidis & flaccescentibus, aut alijs quodammodo, ita ut nullo calore

lore refocillari queant, perfrigeratis est remedium. Esto autem efficaciae medicaminis finis, quum dolor insigniter afficit, liuidiorē insuper & tumidiorē carnē efficit, cūq; lotionē adhibita, pustula clementer ebulliant. Quodd si sensus etiā perierit, animaduertendū est, quoniam ita affecti, si adurantur, non sentiunt: regione delibuta quantumuis, ungento frequentius detecta. In acutis præterea affectionibus, inexpugnabili nempe somni necessitate, grauiori ad altiore quietē impetū & catochō sinapi inducitur, principid quidē cruribus. Vbi materia radices egerit, capiti. His uerō qui frigus, quod difficulter calore uinci potest, experti sint, cruribus & inguinibus sinapismus adhibendus est. Auerſandus autem incontinenter febrientibus, hūcus habentibus, & cartilaginosis, macilentioribusq; sinapismus est. comburuntur enim interdum, & denigrantur partes non carnosæ, sinapi adhibito.

Acopum Bromium.

Ceræ, colophonice, resinæ, singulorum libra, seui ſuilli triens, butyri uncie sex, althææ, fœnogræci, seminis lini, unius cuiusq; dupondo, olei pondo, galbani uncie duæ cum dimidia. Succo pariter cum oleo usq; dum maior pars consumpta sit, decocto, reliqua cum cera & galbano inijce.

Acopon Pœcillum, hoc est multiplex.

Liquoris althææ, fœnogræci, seminis lini, rutæ, cymini, singulorum dupondo, medullæ ceruinæ, olei ueteris pinguedinis anserinæ, opobalsami, nardi, cuiusq; pondo, ceræ, colophonice, resinæ, cuiuslibet sesquipondo, euphorbij, resinæ terebinthinæ, opopanacis, cuiusque uncie sex, castorij quadrans, herbarum ex quibus succus exprimitur, singularum libra adnectenda est. Decoque instar proximi.

Acopum Azanitzæ.

Seui porcini libræ binæ, pinguedinis taurinæ, resinæ, colophonice, hyssopi pharmaci, ceræ, singulorum as, galbani quadrans.

Acopum

Acopum Basilii.

Alibææ, chamæmeli, meliloti, feminis lini, fœnogræci, singulorum fescuncia, amomi quadrans. Hæc in uini Ascaloni, aut Ciliciensis sextarijs octo, per triduum macerantur, et ad mellis usque spissitudinem elixantur, deinde liquoris libræ quinq; cum oleo ueteri, pondo librarũ quatuor cum dimidia, usq; dum liquoris medietas tantum supersit, decoquantur, & immittuntur butyri uncia sex, resina terebinthina triens, adipis anserini uncia quindecim, medulla ceruinæ cum olei momento læuigatæ quincunx, ceræ candidæ tripondo.

Acopum Lysiponium.

Piperis, castorij, styracis, mastiches, aloes, inula campana, ireos, singulorum triens, euphorbij, costi, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, castiæ fistulæ, cachryos, cuiusq; quadrans, adarces, amomi, bdelly, ligni balsami, uniuscuiusq; sextans, malobathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum uncia, succi balsami libra, nardi cyprini, leucini, cuiuslibet libræ duæ, ceræ libra.

Acopum a fœtore dysodes appellatum, ex libris de compositione medicamentorum secundum genera.

Ceræ, resina terebinthina, singulorũ denarij uigintiquatuor, galbani, guttæ ammoniaci thymiamatis, cuiuslibet denarij sex, olei hemina duæ, medulla ceruinæ denarij octo. Vtere syncero & dissoluto. Aliud dysodes: Resina terebinthina denarij sedecim, ceræ denarij uigintiocto, æsypi, mellis, singulorum denarij sex, medulla ceruinæ uncia sex, guttæ ammoniaci thymiamatis, galbani, spumæ nitri, baccarũ lauri, uniuscuiusq; uncia sex, olei ueteris sextarius, uini cyathi duo. Nonnulli castorij quoq; drachmas treis adnectunt.

Acopum barbaricum ex euphorbio, coxendice dolentibus & aliis pluribus utile.

Opopanacis uncia, ceræ Tyrrhenicæ libra, resina terebinthina libræ duæ cū dimidia, galbani uncia, guttæ ammoniaci

niaci thymiamatis uncia duæ, euphorbij, castorij, piperis albi, singulorum uncia duæ, medullæ ceruinæ uncia quatuor, cæsypii uncia quatuor, lemnestidis (est autē adarce) uncia dimidiata, olei styracini, laurini, irini, amaracini, singulorum uncia sex, olei ueteris libræ duæ, hedychroi uncia sex.

Pyxis acopon.

Colophonæ libra una & semis, terebinthinæ bes, guttæ ammoniaci thymiamatis quadrans, thuris dodrans, olei ueteris libræ duæ, succi seminis lini libra, lactis bouilli libra, adipis anserini uncia sex, butyri besßis, ouorum uigintiquatuor albumina, præparatum buxæ uase recondito.

Acopum ex abiete, Galeni.

Seminis abietis cæci modius Italicus, quod est sextarij duo decim, olei libræ quindecim, ceræ libræ quatuor, resinæ strobilinæ uel terebinthinæ triens. Contusum abietis semen in oleo mittitur: ubi in eo diebus quadraginta permiseris, expressum porrice, atq; reliqua admisceto. Vtere contra spontaneas lassitudinum molestias, resolutiones, et articulorum perfrictiones. Quod si urgeat necessitas, coquendum est abietis semen cum oleo, permiscendo, ne cõburatur, aquæ sextarios quatuor, in podagricis scilicet, & arthriticis affectionibus. Ali ter idem: Olei hemina uiginti quinque, quod est, sextarij duo cum dimidio: fructus abietis mystum, hoc est sesquilibra, resinæ abiegnae libræ tres, strobolinæ uel terebinthinæ tantundem, ceræ libra.

Ex alno, ad eosdem languores.

Loco fructus abietis, alni (quæ populus nigra est) fructus parem quantitatem iniiciens, & cætera eodem cum illo modo præpara.

Zosimi unguentum, ad tremores nobile.

Resinæ piceæ uncia sedecim, ceræ triēs, olei uetusti libra, opopanax sextans, adarces uncia una, euphorbij tantundē, nitri triens, spumæ nitri tenerioris tantundē. Nitrū, euphorbium

bium & adarcem contere cum uino, deinde liquorem panacis indito, simulq; laeuigato. Seorsim uerò liquibilia cum arbusa liquefacito ut coloretur, & refrigerata excipe.

Dropax Gallus, Oribasii.

Colophoniam thus referentis, pityinam, & ligneam appellatam, in sola Italia prouenientis, apochymatis, picis aridae, cerae, singulorum librae quatuor, resinae fridae unciae quindécim, picis brutiae librae duae, nitri libra, bituminis, galbani, adarces, pyrethri, uniuscuiusque unciae sex, opopanax, euphorbii, hellebori albi, piperis, cuiuslibet triens, sulphuris ignem non experti quadrans, castorei, guttae ammoniacae, uuae passae syluestris, cuiusque sextans, olei sicyonii libra, ligni balsami unciae sex. Aliter simplex: cerae libra, picis aridae sesquilibra, brutiae libra, resinae piccae sesquilibra, fridae libra & quadrans. Loco nitro prius absterso imposito.

Sinapismi praeparatio.

Ficus aridae pridie aqua tepida irriganda sunt, postero die praeualida exprimendo strenue laeuigandae: deinde acre sinapi, cuiusmodi Syriacum & Aegyptium est, priuatim conterendum, affuso illarum diluto, & massa confecta miscendum. Siquidem uolentius uoluerimus exulcerare, duas partes sinapis cum una ficuum temperabimus: si uerò mitius, è contrario: sin mediocriter, aequis partibus utraque confundemus. Ceterum sinapi ante contritionem aceto dilutum, quemadmodum aliqui faciunt, inefficacius redditur. A sinapis purgatione etiam lauacri usus est, si dolor intensus, rubore uel locus suffunditur, et pustulae oboriuntur, linteolum succo maluae aut fenograci cum rosaceo irrigatum applicemus, deinde rosaceo cerato addita cerussa utemur. In dissolutis uerò, in quibus sensus oblaesus est, multum diuq; aduertere oportet, ut membrum subinde retegatur & inspiciatur. admota etenim non sentientes, saepenumero supra modum exusti sunt, & caprarum baccae cum aceto cas-

¶

taplasmatidis

taplasmatibus instar illius efficaciores quam sinapi sunt, potissimum in his qui laborant coxendice.

Acopon ex atramento scriptorio rubrificans proprie, & hemicranicos potissimum, ex monumentis Alexandri.

Euphorbii, atramenti librarii, singulorum denarii quatuor, myrrhæ troglodytidis, crocomagmatis, piperis albi, cuiusque quadrans, croci denarii duo, aceti quantum opus est ad hæc læuiganda egregie, et ad spissitudinem strigmentorum balnearum. Atque tum illinito, à media superciliorum inchoans usque ad tempus totum, præcipue si pilis denudatus sit: postquam refrigeratum fuerit, rursum illinito: & ubi remedium bene officium suum peregerit, hominem affectum in lauacrum deducito.

Oleorum & unguentorum combinationes diuersæ. Cap. 20.

VNctionum & unguentorum uel oleorum, quæ unguinum naturam resipiscunt, simplicia quidem sunt, quum una oleo species inditur: quæ uero ex pluribus præparantur, composita. Ex simplicibus rursum aliqua ex floribus oleo inditis constituuntur: uerbi causa, rosaceum, chamæmelinum, susinum: aliqua uero ex fructibus & seminibus conflantur, quædam ex germinibus quibusdam: exempli gratia, rutæ, quæ etiâ cum oleo decoquuntur. Quoniam autem flores elixationem nullâ admittunt, insolantur potius: uerum si ualentiores habeant odoris fragrantiam & minimè euanescentem, pluribus diebus insolata, tenuioris essentiae partium, & usui multo commodiora redduntur, ueluti rosaceum & chamæmelinum. Qui autem imbecilliores, promptiusque diffiantur, insolatum minus perferunt, utpote quorum uirtus promptius euanescit, quemadmodum lilium & uiola. Ex his autem quæ fructus & semina constituunt, alia quidem ex ipsis integris oleo intactis conficiuntur, puta melinum: alia uero contusis uel contritis, oleoso, quod in eis continetur, segregato, siue expressis ipsis in cochlearibus, uel ex aqua calente discernendi gratia, ueluti carinum, seselinum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, rhicininum, raphaninum,

ninū, et id genus alia. Cōposita uerò ex plantis odoratis, magna ex parte oleo cū uino, uel musto, uel aqua decoctis, et inde eisdē exemptis preparantur. cōmixtis aut oleo quibusdā succis, interdū etiā adipib. aut medullis. Hæ istiusmodi quædam exacte oleosam consistentiā sortita, simpliciter unguenta uel unctiones dicuntur, ut gleucinum, nardinum, sicyonium, & cyprinum. Quæ uerò spissitudinem acoporum obtinent, ceram aut resinam, aut eiusmodi quippiam suscipientia, myracopa cognominantur: uerbi causa, decamyron, amaracinum, & eiusmodi. Atq; hæc quidem semel simulq; decoquuntur, quæ non admodum ex diuersi generis materia cōstant, quem admodum metopium, mastichinum, sicyonium: alia uerò duabus, aut tribus, aut quatuor iniectionibus: primum contumacioribus decoctis, uerbi causa, aspalatho, spathe, arbore thuris, lauro: deinde uerò aromatibus, folio, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo succis, adipibus, & medullis: si uerò contingat, etiam cera & resinis iniectis. Balsami uerò succus nunquam decoquitur, sed post exactam decoctionē refrigerato moderatē unguento immittitur. Quin ex ipsis etiā unguentis, quædam decoctionem minimē admittunt, sed admiscuntur tantummodo, sicuti mendesium. Sin autem qui uiride unguentum facientes, ipsius sextarium ab igne sublatum, in libris quinq; olei intingunt, æruginis rasæ diligenter leuigatae unciam unam & dimidiā iniicientes, quemadmodū in cyprino et amaracino. Iam uerò simplicia quidē unguenta specierū, quæ ipsis indita sunt, uel ex quibus cōtusis cōflata sunt, uires obtinent, ut ueluti materiæ rationē contineat oleū. Quæ ex uarijs constant, uniuersa natura in calidū mutāt, nonnulla uerò insigniter calfaciūt et emolliunt, sic ut artuū uitio quod angulosin uocāt, et obliuationibus eorū congruāt: è quorum classe sunt, metopium, mendesium, marciatū: moderatius aut pētamyron, decamyron uerò uehementius est, ut summa quoq; rodat. Cæterum medicriter calida, tenuium partium sunt, et

dolores mitigant, & maturant: quale est, fusinū, amaracinū, irinum, crocinum, pholeatinum. Quædam autem præterquæ quod calfaciunt, desiccant admodum & incidunt, cuiusmodi est cyprinum & sicyonium. Quædam uerò calorifica quidē satis, sed maiorem corroborandi uim obtinent, quo nomine stoma cho potissimum & uisceribus resolutis accommodata sunt: cuius farinae sunt, mastichinū, nardinum, & gleucinū. Valentiùs adhuc robur indit, quod ex uua acerba confectum est. Nonnullis postremò ungentis mulierculæ solius odoris gratia utuntur: uerbi causa, pholiato, spicato, cōmageno, & quæ mochelæa, id est ex musto oleoq; cōflata nomē obtinent.

Rosacei præparatio.

Rosarum rubearum detractis unguibus, & per diem noctemq; marcescentium quadrans, olei omphacini sextarius Italicus. Summa cura uasculo extrinsecus, ne diffletur, operaculato, sub dio ad quadraginta dies insolato: quibus elapsis, non in pauimento, sed in tabula deponito. Quidam loco insolatus ad puteū aquæ frigidae quadraginta dies appendunt, propterea quod ex frigore amœnus ac gratus odor conseruetur. Aliqui sub terram hoc ipsum defodiunt.

Chamæmelini præparatio.

Chamæmelorum floris, sine albis folijs marcescentis per diem naturalem sextans, olei sextarius Italicus, uase raro linteolo operto, quò commodius exhalet, insolatur: idq; ad dies quadraginta, à quibus probè contectum, reponito.

Olei anethini præparatio.

Anethi uiridis, comæ arescere incipientis unciam, olei dulcis sextarium Italicum, pari modo insolato. Confici autem potest pro temporis ratione anethinum, ubi insolatus denegatur copia: aridi nanque anethi comam cum oleo in diplomate elixantes utuntur, & chamæmelino consimiliter. Minoris uerò efficaciae hæc sunt is quæ ex uiridibus confiunt, præsertim insolatis.

Lilini

Lilini, quod alii eo quod in Sufis forsan inueniatur,
Sufinum appellant, confectio.

Foliorum liliorum candidorum cōsimili modo tabescen-
tium sextans, in Italicū olei sextarium iniectus exactè ne per-
spirent circumstringitur, & insolatur per triduum: quibus
transactis, primis floribus exemptis & proiectis, aliæ duæ
unciae per sequens triduum immittuntur, & sic reponuntur.

Sufinum lilinum ue compositum.

Olei sextarii tres, calami odorati libræ quinq;, myr-
rhæ quincunx, cardamomi libræ tres, foliorum lily detra-
ctis unguibus marcescētium libra, cinnamomi quadrans, cro-
ci Cilicij quincunx. Præparationem uniuersam in treis in-
iectiones diducito. Primum, myrrham & calamum uno
per quinque dies macerata, ter in die agitemus: post hæc oleo
quamminimum decoquamus. Secundò, cardamomum aqua
maceratum per triduum commouebimus, pari rursus ratio-
ne cum oleo ad horam unam simul elixemus: quibus deinde
exemptis, oleo puro liliorum tertiam partem inijciamus: &
lapso iam triduo, his quoq; exemptis, tertiam liliorum aliam
partem inijcito: quam iterum post triduum exemptis ac pro-
iectis primis, ultimam liliorum tertiam partem cum croco
læuigatam immitte: transactis tribus alijs diebus oleo detra-
cto, cinnamomum contusum indito. Loco huius arnabo, uel
cassia duplum, uel carpesium inijce, & reponito.

Iaton, id est uiolaceum.

Violaceum, alij quidem purpurarum, aliqui uerò cro-
cinorum, alij albarum uiolearum, unguibus detractis, folio-
rum uncias treis, in olei omphacini Italicos sextarios quin-
que inijcientes, præparant: & accuratè ne liberius euapo-
ret, undique constringentes, decem diebus insolare solent,
ter ipsa post triduum commutantes, perinde atq; lilia. ad con-
seruandum præterea pauca quadā exactè arida immittunt.

AAA 3 Melini.

Melinum.

Conficitur melinum è malis cotoneis,exteriore pāniculo subactis, & cum corticibus suis in frusta concisis:deinde ipsorum uncys tribus in olei omphacini sextarios Italicos decem iniectis,& quadraginta dierum spacio insolatis.

Sesaminum.

Oleum sesaminum fit, contritis aut contusis sesamis, & per fiscellas in testulā expressis, in aqua calida oleo ipso sequestrato, & vitreis uasculis reposito.

Raphaninum.

Raphaninum quodque in Aegypto è raphanorum gracilium radicum contuso & selecto semine, cæterorum more conficitur.

Rhicini preparatio.

Et illud cæterorum modo in Aegypto fieri consuevit ex semine rhicini, quod ab insecti similitudine croton appellatur, compari more contuso, uel læuigato.

Olei populei confectura.

Veris tempore, quando magna circa semen resina est copia, præparatur ægirinum. grana namque nigrae populi conquassata unc. quatuor, in dulcis olei sextarium immittunt, & dies quadraginta insolant, uel in cacabo tribus horis decoquunt, & ita colata reponunt.

Oleum amygdalinum.

Conficitur etiam amygdalinum prædictorū more: amygdala amara & pura contunduntur, & aqua exigua insparguntur, & ceu dictum est, sequestrantur. Quidam autem conquassatorum amygdalorum sextantem in dulcis olei Italicū sextarium immissum, in lebetæ elixant.

Amygdalinum quod & Metopium nuncupant.

Aegyptij huius olei inuentores, Metopium ipsum appellauerunt, eo quod galbanum accipiat. planta namq; ex qua galbanum emergit, metopium nuncupatur. Constant autem ex olei omphacini sextarijs uiginti, amygdalorum amariorū

porum libris duabus, cardamomi libra, floris rotundi, iunci odorati, calami odorati, carpobalsami, singulorum libra, myrrha, galbani, cuiusq; uncys sex, terebinthinæ libris duabus, uini perodori ad arida maceranda sextarijs quatuor, mellis Attici libris tribus. Resinam & galbanum læuigata, cum parte olei soluta alijs decoctis inijciemus, & ipsum mel: mixta uerò diligenter omnia, auferentes ab igne, dum adhuc tepidum est, colemus: spissum nanque euadit refrigeratum.

Balaninum.

Balaninum quoque oleum simili cū amygdalino ratione præparatur, ex querneis glandibus.

Carinon, id est ex iuglande.

Nuceum quoque ad balanini instar ex iuglandibus uelustis conficitur.

Laurini faciendi ratio.

Purum quidem laurinum consimilem faciendi rationem habet, ex bacca lauri. mixtum uerò hoc modo conficitur: maturarum oliuarum sextarius in baccarum lauri sextarios duos inditur, conteruntur omnia, et exprimuntur. Sunt qui utriusq; æquale pondus misceant.

Lentiscinum.

Lentiscinum oleum ut laurinum præparatur, ex fructu lentisci bifariam, quum per se, tñ adiectis oliuis non maturis.

Mastichinum.

Mastichinum simplicissimum hoc modo paratur. Mastiches in Chio insula natæ uncia, omphacini olei sextario Italico permiscetur, & in olla decoquitur: nonnulli uerò ab sinib; & styracis, cuiuslibet unciam adijcere consueuerunt.

Mastichinum magis uarium.

Olei sextarij quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalsami libræ decem, florum iunci rotundi libræ quinque, cardamomi lib. 7. mastiches lib. 5. xylomastiches lib. 5. terebinthinæ lib. tres, absinib; comæ lib. uini odorati sex

Aaa 4 tarj

tarij quinque, aquæ sextarij decem. Maceratae uino res apide ante triduum commiscuntur oleo & aqua, & elixantur horas sex, tum: que mastiche & terebinthina injiciuntur, & exacte commixta & infrigidata depurantur, & transfusa reponuntur.

Sicyonium simplex.

Præparatur ex radice cucumeris sylvestris exiccata, uncijis duabus, in olei Italici sextarium iniectis, & in cacaobo decoctis.

Sicyonium compositum.

Olei sextarij decem, cucumeris agrestis radicis deraſe libra, serpylli, meliloti, singulorum uncia sex, tædarum picearum pinguium, alibæ, singulorum quincunx, scolopendrij unc. sex, scænograci sextarij duo. Præmaceratur scænogracum aqua primo diem unam, deinde colatur, & immittuntur dictis cum oleo & uini sextarijs duobus: omnibusq; decoctis, adijciuntur med illæ ceruinæ cum olei momento læuigatæ unc. quatuor, adipis gallinarum totidem, ac denuò colatum oleum alio uase recondito. Nec de sunt qui ipsum post decoctionem dies quadraginta insolant.

Aliud Sicyonium efficacius.

Blaterij succi sextarios treis: aristolochiæ rotundæ & lōgæ, styracis, inulæ campanæ, byssopi, ireos, colocynthidis, pulegij, origani, iunci quadrans, thuris arboris, centaurij, foliorum lauri, uniuscuiusq; sextantem, olei sextarios quinque mixta, usq; dum succi exiguum relinquatur, decoque.

Cyprinum ex monumentis Posidonii.

Olei sextarius, cyperi, inulæ campanæ, iridis, singulorum lib. sampuschi, byssopi, seminis uiticis, saluiæ, cuiuslibet quadrans, floris cyperi lib. Alia quidem omnia uino per diē prius macerata, elixantur cū oleo horis sex: exēpto oleo puro, cyperus injicitur, si quidem ad manum sit, uiridis, cum mollibus tellisq; ramulis incontusis: sin minus, certe aridus. Contusus cum exigua aqua, coquetur hora una & dimidia. Quod si uolueris

uolueris ipsum tingere, postquam remotum ab igne fuerit, infere æruginis puri libram unam cum dimidia. Cæterum Posidonius ferruginis utans acrimoniam, post decoctionem (inquit) per triduum oleum in lebece perudo finito, tingeturque ita ut uirtus ipsius non lædatur.

Alia descriptio Cyprini.

Foliorum iunci quadrati, foliorum lauri, iridis, cyperi, saluie, singulorum uncie tres, arboris thuris, aristolochie longæ, seminis uiticis, cuiusque uncie quatuor, inule campanæ, aspalathi, cuiuslibet uncie sex, rutæ sextans, cupressi tantundem, olei sextarii decem. Hæc antea uino macerata oleo decoque: & ubi colata fuerint, injice rursum xylobalsami, & ligni cassie, singulorum trientem, sampsuchi, cymini, myrti, styracis, mastiches, cuiusque quadrantem, opopanax sextantem, floris cyprini uncias sex, æruginis unciam.

Amaracini compositio:

Inule campanæ libræ decem, ligni balsami libræ uiginti, cyperi libræ octo, floris rotundi iunci odorati, aspalathi, herbæ sabinæ, singulorum libræ octo, opopanax, seminis amaraci, cuiusque libræ duæ, olei præcipui honoris sextarii duo, uini odorati sextarii quinque: alia quidē omnia primam iniectionem uino irrigata constituunt: secundam autem, herba sabina. & illa quidem sex horis decoquantur, hæc uerò tribus. Quidam autem etiam illam tingentes, ferruginis quadrantem adijciunt.

Irii conficiendi ratio.

Iridis, aspalathi, cyperi, singulorum libræ quinque, succi panacis drans, anchusæ sextans, olei sextarii triginta, aquæ sextarii quindecim. Sunt qui ad hæc floris etiam iunci rotundi uncias sex apposuerint, cassieque quadrantem, xylobalsami uncias sex, nardi Celticæ uncias sex. Omnia cōtusa aqua & oleo diebus quinque prius macerata, in cacabo horis sex elixentur, & deponantur.

A a 4 5

Croci

Crocinum, in quo alterius etiam crocomagmatis compositio.

Olei omphacini amoeni odoris libra, calami aromatici librae quinque, myrrhae troglodyticae quincunx, cardamomi unciae septem, croci ex Cilicia unciae sex: primo quidem inciat calamus, & myrrha uino leuigata, prius reposita uncia, piperis albi grana quadraginta, myrrhae troglodyticae denarius, confusa & cribrata rursus in pila cōtere, adiecta olei nardini libra: quo autē atrius reddatur medicamentum, nucum cortices combustos & cōtritos in pilam conijce, deinde opobalsami cochliaria tria, cerae sesquilibram adijce.

De cenanthariis. Cap. 21.

OEnanthina non inde appellationem sortita sunt, quod cenanthen, hoc est labruscā suscipiant (quoniam nonnulla cenanthen non recipiunt) sed uinum ipsius, liliorum item flos nomenclaturam indidit. Ceterum cenanthariorū usus à quibusdam solius fragrantiae & deliciarum gratia adhibetur, ita ut eis utentes, post lauacra perfundantur, mensaeque ipsorum cum spongia abstergantur. Ceterum recte utentibus etiam praesidia conferunt, tum in dissolutis, tum syncope oppressis, si roborantibus stomachum cataplasmatibus admisceantur: his item qui ex morbo, maxime febrili refocillantur, si post lauacrorum exitum toto corpore perfundantur, & naribus etiam dum spirantibus adhibeantur. trahuntur namque in altum, & cum animalem, tum uitalem spiritum corroborant. Conducunt praeterea his qui praecautere, ne in morbos pestiferos incidant, student, quum aer huiusmodi mutationem habet. Est autē Posidonij, quod mesopotamenon appellatur, unguentum huiusmodi.

Oenanthii preparatio.

Cassiae, myrrhae, thuris, folij, amomi, mastichae, costi, earpobalsami & opobalsami, uniuscuiusque quadrans, styracis pinguis iriens, uini odorati Amineci Italici sextarij decem. Confusa omnia, & per secerniculū traiecta, styracem uerò in tenues partes diuisum, in spaciosi oris lagenam cum folijs liliorum

liliorum pridie tabefactorum, & unguibus detractis è domo una in alteram composito: sint autem lilia numero trecēta; deinde uinum infunde, & opobalsamum, mixtaq; simul & commota ante iniectionem, obstructioq; ore lagenæ dies quadraginta insolato, & balneo post restitutam sanitatē utere: & domo uasisq; ungento aspersis, & spongas etiam eodem imbutas faciei adhibeto.

Alia compositio nostra.

Costi quadrans, spicæ nardi, arnabo, cariophylli, singulorum uncia; amomi quadrans: cassiæ, ænanthes, calami, cuiusq; dodrās: styracis, opobalsami, cuiuslibet triens, lilia trecenta, uini Phalerni sextarij decē. Præparantur pari modo.

De thymiamatis & Cyphi. Cap. 22.

C*ypbeos materia media inter ea quæ in potu sumuntur, & antidota est. Vfus ipsius existit, nūc quidem grati odoris gratia incensi, quemadmodū & thymiamatū: nunc uerò narib. admoti, quo destillationes à capite in partes subiectas & coryzæ cōcoquat, obstructiones referet, cerebriq; cauernas expurget: & ad pestilenciales morbos euitandum. Iam per os etiā assumitur, cū hæc cōtra, tum ut pectoris crassos humores concoquat, & aduersus iocinoris frigidiores afflictiones: unde prisci quoque cyphoides antidotos inuenerunt. Temperatur autem remedijs compositis, sed potissimè epithematis & antidotis.*

Rhofatum thymiaia.

Habet costi, amomi, myrrhæ, cassiæ singulorum unciam, styracis chīæ, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, uniuscuiusq; denarios duos, rosarum purgatarum uncias undetrīginta, succi balsami momentum, uini quantum satis est:

Thymiaia Crinatum.

Liliorum unguibus detractis libram, styracis primi meriti dodrantem, spicæ nardi quadrantem, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchularū Indicarū crematarū, mellis, singula

singulorum seiscunciam, opobalsami quincuncem, uini quantum opus est, leuigato, & in pastillos digerito.

Cyphi magnum, quod Iliacum, id est Solarium cognominant, ex speciebus XX XVI.

Styracis, bdellij, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ Campanæ, cuiusque uncie sex: nardi Gallicæ, folij, seminis cupressi, guttæ ammoniaci thymiamatis, pinæ nucis nuclei, splanchni, uel loco ipsius conchularū Indicarum ingentium, fructus balsami, singulorum quadrans: cassiæ, ireos, sefeleos, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, cuiuslibet quincunx: rosarum aridarum, croci, spicæ nardi, herbæ sabinae, asphodeli radicis, alij uerò succi, singulorū triens: lacapthi (est aut pini cortex) uel alterius cuiuspiam arboris dodrans, costi, floris rotundi iunci odorati, cuiusq; sextans: baccae iuniperi magnæ quadraginta, & parue quinquaginta, ammoni, resine terebinthinæ, palmularum purarū, cuiusq; libra, ficuum aridarū acinis exemptis, uuarum passarum ex acinatarum, uniuscuiusq; libræ duæ, mellis despumati libræ quinque. Posidonius uini quoq; odorati sextarios treis adijciebat.

Aliud Cyphi ex uigintiocto compositum, Seleniacum, id est Lunare appellatum.

Bdellij, inulæ campanæ, singulorum septunx, rotundi iunci odorati sextās, sphagni quincunx, baccae iuniperi exiliores quinquaginta, cardamomi quincunx, aspalathi septunx, cassiæ fistulæ quincunx, spicæ nardi sextans, cyperi quincunx, radicis albuci, herbæ sabinae, singulorum triens, seminis cupressi, nardi Gallicæ, malobathri, cum folijs rosarum aridarum, cuiusq; quadrans, costi, croci, singulorum sextās, ladani, myrræ, cuiuslibet septunx, caricarum pinguium, uuarum passarū uinaceis exemptis, uniuscuiusq; libræ duæ, nucleorum pineorum bes, resinæ terebinthinæ libra, styracis septunx, palmularum pinguium libra, mellis libræ quinque, uini fragrantis quantum satis est.

Prepa-

Præparatio Masticha, quod uocant nonnulli
Masuaphium. Cap. 23.

Sertulæ campanæ deunx, ligni balsami, asbalasti herbæ
sabinae, myrrhæ, amomi, floris rotundi inucio dorati, fo-
liorū lauri, myrrhæ stillaticæ, styracis, calami odorati, sam-
puchi, singulorū sextans, ireos quincunx, folij, croci, unius-
cuiusq; uncia, opobalsami uncia dimidia, gummi libra, rosæ
rum siccarum uncia sex, uini quod satis est.

De pesis, ex Antyllo. Cap. 24.

Pesi mulierum utero admoventur. sunt autem differentiæ
eorū generatim tres. alij nanq; emolliendi, alij uerò astrin-
gendi, alij deniq; uasa meatuq; apericendi uim obtinēt. Emol-
lientium in fœminarum locellorum inflammationibus, hul-
ceratione, perfrictione, suffocationibus, auersionibus, ac in-
flationibus deniq; usus est. Conficiuntur autem è cera Tyre-
rhenica, cyprino, susino; pinguedine anserina uel gallinae
ceæ, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, fœnogra-
co, & id genus alijs. Aperientibus autem utimur, ubi men-
struam purgationem retentam prouocare, uel uteri conui-
uentiam, aut compressionem ipsius emendare statuimus. Fas-
bricatur eiusmodi ex melle, artemisia, diastamno, brassicæ
succo, glycyrrhiza, liquore porri, ruta, scammonia, & cono-
similibus. Astringentes autem contrariam facultatē, his quæ
aperiunt, præstant; muliebri nanq; profluiū comprimunt,
laxum contrahunt uterum, & prolapsum restituunt. Astringen-
tium materia iam pridem capite de Collyrijs enumerata
est. Oportet autem pessi crassitudinem strigmentosam, pau-
loq; crassiorem efficere, deinde lana gracili penicillo tortili,
ex lintcolis conceptis simili duplicata, medicamentum exci-
pere, locellorumq; muliebrium ori apponere, sic ut stuppam
oblongam propendentem habeat, quo faciliè, dum uidetur,
liceat pessulum extrahere.

Pessulus croceus, ad inflammationes, uersiones,
duritias, & inflationes.

Ceræ dealbatæ, medullæ uituli, singulorū denarij sedecim.
medullæ

medullæ ceruinæ denarij undecim, adipis anserini denarij octo, adipis gallinacei tantundē, mastiches denarij quatuor, æsypi pharmaci treis, mellis duos, croci octo, rosacei quantum opus est. Crocum lacte humano diluitur.

Aurei coloris emolliendi uim habens pessulus primi meriti.

Croci, æsypi, singulorum denarius, medullæ cerui denarij duo, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, cuiuslibet denarij tres, ouorum assatorum uitelli sedecim, irini & rosacei, utriusq; æquali modo quantum satis est.

Pessus Libanius menses ciens, & ad uteri affectiones eximie conducens.

Nardi unguenti uncia sex, ceræ Tyrrhenicæ quincunx, susini unguenti triens, adipis porcini non ueteris quadrans, adipis anserini & gallinarum, medullæ ceruinæ, unguenti amaracini, singulorum sextans, seui taurini, resinæ terebinthinæ, æsypi, cuiuslibet uncia. Eliquatur in diplomate, quem admodum omnes cæteri pessi.

Emnecapharmacus, id est e nouem rebus constans pessus.

Rosacei unguenti, rhicinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ atq; butyri, æquales partes.

Tianus, emolliendi ui præditus.

Ceræ uncia sex, colophonæ uncia quatuor & dimidia, adipis taurini, guttæ ammoniaci thymiamatis, singulorum uncia quatuor. Guttam ammoniacam aqua dissolue.

Pessus cognomento Aegyptia.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei, uel susini, croci, singulæ partes. In his autem quæ inflammatione uacant, & sordidis, ferruginis quæq; semissis inditur.

Gone ad concipiendum.

Habet butyri uncias sex, æsypi pharmaci, medullæ ceruinæ, adipis anserini et gallinacci, resinæ terebinthinæ, aloes, singulorum quadrantem, ceræ Tyrrhenicæ uncias sex, rosacei

cei libras duas, myrrha, cassia, uniuscuiusq; sextantem, spicae nardi unciam, mellis quantum satis est.

De Succedaneis, hoc est quæ in se commutantur, medicamentis, ex monumentis Galeni. Cap. 25.

Quam in Alexandria mulier quædam (inquit Galenus) graui morbo cum discrimine conflictaretur, lychnida mihi postulauit: quæ quum ad manum non esset, nisi cõfestim lychnidis loco acanthi semine, cuius tum copia erat, usus fuisssem, mulier interisset. Proinde amicorum precibus uictus, hanc de subsidiaria reciprocorum medicaminum commutatione expositionem iuxta alphabeti ordinem aggressus sum.

A

- | | |
|--|---|
| A Brotani loco sumitur Ori-
ganum. | Agarici, Euphorbium. |
| Absinthij, Abrotanum. | Agriostaphidis, Dactyli Sy-
riaci. |
| Acacia, Lentisci succus. | Alicacabi, Semen solani. |
| Acathæ, Cerasiorum acathæ. | Aloes Indica, Aloes uiridis
folia. |
| Acanthij seminis, Semen lychnidis. | Alterci seminis, semē rubicā-
nini, uel glauciæ, uel ster-
cus ibidis, uel lycium, uel
centaurium. |
| Aconiti, Radix ircos sylue-
stris. | Aluminis, sal feßilis. |
| Accori, Asari radix. | Amianti, aphroscelinon. |
| Alea, Glaucium, aut impu-
beris alui excrementum. | Ammi, Anisus. |
| Alea, Acantha. | Ammoniacy thymiamatis,
Propolis. |
| Adianti, Aphroscelinum. | Ammoniacy salis, Sal Cap-
padocum. |
| Adipis uulpini, adeps ursina. | Amomi, Acorus. |
| Adipis ceruini, adeps anseri-
na. | Amyli, Aridus pollen. |
| Aeruginis ferri, excrementum
ferri. | Amygdalorum amarorum,
Absinthium. |
| Aethiopica oliua, lachryma
acaciæ partes duæ. | |

Anacard

Anacardi, Psyscha herba,	Bdellij, sphagnus aromaticus.
Anchusæ, Hyacinthus.	Buccinorum, Ostrea.
Anisi, Daucus.	Buprestis, Blatta serpentes.
Adeps suillus, adeps uulpin.	Butyri, lactis bubuli congelatum.
Aracis, Sesamum.	
Armoracæ, Cardamomum	C
Babylonicum.	Cadmia loco, leucophragis
Aristolochiae rotundæ, Aristolochia longa.	Aegyptia.
Argemones, Seriphe, aut Seriphon.	Calaminthæ, Mentha sylvestris.
Armeni lapidis, Atramētum	Calami odorati, Sphagnus.
librariorum Indicum.	Calliceræ, Foenogracum.
Asari, Gingiber.	Camili, Antutus.
Asbesti, id est calcis uiuæ, Asdarce.	Conchrij, Baccæ lauri.
Asij lapidis, Gagates lapis,	Cantharidum, Phalangia.
uel sal Ammoniacus crematus.	Capparis radicis, Radix ericæ uel myricæ.
Aspalati, Semen uiticis, uel ericæ.	Cardamomi, Ciperis ammoniacæ.
Asphodeli radicis, Beta succus.	Castia mænæ, cinnamomū.
Atramenti sutorij, Squama aris.	Castorij, blatarum pedentium interanea.
Auripigmenti, Sādaracha.	Cadmia, Leucographæ Aegyptia, Cyrannia.
B	Cedria, Cedride.
Baccarum lauri uice, Serpyllis arida.	Ceraunini, Leucographis.
Baccarum cedri, ladanum.	Ceruinae adipis, Suilla.
Balaustij, Malicoria caduca.	Ceritæ, Ostrea.
Balsami succi, stillatitia myrrha.	Ceræ, Sepimētum cum propoli coquitur et cōteritur.
	Cerui adipis, Adeps anseris.
	Ceruicornu, Cornu caprilum.
	Cerussa, Scoria plumbi.
	Chal.

- Chalbānes, Sagapenum. nis marini. (ca
 Chalcantbi, Aeris squarā. Crocomagmati, Aloe Indi
 Chamæleontis succi, Succus Cymini, Semen brassicæ.
 salicis, uel lapathini syluati Cymini Aethiopici, Melan
 cæ radicis. thium.
 Chamædryos, Rumicis sylue Cinaræ radicis, Radix aspa
 stris radix. lathi. (men.
 Chamæmeli, Anthemis. Cynosbati, Alicacabi se
 Cicis, Strigmentū palestrarū. Cyperi, Iuniperus magna.
 Cicidis, Myricæ fructus. Cypheos, Carica cremata.
 Cicutæ seminis, Semen cori- Cyrenaici liquoris, Syria-
 andri. cus liquor.
 Cedrini liquoris & fructus, Cucumeris, Anchusa.
 Ladanum. D
 Cineris cypriæ, Cinis folio- Daphnidum loco, Scrpil
 rum oleæ. lum aridum.
 Cinnabaris, Rodoides. Dauci seminis, Semen sui.
 Cinnamomi, Castiæ duplum. Didamni, Saluia. (us.
 Cissebati, Semen alicacabi. Diphrygis, lapis phrygi-
 Clinopodij, Heliotropium. Dorycnij, Semen alterci.
 Cnidij seminis, Viticis semen. Dracunculi, Aphresimum.
 Colocynthidis, Semen ricini, B
 quod est crotonis. Beni uice, Lotinū aridū.
 Colophonie, Apochyma, Ra Ebisci radice, Folia mos
 sura nauigij. ri.
 Comaræ, Ammoniacum thy Elaterij succo, eiusdem her
 miana. bæ succus. (Nepita.
 Corallij, Moly. Elelisphaco, id est saluia;
 Costi, Cedrini fructus. Helleboro nigro, Radix pa
 Cotyledonis, Anacardium. pyris.
 Crinathemi, Aphrodisium. Eneaphyllo, Potamogitū.
 Croci, Crocomagma. Epithymo, Colocynthidis se
 Crocodyli adipis, Adeps ca men.

Bbb

Ericæ

Ericæ fructu, Galla omphacutis.

Brini folijs, Fimus ibidis.

Brisei folijs, Mori folia.

Erucae semine, Brysimi semen.

Brysimi semine, Struthium

Euphorbio, Stercus palubis.

Bupatorio, Chamæpytis.

F

F *ellis cameli uicem gerit, Fel ascalabotæ.*

Fellis muris aranci, Fel cameli.

Fellis hyenæ, Fel perdicis.

Fellis simiæ, Fel cameli.

Fellis uiperæ, Fel ichneumonis.

Fimi palubini, fimus columbae.

Fimi æluri, Fimus ichneumonis.

Floris salis, Sandaracha.

Floccium uini, seu fecula, Sandaracha.

G

G *ymnasiorum strigmentum, succedit gallæ.*

Galbani, sagapenum.

Gentianæ radici, Apj odorati radix.

Glichoni, Hyssopus.

Glycyrrhizæ succo, Sicami ni succus.

Gongilidi, Heliotropium.

Gryphonis retrimenti, fimus columbinus.

H (cum.)

H *ederæ succo, Persici succo, Hedichroo, Amaracini.*

Humida pice, Succus panacæ.

Hyacintho, Flos isaicos. (cis)

Hyenæ adipe, Vulpis adeps.

Hyenæ felle, Fel perdicis.

Hyoſcyami semine, Rubicæ ni ni semen.

Hyperico, Anethi semen.

Hypocistidis succi, Acaciæ succus.

I

I *ontis uice, sumitur Atramentum.*

Ippuridis, Chamæpytis.

Iridis Illyricæ, Helenium odoratum.

Iteæ succi, Succus leissiatræ.

Iunci odorati, Cardamomum.

Læci rotundi, polygoni radix.

L

L *achrimæ papaueris, succus mandragoræ accipito.*

Ladani, Sampsuchum.

Lanariæ radici, ueratri nigri radicem.

Lapathi radici, Pyrethri radicem.

Lapidis pyritæ, Lapidem pyro-

pyrobolum. (argyriten. Meliloto, Lotum syluestre.
 Lapidis Phrygi, Lapidem Melle, De frutum sapá ue.
 Lapidis magnetis, Lapidem Melle Attico crudo, mel alia
 Phrygium. ud diffumatum.
 Lapidis asy, Lapidē gagatē. Meo, Myrobalanum. (ri.
 Lathyridū, Granū cnidiū. Myrsinite uino, Succus mo-
 Lepidij, Erythrodanum. (ris Misyi Cyprio, Rubrica piclo
 Lepidij radici, Folia cappa rum cypria.
 Leporis marini, Cancrum Muscerdæ, Musca tantundē.
 fluuialem. Molibdæna, Spuma argenti.
 Leucini floris, Strution. Mororum succo, Rubi folia.
 Libani, Ampeliten. Myrobalano, Peucinum.
 Ligni balsami, radicem uiolæ candidæ. Morrha Troglodytide, Calam-
 mū odoratus.
 Lini seminis, Fabæ succum. Myrti oleo, Lentiscinum.
 Loti seminis, Betæ semen. Myrto, Succus mori.
 Lybisci, Semen staphylini. Misy, Succus Cyprius.
 M Misy affato, Diphryga.

N

Malobabri loco, sumitur Ardi Syriacæ loco, Iuno
 Cassia, uel nardus Indica, N cus odoratus.
 Tractylus. (licum. Nepitæ, Menta syluestris.
 Magnesena uitrea, labrū Ita Napyos, Gongylidis semen.
 Malis cotoneis, Melilotum. O
 Malua, Fœnogræcum. Cimi uice sumitur Sisy-
 Malo terræ rotundo, Malū brium
 terræ Longum. (ma. Ocimoidis, Syluestris mēia.
 Mandragora, Oleæ lachry Oenanthes succi, Ampelini
 Mandragoræ succo, Dorica arboris.
 Māna, Thuris cortex. (niū. Oesypi, medula uituli.
 Marsinati, liquor mori. (tex. Olei rhicinini, Oleū laurinū.
 Mastichæ, iunci rotundi cor Olei ueteris, Duplū olei coq̃a
 Medulla cerui, Adeps cerui, aur, cū adipe suillo uetere.

Bbb a Olinus

Oliuæ Aethiopicæ, Lachry

mæ acaciæ partes duæ.

Oleæ lachrymæ, Hypocisti

dis succus. (ra.

Omphacis, Galla immaturo

Onocardia, Psicolotanis.

Opobalsami, Succus myrsi

tini.

Opocarpasi, Liquor myrti.

Opoponacis, Lac sycamini.

Orizæ, Hordeacea farina.

Ormini, Lini semen.

Oenithogallorū, Anthalli.

P

Papaueris locum supplet

Mandragoræ succus.

Peristreonis, Chameluce.

Picis liquida, Opopanax.

Pityocampæ, Vespæ in ce

Piperis, Zingiber. (dria.

Polij seminis, Semen erucæ.

Polypodij, radix Chame

læ, uel Chamæleontis.

Polytrichi, Absinthium.

Populi nigrae furculorum,

sampsychus.

Propolis, Ladanum.

Psilij, Lenticula palustris.

Pterci, Cnecori semen.

Pulegij, Hyssopus.

Pyrethri, zingiber.

Pumicis, terra Cretica.

Phu, Sphagnus.

Phuci, Anchusa.

Q

Ro Quercus uisco, Cha

mæleon.

R

L Oco Rapæ, Heliotropiū.

Radicis rumicis, Cinira.

Rhaphanini olei, Rhiciniū.

Resinæ piceæ, Resina tere

binthina.

Resinæ colophonice, Apo

chyma.

Rhodæidis, Sinopi.

Rosarum siccarum, Persæ

folia sicca.

Rotundi iunci odorati, Car

damomum.

Rhu, Centaurium. (mæ.

Rubi canini, uescaginis se

Rubiginis ferri, Scoria fer

ri.

Rubrica pictorum, Misi cy

prium.

Rumicis, Pyrethri radix.

Recremēti plūbi, Helcisma.

Recremēti Cyprii, Atramē

tū metallicū Ægyptium.

S

L Oco Sabini, accipitur

Oleum rhicininum.

Sagapeni, Pini resinæ arida.

Salamandræ, Lacerta uiri

dis.

Salis ammoniaci, Sal cappa

docicum.

docicum.	niculi.
Saluiæ, Nepita.	Sphagni odorati, Rotundus
Săpsuchi, Rhus Megaricus	iuncus odoratus cultus.
ficcus.	Sphec le, Sandaracha.
Santonici, Abrotanum.	Sphodeli, Cypriæ cinis.
Sarapoidis, Radix pæonice.	Stapbydis satina, Dactyli.
Satyri, semen Bruce:	Stercoris uulturis, Fimus co-
Scammonia, Crotones rhi-	lumbinus.
cini.	Stercoris turturis, excremento
Schœni odorati, Cardamo-	tum palumbinum.
mum.	Stimneos secti, Squama æ-
Schini, Polygoni radix.	Styracis, Castorium. (ris.
Scillæ, Bulbus.	Strobilorum, Semen cucume-
Scingi, Satyrium.	ris.
Scordy, Caput albi papauca	Struthij radicis, Radix uera
ris.	tri nigri.
Scoriæ plumbi, Helcisma.	Strychni radicis, Veratrum
Scoriæ Cypri, Melantheria	nigrum.
Aegyptia.	Succi carpassi, Succus myrti.
Seminis hypocistidis, Traga	Succi peucedani, Succus gly-
canthæ semen.	cyrrhizæ.
Sēperuini liquoris, Laſuce	Succi rhododaphnes, Viscus
succus.	quercinus.
Sepiæ testæ, Pumex.	Succi fici, Succus mori.
Serpylli, Potamogiton.	Succi Cyrenæici loco, Succus
Sesami, Semen lini.	Syriacus.
Sesamoides, expressum ama-	Succi papaueris, Succus man-
racinum.	dragoræ.
Sinapis, Cardamomum.	Succi salicis, Nigræ hederæ
Sisonis, Anisi.	succus.
Sisymbri, Ocimum uel Basi-	Succi gallæ, Succus mori.
licum.	Succi mori, Succus hederæ.
Sparagi Lybica, Radix fœ-	Succi Syriaci, Mori succus.
	Bbb 3 Succ

Succi panacis, Lac Sycami
 ni.
 Succi polygoni, Succus plan-
 taginis.
 Sulphuris uiui, Sandaracha.
 Symphyti, Centaurium.
 Syrici, Spuma argenti.

T

Vicem terræ Samiæ gerit
 Leucographe Argyp-
 ptia.
 Terræ Erythriadis, Calx
 Thebaica.
 Terræ apalæ, teneræ uel Plū-
 bago.
 Terræ asteris, Cimolia.
 Thapsiæ, Elydrion.
 Thapsiæ succi, Chamæleotis
 atri succi.
 Thermutiadis, Lycopsolos.
 Thymi, Satureia.
 Thuris, terra ampelitis.

Tithymalli, Chamæleon.
 Tiscendra, Asphodeli radix.
 Troximi, Maiunium.
 Trixaginis, radix rumicis
 syluestris.

V

Verbasci loco sumitur Cha-
 meleuca.

Veratri nigri, Radix papyri.
 Vini Italici, Vinū Mendesiū.
 Vuæ passæ satiuæ, Palmulæ
 synacæ caro.
 Visci quærnei, chamæleon a-
 ter.
 Vulpini adipis, Vrsinus adeps.
 Vulturis stercoris, fumus colū-
 binus.

X

Xylbalsami loco, Violarū
 albarum radix.

Z

Zingiberis uice, Pyrethrū.

De ponderibus & mensuris. Cap. 28.

Ponderis mensura grauitate dydicatur: mensura, conca-
 uitate uasis. Vas autem sicca quantitatis aut humide mē-
 sura est. Est igitur quantitatis quæ mensuratur, triplex diffe-
 rentia: una quidem ponderis: altera arida essentia, quæ ue-
 luti in cumulum potest aggerari: tertia liquidarū rerum est.
 Quum autem plurima & infinita ferè pondera ac mensuræ,
 pro regionum diuersitate, & eorum qui utuntur consuetudi-
 ne existant, de ijs modò quæ in communi maximè omniū usu
 cœmentur, mentionē facere instituimus.

De

De ponderum & mensurarum notis.

Quandoquidem autem aliqui non integris literis, sed per characteres, notasq; quum pondera, tum mēsuras significā: satius fuerit nos quoq; priscos in hac parte sequi, primitusq; ipsos characteres explicare. Principio igitur χ litera quotiens α insidet, Chalcum, hoc est, creolum eiusmodi figura χ portendit: si uerò o incumbat, choan, id est congiū signat, hoc modo χ. si α, choenicē, χοι. si η, chemā, χ. Ceterū K siquidem i literā incumbētē habeat, cū recta linea inferius cornu per obliquū secāte, ceratiū, id est siliquū demonstrat, sic K^o. Sin^o supra K insideat, cyathū, K^o. si o, cotylā, hoc est hemianam, K^o. Quod si linea utrinq; in obliquū circumflexa nihil aliud circūstāte pingatur, obolū ostēdit, ∞. si geminā, quas nihil circūstāt, lineae ponūtur, binos obolos significant, ∞. qui grāma, hoc est scrupulū faciūt, quod litera γ annexum habēs p, à recta quadā linea dissecū, significat p^o. Duae autē lineae copulae, atq; altera extremitate in angulum flexa instar K duorum cornuum ad rectam lineam spectantium, drachmam, qui denarius est, ostendunt, <. cui cognominis est quam holcam indigitant. Proprie autem holcam λ cui in medio litera o adiecta est, protendit, hoc modo λ. At ubi ipsi λ appositum est, libram declarat, λ. Nonnulli uerò eadem litera ab altera litera λ linea oblique diuisa libram significant, λ. Porro quum γ litera in ipso sui angulo o adjacentem habet, unciam indicat, fo. uerò ubi in uerticis medio^o superimpositum habet, minam μ. Sin v habeat, mystrium, μ. Si e, medimnium, μ. Si o, modium denotat, μ. Ceterum τ cui g cum^o apposita est, triblion significat, τ^o. & supra se^o positum habens, xestam, id est sextarium, ξ. si^o suprapositum, oxybaphū, id est acetabulū ξ^o. Quidā uerò xestam per ξ literā recta linea secā designant ad hunc modū ξ. Si u incubit litera μ, heminā ostēdit, sic, μ. n completēs g, incubit litera u, ceraniū significat, hoc modo K^o.

Bbb 4

De

De ponderibus.

Mina Attica & Aegyptia	uncias continet	16
Mina Romana	Uncias habet	20
Libra	Uncias	12
Uncia	Drachmas, id est denarios	8
Drachma	Scrupulos	3
Scrupulus	Obolos	2
Obolus	Siliquas	2
Siliqua	Aereolos 2. duasq; tertij partes Ital.	
Obolus	comprehendit Aereolos	8

De liquidis mensuris.

Ceranium Italicum	complectitur congios	8
Congius, siue Chus, Sextarius		6
Sextarius Heminas, quæ & tryblia dicuntur,		2
Hemina, siue tryblium, magna Mystra 3. acetabula uerò		4
Magnum enim Mystrum	habet acetabulum	1
Acetabulum	continet Cyathum	1.5
Cyathus Chemas paruas, aut mystra parua		11

Quod si ponderum liquidarum rerum mensuram dyjudicare laboras, permulta quidem in examine suo deprehēdes discrimina, quemadmodum in olei, uini, & mellis exemplo explanabimus. Mel igitur grauius quā uini quarta parte ac decima est, quo fit, ut pars ponderis tantum non tertia melli accedat: habet etenim eadem uini mellisq; mensura totum uini pondus, & insuper eius tertiam. Oleo uerò mel dimidia parte grauius est. complectitur enim totū olei pōdus, & eius præterea dimidium. Vinum uerò nona parte oleum grauitate excedit. totum namq; ipsius pondus et nonam eius partem continet. Quæ res ut dilucidior reddatur, omnium mensurarū pondus, formula subiecta, tanquam in tabula depicta, sigillatim subiungemus, ut quid hæc communiter disti deant, liquidò constet, liquores hosce, oleum, uinum, & mel, ex ordine ob oculos constituentes.

Italicum

Italicum ceramium continet libras

Olei 72. Vini 80. Mellis 108.

Chus siue congius continet libras

Olei 9. Vini 10. Mellis 13.5.

Sextarius continet uncias

Olei 18. Vini 20. Mellis 17.

Cotyla seu hemina continet uncias

Olei 9. Vini 10. Mellis 13.5.

Magnum mystrum continet uncias

Olei 3. Vini 3. scrup. 8. Mellis 4.5.

Acetabulum continet drachmas

Olei 17. Vini unc. 2. scrup. 12. Mellis drach. 27.

Cyathus continet drachmas

Olei 12. Vini 12. scrup. 4. Mellis unc. 2. den. 2.

Mystrum paruum continet drachmas

Olei 6. Vini scrup. 20. Mellis denar. 9.

Cæterum Oribasius secundum Adamantium asserit, sextarium quidem Italicum, mensura uini habere uncias uiginti quatuor, pondere uero libram uncias octo: sextarium autem mellis librarum duarum cum dimidia pondus complecti.

De mensuris aridorum.

Aegyptia Artaba continet Modios 5.

Modius Aegyptius & Italicus Chœnices 8.

Chœnix complectitur Sextarios 2.

Sextarius, semisextarios, quos & heminas nuncupant, 2.

Hemina comprehendit Cyathos 8.

Atticus Medimnus hemicœta, id est semisextarios 12.

Hemiedum siue Semodius continet Chœnices 4.

Si c Medimnus continebit Minas 48. Sextarios 96.

Istiusmodi autem mensurarum pondus exprimere expeditum non est, quod aridarum rerum discrimina iuxta lancis momentum infinita existant.

Bbb 5 PON

762 PAUL. ÆG. LIB. VII.
PONDERV M, Q VIBVS VSVS
passim interpres est, nomenclatura &
expositio.

Duodecima pars asis	Vncia, græcè οὐνία. 1.	
Sextans	Vncia	2
Quadrans	Vncia	3
Triens	Vncia	4
Quincunx	Vncia	5
Semis uel semissis, & selibra, seuunx	Vncia 6. uel lib. 5	
Septunx	Vncia	7
Bes uel besis	Vncia	8
Dodrans	Vncia	9
Dextans	Vncia	10
Deunx	Vncia	11
As, uel asis, libra, pondo	Vncia	12
Dupondo	Libra	2
Tripondo	Libra	3
Sescuncia	Vncia	1.5
Semuncia	Vncia	5
Denarius	Drachma	1

PAULI ÆGINETÆ LIBRI SE
ptimi & postremi finis, Albano Torino Vito
. durenfi interprete..

ERRATA.

Pag. 10. uers. 28. Inflammatoria 14. 3. brumæ et 11. mer-
curiali 22. 5. sedos 24. 9. ipsius 29. 6. noxiam 45. 28. ab
sorptos 46. 16. obstructos 58. 19. dura et 20. gammari et
24. terrestris 75. 23. naturalis & 25. altitudine 76. 15.
differentijs 77. 3. longum & 8. contractionis 79. 26. au-
tem 85. 26. corpus 86. 7. quietis 107. 17. moliendam
112. 6. inunctiones 113. penult. esculenta 130. 4. ceu 137.
3. elaterium 143. 2. aliquot 147. 4. ex 149. 7. iecur 151.
4. adhibendæ & 19. tardam 153. 21. fit 161. 20. medica-
menta 164. 28. conuulsionib. 168. 30. scarificato 169.
20. Attici 179. antepen. impositi 207. 10. uelut obtorto
209. 13. extrahatur 244. 19. succus 245. 18. refertur
250. ult. huc 363. 7. non inquinat 269. 23. immitte 247.
21. enneapharmacum & 22. Est autē 279. 2. decocta
287. penult. narib. 290. 16. horminum'ue 295. 10. infans
302. 20. humorib. 321. ult. cardamomum 333. 25. pondere
345. 22. Dioscorides 391. 2. eis 396. 9. Ab 418. 12. cele-
rem & 23. summamq; 420. 17. & susp. 430. 17. Mu-
sculorumq; 435. 18. palpebra 439. 2. maiore 451. pe-
nult. sanguinis 461. 28. interuallum 499. 2. regioni et 26.
denudatam 501. 6. catus 511. ult. Tantum 523. 28. ferulas
525. 8. magnus 528. 28. existit.

In cæteris æquus lector minus offendetur.

DE PAVLO AEGINETA, HIERONYMI Gemusæi iudicium.

Paulus hic noster, ut propria quidem philosophiæ naturalis principia non attigit, quippe quæ ad superiorem artificem pertinent: ita quæcunq; ab hisce deinceps sequuntur, atq; artis medicæ peculiaria sunt problemata, ea uniuersa in hanc Epitomen digessit. Eaq; propter, nostro seculo hic autor profectò longè est accommodatissimus. Siue enim hominem in Phisicis questionibus exercitatum accipiat, ab illis ipsis quæ in naturali philosophia is postrema didicerit, exorsus, reliquam artem totam superstruit, & magno certè compendio omnibus modis absolutissimum artificem facit, dum ea quæ multi non sine magno negotio, & nonnunquam cum auditoris fastidio in medium adferunt, in iucundissimam & facillimam breuitatè redigit: siue is ignarus & philosophiæ rudem auditorem sit nactus, tum iubet ut subiectis problematibus, quæ apud Naturales postrema ostenduntur, tandiu fidem illis citra demonstrationem adhibeat, donec inde factò artis initio, compertum habuerit, quo pacto ex ijs problemata & præcepta medicinæ confirmantur, stabilianturq;. Quæ sunt sub conditione scientem eum efficient, quatenus uidelicet sint demonstrata. Quòd si postmodum antiquis illorum audire cupiat, ad Naturalem artificem accedat oportet. Veluti post συνολογία de elementis, de temperamentis, quot sint numero, & quæ sint: de proportionem elementorum ad constitutionem mixtorum, de facultatibus consequentibus quamq; mixtionē: et post definitionē sanitatis, quòd sit symmetria calidi, frigidi, humidi, et sicci, aut omnino mediocritas cōpositionis. Et morbi, quòd huic sit cōtrarius. Sequitur problema artis, quibus nā sanitas cōseruetur, aut morbus quib. tollatur: et ostenditur illud similibus fieri, hoc cōtrariis. Quo loco deinceps sequuntur quæstiones alie, quæ quibus sint similia,

milia, aut quæ quibus contraria sint. Calida frigidis sunt
 contraria, pleno uacuum est contrarium, salubria symme-
 tris sunt similia. quæ sint salubria aut calida, aut frigida.
 Vbi mox diuiditur disciplina in partes duas, unam de tuen-
 da sanitate, alteram de curandi ratione. Illam docuit Pau-
 lus libro primo, qui respondet sex libris Galeni de tuenda sa-
 nitate, & tribus de Alimentorum facultatibus. Hanc uerò
 in sex libris sequentibus, qui respondent reliquis operibus
 Galeni, quæ iuxta doctrinam compositiuam fuere conscri-
 pta, quibus docetur uniuerſa medendi ratio. Atq; hæc om-
 nia huius artis uidentur eſſe propria. Porro ægritudinum
 aliæ in ambitu totius conſiſtunt: ueluti ſunt ex ſimilarium
 partium ægritudinibus, febrium genera. Aliæ in una par-
 te corporis figuntur, ac pro earum differentia uarias ap-
 pellationes ſortiuntur. Expoſitionem febrium habet liber
 ſecundus, in quo primum docetur, quomodo ſit cognoscen-
 dum, utrum ſalubris an letalis, morbus ſit futurus: & num
 breuis an diuturnus, & omnino quæ ad doctrinam iudicio-
 rum & dierum iudicialium, eorumq; cognitionem & præ-
 notionem pertinent. Quæ omnia reſpondent libris de diebus
 Criticis, & de Criſibus. Quæ deinceps ſequuntur, aut expo-
 ſitionem habent ipſarum febrium, earumq; differentias &
 cauſas continent, & reſpondent libris Galeni de febrium
 differentiis: aut ſigna cuiuſq; generis, & tum communem
 omnibus, tum propriam unicuiq; curationem, & reſpon-
 dent ſeptem, poſtremis de Methodo medendi, & libro ad
 Glauconem primo. Poſtrema pars habet doctrinam acci-
 dentium, quæ febres conſequuntur. Tertius liber, morbo-
 rum omnium, per ſingulas partes corporis graſſantium ex-
 poſitionem continet, initio ſumpto à capite. is reſpondet ma-
 ximè tractationi de Locis affectis, & iſ quæ de Compoſitio-
 ne medicamentorum iuxta locos inſcribuntur. Liber quar-
 tus eſt de morbis, qui non in ſola qualitatum intemperie,
 ſed ſub

sed substantia aliqua ijs qualitibus prædita ad partes flu-
ente, consistunt, & proinde tumorē in corpore excitant, ac
nullum medicorū latere possunt. ut sunt Erysipelata, Phle-
gmone, Oedemata, Phymata, Phygela, Struma, Elephan-
tiasis, Psora, Lepra, Vitilignes, Tumores duri (scirros ap-
pellant) & quæ huius generis cum sint, referuntur ferè ad si-
miliarium partium uitia: uelut unitatis solutio. ex quo genere
sunt quæ de uulneribus, de ulceribus, de sinibus, fistulis, neruo-
rum uulneratione, de uenarum aut arteriarum profluuiio, et
omnino de ijs quæ extra corpus sunt, & sensum propius ad-
mittunt, ac proinde facilius cognoscuntur. E' quibus illa pe-
tuntur ex duobus postremis de morbis curandis, ac libro se-
cundo ad Glauconem. hæc uerò respondēt libris prioribus
de curandi ratione, maximè autem tertio, quarto, et quinto.
Item ijs de compositione iuxta genera, uelut quæ de neruo-
rum uulneribus dicuntur, petita sunt è libro tertio. ulcerū cu-
ratio, è libro sexto. Et differunt hæc inter se, quatenus in me-
thodo medendi inuentionem cuiusq; magis prosecutus uide-
tur, & rationem præceptorum demonstrasse: in hoc au-
tem cuiq; suam materiam accommodasse, & præceptorum
usum frequentioribus exemplis patefecisse. Sequens liber,
tum animalium uenenatorum, tum pharmacorum letalium no-
xas continet. hic ex magna parte desumptus est ex ijs, quæ
Dioscorides de eadem parte tradidit tribus libris, septimo,
octauo, et nono. Sextus ea habet, quæ instrumentis chirurgi-
cis peraguntur, & maiorem apparatus postulāt, uelut sunt lu-
xata & fracta, & in uniuersum articulorum & ossium, &
partium instrumentariarum uitia, quæ per chirurgiā emen-
dantur. Hæc sanè sextum librum methodi maximè affinem
habent: quanquam hanc partem post Hippocratem nullus,
peculiares ad id libros instituens, ita absoluisse uidetur ut fe-
cit Paulus, ut etiam hoc nomine sit ἀνταγιστὶς, tota hæc
traditio. Galenus uidetur contentus fuisse editis commenta-
rijs ijs

r̃ys in libros Hippocratis, quibus hæc pars artis continere-
 tur, ut sunt, κατὰ ἰατρικῶν liber unus, πρὸς ἀφθέρων libri tres, et
 totidem πρὸς ἀναιμῶν. quod maius esset operæ præcium relia-
 quam artem emendasse quæ rationem haberet difficiliorē,
 ac proinde magis ambiguam, & improborum medicorum
 udibrijs expositam. Libro septimo, qui postremus est, ma-
 eriam exponit & instrumenta, per quæ fit curatio, ac præ-
 mum simplicium medicamentorum naturam tradit, quæ pars
 respondet libris Galeni πρὸς ἀπλῶν φαρμάκων. post deinde
 compositorum medicaminum expositionem facit, docens il-
 lorum & modum componendi, & facultatem atq; usum.
 In primis autem, quorum aut ipse libris præcedentibus men-
 tionē fecerit, aut singulare quodpiam auxiliū cognouerit.
 Et primum de purgantib. agit, ac simplicibus. quæ pars re-
 spondebit libris Galeni de purgantium medicamentorum fa-
 cultatibus, de his quos purgare oporteat, quibusq; medica-
 mentis, & quo tēpore. Item locis alijs in quibus finitima hæc
 præcepta ab ipso tradita fuere: uelut libro sexto ὑγιεινῶν do-
 cet triplicē compositionē hieræ picræ, libro primo δὲ κατὰ
 τόπαις, medicamēti quod ex colocynthide et scammonio præ-
 paratur. Sequitur pars de Antidotis, ac respondet libro Ga-
 leni eodē titulo, necnō ijs quæ de Theriaca ad Pāphiliαν,
 quæq; ad Pisonem scripta fuere. Post hæc sunt quæ foris
 adhibentur, ueluti smegmata, emplastra, unguenta, acopa,
 synchrismata. Horum omnium modi, præpara-
 menta & usus, in δὲ κατὰ γένη ferē
 petuntur.

FINIS.

BASILEAE, SUMPTI-
 bus Ioan. Oporini, 1551. Mense
 Martio.

by Gentles y^e m^ore
for a legd^e m^ore
and a R^eg^e

Teis is doctor h^om^ore
book h^om^ore
f^o r^oking and m^ore
m^ore m^ore h^om^ore
op^oter and a h^om^ore
m^ore h^om^ore h^om^ore
g^od f^or h^om^ore

god f^or d^o op^oter
and wh^o op^oter

At the Doctor

moste povere wch. and
g. 1. 10. 10. 10.

10. 10. 10. 10. 10.

10. 10. 10. 10. 10.